

S. 804 B



HISTOIRE

DE

L'ACADEMIE

ROYALE DES SCIENCES.

ANNÉE M. DCCXLIII.

Avec les Mémoires de Mathématique & de Physique, pour la même Année.

Tirez des Registres de cette Académie.



A PARIS,

DE L'IMPRIMÈRIE ROYALE.

M. DCCXLVI.





POUR

L'HISTOIRE.

PHYSIQUE ET HISTOIRE NATURELLE.

THIS QUE ET THIS TOTAL THAT CHEEL	ه استاد
SUR les Couleurs accidentelles. Pa	ge r
	-
Sur la formation de la Glace dans les grandes Rivières.	8
Observations Météorologiques & Botanico-météorologiques.	15
Sur l'Ouie des Poissons, & sur la transmission des sons l'eau.	dans 22
Leçons de Physique expérimentale, tom. I & II.	27
Diverses Observations de Physique & d'Histoire Natur	elle.
I. Sur la Scintillation des Etoiles fixes.	28
II. Pierres ponces vues sur la mer, entre le Cap de Bonne-Espé	rance
& les Isles de Saint-Paul & d'Amsterdam.	32
III. Parélie observé à Reims.	33
IV. Sur un Arc-en-ciel extraordinaire vu en Dalécarlie.	35
V. Sur le Haussement vrai ou apparent de la Mer auprès de	cer-
taines Côtes.	40
VI. Hauteur extraordinaire du Baromètre.	41
VII. Bouteilles d'une fragilité singulière.	43
VIII. Expériences sur l'Electricité.	45
IX. Sur la distribution méthodique des Coquillages, & descri particulière d'une espèce de Buccin ou de Limaçon ten	ption ostre.
	45
X. Sur une espèce de Ver qui vient à la langue des Chiens.	48
1743.	

XI. Grand Os fossile trouvé en Bourgogne. XII. Grand morceau de Cryslal rempli d'Amiante. XIII. Ivoire rendu flexible & transparent.	51 52
ANATOMIE.	
Sur les Monstres.	53
Sur le Strabisme.	68
Sur la formation des Os, & sur la réunion de leurs fracti	ures. 69
Divers Ouvrages & diverses Observations d'Ana	tomie.
I. Sur la Respiration.	71
II. Sur l'introduction de l'Air dans le corps animal.	77
III. Elémens de Médecine pratique.	81
IV. Sur la question si le Cœur se raccourcit ou s'il s'along se contracte.	e lorsqu'il 83
V. Organe de l'Ouie.	85
VI. Sur le dedans extraordinaire de la bouche d'un en Bec-de-lièvre.	
VII. Double Matrice.	86
VIII. Muscle singulier.	87
IX. Ovaires où l'on a trouvé des cheveux, des os & des e	dents. 88
X. Taille latérale.	89
XI. Douzième Vertèbre du dos d'un homme, traversée pa d'une lame d'épée qui s'y cassa.	r le bous
XII. Suites d'une Blessure à la tête.	91
XIII. Paralysie sans sentiment, quoique les mouvemens de	
insensible ne soient point détruits.	92
XIV. Autre Paralysie de même nature.	95
XV. Odeurs communiquées au corps animal.	96

CHYMIE.

Sur les Eaux minérales de Saint-Amand en Flandre. 98

Diverses Observations Chymiques.

I.	Effet remarquable du Remède de Mue Stephens.	99
II.	Sur deux espèces d'Etains alliez.	IOI
III.	Huile caustique pour marquer le linge.	104
IV.	Pierre de Bologne.	105
V.	Sels Neutres.	106

BOTANIQUE.

Observations de Botanique.

Ĩ.	Sur la culture du Riz.	107
II.	Sapins fossiles.	110

ARITHMETIQUE.

Sur les Nombres Premiers, & sur les différentes puissances des termes de la suite naturelle des nombres, avec la manière d'en dresser des Tables.

ALGEBRE.

Sur le Cas irréductible du troisième degré.

119

GEOMETRIE.

Nouvelles Démonstrations des principales propriétés de la Cycloïde.

ASTRONOMIE.

Sur l'Inégalité des Hauteurs du Soleil au folstice d'été, & sur l'Augmentation apparente de l'obliquité de l'Écliptique depuis quelques années.

* 1

De l'Orbite de la Lune dans le Système Newtonien.	123
Sur la Conjonction de Mars avec Saturne & Jupiter.	129
Passage de Mercure par le disque du Soleil, le 5 Nos	vembre
1743.	131
Sur les deux Comètes qui ont paru cette année, & fur	l'Orbite
de celle de 1729.	136
Sur les Réfractions Astronomiques.	140
Sur le Gnomon & l'Obélisque de la Méridienne de Saint	Sulpice.
	142
Théorie des Cometes.	147
Ephémérides des mouyemens célesles.	149
Diverses Observations Astronomiques.	
I. Comète de 1742 observée à la Chine.	150
II. Anciennes Observations de la Chine sur l'obliquité de	-
III. Carte céleste.	151
IV. Petit Calendrier.	153
Projet de Cartes de la France. Cartes des Côtes & des Mers des Indes orientales & Chine, avec des Mémoires sur ces Côtes & sur ces N.	154 r de la
des Instructions concernant les voyages qu'on y peut fait	
M E' C H A N I Q U E. Leçons élémentaires de Méchanique. Traité de Dynamique. Traité de l'art de la Corderie.	164 164
M E' C H A N I Q U E. Leçons élémentaires de Méchanique.	164

Machines & Inventions approuvées par l'Académie en 1743.

I.	Machines à faire remonter les Bateaux, & à brifer les Rivières.	
	acs Revieres.	167
H.	Machine hydraulique.	168
III.	Machine peur deubler les Soies & pour leur donner le l'usage des Fabricans de Bas au métier.	
	y .	170
IV.	Pantographe.	171
V.	Horloge d'une demi-minute pour l'epération du Lok.	172
I Toge	de M. le Cardinal de Fleury.	175
Eloge	de M. l'Abbé Bignon.	185
Eloge	de M. Lémery.	105





POUR

LES MEMOIRES.

SUR les Eaux minérales de Saint-Amand en Flandre. Par M. MORAND. Page 1

De l'Orbite de la Lune dans le Système de M. Newton. Par M. CLAIRAUT.

Designes M en de rendre le Bleu de Prove plus solule à l'air, & plus sacile à préparer. Par M. GEOFFROY. 33

Me : . . . for l'i mondre d'ut se serment les Glaçons qui flottent sur les grandes rivières, & sur les disférences qu'on y remarque lorsqu'on les compare aux glaces des eaux en repos. Par M. l'Abbé Nollet.

Ministe où l'en prouve qu'il y a une inégalité très sensible dans les plus grandes hauteurs du Soleil au solslice d'été, & que l'obliquité apparente de l'Écliptique a augmenté depuis 1738, d'environ un quart de minute ou quinze secondes. Par M. LE MONNIER Fils.

Sur le Zinc. Second Mémoire. Par M. MALOUIN. 70

Quatrième Mémoire sur les Os, dans lequel on se propose de rapporter de nouvelles preuves qui établissent que les Os croissent en grosseur par l'addition de couches ofseuses qui tirent leur origine du périoste, comme le corps ligneux des Arbres augmente en grosseur par l'addition de couches ligneuses qui se sorment dans l'écorce. Par M. DU HAMEL.

- Cinquième Mémoire sur les Os, dans lequel on se propose d'éclaireir par de nouvelles expériences comment se fait la crûe des Os suivant leur longueur, & de prouver que cet accroissement s'opère par un méchanisme très-approchant de celui qu'observe la Nature pour l'alongement du corps ligneux dans les bourgeons des Arbres. Par M. DU HAMEL.
- Differtation fur les Couleurs accidentelles. Par M. DE BUFFON. 147
- Extrait de quelques Observations Astronomiques, saites au Collège Mazarin pendant l'année 1743. Par M. l'Abbé DE LA CAILLE.
- Observation Anatomique. Par M. DU HAMEL. 191
- Observations de la Comète qui a paru au commencement du meis de Février de cette année 1743, & de l'orbite de la Comète de 1729. Par M. MARALDI. 193
- Mémoire sur l'Ouie des Poissons, & sur la transrussion des sons dans l'eau. Par M. l'Abbé Nollet. 199
- Addition au Mémoire sur le Cas irréduclible du troissème degré, imprimé dans le volume de l'année 1741, page 25. Par M. NICOLE. 225
- Dissertation sur la cause du Strabisme ou des Yeux louches, Par M. DE BUFFON. 231
- Suite du Mémoire sur les Réfractions. Par M. CASSINI DE THURY. 249
- Observations Botanico Météorologiques pour l'année 1742, faites aux environs de Pluviers en Gâtinois. Par M. DU HAMEL.
- Observation du Passage de Mercure sur le disque du Soleil,

Later 1	- 4	475	Y	7.9
	α	8.4		3-6
- 1	13	1.7	L	ونسال


faite	à	l'Observatoire	Royal	le 5	Novembre	1743.	Par
M.	M	ARALDI.					28 I

- Sixième Mémoire sur les Os. Par M. DU HAMEL. 288
- D. la Control of Mark and Salam & James Par M. Cassini.
- Remarques sur les Monstres. Cinquième & dernière partie.
 Par M. WINSLOW. 335
- Conjonction inférieure de Mercure au Solcil, observée à Paris le 5 Novembre 1743. Par M. LE MONNIER Fils. 359
- Chabrada (l'églife de Saint Sulpice. Par M. LE MONNIER Fils.
 - Septième Mémoire sur les Os. Détail d'une maladie singulière pendant laquelle une Fille a perdu à différentes sois presque tout l'humerus, sans que son bras se soit accourci, & sans qu'elle en ait été du tout estropiée. Par M. DU HAMEL.
 - Observation du Passage de Mercure devant le disque du Soleil, faite le 5 Novembre de cette année 1743. Par M. CASSINI. 372
 - Troisième Mémoire renfermant plusieurs Observations sur une maladie du Siphon lacrymal, dont les Auteurs n'ont point parlé. Par M. Petit. 390
 - Observations Météorologiques faites à l'Observatoire Royal pendant l'année 1743. Par M. MARALDI. 400
 - Sur une Conjonction de la Lune à l'Étoile \u03c4 du Sagittaire, avec des Recherches fur la plus grande inclinaison de l'Orbite au plan de l'Écliptique, & sur la plus grande Latitude de la Lune. Par M. LE MONNIER Fils. 403

 Mémoire

Mémoire sur disserentes Pétrifications tirées des Animaix et des Végétaux. Par M. l'Abbé de Sauvages, de la Société Royale de Montpellier. 407

Extrait d'une Lettre de M. Dehfle, écrite de Peterflourg le 24 Août 1743, & adressée à M. Cassini, servant de supplément au Mémoire de M. Delisle, inséré dans le volume de 1723, p. 105, pour trouver la Parallaxe du Soleil par le passage de Mercure dans le disque de cet Astre. 419



ERRATA pour l'Histoire de 1742.

Page. Ligne.

19, 21, 1732, lisez 1731.

St. S. \ \ \land \ \la


So, 9610, Deshaies Meurisse, lisez Deshaies & Meurisse.

108, antep. 25000 ans. lifez 25000 ans!

174, 14, de son, lisez du.

175, 20, 1661, lisez 1651.

177, dern. après ces courbes, ajoûtez, de même que celles qui passent par les points où l'on observe une certaine déclinaison, & qui s'écartent plus ou moins des premières,



HISTOIRE

DE

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES.

Année M. DCCXLIII.

PHYSIQUE

E T

HISTOIRE NATURELLE.

SUR LES COULEURS ACCIDENTELLES.



E Système de Newton sur les Couleurs, si V. les M. conforme aux loix de la Réfraction, & si in-P-147-dépendant de tout autre Système, même de celui de la propagation de la Lumière, soit par émission de corpuscules, comme dans les

odeurs, soit par vibrations de pression, comme dans les sons,

Hist. 1743. A

2 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

emporte aujourd'hui presque tous les sustrages. Ce système, que M. de Busson expose en peu de mots à la tête de son Mémoire sur les Couleurs accidentelles, se lie parsaitement avec ce que nous allons dire ici de ces couleurs; mais nous le supposerons sussiliamment connu, & nous pourrions même,

à la rigueur, nous en patler.

On ne sçauroit avoir un peu réfléchi sur les qualités senfibles des corps, telles que la lumière & les couleurs, les odeurs, la chaleur, les sons, les saveurs, sans être pleinement convaincu qu'elles ne sont rien en eux qui ressemble le moins du monde au sentiment que nous éprouvons à leur occasion: configuration de parties & mouvement, vibrations communiquées au fluide qui est entreux & nous, & qui vient frapper les organes de nos sens, c'est à l'égard des corps tout ce qu'ils ont de réel pour la production de ces qualités que nous leur attribuons. Ce que je vois en regardant cette prairie éclairée du Soleil, ce que j'entends dans l'air émû par les frémissemens de cette cloche, ces modifications de mon être en tant que sensible, que je qualifie de lumière, de couleur & de son dans les objets qui en excitent chez moi la fensation, ne feur appartiennent certainement pas davantage que la douleur ou la piqure que je sens à ma main, lorsqu'on en divise les sibres, appartient au fer qui me blesse. Toute la dissèrence qu'un sentiment confus me porte à imaginer entre ces deux espèces de senfations, relativement aux objets qui les font naître, n'est fondée que sur la sage institution de la Nature qui nous livre sans danger à l'erreur dans celles qui ne nous touchent que foiblement, mais qui ne permet pas que nous nous trompions à l'égard des autres, en tant qu'elles nous avertissent de la destruction actuelle ou prochaine de nos organes. Ces impressions légères, ces perceptions qui ne semblent affecter nos sens d'aucune trace corporelle, nous les répandons volontiers sur les corps qui nous environnent; mais la douleur ou un plaisir vis nous rappellent trop sortement à nous-mêmes, pour nous laisser ignorer que ce qui se passe

alors en nous, est uniquement à neus, & ne seauroit appartenir aux objets extérieurs: là on ne croit qu'agir, apercevoir, juger, ici l'on ne peut se cacher que l'on sent. Les qualités sensibles des corps, &, pour ne parler que de celles dont il s'agit dans cet article, les Couleurs, ne sont donc en un sens qu'apparence & illusion, & n'existent récllement dans les corps qu'on nomme colorez, que par l'espèce de sumière qu'ils sont capables de restechir vers nous, & qui constitue telle ou telle couleur, ou ensin par les vibrations communiquées par eux au milieu propre de la lumière, & portées

jusqu'au fond de notre œil.

Cette théorie générale nous conduit à celle-ci, que toutes les fois que par quelqu'accident, ou par quelque cause interne ou externe que ce soit, les sibres de notre ners optique, ou celles de notre cerveau qui leur répondent, seront Chrankes de la même manière qu'elles ont coutume de l'ene par la lumière & par les couleurs, nous verrons de la lumière & des couleurs femblables à celles dont la prefence des corps lumineux & colorez a coûtume d'exciter en nous le sentiment. Il n'est personne qui ne l'ait éprouvé mille fois, ou par un coup subitement reçu sur les yeux, ou par l'indisposition ou la simple lassitude de l'organe, ou en prefiant volontairement le coin de l'œil, ou en songcant; car les couleurs & les images que nous voyons dans nos songes, ne sont pas moins vraies à notre égard que celles que nous apercevons en ouvrant les yeux sur une vaste campagne.

De-là cette division bien naturelle des Couleurs, en Couleurs réelles dans le sens que nous l'avons expliqué, nécessaires & permanentes, du moins tant que les parties extérieures de l'objet demeurent les mêmes, & en Couleurs accidentelles & variables qui ne résident absolument qu'en

nous.

Lorsqu'après avoir r gardé fixement le Soleil, on vient à fermer les yeux, ou que, les yeux ouverts, l'on entre tout-à-coup dans un lieu obseur, on voit succettivement

HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROTALE

fur le disque du Soleil qui demeure empreint dans l'imagination, & plus souvent comme sur une muraille, du blanc, du jaune, du rouge, du verd, du bleu ou du violet, & ensin du noir, à peu près dans l'ordre des couleurs prismutiques, & quelques sis sur sordre & à diverses repuises, selen que les obrantemens & les convulsions du ners optique s'atsoiblissent plus ou moins promptement; couleurs vraiment accidentelles, & qui changent sans qu'il arrive aucun changement à la surface des corps auxquels nous les rap-

portons

Observous aussi que les couleurs réelles se peindront constamment & dans tous les cas sur le fond de l'œil, même inanimé & separe de l'animal, au lieu que les couleurs accidentelles & variable, uniquement propres à l'œil vivant, & entièrement dûes à des mouvemens dont nous renfermons actuellement la cause méchanique, n'ont pas même dans nos yeux, & au moment où nous les voyons, cette existence taperficielle des premières. Car il ett plus que vrai-femblable que les couleurs accidentelles ne sont accompagnées sur le fond de l'œil d'aucure peinture qui s'y rapporte, ou plutôt qu'e les mutifient pur le seul ébranlement intérieur qui nous en fait éprouver la fenfation, malgré la peinture toute différente des couleurs réelles qui ne cessent point de se projeter dans l'œil, lorsqu'il est ouvert sur des objets éclairez, & dont resulteroient d'autres ébranlemens, d'autres sensations, s'il se trouvoit dans son état ordinaire.

Les Couleurs accidentelles peuvent donc être produites par une infinité de causes, & sont innombrables par leurs nuances, comme les couleurs réelles & nécessaires. L'examen n'en est pas moins curieux que de celles-ci, & il a cet avantage qu'il peut conduire plus directement à la connoiste de contra la guérison des maladies de l'organe qui en est le sujet.

Quelques Auteurs ont parlé des couleurs accidentelles de transperson la fensation par le trop grand ébranlement, ou par la trop grande tension de l'œil; mais personne avant.

M. de Buffon, n'avoit remarqué la correspondance systèmatique de ces couleurs avec celles qu'on nomme réelles; par exemple, que le rouge y produit le verd, qu'au jame succède le bleu, & que ces couleurs accidentelles mêices avec les réelles donnent les mêmes phénomènes que ces dernières mêlées avec d'autres de même nature; correspondance qui s'accorde parfaitement avec la théorie expliquée en 1738*, * Mém. p. 26 des vîtesses de vibration ou de transport du fluide, ou des corpuscules lumineux, selon le système Newtonien, & par l'analogie des chranlemens plus ou moins prompts de l'organe avec ces vîtesles.

Parmi les expériences que M. de Buffon a faites sur les Couleurs accidentelles, & qu'on trouve dans son Mémoire, nous en choifirons une, qui est la première, & qui suffira pour faire sentir l'étendue que pourroit avoir cette recherche.

Si l'on regarde fixement & long-temps une tache, par exemple, un petit carré de papier rouge sur du papier blanc, on verra naître autour du carré rouge une espèce de couronne d'un verd foible; & si, en cessant de regarder ce petit carré, on porte l'œil sur le papier blanc, on y apercevra très-distinctement un carré d'un verd tendre tirant un peu fur le bleu, & de la même grandeur que le carré rouge. Cette apparence, ce carré verd imaginaire, subsiste plus ou moins long-temps, selon que l'impression de l'organe, qui s'y rapporte, a été plus ou moins vive, & il ne s'évanouit qu'après que l'œil s'est porté successivement sur plusieurs autres objets dont les images, & la nouvelle impression moins forte que la précédente, ont délasse & rétabli les sibres de la Rétine ou de la Choroïde dans leur état ordinaire. On concoit assez que des taches d'une autre couleur & d'une autre figure sur des fonds d'une autre couleur donneront d'autres apparences analogues à celles-ci, & qui se combineront entr'elles de mille façons différentes.

Ces expériences etant faites avec des couleurs brillantes, comme on en voit dans les métaux polis, réussiront encore mieux qu'avec des couleurs mattes, comme sont celles du

A iii

6 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

papier & des étoffes; car ce brillant, ou une plus grande qualitie de l'unitée reflechie, l'uigue plus promptement l'un me de le rond pur la plutot i deeptible des chrandemens

qui produisent en nous ces illusions.

M. de Buffon a fait éprouver celles dont nous venons de parler, & dans les mêmes cas, à plusieurs personnes, qui toutes ont vû les mêmes apparences, c'est-à-dire, des apparences de même nom; car on sçait qu'il n'y a nulle certitude que les mêmes objets colorez réveillent en différentes performe qui les recadent, les memes fenfations de couleur, & nous en pourrions dire autant par rapport aux saveurs & à toutes les autres qualités sensibles; ce que j'appelle verd, un autre peut fort bien le voir comme ce que j'appelle jaune ou violet. Le Monde sensible est plein de ces mal-entendus, mais on ne laisse pourtant pas de s'entendre & de convenir julipra un certain puliit, but jaan applique confluiument les mêmes dénominations aux mêmes causes extérieures, de ce que l'on sent de part & d'autre. Ainsi les expériences de M. de Buffon répétées par d'autres Phyficiens, & suivies en ce sens des mêmes essets, fortifieront d'autant plus les inductions qu'il en tire par rapport à l'optique & à l'organe de la vûe du commun des hommes.

Une maladie ou une incommodité fort ordinaire de cet organe, sur-tout chez les gens d'étude & les Observateurs, est celle des taches obscures ou points noirs qu'on voit voltiger sur le papier & sur les autres objets éclairez. Le fré pant usage du microscope de des lunctes d'approche, ces expériences mêmes sur les couleurs, sont très-capables de la produire, & M. de Busson qui s'y est exposé par tant d'endroits, ne l'a pas évitée; mais c'est dans son Mémoire qu'il faut lire le détail qu'il en fait, & comment il en est guéri.

Ce Mémoire finit par une observation bien digne de remarque, & dont M. de Busson s'étonne avec raison que les Physiciens & les Auteurs d'Optique n'ayent point parlé. Les ombres des corps qui par leur nature doivent être noires, pais par les constitent que dans la privation de la lumber,

& qu'en effet elles ne présentent ordinairement à l'œil que du noir, sont toûjours colorées au coucher & au lever du Soleil. M. de Buffon a observé plus de trente Soleils levans, & autant de Soleils couchans où les ombres qui tomboient fur une muraille blanche ou sur du papier blanc, étoient vertes, & plus souvent bleues, mais d'un bleu aussi vif que celui du plus bel azur. Le phénomène se soûtient dans toutes les saisons, & depuis qu'il est annoncé, d'autres personnes très-exercées à observer, l'ont vérissée. M. de Busson s'étant abstenu d'en donner la cause, nous ne tenterons point ici de l'expliquer. Ces couleurs doivent apparemment être mises au nombre des couleurs réelles, & se peindront sans doute fur le fond de l'ail & dans la chambre obteure qui fournit un des principaux moyens de les diftinguer d'avec celles qui

ne sont qu'accidentelles.

On peut ajoûter à la suite de ces illusions & de ces réalités d'optique, & sans sortir de la théorie sous laquelle nous venons de les confidérer, ce qui se passe à l'égard de certaines couleurs, telles que le bleu & le verd, vûes pendant la nuit à la famière des lampes & des bougies, avec l'echange vrai ou apparent qui s'en fait; car on sçait qu'il est trèsdifficile de les diffinguer, ou plûtôt de ne les pas prendre presque toûjours l'une pour l'autre. Sur quoi nous remarquerons seulement que ces deux couleurs, qui sont contigues dans le Speche ou image folaire que donne le prisme, dissèrent vrai-temblablement beaucoup moins entr'elles par leur méchanisme, comme par leur réfrangibilité, que celles qui sont séparées dans la même image par d'autres couleurs intermédiaires. Mais on peut demander si ce verd qu'on voit alors comme bleu, & ce bleu que l'on prend pour du verd, sont réels ou accidentels? Se peignent-ils au fond de l'œil conformément à la sensation qui en résulte? Ce seroit sans doute un sujet de recherche assez curieux & assez sécond, & qui influeroit peut-être sur les Arts, & principalement sur la Peinture. En général il ne paroît pas que la réalité de telle ou telle confeur vue à la lumière du jour, doive

S HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE en exclurre une autre dans la même furface colorce vûe à

la lumière pale & imparfaite des flambeaux, dont les rayons chaquez d'une infinite de corpufeules hetérogenes peuvent fouffir de tout autres refrictions que les rayons du Soleil, & fe filtrer tout autrement en paffant par le milieu qu'ils ont à traverser.

SUR LA FORMATION DE LA GLACE DANS LES GRANDES RIVIERES.

V. Jes M. p. 51. M. TAbbé Nollet nous a donné sur ce sujet un Mémoire qui a pour but de faire voir, que la Congélation des Rivieres ne commence pas par seur sond, comme quelques personnes s'ont pense, muis par seurs bords & par seur superficie, comme on convient qu'il arrive aux étangs, &,

en général, à toutes les eaux dormantes.

Ouelque système que l'on tuive sur la formation de la Glace, il paroit que l'eau qui se durcit & se gèle, ne reçoit un tel changement que par le contact ou par l'approche de quelqu'autre corps dur ou fluide, dont le degré de frojdeur surpatie celui qu'elle avoit actuellement, & va tout au moins jusqu'au froid de la congélation. Ce ne peut donc être que par la superficie, par la partie la plus exposée à l'action de ce corps ou de ce fluide, de l'air, par exemple. que l'eau commence à se glacer; & c'est aussi ce que l'expérience confirme en général. Si dans un temps de gelée on pretente à l'air froid un gobelet plein d'eau, on verra bientot paroîtie à la superficie de cette cau de petits filets de glace, qui venant à se multiplier, & à se joindre bout à bout, ou latéralement, ou sous une certaine inclinaison, y formeront d'abord une espèce de réseau, une pellicule. Ex entin une l'ime fensible de glace, plus ou moins épaisse, selon que le froid sera plus ou moins grand. Et s'il étoit possible que ces premiers filets ou ces glaçons naissans le termatient au defious de la superficie de l'eau, ils y monteroient

monteroient aussi-tôt par leur légéreté, puisque la pesante et specifique de la glace et le comme on sçait, beaucoup moindre que celle de l'eau dans son état de liquidité. Ainsi les premières masses sensibles des glaçons qu'on y apercevroit, se trouveroient toûjours à la superficie. Les bords des rivières doivent être glacez avant leur courant, non seulement par cette raison, mais encore parce que l'eau y est plus tranquille, moins prosonde, & plus près d'un terrein déjà refroidi par l'air extérieur.

Par quelle circonstance extraordinaire ces gros glaçons qu'on voit flotter au milieu des grandes rivières se seroient ils donc formez au fond de l'eau ou sur le terrein qui est au dessous, avant que de monter à la superficie? La froideur de ce sond & de ce terrein n'étoit-elle pas avant la gelée moindre que celle de la congélation? Le froid qui a du se saire d'abord sentir dans l'atmosphère n'a-t il pas dù aussi frapper la surface extérieure du liquide avant que de pénétrer jusqu'à celle du sond & jusqu'au terrein qui lui est

contigu?

A une théorie se simple & se lumineuse on oppose l'expérience, ou, pour parler plus exactement, le témoignage d'un nombre de gens fort peu en état de discerner & de constater l'expérience; car ce mot prononcé au hazard ou fur de légères apparences fut toûjours le bouclier de ceux qui ne scauroient rien approfondir par eux-mêmes, ou se donner la peine de raisonner. Les meûniers, les pêcheurs, les bateliers, les matelots des grandes rivières & le peuple qui en fréquente les bords, déposent unanimement en faveur du préjugé, que la glace se forme au fond des rivières & sur le terrein de seur lit plûtôt qu'à la surface de l'eau; ils disent en avoir vû monter les glaçons, ou les en avoir arrachez avec leurs crocs, s'ils n'aiment mieux attribuer cet effet au Soleil qui les détache, disent-ils, du fond où ils s'étoient formez pendant la nuit, & les attire pendant le jour vers la superficie. Il faut convenir cependant que quelques-uns en donnent une meilleure raison, scavoir, qu'on

aperent touvent for un des cotes des glacons flottans, des verliges non equivoques du terrein & du gravier fur lequel ils to lent formez, & fur lequel en effet ils paroiffent avoir séjourné quelque temps avant que de rouler avec les eaux. Mais ces glaçons ne viendroient-ils point des bords de la rivière, des itles, des banes de table & des bas-fonds qu'elle rencontre dans son cours, & d'où ils auront été détachez & entraînez vers le courant? Ne faudra-t-il pas aussi en attribuer un grand nombre aux ruisseaux & aux petites rivieres qui se jettent dans la grande, & qui par leur peu de Luquer & la proximite de leurs bords n'en fauroient guère fournir que de cette espèce? car on ne peut douter que ce ne soit, du moins en partie, à de semblables causes que font dus ces glacons que les grandes rivières charient pendant les fortes gelees. Quoi qu'il en foit, l'Académie consultée plus d'une sois sur cette question, s'en est toûjours tenue a la theorie génerale, conformement à l'idee & aux observations de ceux d'entre ses Membres qui ont le plus travaillé sur les phénomènes de la Glace.

Mals voici un Physicien distingué par la sagacité qu'il fait paroître dans les experiences les plus delicates, qui excepte le cas dont il s'agit de la théorie générale, & qui embrasse les dont vulgaire. M. Hales de la Societe Royale de l'ondres, dans son excellent livre de la Statique des Végétaux, traduit de l'Anglois en Irancois par M. de Busson, dit formellement avoir vû en même temps sur une rivière & la glace de la superficie, qui avoit un tiers de pouce d'épaisseur, & à travers celle ci une autre glace adherente au sond, Inquelle étant rompue se trouva de près d'un demi-pouce. Cette g'ace de dessous se joignoit, ajoute t-il, a celle de dessus au bird de l'eau, & les deux lits de glare s'eloignoient de plus en plus l'un de l'autre à mesure que l'eau devenoit plus profonde. Il attribue cet effet au courant de l'eau. « Comme l'on n'a jamais vû, dit-il, les étangs, ses mares, & toutes les eaux estates assumentes à se deux sentres se les eaux en les des des des des la courant de l'eau.

[»] calmes commencer à se glacer par le fond, il faut nécessai-

[»] rement que le courant de l'eau en soit la cause dans les rivière.

car il est sûr que dans les eaux calmes, aussi-bien que dans la « terre, la surface est bien plus froide que le dessous, au lieu « que dans les eaux courantes le dessus & le dessous se mêlant « ensemble, deviennent à peu-près aussi froids l'un que l'autre, « & le dessus ayant toujours plus de vîtesse que se dessous, & «

pas plus de froid, il ne se glace que le dernier. »

Il faudroit donc sçavoir si l'obstacle que le mouvement apporte à la congélation de la surface de l'eau, peut prévaloir sur celui que le moins de froideur doit causer vers le sond. Mais nous n'examinerons point ici une raison qui ne sçauroit être admise qu'autant que le sait qu'elle suppose, seroit certain. Il ne s'agit que de le constater ce sait, ou de le détruire, ou de démêler ce qu'il pourroit y avoir d'équivoque. Le témoignage de M. Hales méritoit bien une pareille discussion, d'ailleurs assez curieuse par elle-même, & digne de tous les soins que s'est donné M. l'Abbé Nollet pour la rendre concluante & décisive.

Il remarque d'abord, 1° Que les observations rapportées par M. Hales, ont été faites dans un endroit de la rivière qui sert d'abreuvoir, & où par conséquent elle avoit peu de profondeur.

2" Que la glace qu'il y a vûe n'ayant qu'un tiers de pouce d'épaisseur, n'a pû lui permettre de marcher dessus, pour l'examiner plus avant.

3° Que le témoignage des pêcheurs est si souvent employé dans ce récit, qu'il est à craindre que M. Hales n'y ait mis

trop de confiance.

Il convient qu'en général le dessous de la glace qui se forme sur les rivières n'est point uni, comme on le voit ordinairement à la glace des eaux dormantes; qu'il est moins compacte, & comme enduit d'une poussière de petits glaçons plus ou moins grumelez, en cela assez semblable aux pierres qu'on tire de la carrière, & qui sont couvertes de cette partie tendre qu'on nomme le bousin, comme les bateliers appellent aussi cette espèce de glace; que de plus on y trouve souvent de la terre & mille petites saletés, telles qu'il peut y en avoir

12 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

au fond des rivieres. Mais M. l'Abbe Nollet ethbien doigné de cro', e que ces glaçons fe foient formez fur ce fond & au dessous de l'eau, comme on le suppose, & qu'on les y ait vû adhérens. Ce n'est pas qu'il n'ait pû arriver quelquesois à des bateliers de retirer de gros morceaux de glace avec leurs croes à quelques pieds de pretendeur aupres des bords des rivières, mais ce n'est sans doute que parce qu'il arrive souvent qu'apres une gelee faivie d'un commencement de de jul. les rivières viennent à grossir, & à se geler de nouveau, avant que la glace qui s'étoit formée la première fois à leurs bords, ait fondu, ou s'en soit détachée. Il n'en a pas fallu davantage à des gens sans principes & peu exercez à douter, pour leur saire croire qu'une pareille glace s'étoit sormée au dessous de l'eau. Voilà le préjugé établi, on ne manque pas ensuite de personnes plus éclairées qui l'adoptent & qui l'autorisent; muis on peut hardiment nier le fait tel qu'ils le supposent, julqu'à ce qu'il ait été mieux vérifié, car tout au moins faut-il que l'expérience soit incontestable pour faire preuve contre des principes évidens, ou pour en fonder l'exception.

Cependant M. l'Abbé Nollet n'en demeure pas là, il. cherche la cause de cette dissérence que l'on remarque entre les glaçons des rivières, & ceux des étangs & des eaux

dormantes.

Pendant la gelée de cette année, & lorsque le thermomètre de M. de Reaumur étoit beaucoup plus bas que le terme de la congélation, il sit ouvrir de la glace épaisse de plusieurs pouces sur la rivière de Seine & en des endroits où l'eau avoit 9 à 10 pieds de prosondeur. Le glaçon enlevé, il vit contre son attente que le bousin qui y étoit attaché, ressembloit très-souvent à celui qu'il avoit observé plus près du rivage, il y remarqua les mêmes saletés, & il s'aperçut aussi que la surface de l'eau en étoit couverte, quelque soin qu'on prît de les en ôter.

Le bousin mêlé de toutes ces saletés monteroit-il ainst du sond vers la superficie, & seroit-ce par cette voie qu'il entre ceuit à la putie interieure de glaçon, qu'il rencontre?

Pour s'en éclaireir, M. l'Abbé Nollet fit venir un tonneau dont on ôta les deux fonds, il fit faire dans la glace un trou de même diamètre, & il y plongea perpendiculairement le tonneau jusqu'aux trois quarts de sa longueur; il forma de cette manière une espèce de puits d'où l'on enleva bien-tôt tout le bousin qui en couvroit l'eau; après quoi il n'en vit plus, & il demeura convaincu que cette poussière, ces débris, &, pour ainsi dire, ces gravois de glace avec toutes les matières étrangères qui s'y attachent, obéissent au courant, ne se fixent point aux endroits où la gelée les a sait naître, &

ne viennent point du dessous de l'eau.

D'où viennent-ils donc, ou plûtôt quelle est la cause de leur formation? Il n'est pas mal-aisé de l'imaginer. Une infinité de petits glaçons formez sur toute la superficie de l'eau, & principalement vers ses bords, sont entraînez, choquez, brifez, atténuez de toutes parts, & quelquesois arrondis par d'autres glaçons & par le courant même, avant qu'ils ayent eu le temps de grossir, ou de s'unir; poussez contre la surface inférieure des grandes pièces de glace, ou jetez au dessus par les vagues, les uns s'y attachent plûtôt ou plus tard, selon que mille cas fortuits les y déterminent, tandis que les autres continuent de rouler avec le courant; enfin chargez de toutes les particules de matière étrangère qu'ils portent avec eux, ou qu'ils rencontrent sur leur chemin, de terre, de vase, d'écume, de paille, de brins d'herbe, ils forment au deslous, aux côtés, ou au dessus des gros glaçons, tantôt cette espèce de duvet rare & spongieux qu'on y observe, tantôt cette superficie apre & grumeleuse qui n'y est pas moins ordinaire, & où l'on croiroit voir l'empreinte d'un terrein fur lequel its auroient pris naissance. Et il ne faut pas douter que parmi tous ces glaçons qui couvrent les rivières pendant les fortes gelées, il ne s'en trouve plufieurs où cette apparence d'empreinte n'est pas trompeuse, & qui retiennent même des fragmens de la rive dont ils se sont détachez, ainsi que nous l'avons sait entendre au commencement de cet extrait; mais ceux-ci, selon M. l'Abbé Nollet, sont en HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

très-petit nombre. En un mot, on n'a nullement besoin de recourir à la prétendue congélation du fond de l'eau, pour expliquer les différences qui caractérisent les glaçons des grandes rivières, comparez à ceux des eaux dormantes, & c'en est assez pour ôter toute sa force au grand argument

de l'opinion vulgaire.

Mais en admettant toutes ces explications comme vraifemblables, & même suffisantes, ne pourroit-on point demander encore s'il est bien prouvé que le lit des rivières en un temps de gelée, ne se refroidisse pas plûtôt que la surface extérieure de l'eau ou du terrein exposé à l'air? car enfin il y a une chaleur centrale ou soûterraine, quelle qu'en soit la cause, dont les essets ne sont pas douteux, & dont la temp rature aduelle de l'atmorphere participe infiniment, ou n'est en grande partie que le résultat, conjointement avec ce qu'il faut en attribuer aux causes générales & particulières Ménizzo, de la vicissitude des saisons*. Cette chaleur qui varie sans cesse auprès de la surface de la terre, mais dont la privation totale ne feroit du Globe terrestre qu'une masse de glace, interceptée ou diminuée par des circonstances que nous ignorons, & qui entrent peut-être pour beaucoup dans la cause de la gelée, ne donneroit-elle pas occasion à un plus prompt refraidiffement du fond du lit des rivières & de l'eau qui en approche, par cela même qu'il est plus profond & à couvert de l'air extérieur qui n'en a pas encore senti la diminution? J'avoue qu'il n'y a pas grande apparence à cette conjecture, & que d'autres effets, tels, par exemple, que celui de la glice qu'on ne trouve jurnis au dels de quelques pieds fous terre, s'opposent manifellement au sujet de doute qu'on en pourroit tirer dans la question presente. Ne neglig ons point cependant de diffiper ce doute par l'inspection même du fait.

M. LAbb Nollet a plong' pluficurs fois & en différentes années des thermomètres au fond de la rivière, soit au commontement de la gelée, foit lorf jue la glice de la fuperficie avoit 2, 3, 6 & julqu'a 8 pouces d'épaisseur, & il n'a jamais

1.131.

15

trouvé l'eau de ce fond au degré de froid nécessaire pour la convertir en glace. Il est vrai qu'elle en a quelques approché, mais ce n'a été qu'après plusieurs jours d'une forte gelée, & nullement lorsque la glace de la superficie n'avoit que trois quarts de pouce d'épaisseur, encore moins lorsqu'elle n'étoit que d'un tiers de pouce, qui est le cas où M. Hales suppose qu'il s'en étoit formé une de demi-pouce sur le fond même.

Nous ne suivrons point M. l'Abbé Nollet dans un plus grand détail de ces observations qu'il déduit avec beaucoap de clarté, non plus que dans l'examen de quelques autres phénomènes de la glace & de la gelée qu'il a touchez par occasion, & qu'il faut lire dans son Mémoire.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES ET BOTANICO-METEOROLOGIQUES.

Les travaux les plus brillans & qui demandent le plus de pénétration & de finesse per le pénétration & de finesse, ne deviennent pas toûjours les plus utiles aux hommes, & sur-tout à la postérité. Des observations affidues sur la conflitution de l'air, les variations & les différens poids de l'atmosphère, une histoire suivie & bien circonstanciée des vents, des pluies, des météores, du chaud, du froid, dans chaque année, dans chaque saison, & chaque jour; une comparaison continuelle de toutes ces viciffitudes avec la production des fruits de la terre, & avec le tempérament, la fanté & les maladies des habitans; toutes ces observations faites avec soin pendant plusieurs années. pendant plusieurs siècles, & dans chaque pays, produiront vrai - semblablement quelque jour une Agriculture & une Médecine plus parfaites & plus fûres que tout ce qu'on pourroit espérer des spéculations les plus sublimes de la Physique dénuées de ce secours.

Travailler en faveur de la postérité ne fait pas cependans

16 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

une occupation bien fuisfaillante pour le commun des hommes; il en est peu que la reconnoissance qu'ils doivent à ceux qui les ont précédez, invite à s'acquitter envers ceux qui ent a les faivre. Le plaifir attaché à l'exercice d'un tel devoir ne cède que trop souvent à l'attrait des intérêts présens & particuliere; ratis les Compunies (gavantes, les Academies, si heureusement établies depuis près d'un siècle, & qui ne meurent point, suppléeront à ce que la vie trop courte des hommes pourroit les empêcher d'entreprendre.

On ne trouve pas que l'Académie des Sciences ait sait les observations dont il s'agit dans cet article, avant 1688; il paroit cependant que quelques-uns de les Membres avoient observé plusieurs années auparavant & peu de temps après l'etabliffement de l'Academie, la quantite d'eau de p'vie & de neige qu'il tombe tous les ans, soit à Paris, soit à Dijon, ce qui s'en évapore, & ce qui s'en imbibe dans la terre à plus ou moins de profondeur, comme on en peut juger par quelques ouvrages fort antérieurs, touchant l'origine des fontaines & des rivières, & sur-tout par le Traité du mouvement des eaux de M. Mariotte. Mais il est certain qu'en 1688 la Compagnie resolut de mettre ces observations en *Hid. del'Ac, règle *. M. Perrault donna le deficin d'une machine propre à toné 2 des anc. cet ularge, & M. Sedileau se chargea de les exécuter. Après M. Sedileau ce fut M. de la Hire, entuite feu M. Maraldi, & enfin M. Marddi neveu du précédent, qui le continue aujourd'hui, sans qu'il y ait eu d'interruption. On y joignit bien tot les observations du Barometre & du Thermometre, le plus grand chaud & le plus grand fioid qu'il fait chaque année, chaque saison, chaque jour, & avec les circonstances des vents & des météores qui y répondent, les déclinaisons

Mim. p. 42.

La quantité moyenne de l'eau qui tombe tous les ans à l'Observatoire, ou à Paris, car on les consond ordinairement, fut d'abord établie d'environ 19 pouces, sur la comparaison

le nom général d'Observations Météorologiques.

de l'aiguille aimantée, &, dans ce siècle, les apparitions de l'Aurore Boréale. On a compris toutes ces observations sous

des dix premières années; mais en 1708 ou 1709, c'està-dire, vingt ans après le commencement des observations, cette moyenne devoit se réduire à environ 18 pouc. 8 lign. En 1718 révolu elle étoit encore à peu près la même, mais en 1728 ou après 40 ans, elle se réduisit à 17 pouces 3 lignes; & ensin 50, ou 55 ans après la première année, ce qui nous conduit jusqu'en 1743, cette quantité moyenne, déduite de la somme totale, n'est plus que d'environ 16 pouces 8 lignes. Nous tirons ce calcul d'une note que M. Maraldi nous a com-

muniquée sur ce sujet.

Il est clair que plus le nombre d'années sera grand, plus la moyenne adoptee approchera du vrai. Tout est en mouvement & tout change dans la Nature, mais tout y tend aussi à l'équilibre, & l'inconstance même y a ses loix. Si nous avions des observations météorologiques de plusieurs fiècles dans un même pays, il y a tout lieu de croire que fa somme totale des pluies tombces dans ce pays pendant un fiècle ne différeroit pas sensiblement de celle d'un autre siècle, ou que s'il s'y trouvoit des différences marquées, un nombre de fiècles plus grand encore nous en dévoileroit la marche & les compensations. Car enfin les pièces de la machine de notre globe & son atmosphere ne sont pas infinies, leurs révolutions doivent nous redonner à peu près les mêmes effets, ou nous indiquer la cause de variation & de dépérissement qui en trouble les retours. L'Afie, l'Afrique & l'Amérique nous fournissent mille exemples de grandes contrées où il tombe en certains temps de l'année des pluies réglées, auxquelles on s'attend, & sur lesquelles il est rare que l'on se trompe. Ces contrées sont pour la plupart comprises entre les Tropiques, ou ne s'en éloignent pas beaucoup. L'Europe qui, en général, ne nous offre rien de pareil, occupe au contraire le milieu d'une Zone tempérée, mais auffi ses parties les plus septentrionales sont affez régulièrement chargées de neige pendant sept à huit mois de l'année, & l'été qui succède à ce long hiver, est communément affez uniforme. Les vents sont toujours plus règlez par leurs Hift. 1743.

durées, par leurs directions, & par les temps de l'année où ils foufflent dans la Zone torride, & dans la Zone polaire que nous connoissons, que dans la tempérée qui est entre ces deux extrêmes. On observe quelque chose de semblable dans les variations du Barometre, qui disparoissent presquentierement sous l'Equateur. Or si le descelement des pluies, des vents & des saisons peut être ramené à quelque chose de sixe & d'unisorme dans les extrêmes, n'est-il pas à présumer que la même constance & la même unisormite saussitent dans les climats moyens qui en participent, quoique sous une forme plus complique & plus difficile à demèter? Ne nous lassons donc point d'observer tous ces phénomènes, d'en rechercher la ligiton & la cause, & croyons que le truit n'en est peut-être pas aussi loin de nous qu'il le paroît. La pretumption est ici moins a craindre que le decouragement.

Après cette digression que nous n'avons pû resuser à l'importance de la matière, nous rapporterons succinclement les resultats des observations meteorologiques de M. Mataldi pendant ces trois dernières années, & seulement pour Paris.

En 1741 la quantité de pluie a été de 12 pouces 10 lignes, en 1742 de 12 pouces 9 lignes, & en 1743 de 13 pouces 2 lignes ; ce sont par consequent, & selon l'année commune établie ci-dessus, trois années sèches, & elles auroient dû le paroitre d'autant plus qu'en 1740 qui les précédoit, il en étoit tombe 21 pouces 6 lignes ?. Mais il taut prendre garde que la sécheresse, ou l'abondance d'eau d'une année, ne décident pis tant pour la tertilite que la distribution qui s'en est faite en certains mois & dans certaines circonstances.

Les jours de la plus grande chaleur de ces trois années, ont été les 7 & 8 Août 1741, le 2 Juillet & vers la fin d'Août 1742, & le 17^{me} Juin 1743; le Thermomètre de M. de Reaumury est monté à 27, 29, & 24 degres au dessus de la congelation. Les jours du plus grand froid le 26 Janvier 1741, le 10 du même mois 1742, & le 7 Janvier 1743; le même Thermomètre étant descendu dans le même ordre à 8, à 12, & à 5 degrés ½ au dessous du terme de la

V. les M. p. 400.

congélation. Les plus grands froids de ces années fe trouvent beaucoup plus proches du folstice d'hiver qu'ils ne le sont communément; car, comme il a été remarqué en 1719*, *Nem.p.126. par la comparaison d'une trentaine d'années la moyenne proportionnelle du temps où se font sentir les plus grands froids, tombe sur la fin de Janvier ou au commencement de Février, de même que celle des plus grandes chaleurs fur la fin de Juillet & au commencement d'Août. Où l'on peut remarquer que la proportion ou la diffance de ces plus grands, par rapport aux solffices, est à peu près la même que celle des heures après minuit ou après midi, sçavoir, vers les 2 heures quelques minutes, par rapport au plus grand froid ou au plus grand chaud d'un jour d'hiver ou d'un jour d'eté, &, comme il est aisé de voir, par la même raison.

Les plus grandes hauteurs du mercure dans le Baromètre, aux mêmes années 1741, 1742 & 1743, ont été le 8 Février à 28 pouces 7 lignes, le 5 Janvier à 28 pouces 2 lignes, & les 2 & 21 Janvier à 28 pouces 7 lignes; les plus grands abaissemens le 19 Septembre à 27 pouces 5 lignes 3, le 10 Janvier à 27 pouces 8 lignes, & le 18 Juillet à 27 pouces 6 lignes 1. Ces abaissemens vont quelquesois à près d'un pouce plus bas; ainfi la variation a été fort petite à cet égard. Si l'on examine les variations du Baromètre en détail, & fur un grand nombre d'années, on verra que les plus grandes hauteurs & les plus grands abaitsemens arrivent presque toùjours en hiver.

L'Aiguille aimantée déclinoit en 1741 de 15 degrés 35 ou 40 minutes du nord vers l'ouest, en 1742 au mois de Juin, de 15 degrés 40 minutes, & au mois de Septembre. de 15 degrés 10 minutes: elle a été toute cette année 1743 à 15 degrés 10 ou 15 minutes. Au commencement & vers le milieu du fiecle passé la déclinaison de la Boussole étoit à l'est, mais diminuant en ce sens de plus en plus, de manière qu'elle devint enfin nulle & que l'aiguille se dirigeoit exactement vers le Pole en 1666, époque à remarquer. & qui est la même que celle de l'établissement de l'Académie

HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE des Sciences. L'aiguille aimantée a toûjours avancé depuis vers l'ouest, excepté quelques années, comme 1718 & 1719, où elle a paru itationnaire, & quelquetois un peu retre grade, comme dans cette année 1743. Elle déclinoit en 1700 de 8 degrés 12 minutes.

M. Maraldi n'a point pulé des Aurores Boréales qui ont paru ici pendant ces trois années, sans doute parce qu'on ne lui a point remis de Mémoires sur ce sujet. Les principales que nous y avons observées, ont été en 1741 celles du 23 Janvier, du 4, 6 & 21 Mars, du 7 Avril, du 23 Juillet, du 10, 13 & 20 Août, du 2 & 8 Octobre; en 1742 celles du 30 Août & du 7 Septembre; en 1743 celles du 2) Janvier, du 19 Mars, du 2 Septembre & du 25 Octobre. Par tout ce que nous avons de Memoires fur ce phénomène depuis quinze ou vingt siècles, quoique sous des noms & sous des idées fort différentes, on voit qu'il se montre par de grandes repriles de plutieurs années de fuite; après quoi il cetie ou n'ett guere vifible durant plufieurs autres annees dont le nombre est auffi fort inegal. Le commencemens de cette dernière reprise peuvent être placez vers les années 1707, 1708 & 1709 pour la Suéde, le Danemarck & la Prusse; mais elle n'a guère été connue en France, en Angleterre & vers le milieu de l'Allemagne qu'en 1716, à l'occation de la grande Aurore Borcale du 17 Mars, qui fut vue dans toute l'Europe, depuis I ithonne & Cadiz jusqu'aux extremités septentrionales de Moscovie. C'est aussi de cette annce que partent nos Histoires de l'Academie ou il est fait · Hill. 1716, mention de ce phénomène *. Il semble depuis quelques années que la reprise soit sur son déclin, tant pour la fré-

Ce sont-là toutes les sortes d'Observations météorologiques qu'on ait recueillies dans nos Memoires, & dont on ait rendu compte dans l'Histoire de l'Academie jusqu'en 1741; mais en voici enfin d'un autre ordre, & telles que nous avons paru les defirer au commencement de cet article:

c'est à M. du Hamel qu'on en est redevable, sous le titre

quence des apparitions que pour leur éclat.

V. les M. p. 259.

d'Observations Botanico-méteorologiques. M. du Hamelaura la gloire d'avoir défriché ce vaste champ, du moins n'avonsnous rien dans ce genre de si suivi & de si exact que ce qu'il nous en a déjà donné. Les Anciens chez qui les travaux de la terre étoient en honneur & en très-grande recommandation, ne manquoient ni de préceptes pour s'en assurer le succès, ni de prédictions fondées sur l'expérience & fur l'état du ciel pour en prévenir les suites. Leurs Poëmes d'Agriculture & quelques-uns de leurs autres ouvrages en font foi. Les Egyptiens sur-tout, par l'inspection de certains vents réglez & des débordemens du Nil, pouvoient avoir des vûes affez étendues fur ce fujet; mais en général ils femblent avoir trop donné aux influences & aux configurations des Aftres, & pas affez à l'hittoire phyfique de l'air, fur laquelle ils n'avoient point, à beaucoup près, les fecours que nous avons aujourd'hui.

Ces Observations météorologiques, comme les précédentes, ont pour objet la conflicution de l'atmosphère & la température des saisons, mais continuellement appliquées à la culture & à la production des biens de la terre, ainsi qu'aux maladies régnantes parmi les hommes & les animaux. M. du Hamel les a faites dans la Terre de Dénainvilliers. située auprès de Pluviers entre la Beauce & le Gâtinois, où M. de Dénainvilliers son frère, très-capable par lui-même de bien observer, les continue en son absence. Elles furent commencées en 1740, & depuis M. du Hamel en fait part tous les ans à l'Académie après l'année révolue; il joint à la fin de chaque suite des douze mois un résultat qui ne peut être encore que fort borné; mais les réfultats plus généraux & plus utiles ne manqueront pas d'arriver en leur temps, comme M. du Hamel nous le fait espérer : l'édifice sortira de terre, on n'a fait jusqu'ici qu'en jeter les fondemens. Nous nous sommes contentez d'indiquer ces observations dans l'Histoire de 1741 & de 1742, & nous n'avons encore présentement rien de mieux à faire, vû le détail immense dans lequel il faudroit entrer pour en donner une idee plus HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE compléte. Mais nous ne sçaurions trop exhorter ceux qui ont à cœur l'utilité publique, à les lire, &, s'ils sont à portée d'entreprendre quelque chose de semblable, à les imiter.

SUR L'OUIE DES POISSONS,

ET SUR

LA TRANSMISSION DES SONS DANS L'EAU.

V. 1 M.

T Ls Poitions différent affez de nous & de la plupart des La animaux terrellies par leur figure, par la ilracture tant interne qu'externe de leurs parties, par l'élément dans lequel ils vivent, & par leurs besoins, pour en disserer aussi par les organes des mêmes sens, & par leurs sens mêmes. On ne devroit pas être surpris qu'ils en eussent quelqu'un que nous n'avons pas, en ou'ils tattent paiver de quel qu'autre que nous avons. L'Ouie, par exemple, semble leur avoir été resusée avec la voix dont l'ulage ett franche, ue à l'oule; mais comme l'analogie, telle du moins que nous le concevons dans la Nature, est affez souvent trompeule, la raison de la diversité, & même des contraires, ne l'ext pas moins que que fois. C'est que nous rapportons fouvent l'une & l'autre à de prétendues fins aussi bornées que notre intelligence, & qui s'écarteroient en bien des occasions du plan genéral auquel elles sont subcid mices. Confultons done uniquement l'expérience dans le cas dont il s'agit, elle nous conduira du moins à un doute plus éclairé.

Ce qui fait croire qu'en général les Poissons manquent du sens de l'ouïe, c'est qu'on ne trouve dans la plupart aucun organe qui paroisse répondre à ce sens. La partie de seur tête qu'on nomme les Ouïes, branchiæ, par où, selon M. Daverney*, ils respirent l'air qu'ils expriment de l'eau, & par ou l'inscroit communément qu'ils entendent, étant bien examinée, n'a paru nullement propre à cette dernière sonction. Les Naturalisses & les Anatomisses s'accordent sur ce point, quoiqu'ils disserent d'ailleurs en particulier sur la

question, les uns voulant que les poissons soient absolument privez du sens de l'ouïe, les autres affirmant qu'ils en sont douez, sans expliquer comment, & quelques-uns n'étant pas

trop d'accord avec eux-mêmes sur ce sujet.

Les Cétacées, tels que les baleines, les touffleurs, & quelques autres grands poissons qui se tiennent long-temps sur l'eau, ou qui fortent même de l'eau pour paître sur le rivage à la manière des animaux terrestres, doivent être exceptez. On leur trouve des conduits auditifs qui ne paroissent pas équivoques, tandis qu'on ne voit rien de pareil dans les poissons ordinaires, sur-tout dans ceux qui sont couverts d'écailles; mais aufli les cétacées différent-ils beaucoup des autres poissons par la structure interne & externe de leurs parties, par leur manière de le nourrir, de s'accoupler, & par mille autres particularités. Ceux d'entre les petits où l'on trouve des conduits propres à l'ouie, comme dans la raie & dans la lamproie, fortent visiblement de la classe des écailleux.

La différence que l'on remarque entre ces deux espèces de poitsons, pourroit bien cependant en mettre beaucoup dans leur façon d'entendre, & dans les organes qui occasionnent ce sentiment, sans l'exclurre. M. Klein Secrétaire de la République de Dantzick, connu par son sçavoir & par les excellens morceaux d'Histoire Naturelle qu'il publie depuis quelques années, penche pour l'affirmative. Il nous a donné dans un de ces ouvrages le dénombrement & la figure de certains petits offelets qui se trouvent dans le crâne de plufieurs fortes de poissons, & qu'il conjecture pouvoir constituer en eux l'organe de l'ouie. Mais de quelque poids que soient les observations de M. Klein en faveur de l'ouïe des poitsons par un organe immédiat, la fagesse avec laquelle il ses propose, nous permet de suspendre encore notre jugement.

Quand on fait attention aux signes extérieurs que les poissons nous donnent de ce qui se passe en eux par rapport aux sons, on ne scauroit d'abord se desendre de croire que le sens de l'ouie n'a pas été réfusé à leur espèce. La pratique constante des pêcheurs, lorsqu'il s'agit de les surprendre,

HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE plûtôt que de les entraîner de force avec le filet, est d'y proceder en prand filence; ce qui suppose du moins qu'on a epi ave cui le lucit étoit contraire d'apèche. Mais que penfer de complitum demolliques, qui, selon le tempignaze de tant d'Auteurs, tels que Pline, Rondelet, Boyle, &c. s'affemblent au bruit d'une cloche, ou de quelqu'autre instrument, lorsqu'on veut seur donner à manger? Pline ajoûte que ses paintins ga'on gardoit à Baïes, aujound'hui Pouroles, dans les viviers de Domitien, accouroient lorquion les appelloit par leur nom. Ce fameux Naturalitte n'ignoroit pas que les politions font prives, tout au moins en apparence, des organes de l'ouie, & nonobstant cette privation, ou avec les exceptions qu'il y mettoit peut-ètre, il croit que quelques-uns, comme le muge, la saupe, le cromis & le loup, quoique écailleux, entendent. Il y a dans Martial une Epigramme qui roule toute entière sur les poissons sacrez de Baïes, & qui Suppote le fait rapporté par Pline comme tres-connuis des au de ces poissons, dit le Poëte, vient à la voix du maître qui l'appelle. On en raconte autant d'un poisson qui étoit nourri dans les viviers du Louvre du temps de Charles IX.

Toutes ces autorités cependant, ou autres semblables en faveur de l'ouie des poitsons, n'ont pas paru suffisantes à M. l'Abbé Nollet dans le Mémoire qu'il a fû à l'Académie fur ce sujet. Les Auteurs dont il s'agit, n'auront pas toûjours été témoins de ce qu'ils avancent, ou ils ne l'auront point examiné avec toute la rigueur qui étoit à desirer en pareille matière; ils peuvent y avoir ajoûté des circonstances qui nous déguisent les faits, ou en avoir supprimé quelqu'une qui nous en auroit indiqué la véritable cause; une vûe subtile, ou quelqu'autre sensation, des ébranlemens communiquez au fond ou aux parois du bassin, de petites agitations dans l'eau. avertiront les poissons de mille mouvemens extérieurs qui se lient avec l'habitude qu'ils ont prise de venir à certaines heures au bord & à la surface de l'eau, & qui répondent en apparence à des fignes que nous ne rapportons qu'au bruit, ex dent les autres effets nous comppent. Ces poiffons rouges,

dorez

dorez & argentez que les Chinois nourriffent par curiofite dans leurs maifons & dans leurs jardins, & qui ne manquent pas de venir à la surface de l'eau, pour peu qu'on frappe sur le bassin ou sur le vaisseau qui les contient, est ce le bruit qui les attire, ou l'ébranlement causé par la percussion? Ceux que le bombardement d'une ville maritime, ou le pétardement de quelque rocher a écartez d'une plage, quelquefois pour pluficurs années, n'ont-ils pas du éprouver dans l'élément où ils vivent, une commotion violente indépendamment de tout bruit? Les éruptions de l'Altna fe font quelquefois sentir jusqu'à Malte, c'est-à-dire, à plus de 40 lieues, malgré l'interposition de la mer, par le seul srémissement du terrein ou des rochers contigus; la mer même se ressent si fort de parcilles (coufies, que des Navigateurs ont été fouvent avertis par-là à 25 ou 30 lieues en mer, des tremblemens de terre qui arrivoient dans les continens : en un mot, il y aura toûjours à douter si les poissons entendent véritablement & à notre manière, jusqu'à ce qu'on ait découvert en eux quelqu'organe auditif qui ressemble au nôtre.

Mais il se présente encore ici un sujet de doute qui entre nécessairement duns la question de l'ouie des possisons, & qui méritoit d'ailleurs par lui-même tous les soins que M. l'Abbé Nollet s'est donné pour l'éclaireir, sçavoir, si la transmission des sons, comme objet de l'ouie, est possible à travers l'eau; car si elle ne l'étoit pas, il l'audroit convenir que les possisons n'entendent point sous l'eau, & l'on scroit même sondé à croire d'après mille autres phénomènes de la Nature, que les animaux destinez par tout le reste de la méchanique de seur corps à vivre dans l'eau, seroient privez des organes relatifs au son, ou que ces organes naissans, inutiles & superstus, venant à s'est cer saute d'usage, disparoitroient entièrement après quel-

ques générations.

L'air est le milieu propre & le véhicule du son; il y a de l'air dans l'eau, mais intimement mêlé avec elle, & sous une s'inne très différente de celle qui paroit être requise pour la propagation du son. La propagation du son se fait par des Hill. 1743.

26 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE vibrations de pression, & l'eau, qu'on croit incompressible, ce qui l'il containement jusqu'un certain point malgre de très-grandes sorces extérieures qu'on y emploie, ne paroît guère propre à recevoir & à transmettre des vibrations,

c'est-à-dire, des compressions & des dilatations alternatives. D'un autre côté la moindre chaleur sussit pour rarésier l'eau, & le moindre froid pour la condenser sensiblement. Il faut donc encore en venir à sonder la Nature en elle-même.

. Mica. p. 37.

Si les expériences dont nous avons parlé en 1737*, & d'où il suit que les corps sonores transmettent le son & leurs tons de l'eau dans l'air, sont bien certaines, la transmission du son de l'air dans l'eau, qui en est l'inverse, devient plus que probable. Mais M. l'Abbé Nollet ne s'en tient pas là-dessus à des probabilités ni à de simples inductions, il veut voir & entendre par lui-même. Il s'est plongé dans l'eau à plusieurs reprises, en divers temps & à dissérentes prosondeurs, jusqu'à 18 pouces au dessous de la surface de l'eau, & avec toutes les attentions nécessaires pour rendre ses observations concluantes, & le résultat en a été que non seulement le bruit, quoique plus ou moins assoibil, se transmettoit à travers l'eau, mais encore l'espèce de bruit, les tons & les articulations de la voix humaine.

Il est donc prouvé que les poissons pourroient entendre sous l'eau, mais il demeure toûjours incertain s'ils entendent ou s'ils ont de quoi entendre. M. l'Abbé Nollet ne pousse plus loin la conséquence, & nous n'avons garde d'être plus décisits. Artedi qui a été peut-être l'homme du monde le plus curieux de tout ce qui concerne les poissons, & qui s'en est le plus occupé, est contraint d'avouer qu'ils sont destituez du sens de l'ouïe; mais il pensoit, conformément à ce que nous avons déjà remarqué, & M. l'Abbé Nollet ne s'en éloigne pas, que les trémoussemens de l'eau pouvoient les avertir des bruits qui se faisoient autour d'eux *. Semblables à nos sourds & muets, ce seroient là les signes par où ils entendent. J'ai vû en province une sille sourde & muette de naitiance qui sentent d'attez loin le bruit du tambour,

* Ichshyologia, p. 19.

& celui de la mousqueterie par le creux de l'estomac; elle dislinguoit très-bien ces deux sortes de bruit, & elle les caractérisoit par le geste d'un homme qui bat la caisse, ou qui tire un coup de fusif, quoiqu'elle sut dans une chambre scrmée, d'où elle ne pouvoit en voir l'origine. Peut etre que les poitsons ont un pareil sentiment, & plus exquis, à quelque partie ou à toutes les parties extérieures de seur corps.

I Ls premiers Reformateurs de nos idees fur la Phytique, Leçens de Bacon, Galilée, Descartes, ne se sont point lassez de nous Physique exrecommander d'interroger la Nature dans ses essets & par tom. I & II. nos expériences, avant que d'en venir à la spéculation & aux conjectures; Mariotte & le fameux Newton, à ne les considirer que par ce côté, ont renchéri sur leurs prédécesseurs, sinon dans le precepte, du moins dans la pratique. Plusieurs squans Physiciens & Géomètres du ficele patlé ont marché fur leurs traces; mais on peut dire que notre siècle se distingue encore plus particulièrement dans cette partie, par la multitude & par la finesse des experiences. M. l'Abbé Nollet qui embraffe toutes celles qui sont connues, n'a rien négligé auffi pour les redifier & pour les étendre. Appelle à montrer la Phylique expérimentale à Monteigneur le Dauphin, & ayant eu l'honneur de lui en donner des leçons, il s'est ensin déterminé à les rendre publiques par l'impression, & il nous en a donné cette année deux volumes qui seront suivis de plutieurs autres. Il traite dans ceux-ci des expériences qui ont pour objet l'étendue, la divisibilité, la pososité, la compressibilité & l'elasticité des corps, les loix du mouvement, les effets de la pefanteur, les forces centrales, la Statique & l'Hydroflatique; vastes matières où l'industrie du Physicien ne tend pas à moins qu'à mettre fous nos yeux la méchanique de l'Univer. On v trouvera la description des inffrumens dont il faut se servir pour saire ces expériences, & sur-tout de ceux dont M. l'Abbé Nollet se sert lui-même, qu'il a beaucoup persectionnez, & qui sont exécutez avec toute l'intelligence, & même avec toute la propreté qu'on y peut

desirer. Il est sobre dans ses raisonnemens, mais il ne manque point de saire sentir, quand l'occasion s'en présente, la liaison intime qu'ont toûjours les expériences bien saites, avec les qu'and principe de la bonne manière de philosopher. Ausi est ouvrage dissère t-il de la plupart de ceux de même espèce, en ce qu'il est moins un recueil d'expériences, qu'un assemblige mestadique de principes liez entr'eux, & prouvez par des saits.

DIVERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE ET D'HISTOIRE NATURELLE.

I

Sur la Scintillation des E'toiles fixes.

A plûpart des Physiciens modernes s'accordent à expliquer par les trémoussemens de l'air, ou des vapeurs qui s'élèvent dans l'air, la Scintillation des Étoiles fixes, ces fecousses, ces vibrations de la lumière qu'elles lancent vers nous, cet étincellement qui les distingue des Planètes. Il n'est personne qui n'ait pû se convaincre d'un semblable effet, qu'on ne peut guère attribuer qu'à cette cause en regardant l'horizon par-dessus une vaste campagne dans un jour de soleil fort chaud: tout y paroît en mouvement de vibration. On verra encore la même apparence à quelques pouces au dessus d'un poële, st l'on y regarde vis-à-vis d'une fenêtre, ou de quelqu'autre objet sur lequel donne le grand jour. La force réfractive d'un air différemment échaussé ou mêlé de vapeurs en mouvement, n'étant pas la même, il faut nécessairement que la lumière qui passe à travers, y soussire des 1 fr. lions differentes qui clevent & qui abaillent alternativement les objets, & y causent ce tremblottement apparent. M. Newton ajoute à cette explication generale une Il faut encore prendre garde que ces effets, à l'égard des corps célestes, ne sont sensibles que sur une grande lumière ou fort vive : c'est pourquoi on ne les remarque point communément dans les Planètes. Vénus & Mercure ont cependant quelquesois un peu de cet étincellement, à cause de leur proximité du Soleil, & par la vivacité de la lumière qu'elles réstéchissent vers nous; & le Soleil lui-même, vû avec la lunette & au travers d'un verre coloré ou ensumé, paroît presque toùjours tremblotter & ondoyer par les bords de son disque. On ne sçauroit donc guère douter que la Scintillation des Étoiles sixes ne soit principalement dûe aux vapeurs qui s'élèvent dans l'atmosphère; mais ensin il ne fera pas inutile de s'en assurer, s'il se peut, par l'observation immédiate saite dans un pays où la pureté de l'air n'admette aucunes de ces vapeurs.

M. Garcin, Docteur en Médecine, de la Société Royale de Londres, & Correspondant de l'Académie, nous la fournit cette observation, accompagnée de plusieurs circonstances curienses, dans une lettre qu'il a écrite à M. de Reaumur,

& dont nous allons donner l'extrait.

C'est en Arabie, & directement sous le Tropique du Cancer, de même qu'à Gomron ou Bander-Abassi, port sameux du Golse Persique, que M. Garcin a observe ce ciel, ou cet air exempt de vapeurs. On sçait que ce pays est sort chaud, & que l'air y est parsaitement serein presque toute

D iij

l'année. Le printemps, l'été & l'automne se passent, dit M. Garcin, sans qu'on y voie la moindre rosce. Dans ces mêmes temps tout le monde couche dehors sur le haut des maisons qui sont en platte-sorme; le lit consiste en une pièce de toile coupée en quarré long, & attachée par ses quatre angles aux bouts supérieurs de deux pliants ou de deux pieds dont les branches se croisent en sautoir & s'ouvrent autant que la toile peut s'étendre; c'est sur cette toile toute simple que l'on dort tout nud, après avoir mis un ou deux couffins sous sa tête, la grande chaleur ne permettant pas de dormir avec quelque chose de plus. Quand on est ainsi couché, & qu'on vient à s'éveiller, il n'est pas possible d'exprimer, dit M. Garcin, le plaisir qu'on prend à contempler tranquillement & dans le filence de la nuit, la beauté du ciel, l'éclat des étoiles, & leur commune révolution d'orient en occident. La magnificence de ce spectacle suit naître mille réflexions, & frappe également le sçavant & l'ignorant; c'est une lumière pure, serme & éclatante, nul étincellement. Ce n'est qu'au milieu de l'hiver que la Scintillation, quoique très-foible, s'y fait apercevoir. M. Garcin ne révoque donc pas en doute qu'il ne faille attribuer la Scintillation des Etoiles à une constitution d'air toute contraire, aux vapeurs qui s'y mêlent, & qui s'élèvent fans cetle dans l'atmofphère des pays moins secs; & son explication sur ce phénomène revient à peu près à celle que nous en avons donnée au commencement.

La sécheresse des environs du Gosse Persique est telle, que non seulement on n'y voit jamais sortir de terre aucunes vapeurs, mais qu'on n'y aperçoit pas même un brin d'herbe pendant les trois saisons chaudes de l'année dans les lieux découverts & les plus exposez aux rayons du Soleil; c'est presque de la cendre plûtôt que de la terre, elle y est comme calcinée. Il n'y a que trois ou quatre sortes d'arbres qui puissent y subsister dans les lieux incultes, encore y sont-ils bien rares. Le royaume de Bengale, où M. Garcin a sait aussi ses observations, est bien dissérent; car quoique

ce royaume soit à la même latitude, ou qu'il soit même plus méridional que le Golte Pertique & la plus grande partie de l'Arabie, les Plantes y croissent en abondance, & les vapeurs s'y sont apercevoir sur-tout par la rosée. On s'y garde bien de coucher aussi souvent dehors que dans le midi de la Perse, & par une suite de tout ce que nous venons de dire, la lumière des Étoises y est presque toûjours vacillante, moins cependant qu'en Europe.

Ceci nous rappelle une semblable observation saite par M. de la Condamine dans le Pérou, pays renommé par la singularité qu'il n'y pleut jamais, ou, pour parler plus exactement, presque jamais, du moins dans les lieux dépouillez de forêts, au bas de la Cordelière, par exemple, entre cette chaîne de montagnes & la mer, & tout le long de la côte depuis le Golse de Guayaquil jusqu'à Lima, capitale de la province, à environ 12 degrés de latitude australe. Aussi M. de la Condamine qui a parcouru toute cette côte, s'aperçut que la Scintillation des l'ixes y étoit bien moins sensible que dans nos climats.

M. Garcin nous a prévenus dans la réflexion qu'il fait, & qui se présente ici naturellement, sur les contrées Assatiques. qui furent le premier berceau de l'Aftronomie. On comprend affez quel avantage un ciel toûjours pur & ferein a dû leur donner à cet égard sur le reste du monde. Il nous apprend de plus que la commodite de voir toujours ce ciel avec le cortège brillant qui l'accompagne, ou plutôt l'impossibilité de ne le pas voir fans cetle, a fait de tous les habitans de Bander-Abaffi & desenvirons, prefqu'autant d'Affronomes. Les interruptions du sommeil deviennent pour eux la source de mille observations que des soins pénibles nous préparent, & que souvent un ciel ingrat nous enlève. Tous sçavent lire plus ou moins distinctement dans ce grand livre, & déterminer au juste, quand ils s'éveillent pendant la nuit, l'heure qu'il est à ce vaste & magnifique cadran qui s'offre à leurs yeux. Si les talens se developpent à mesure qu'il se présente plus d'occasions de le: exercer, & s'ils sont affez également répandus sur la totalité de genre humain, combien de semblables pays, la Chaldée, l'Typat et l'Arabie, n'ent-ils pas du roduire d'Astronomes, lorsque les Sciences & l'Astronomie sur-tout y étoient en honneur?

Le différent degré de force & de fréquence qu'on peut remarquer dans la Scintillation des Fixes en Europe, relativement aux différentes saisons de l'année, selon qu'elles sont plus ou moins élevées sur l'horizon, & par rapport à quelques autres circonstances, sournit encore à M. Garcin de quoi se consirmer dans l'hypothèse des vapeurs. C'est un détail qu'il traite, comme tout le reste, avec intelligence, mais qu'il est aisé de ramener aux mêmes principes, & que nous supprimons ici, pour laisser au lecteur le plaisir d'y suppléer.

I I.

Pierres ponces vûes sur la mer, entre le Cap de Bonne-Espérance & les Isles de Saint-Paul & d'Amsterdam.

Nous devons encore à M. Garcin l'observation suivante qu'il apprit à Batavia en 1-26, d'un Capitaine des Vaisseaux de la Campagnie Hollandoise, homme celaire, & dont il

connoissoit l'exactitude.

Le Vaille at faifoit route du Cap de Bonne-Espérance aux Illes de Saint-Paul & d'Amtlerdam, par un vent oueil-nordoueil dans le mois de Mars de l'année 1726, pour gagner ensuite vers les Isles de la Sonde. Il étoit entre le 38 & le 3010 degre de l'utitude authrale, lorsqu'on vit l'umer couverte d'une quantité prodigiente de ces pierres edein es, porentes & légères qu'on nomme Pierres ponces, depuis la grosseur d'une noix jusqu'à celle de la tête d'un homme & davantage. On vogua parmi ces pierres ou ces fragmens de pierre pendant neuf ou dix jours, sur un espace de plus de 500 lieues: elles étoient répandues nord & sud, & slottoient au gré du vent, sans qu'on en vêt les bornes. On s'informa l'année suivante avec les habitans du Cap, s'il ne s'étoit rien passé din vent, se isse qui put y taire soupeonner l'erupi et de

de quelque volcan; mais ils répondirent qu'ils n'en avoient aucune connoissance, quoiqu'ils eussent vû quantité de ces pierres que la mer avoit jetées sur leurs côtes dans le temps où le Capitaine Hollandois avoit fait son observation.

M. Garcin ne doute pas que ces fragmens de pierre ne vinssent du fond de la mer; il croit aussi que les montagnes où l'on trouve beaucoup de pierres ponces, portent une marque certaine de leur origine, & qu'elles ont été volcans, mais il ne pense pas pour cela que toutes les grandes montagnes, ni le plus grand nombre, doivent leur formation à l'éruption des volcans; il a là-dessus un sentiment qui nous sera plus particulièrement développé dans quelqu'autre occasion, dont le public profitera. Quoi qu'il en soit, on n'ignore pas qu'il y a des feux fouterrains au deffous des mers, de vrais vo! cans qui se manifestent par leurs éruptions. Les isles formées de nos jours auprès de celle de Santorin dans la Méditerranée, & entre les Açores dans l'Océan *, en fournissent des preuves fensibles. Les pierres ponces qui flottent de temps en temps sur la mer en très-grande abondance & fort loin des terres, ne le justifient guère moins: on le sçait, mais de nouveaux exemples sur une question curieuse & intéressante, & surtout lorsqu'ils sont aussi marquez que celui qu'on vient de voir, méritent toûjours d'avoir place dans le Recueil de faits & d'observations que l'Académie a principalement en vier-

III.

Parélie observé à Reims.

M. de la Croix Chapelain de Saint Symphorien de Reims a écrit à M. Cassini que le 16 du mois de Mai de cette année vers les 7 heures & demie du matin il avoit observé un Parélie dont voici la description.

C'étoit un grand cercle lumineux & coloré dont le Soleil occupoit le centre, & dont le diamètre avoit environ 40 degrés de longueur; la largeur de fon limbe pouvoit être de 2 degrés, une bande colorée & aussi lumineuse que ce

Hist. 1743. E

34 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE limbe, dirigée d'orient en occident, & d'environ un demidegré moins large, en formoit le diamètre, & passoit par consequent par son centre & par le Soleil. Aux deux extrémités de ce diamètre étoient deux petits soleils assez mal formez, de figure ovale, & éloignez du cercle de près d'un degré, la vivacité de leur lumière alloit jusqu'à ne pouvoir être regardée fixement; les rayons qui en partoient, étoient en plus grande quantité ou plus denses que ceux du limbe lumineux, & dans celui de ces deux faux foleils qui étoit vers l'orient, ils s'étendoient un peu plus loin qu'ils ne faisoient dans son pareil vers le côté opposé; leur diamètre n'étoit guère que le tiers de celui du véritable Soleil. Vers le bord supérieur & septentrional du limbe du cercle on voyoit une bande parallèle à la précédente, de même couleur & de même largeur vers son milieu; mais ses extrémités se terminoient un peu en fuscau, c'étoit, quant à sa longueur, comme une tangente de 30 degrés sur le milieu d'un arc. M. de la Croix ajoûte que le ciel étoit serein, excepté vers l'orient où il y avoit quelques nuages, & que le Parélie subsista jusque vers les 10 heures; ce qui lui donne une sort longue durée.

Ces bandes & ces traînées de lumière dont nous venons de parler, sont la partie du phénomène où les distérens Obfervateurs semblent le plus varier entr'eux par la manière dont ils les décrivent. Dans tous les Parélies que Hévélius, Huguens & plusieurs autres Auteurs nous ont rapportez, ces bandes sont presque toûjours formées, ou par les queues des faux soleils, lesquelles s'étendent en ligne droite de part & d'autre & les joignent au véritable, comme ici peut-être dans la bande diamétrale, ou par l'arc tronqué ou entier du limbe de quelqu'autre cercle beaucoup plus grand, & qui joint les trois soleils, ou par le fragment d'un cercle qui touche celui qui a le Soleil pour centre, comme pourroit être encore ici cette espèce de tangente de 30 degrés. Nous ne prétendons point par-là infirmer l'observation de M. de la Croix, qui nous paroît exacte, nous voulons seulement

indiquer des circonstances auxquelles on pourroit ne pas tuice attention, & qui se sont montrées sensiblement dans les Parélies que nous avons observez, de même que dans la plûpart de ceux dont les Auteurs nous ont donne les descriptions & les figures, & où les cercles lumineux & les soleils se trouvent quelquefois en très-grand nombre. Tous ces phénomènes nous semblent s'accorder avec la conjecture qui fut proposée sur ce sujet dans l'Histoire de 1721*, que les Parelles, affez différens en apparence par le nombre de cercles & de soleils, ne sont jamais que le même, ainsi que l'arc-enciel; que leurs différences ne viennent que des parties qui manquent à quelques-uns, parce qu'en ces endroits les matières réfractives ou réfléchiffantes, les particules d'eau, de neige ou de glace répandues dans l'air, ont manqué, ou se sont trouvé obscurcies par des matières plus opaques, ou enfin parce que dans ces endroits douteux l'observation ellememe a été imparfaite; que les faux foleils ne refultent que d'une complication de lumière ou de la superposition qui s'en fait aux points d'intersection des cercles où en effet ces solcils sont toûjours placez, &c.

IV.

Sur un Arc-en-ciel extraordinaire vû en Dalécarlie.

Les Parélies entourent toûjours le Soleil, le Soleil est toûjours au centre d'un ou de plusieurs de leurs cercles concentriques. Les Arc-en-ciels ou lris paroissent toûjours au contraire dans la partie du ciel qui est directement opposée au Soleil, & lorsqu'il en paroît plusieurs à la fois, ils sont presque toujours concentriques entr'eux. C'est sur ce pied-là que ce meteore, qui passoit chez les Anciens pour un esset de la Nature des plus inexplicables, est aujourd'hui l'un des mieux expliquez, des mieux calculez. Marc-Antoine de Dominis, Descartes, & ensin Newton en ont mis la théorie dans le dernier degré d'évidence. L'observation de celui ci nous a été communiquée par M. Celsius, Professeur E ij

* Page 8

36 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

d'Astronomie à Upsal, dont nous avons déjà sait mention honorable dans notre Histoire*. Il a été vû en Dalécarlie province de Suéde, & c'est M. Celssus lui-même qui l'a observé le 8 Août de cette année 1743, vers les 6 à 7 heures du soir.

Imaginez un Arc-en-ciel ordinaire dont les deux branches aussi distinctes & aussi colorées que son sommet, appuient fur l'horizon; ce fera, comme on le peut juger par la hauteur que le Soleil devoit avoir alors au lieu de l'observation, un arc beaucoup moindre que le demi-cercle: accompagnez-le de son second, ou de cet arc extérieur & concentrique qui paroît souvent en même temps, teint des mêmes couleurs, quoiqu'un peu moins vives que celles du premier ou principal, & toujours en ordre inverse; ce n'est-là encore que ce qu'on a coûtume de voir. Mais si d'un point pris comme centre fur la flèche du premier arc, & autant au dessus de l'horizon que le centre de cet arc est au dessous, vous décrivez un cercle ou un troisième arc qui parte de l'horizon & des mêmes points que le premier, de manière que s'ouvrant de la & s'élevant au dessus des deux autres, il coupe le second à droite & à gauche & vienne se fermer en ceintre au dessus du second, vous aurez le phénomène de M. Celfius. Remarquons encore d'après l'Observateur, que la distance du sommet de cet are excentrique plus grand que le demi-cercle, étoit la même au deffus du fommet du fecond que la diffance du fecond au premier; que ses couleurs, à peu près aussi vives dans tout son limbe que celles du second, devenoient blancheatres, indécises & consuses aux points d'intersection avec le second, & sur l'horizon avec le premier, & qu'il ne dura tout au plus qu'un quart d'heure. M. Celsius ne nous dit pas fi les deux autres subsistèrent plus long-temps, ce qui pourroit cependant être ici de quelque consequence, mais il ajoûte qu'il n'eut pas plûtôt aperçu ce phénomène qu'il se saisit du premier instrument qui se présenta sous sa main pour prendre La hauteur du Soleil, & qu'il la trouva de 1 1 degrés 3 0 minutes. Ainsi l'on pouvoit, continue-t-il, regarder ce troisième arc

comme un Arc-en-ciel ordinaire formé par les rayons d'un second Soleil supposé à 11 degrés 30 minutes sous l'horizon; car on sçait que le centre des Arc-en-ciels ordinaires se trouve toûjours fur un axe commun avec l'œil du spectateur & le

Soleil qui est à l'opposite.

Les Arc-en-ciels excentriques sont donc très-rares, nous ne sçavons pas qu'on en ait observé plus de deux ou trois depuis près d'un fiècle, encore n'y en a-t-il qu'un dans ce petit nombre qui soit entier & qu'on puisse comparer à celui qu'on vient de voir; cette comparaison que nous allons faire ici, conjointement avec la cause vrai-semblable de leur

génération, ne fera peut-être pas inutile.

On trouve dans les Transactions Philosophiques de la Société Royale de Londres, que M. Halley étant à Chester en 1698, y observa un Arc-en-ciel en tout le même que celui de M. Celfius que nous venons de décrire, excepté que l'excentricité du troissème arc y étoit beaucoup moindre, son sommet ne faisant que se consondre avec le simbe & le fommet du second arc; c'étoit le 17 de pareil mois & à la même heure, c'est-à-dire, au mois d'Août entre les 6 & 7 heures du soir. D'où peut venir cette excentricité? elle semble fortir de la théorie connue. L'explication que M. Halley propose, on qu'il adopte sur ce sujet, est fort simple. & nous l'adopterons après lui; il attribue cet arc excentrique à la réflexion des rayons du Soleil qui tomboient alors sur la rivière de Dée qui passe à Chester.

La Dalécarlie est un pays très-coupé de lacs & de rivières. mais de la manière dont M. Celssus désigne le lieu de son observation (in paroecia Husby Dalecarlia & villa Klostret) que nous ne trouvons point sur nos Cartes, & le sçavant Observateur nous ayant été enlevé depuis, nous serions dans l'impossibilité de rien dire de plus positif à cet égard, si un habile Géographe * à qui nous avons eu occasion d'en *M. d'Anville parler, n'étoit venu à notre secours. La paroisse de Husby est dans la partie méridionale de la Dalécarlie, entre les villes de Fahlun & de Hedmora, fur la rive gauche de la Dale,

38 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE rivière qui donne son nom à la province, & qui sort de cette chaîne de montagnes qui sépare la Suéde de la Norvège.

Il est donc certain que les rayons du Soleil tomboient alors sur cette rivière qui, selon la position donnée & à l'heure du phénomène, devoit se trouver entre le Soleil & l'Observateur. Supposons-la tranquille, & n'oublions pas ce second Soleil que M. Celsius imagine être autant au dessous de l'horizon que le véritable est au dessus, on va voir que tout s'accorde merveilleusement avec l'hypothèse & les deux observations.

Si du centre de l'arc excentrique qui coupe le double Arc-en-ciel de M. Celsius, on mêne une ligne droite au point réfléchissant de l'eau, & qu'on prolonge cette droite sous l'horizon vers le ciel inférieur, il est évident par l'égalité des angles de réflexion & d'incidence qu'elle ira y rencontrer ce Soleil fictice que nous y avons placé, & que ce troissème arc seroit précisément le même dans l'un & l'autre cas, à quelque dégradation de couleurs près dans celui qui est réstéchi par l'eau. De plus, le jour de l'observation de M. Halley à la même heure du foir, donne le vrai Soleil moins haut fur l'horizon, & le Soleil fictice moins bas au dessous que l'observation de M. Celsius, non seulement parce que la declin ison septentajonale du Soleil etoit moins grande le 17 Août que le 8 du même mois, mais encore parce que la latitude de Chester est de près de 7 degrés plus petite que celle des parties les moins septentrionales de la Dalécarlie. Or, comme on sçait, l'Arc-en-ciel ordinaire doit être vû d'autant plus bas & d'autant plus petit que le Soleil réel est plus élevé sur l'horizon, & par l'inverse notre troissème arc doit être vû d'autant plus haut & d'autant plus grand que les rayons du Soleil imaginaire, ou, ce qui revient ici au même. que les rayons réfléchis par la surface de l'eau partent de plus bas & forment un plus grand angle avec l'horizontale. Donc le troisième arc de M. Halley a dû être vû moins haut & plus petit que celui de M. Celfius, & l'un & l'autre ont dû paroatre tels que ces Observateurs nous les representent.

Le second renversement des couleurs dans ce troisième arc, où elles sont rangées selon le même ordre que dans le premier, ne sera pas moins une suite nécessaire de cette génération; ces couleurs y seront aussi plus lavées & telles qu'on les y voyoit en esset, ayant sousser une dissipation de lumière de plus par la réslexion, comme celles du second arc auxquelles M. Celsius les a comparées.

Du reste la première idée de cette production des arcs excentriques semble ctre due à M. Estienne Chanoine de Chartres, qui, après avoir décrit un Arc-en-ciel ainsi coupé par une espèce de chevron rompu & circulaire de même nature, mais plus soible en couleurs que l'Arc-en-ciel primitif, remarque que torsqu'il sit son observation la rivière de Chartres qui va à peu près du midi au nord, se trouvoit entre lui & l'Iris, & au même niveau à environ 150 pas au delà. Cette observation su faite le 10 d'Août 1665, toûjours à 6 heures & demie du soir, & on l'inséra l'année suivante dans le Journal des Sçavans & dans les Transactions

Philosophiques.

Il suit de tout ce que nous venons de rapporter, & de l'hypothèse, si elle cst conforme à la Nature, qu'on pourra se procurer assez souvent le phénomène de M. Celsius, en se plaçant comme il convient pour le faire naître, ou pour le voir dans les circonstances savorables d'un Arc-en-ciel bien marqué, d'un Solcil brillant, & d'une eau tranquille. Il paroît d'ailleurs assez indisserent que l'on se place entre le Soleil & le point réslechissant de l'eau, ou entre ce point & l'Arc-en-ciel, puisqu'on vient de voir par l'observation de M. Estienne & par celle de M. Celsius, que le phénomène a lieu dans l'une & l'autre position. M. Halley supposé du même côté que la ville de Chester, étoit dans le cas de M. Celsius, la rivière se trouvant de même vers le couchant, entre l'Observateur & le Soleil; & si l'on en juge par l'évènement, c'est le cas le plus savorable.

Sur le Haussement vrai ou apparent de la Mer auprès de certaines Côtes.

M. l'Abbé Conti voulant donner raison du Haussement de la Mer par rapport à quelques édifices de Venise où l'on croit l'avoir aperçu, s'est adressé à l'Académie pour sçavoir si l'on avoit des observations précises sur ce sujet, & pour lui en demander la communication; on n'a pû le satisfaire. M. Cassini, qui a beaucoup travaillé sur les marées, comme on le voit dans plusieurs volumes de nos Mémoires, a dit qu'à l'égard de celles de la Méditerranée, elles étoient si peu fensibles qu'on n'avoit sait aucune observation de la hauteur où elles avoient pû monter en dissérens temps. Il en est à peu près de même de celles de l'Océan pour la comparaison que M. Conti desiroit, quoiqu'elles soient beaucoup plus grandes & que l'on en ait plufieurs observations exactes, faites en divers ports du royaume. Nous n'avons nulle connoid nee qu'on sit marque anciennement la hauteur de la mer dans son flux & reflux, par le moyen de quelque point fixe. pour la comparer à celle qu'on y remarqueroit dans la suite; l'esprit d'observation & des expériences est trop moderne pour cela. Nous avons écrit là-dessus à M. Bigot de Morogues Capitaine des Vaisseaux du Roi, Correspondant de l'Académie, & très-capable d'un pareil examen, qui n'a pû nous éclaireir davantage sur cette matière. Il est entré seulement dans un détail qui nous en fait mieux fentir la dissiculté, du moins à l'égard du port de Brest, où il étoit lorsqu'il a répondu à nos questions. M. Froget de l'Éguille Lieutenant des Vairie aux di Roi du departement de Rochefort, en a mandé quelque chose d'équivalent à M. du Hamel. On ne peut nier cependant que le niveau de la mer n'ait changé à l'égard de certaines côtes, ou, ce qui n'est ni moins intéressant ni moirs vrai-semblable, que les côtes n'avent buissé ou haussé, & Il listoire nous fournit là-dessus des témoignages qui ne permettent

permettent pas d'en douter. Mais ces témoignages, où l'on n'a guère eu en vue d'instruire les Physiciens, ne les instruisent guère en effet, par le défaut de mille circonflances dont il feroit à souhaiter qu'on eût accompagné les faits. Dire au public que nous manquons d'observations sur ce sujet, c'est inviter les Sçavans à en faire.

VI.

Hauteur extraordinaire du Baromètre.

M. Allaman de Leyde, qui s'applique avec zèle au progrès de la Physique, Editeur de la Traduction Françoise des ouvrages de M. s'Gravesande, a mandé à M. l'Abbé Nollet, avec qui il est en commerce de lettres, que le 2 du mois de Janvier de cette année 1743, par un vent d'ouest & pendant une pluie affez abondante, le Baromètre avoit été plus haut à Leyde qu'on ne l'y avoit vû depuis 40 ans. Le mercure étoit monté à 29 pouces 9 lignes du pied du Rhin, c'est à 28 pouces 8 lignes & du pied de Paris, selon le rapport connu de celui-ci au précédent en raison de 144 à 139. On a vu ci-dellus * que le Baromètre de l'Observatoire · Page 14. est monté le même jour à 28 pouces 7 lignes, de 1 ligne? moins qu'à Leyde, sur quoi il resteroit à comparer les niveaux des lieux où les deux observations ont été saites. Tout ce que nous sçavons sur ce sujet par divers nivellemens de la rivière de Seine depuis Paris jusqu'à son embouchure, c'est que la grande falle de l'Observatoire est de 45 à 46 toises plus haute que le niveau de la mer, ce qui répond à environ 4 lignes ! de hauteur du mercure, & donneroit au Baromètre 2 8 pouces 1 1 lignes ; ainfi la hauteur du Baromètre à Leyde le 2 Janvier pourroit bien n'avoir pas été plus grande ni même aussi grande qu'à Paris le même jour, relativement aux lieux de l'observation, & supposé que la ville de Leyde soit assife sur un terrein moins élevé que celui de Paris, à quoi il y a beaucoup d'apparence, vu la proximité de la mer & la situation de la ville de Levde, qui est dans une plaine sur un bras du Rhin. En ce Hift. 1743.

ca il fautroit que le Barometre fut ordinairement, teutes proportions girdees, plus bas à Leyde qu'al Observatoire de Piris, ce qu'il seroit toujours bon de scavoir. & pourquoi; car il n'est pas sort rare à Paris que le Baromètre monte à 28 pences 7 lignes; cette année & l'année 1741 nous en sournissent des exemples, & si l'on remonte plus haut, on en trouvera de tout semblables ou plus sorts, sçavoir en 1737, 28 pouces 7 lignes; en 1726, 28 pouces 8 lignes; en 1722, 28 pouces 7 lignes \frac{1}{4}, &c. ce qui est bien dissérent d'une révolution de 40 années pour une seule de ces hauteurs de 28 pouces 7 lignes. M. Allaman ajoûteroit à l'obligation que nous lui avons de l'avis qu'il nous a donné, si, par la vérification des lieux & par la compartison de plusieurs années entre Paris & Leyde, il vouloit contribuer à éclaireir ce point

particulier de Physique.

Deux confiderations peuvent rendre le fuit dis ne de remarque. L'une, qu'en géneral les hauteurs du mercure dans le Barometre sont d'autant plus grandes en differens pays, que ces pays sont plus cloignez de l'Equateur & approchent du Pole: or la latitude de Leyde ou son éloignement de l'Equiteur surpille de près de 3 degrés & demi la latitude de Paris. L'autre, que les hauteurs & les variations du Baromètre, toutes compensations saites, conservent un grand accord & beaucoup de conformite entr'elles dans des ficux fort doignez, par exemple, à Uranibourg, Gines, Malaca & Paris, comme on la conclu de plusieurs observations correspondantes; & la distance de Leyde à Paris n'est pas à beaucoup près auffi grande que celle de tous ces lieux. On ne peut douter cependant qu'il ne s'y trouve d'affez grandes différences par rapport à plusieurs autres endroits; & c'est ce qu'il faut tâcher de connoître, ou du moins d'observer. Cette grande enveloppe d'air qu'on nomme l'Atmosphere, & dont la pelanteur locale & actuelle se fait fentir sur le Baromètre, doit par elle-même tendre sans ceffe a l'équilibre, & à une forte de parallelisme autour du globe terrestre, ainsi que tout autre sluide; mais elle a ses

DES SCIENCES.

vicissitudes & ses tempètes, aussi-bien que la mer, ses ssur & ses restux disterens, selon les circonstances & par le concours d'une infinité de causes générales & particulières.

VII.

Bouteilles d'une fragilité singulière.

Ces Bouteilles, dont le célèbre M. Wolf a envoyé la description & les propriétés à M. de Reaumur, furent apportées cet été par un Italien à Hall en Saxe où M. Wolf fait sa résidence. Elles ont la forme d'une pomme de canne ou d'une poire fort alongée; leur longueur est d'environ 8 pouces sur deux ou trois de largeur; le verre en est partout affez mince, excepté à leur fond qui est convexe en dehors, & de deux ou trois lignes d'épaisseur. Si par leur ouverture, qui peut avoir un ou deux pouces de diamètre, on laisse tomber perpendiculairement une pierre aussi grosse que cette ouverture le peut permettre, qui ne soit ni sort dure ni anguleuse, ou une balle de plomb beaucoup plus pesante, le fond & toute la bouteille demeurent dans leur entier. sans se casser ni se feler. Ainsi il est clair que ce n'est pas absolument la percussion, quoiqu'assez sorte, qui sait casser le fond de ces bouteilles; mais pour peu qu'on y fasse tomber un petit fragment anguleux de pierre à fusil, leur fond se casse en plusieurs morceaux, à peu près comme les Larmes de Prusse ou de Hollande. La bouteille se brise aussi jusqu'à quelques doigts au desfus, mais si elle se rompt plus haut & au delà du milieu de sa longueur, c'est en gros morceaux, souvent irréguliers, & quelquesois en forme de couronne ou d'anneau, peut être par le retentissement soudain de toutes ses parties. M. Wolf croit que ces bouteilles, de même que les larmes de verre, ont été refroidies dans l'eau en sortant du four, & sa conjecture ne paroît pas douteuse; on connoît les larmes de Hollande, leurs phénomènes sont décrits dans la plûpart des Traités de Phyfique; elles fouffrent le marteau quand on en frappe la tête, mais elles se réduisent en

44 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

pondre lorquion les rompt par l'extremite de la queue qui ett quelquetois prelquiautii delice qu'un cheveu. Le même effet arrive fill on use latete de la larme for une pierre a equiter, junguia la protondeur de quelqu'une des petites toufilures ou bulles qu'on y apercoit. Il n'est pis ctona intique les is fissent à d'affez grands coups de marteau, le verre dont elles font faites étant par lui-même très-dur, & le devenant peut-être encore davantage par l'espèce de trempe qu'on lui donne; mais la façon dont elles se brisent à la moindre rupture de leur queue, n'est pas si ailee à comprendre. On croit cepend int Pexpliquer affez bien par l'Irruption foud ine d'une matière subtile & apparemment très-agitée ou très-élastique, qui se glisse dans les intentices de leurs parties interieures moins serrées que leur surface, & qui les fait éclater avec force de tous côtés. Cette théorie peut s'appliquer naturellement aux bouteilles dont il s'agit; le caillou anguleux, dur & tranchant qu'on y laitle tom! er, brile, egratigne en quelque point la pellicule dure & compacte de leur fond que la fubiliance molle du plumb, ou la furface unie d'une plus grotte pie re n'ont pu entamer & ou elles n'ont pu ouvrir l'entree a cette matiere Subtile dont nous venons de parler. Mais il sera plus prudent d'attendre qu'on connoisse mieux la fabrique de ces bouteille. & qu'on en ait bien des fois répeté l'experience & conflué les phénomènes, avant que d'en venir à l'explication; & d'aritant plus que j'y apercois une difference confiderable par rapport aux larmes de Hollande, celles-ci pouvant être quelquefois limées & ufees jutqu'à une ligne de protondeur ou au delà, sans éclater, ainsi qu'il a été dit ci-dessus & que je l'ai éprouve, tandis que le fond des bouteilles dont il s'agit ne scauroit souffrir la moindre solution de continuité, la moindre ¿gratignure fans fe caffer en pluficurs morceaux.

Depuis que la lettre de M. Wolf eut et lue à l'Académie, M. le Due de Suint Aignan, ci devant Ambaffadeur extraordinaire du Roi à Rome, nous fit l'honneur de venir à une de nos Assemblées, & y apporta deux ou trois de ces bouteilles qu'on lui avoit données à Bologne où elles sont tort connues; elles furent mises à l'épreuve qui réussit à peu pres de la manière que nous venons de décrire. Nous avons appris aussi qu'on en avoit sait d'autres toutes semblables ailleurs, & en France tout proche de Paris, qui avoient eu le même succes, quoiqu'elles n'eussent été resroidies qu'à un air froid en sortant du sour. Il faut essayer si la partie extérieure du sond peut soutenir la percussion, & souffrir quelque temps la limme, comme les larmes de Hollande, auquel cas la dissérence que nous y avons remarquée se dissiperoit presqu'entierement, la partie intérieure & centrale de la tête de ces sarmes répondant en quelque saçon à la surface intérieure du sond de nos bouteilles.

VIII.

Expériences fur l'E'lectricité.

M. Bose Professeur de Physique à Wittemberg dans le Duché de Saxe, nous a communiqué des expériences nouvelles & curieuses qu'il a faites sur l'Electricité, matière qui devient de jour en jour plus séconde en merveilles sans nombre & sans exemple. Les expériences de M. Bose ont été remises à M. l'Abbé Nollet, qui étant particulièrement chargé de travailler sur ce sujet, en sera part au public, & rendra à leur auteur le témoignage dû à son sçavoir, & à ses attentions pour l'Académie.

LX.

Sur la distribution methodique des Coquillages, & description particulière d'une espèce de Buccin ou de Limaçon terrestre.

L'Histoire Naturelle est si vaste, & les objets qu'elle nous présente dans chacune de ses parties sont si nombreux qu'on ne sçauroit les retenir & les embrasser tous, sans les considérer sous certains aspects genéraux que s'on divisé encore en genres & en espèces. Ainsi les Botanistes ont etabli d'abord leurs Classes de Plantes, ensuite leurs Familles, leurs Genes,

& enfin leurs Espèces qui caractérisent ces plantes dans un plus grand détail. On en a fait autant des animaux, qu'on a divisez en quadrupèdes, oiseaux & volatiles, poissons, crustacées, insectes, reptiles, amphibies, vers, coquillages, &c.

Les Coquilles ont donc été aussi distribuées en classes, samilles, genres & espèces. Objet de la simple curiosité par les beautés extérieures dont elles brillent, elles ont sait bientôt celui des recherches sçavantes des Physiciens & des Naturalistes. L'animal destiné à vivre sous ce toit singulier par sa structure, par la vivacité & par la variété de ses couleurs, n'étoit pas cependant moins digne de leur attention; ils la lui ont donnce a d'autres egurds, mais ludificulté de l'observer & de le disséquer, le peu de consistance de ses parties dont la sigure varie même sans cesse par ses mouvemens, s'ont sait négliger dans la distribution me shodique des coquillages.

Nonobstant ces difficultés il a paru à M. Daubenton Docteur en Médecine, qu'il seroit à propos de faire entrer la confideration des animaux dans cette diffribution, & c'est le sujet d'un Mémoire qu'il est venu fire à la Compagnie. Il convient & il prouve par plutteurs raifons que les caractères qu'on établit sur les seules coquilles, sont aussi certains & plus distincts que ceux que l'on pourroit tirer des animaux qu'elles renferment. Les coquilles, dit-il, sont modelées sur ces animaux dans les premiers momens de leur formation. & lear accralifement fe falten meme proportion. La coquille du gros limaçon de nos jardins fait déjà plus d'un tour de spirale lorique ce coquillage vient de naitre; l'animal en remplit alors toute la capacité, & par confequent il est tourne de même en spirale. Des ce premier tour la cavité de la coquille est un peu évasée du côté de son ouverture; les tours qui suivent, gardent dans leur accroissement à peu près le même ordre & la même loi de progression que le premier, parce que les parties de l'animal grossissent de même. Dans les coquilles Biralres ou de deux pièces, que l'on nomme communément à deux battans, les animaux ne sont point tournez ca volute, auti n'v a t-il point de volute à la coquille. Le

corps du poisson nouveau-né est couvert seulement de deux petites lames de coquille, une sur chaque face, & à mesure qu'il grossur, les deux battans s'alongent, s'élargissent & prennent le contour de sa convexité. On voit le même accord jusque dans les coquillages à Opercule; cette partie qui est de la même substance que la coquille, s'étend & s'épaisset à mesure que l'entrée dont elle est le bouchon ou le couverele, devient plus grande. La coquille est donc un tableau sidele de la sigure de l'animal, du moins dans l'état de repos, & par cette raison jointe à toutes celles que nous avons touchées ci-dessus, on a du lui donner la presence sur l'animal même, regardé tout seul, dans la distribution méthodique des Coquillages.

Mais M. Daubenton remarque en même temps que la connoitsance des animaux & de l'intérieur de leurs coquilles est quelques ois indispensable pour s'assurer de certains caractères distinctifs que la seule inspection extérieure ne nous eut jamais dévoilez. Il faut donc y avoir égard pour former un système complet de Conchyliologie & une distribution de genres & d'espèces qui réponde à toutes les variétés de la

Nature.

Entre les preuves & les exemples que M. Daubenton en apporte, il infifte principalement sur une petite espèce de Limaçon ou de Buccin terrestre qu'il croit avoir été inconnu jusqu'ici en ce qui regarde une sorte d'opercule qui tient a la coquille, & non à l'animal, en quoi il differe des opercules proprement dits. L'animal abaisse celui-ci en sortant, & des qu'il rentre, cet opercule se remet en place de lui-mome par fon élasticité, c'est pourquoi M. Daubenton lui donne le nom d'opercule à ressort. Le Buccin dont il s'agit, & qui se trouve communement dans les mousses des vieux murs, est du genre de ceux qu'on a nommé L'inques, parce qu'étant couché sur sa base ou sur son ouverture, ses spires ou helices vont en montant de gauche à droite, & au contraire s'il est regardé par son ouverture tournée vers le speclateur; car parmi ce nombre infini de limaçons, de buccins, de pourpres, de trompes, &c. qui couvrent la terre & qui remplifient les HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE fleuves & les mers, il est plus rare qu'on ne croiroit d'en trouver dont les spires soient tournées en ce sens, & n'aillent pas de droite à gauche dans la position où celui-ci va de gauche à droite. Mais nous ne suivons pas M. Daubenton plus loin dans la description de cette coquille & de l'animal qu'elle renserme, non plus que dans les conséquences qu'il en tire par rapport à son sujet; il pourra sui-mème, s'il le juge à propos, faire usage de toutes ces recherches dans l'Académie, où il a cte recu quelques mois après y avoir su le Memoire dont nous venons de parler.

X.

Sur une espèce de Ver qui vient à la langue des Chiens.

Cette espèce de Ver, qu'on peut appeller Sublingual, qui naît ou qui s'attache au deflous de la langue des Chiens, se trouve être fort commun dans certains pays, & sur-tout en Routillon & a Perpignan où M. Barrere, Correspondent de l'Académie, & Professeur en Médecine, l'a observé. Il est pour l'ordinaire blancheatre, rond, de la fongueur d'environ deux pouces, & d'une ligne de diamètre vers le milieu du corps, pointu par les deux bouts, principalement par sa queue qui est fort esfilée sur la longueur de trois ou quatre lignes, & assez semblable à celle d'un têtard. Il se tient caché fous le milieu de la langue de l'animal, & s'y étend communément depuis le filet ou le frein jusqu'à la pointe. adhérant à la superficie sous la membrane externe ou épidermoide, à travers laquelle il est aisé de l'apercevoir. Vû avec la loupe, il ressemble à un petit intestin boursousse. luisant & poli dans toute sa surface, & l'on y distingue trèsbien la tête & la queue. La tête a une petite fente, & qui en est apparemment la bouche, d'environ une demi-ligne, un peu en deça de son extrémité. Il seroit à souhaiter que M. Barrere, qui a joint une figure à son Mémoire, nous eût envoyé le Ver même avec la langue du chien qui en étoit attaque. Les petits chiens couchans & les chiens de berger font

49

font les plus sujets à cette maladie, du moins en Roussillon où M. Barrere ne l'a point remarquée dans aucune autre espèce. Le mal s'annonce par une faim & une maigreur extraordinaires qui augmentent à mesure que le Ver devient plus grand, & dont la suite est une mort certaine, si l'on n'a soin d'y remédier. Toute la cure consiste à enlever ce Ver avec une aiguille ou avec un petit morceau de bois dur & pointu; mais il faut attendre pour cela qu'il ait aquis une certaine grosseur, parce qu'aup uravant on ne sçauroit s'apercevoir. On ne met rien sur la plaie; il est même bon de sa saisser saigner. Nous n'entrerons point dans un plus grand détail de l'opération, non plus que dans la recherche de l'origine & de la production de cet insecte, sur quoi l'Academie attend de nouveaux éclaircissemens.

XI.

Grand Os fossile trouvé en Bourgogne.

Des coupeurs de bois trauvèrent il y a quelques années un grand Os à deux pieds de profondeur en terre, dans une forêt qui est entre Challon & Tournus. Cet Os sut remis à un Curé du voisinage d'où il passa en d'autres mains, & il est ensin parvenu jusqu'a M. Geotsroy qui en a fait part à l'Académie.

C'est, seson toute apparence, un grand fragment de l'omoplate d'un Elephant, ou de quelqu'anim d'marin & cetacce; mais le plus grand nombre des connoitseurs le jacent être d'un éléphant. L'omoplate est cet os plat & à peu prestriangulaire, situé à la partie possérieure de l'épaule dans l'homme, ou de chaque côté de l'avant & de la poitrine dans les quadrupèdes. Celui-ci qui est rompu à une de ses extrémités, a ençore 2 pieds 3 pouces de longueur, & comme il y en a bien au moins 3 pouces de détruit, c'est en tout 2 pieds 6 pouces qu'il pouvoit avoir étant entier. Sa plus grande largeur est d'environ les deux tiers de cette longueur, ou de 20 pouces. La tête & le col de l'omoplate, ou la partie de

Hist. 1743.

HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

cet os qu'on peut appeller l'angle supérieur dans l'homme & l'angle inférieur dans les quadrupèdes, est ordinairement d'une flibîtance diploique ou spongieuse, & il en faut dire autant de la crete, de l'épine & des bords; le reste est composé de lames ctroitement unies les unes aux autres. Dans l'omoplate fossile dont il s'agit, les bords n'existent plus; mais la tête, le col & la crète qui reflent, sont d'une substance diploïque, & ce qui s'est conservé des autres parties est compacte & solide. Nous ne pousserons pas plus loin cette description.

Quant à la grandeur de cet Os, qui semble indiquer une taille démesurée, & qui auroit peut-être passé autresois pour une preuve incontestable qu'il y a eu des géans, en quels géans! il n'y a rien ici d'extraordinaire, même dans la supposition qu'il appartenoit à un animal terrestre. Voici d'où

l'on peut le conclurre.

HILL IN p. 196. * M. Sande P. Ac. forms, partis, 8.91.

L'Eléphant qui fut disséqué à Versailles par M. Duverney • Paller L en 1681*, & dont M. Perrault nous a donné la description anatomique avec les figures*, avoit 7 pieds & demi de hauteur, à prendre depuis le haut du dos jusqu'à terre, quand il fut dissequé, & n'ayant encore que 17 ans. On scait que les animaux de son espèce croissent bien au delà de cet age, & que, selon Aristote, Pline & quelques autres Auteurs, leur jeunesse ne commence qu'à 50 ou 60 ans. Son Omoplate étoit cependant de 22 pouces de longueur. Donc, par une règle de proportion, & en supposant que cette partie croisse à peu près en même raison que les autres, l'Eléphant de notre Omoplate fossile aura eu tout au plus 10 pieds 3 pouces de hauteur : cela fait, je l'avoue, un grand éléphant; mais on trouvera dans les livres des Naturalisses anciens & modernes, & dans les relations des Voyageurs, qu'il y en a de plus grands dans les Indes. Gillius dit en avoir mesuré un qui étoit à Constantinople, & qui avoit 10 pieds in pouces de hauteur, &, selon Scaliger dans ses notes sur l'Histoire des animaux d'Aristote, il y en a de 9 coudées ou de 13 pieds & demi.

XII.

Grand morceau de Crystal rempli d'Amiante.

On voit souvent de petits morceaux de Crystal de roche dans lesquels paroiffent différentes substances heterogenes, des pailles, des brins d'herbe, de la terre, &, ce qui est plus rare, de l'Amiante, autrement Albeste ou lin incombattible, matière minérale & talqueuse qui ressemble beaucoup a l'alun de plume; & tout petits que sont ces cryslaux, on seur donne place dans les Cabinets d'Histoire Naturelle. Aussi a-t-on regardé comme fort curieux & fort rare par la groffear, un grand morceau de Crystal de roche rempli d'Amiante, que M. Morand a montré à l'Académie. C'est un bloc irregulier & à plufieurs faces, les unes planes & polies, les autres convexes ou concaves, brutes & raboteuses, qui a 5 pouces \(\frac{1}{2}\) de hauteur, depuis une espèce de base un peu arrondie, jusqu'à une pointe pyramidale & à quatre pans irréguliers qui le termine, & de 4 pouces dans sa plus grande largeur; il pèse 4 livres moins 2 onces.

Ce bloc de crystal semble résulter de trois morceaux qui s'ajustent ensemble, qui en quelque façon se pénètrent, & dont le plus gros laisse à découvert trois faces & quatre angles, les deux autres morceaux lui étant unis dans l'espace qu'auroient occupé les deux autres faces & le cinquième angle de l'extrémité d'un prisme pentagonal, dont il a sa figure, ce qui n'est pas le plus ordinaire; car en général c'est la figure hexaèdre que les crystaux affectent plus que toute autre, soit comme prismes, soit comme pyramides. Ils sont souvent l'un & l'autre, prismes par le milieu, pyramides plus ou moins oblongues par les deux bouts, & cela par la seule industrie de la Nature dès seur première formation, & jusqu'a se montrer sous ces figures dans leurs plus petites parties,

& réduits en poudre.

Celui-ci, comme nous l'avons dit, contient beaucoup d'Amiante dans son intérieur; cet amiante y est logé &

rationale par files ou faile aux de différentes groffeurs, dans des tuyaux à peu près cylindriques qui traversent obliquement & parallèlement entr'eux toute la masse du crystal, depuis sa base où l'on voit l'ouverture de quelques-uns, jusqu'a sa pointe & à se saces seperieures où ils se terminent sans les percer. La transparence du crystal permet à l'œil de fuivre les tilets d'amiante dans ces conduits dont ils parolisent remplir exactement la cavité.

Ĉe morceau avoit été pris dans les Pyrénées, & donné à un Genéral Autrichien qui étoit à Barege; ce Genéral vint à Paris, & en fit préfent à M. Morand qui avoit acheve de le guerir d'un coup de feu, pour lequel il étoit alle aux éaux.

XIII.

Ivoire rendu flexible & transparent.

M. Geoffroy a fait voir à la Compagnie une petite cuillier d'Ivoire que de la moutande où elle a trempé long-temps, a rendu tlexible & transparente comme de la corne. Ce fait que l'Academie a jugé digne de remarque, peut aider à en cellareir un autre fort femblible que nous avons rapporté dans l'Histoire de l'année dernière*.



ANATOMIE.

SUR LES MONSTRES.

T Es Monstres, tels que les enfins à deux têtes, & en v. les M. général tous les sœtus, soit de l'homme, soit des ani- P-335. maux, qui diffèrent de la commune espèce par la structure ou par le nombre de leurs parties internes ou externes, naissent-ils de germes monstrueux, ou ne sont-ils que l'effet du désordre & du mélange sortuit de deux ou de plusieurs germes dans le sein de la mère? C'est le sujet d'une question qui a été long-temps agitée dans l'Académie entre M.W inflow & M. Lémery, & dont nous avons déjà fait mention dans l'Histoire de 1742*, & dans l'Eloge de M. Lémery *. Nous ajoûtames que M. Winflow s'étant presque toujours contenté d'exposer les saits sans toucher aux conséquences, attendoit a la consequences, attendoit a la consequences de la consequence del consequence de la conseque patiemment que M. Lémery eût tout dit, pour lui répondre, & pour nous donner sa véritable pensée sur ce sujet. Il l'exécute présentement dans le dessein de n'y plus revenir, soit Hinton donnate à caule de la mort de son illustre antagoniste, soit parce qu'il marques sur les croit après cela la question suffisamment éclaircie d'après les Meghes. pièces rapportées de part & d'autre.

Avant qu'on eût découvert, ou qu'on fût convenu parmit le plus grand nombre des Physiciens & des Anatomistes: que toutes les générations des corps organifez le font par des œufs ou par des germes qui les contiennent en raccourci, il ne pouvoit guere y avoir de véritable dispute sur l'origine des Monstres, du moins étoit il disticile de ramenci la dispute à une Physique intelligible. Une meprife ou un jeu de la Nature étoit la cause ordinaire qu'on donnoit de leur formation. Ce n'est que vers la fin du dernier siècle qu'on a commencé d'imaginer sur ce sujet une sorte de méchanisme, mais encore

ses dernières Re-

* Paged to

HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

bien vague & toujours fondé sur la consusion des germes dans le sein de la mère. Ainsi M. Duverney peut être regardé comme le premier qui ait mis la question en règle & qui ait osé soûtenir contre l'opinion dominante des modernes, que les Monstres viennent d'œufs ou de germes primitivement monstrueux, & qu'ils sont organisez avec autant d'art & de fagelle & pour une sin aussi déterminée que ce que nous appellons les animaux parfaits. M. Regis s'étoit déjà déclaré en faveur de la même opinion dans sa Philosophie, mais en passant, & sans entrer dans aucun détail anatomique. Le premier Mémoire de M. Duverney sur ce sujet parut en 1706*. à l'occasion de deux ensans joints par la partie inférieure de

"Min. p. 415.

leurs corps.

M. Winflow qui est entré dans la même carrière, plus réservé cependant & moins décisif que M. Duverney sur l'hypothèse des germes monstrueux, mais peut-être encore plus fécond en raisons de douter sur l'hypothèse contraire, à été presque seul à soûtenir tout l'effort de ceux qui la désendent, & qui de leur côté sembloient avoir entièrement remis leurs intérêts à M. Lémery. On peut voir les Mémoires de ce dernier dans les volumes de 1724* & 1738*, & enfin dans celui de 1740*, où il y en a cinq, tout ce qui nous * restoit de lui sur cette matière, soit avant, soit après sa mort, ayant été mis dans ce volume dont l'impression n'étoit pas encore achevée lorsqu'il mourut. Le Mémoire de 1724 sur un enfant à deux têtes, double par cette partie & par l'épine du dos, mais simple & unique par la poitrine & par le reste du corps, est comme la base & la source de cette dispute.

* Pust da.

* IF. 109.

210, 433. 5170607.

Page 21.

Les Mémoires de M. Winflow qui s'y rapportent, ont été * Page 366. donnez en 1733*, 1734*, 1740* & 1742*. C'est de ces * Poge 453. quatre Mémoires qu'il part aujourd'hui, & dont il rappelle * Page 586. quelques articles dans ce cinquième, qui doit être, comme il nous l'annonce, le dernier qu'il écrira sur la question des Monstres.

> Quelqu'équitables que soient deux adversaires dans le cours d'une dispute, il est dissicile qu'il ne seur échappe de

s'imputer réciproquement des opinions qu'ils désavouent, & dont ils croyoient avoir prévenu le reproche par des reftrictions disertement, mais quelquesois inutilement énoncées. en un mot, d'altérer & d'outrer l'opinion contraire, quand l'occasion se présente de la combattre par-là avec plus d'avantage. Sans examiner si M. Winslow est tombé dans ce cas, nous nous contenterons de répéter qu'il s'est toûjours borné à la question réduite à ses moindres termes & à l'examen des' faits revêtus de leurs circonffances les plus prochaines; mais la forme que cette dispute avoit prise entre les mains de M. Lémery, plus foûtenue de raifonnemens & d'inductions d'après un principe métaphyfique étranger au sujet, plus affirmative, plus pressante, sans aigreur pourtant, mais avec plus de tour & de véhémence, pouvoit quelquefois aisément lui faire perdre de vue les limites entre lesquelles M. Winflow s'étoit rensermé. Quoi qu'il en soit, nous ne doutons point que M. Lémery, foncièrement plein de douceur & trop éclairé pour ne pas sentir tout le mérite de son adversaire, ne fût un des premiers à lui rendre justice s'il pouvoit être encore un de ses lecteurs.

M. Winflow observe donc dans ce dernier Mémoire, que M. Lémery lui attribue plusieurs propositions qui sont manifestement contraires à la manière dont il s'étoit expliqué. Il en rapporte des exemples, & il revient sur quelques articles qu'il avoit traitez trop succinclement ou qu'il avoit omis, & qui lui ont paru dignes d'être accompagnez des mêmes réflexions que ceux où il étoit entré auparavant dans le plus grand détail. C'est principalement à ces deux objets que se réduit cette cinquième partie des remarques de M. Winflow for les Monthres. Par exemple, M. Lémery exclut abfolument toute e of armition in or arucule d'origine, & il attaque quelquefois M. Winflow, comme si celui-ci n'étoit pas moins exclusif à l'égard des conformations extraordinaires par accident. Mais M. Winflow déclare qu'il n'a jamais prétendu exclurre en toute occasion les conformations monstrueuses accidentelles, & il le pro ive par les expressions qu'il a employees.

56 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

M. Lemery appose que M. Window a traité de Monstres proprenient des réglets ordinaires que par quelque situation ou transposition de parties, tels, par exemple, que ce Soldat des Invalides qui sut disséqué en 1686 par M. Méry, & à qui l'on trouva toutes les parties internes de la poitrine & du bas-ventre situées à contre-sens; mais M. Winslow dit n'avoir jamais donné le nom de monstre ni à ce Soldat ni a aucun autre sojet de cette

espèce.

Nous ne voyons point cependant où seroit l'incongruité dans ce dernier cas, & ceci nous paroit entièrement tomber dans une question de nom; car de quoi s'agit-il dans cette dispute! n'est-ce pas de sçavoir si certaines conformations extraordinaires peuvent être expliquées intelligiblement par les seuls accidens arrivez au sœtus dans le sein de la mère. ou s'il faut avoir recours à une organisation preexistante du germe qui l'a produit? Or fi la transposition des partie est tel'e qu'on ne puisse pas mieux l'expliquer par les accidens que par la formation même des parties montlrueuses ou doubles, quel inconvénient y aura-t-il à traiter tous ces sujets de monttrueux? L'usage commun de la langue en sera tout au plus un peu bleffe, mais l'idee philosophique qu'en doit attacher ici au mot de Monstre ne le unoit en recevoir aucune atteinte; & il résultera toûjours de la chose, ou que la confusion des germes produit des conformations inconcevables par les loix de la Méchanique, ou qu'il y a des germes primitivement organisez d'une maniere toute différente du reste de l'espèce. Si la situation à contre-sens des parties internes du Soldat diffeque par M. Mery, re confittoit qu'en un renversement de parties de droite à gauche & d'avant en arrière, que le foie, par exemple, étant au côté gauche & la rate au côté droit, la partie naturellement antérieure de ces viscères regardat le dos, & la partie naturellement postérieure le devant de la poitrine, on pourroit dire peut être qu'ils auroient tourné comme sur un axe, & que par cette révolution commune, assez disficile pourtant à concilier avec la continuation

continuation de la vie du fœtus, ce qui étoit du côté droit auroit patie au côté gauche, & que ce qui étoit du côté gauche fe feroit placé au côté droit; mais ce n'est point là le cas du Soldat de M. Méry, tous ses viscères avoient seur partie naturellement antérieure & postérieure dans la position ordinaire à cet égard. Conçoit-on comme cette nouvelle ordonnance, par rapport aux sigamens, aux vaisseaux qui doivent l'accompagner, & à toute l'économie animale, a pû s'exécuter par le simple transport local & fortuit, ou le conçoit-on mieux que la formation d'une partie véritablement monstrueuse?

Prêtons-nous cependant à la délicatesse de M. Winslow sur ce point, & achevons de rendre ici ses vrais sentimens tels

qu'il les expose sui-même.

Il pense 1° Qu'en général les deux systèmes, des sectus monstrueux d'origine & des sectus monstrueux par accident, peuvent être employez selon les dissérens cas des conformations extraordinaires.

2° Que dans certains cas on ne doit y en employer qu'un des deux, sçavoir, lorsqu'on n'a point de raison sussiliante à donner en saveur de l'autre.

3° Qu'il y a des cas où l'on est obligé de recourir à l'un & à l'autre, en ce qu'aux consormations extraordinaires d'origine il peut en être survenu d'autres par accident.

4° Ét qu'enfin il se trouve plusieurs cas où les plus habiles. Phyticiens & Anatomistes seroient sort embarrassez à choitir

entre les deux systèmes.

Tout le reste du Mémoire roule sur des exemples relatifs à cette division, & principalement sur ces conformations extraordinaires qui ne peuvent être expliquées d'une manière satisfaisante, par la confusion des germes dans le sein de la mère, & nous y renvoyons le lecteur.

Cette doctrine soûtenue avec modération n'a pas laissé de faire des prosélytes, même chez les Etrangers, M. Haller, l'un des plus se ivans Anatomistes d'Allemagne, & Prosédeur d'Anatomie, de Chirurgie & de Botanique à Gottingen, a

Hist. 1743.

S HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

pris pal·li pement la défense de M. Winsiow contre M. Lémery, dans deux Differtations qu'il a publices sur ce sujet, april con examine quatre ou cinquens relations de Montles, & april en avoir diffe proplusieurs lui-meme. M. Winstow lui en a marqué sa reconnoissance & le cas qu'il fait d'un tel suffrage, dans plus d'un endroit de son Mémoire.

A l'égard de l'Académie, où le système de M. Duverney avoit déjà des partisans sorsque M. Lémery prit la plume pour le combattre, il n'y a pas d'apparence que le nombre en soit diminue depuis que M. W inflow a dopte ce système sur le pied qu'on vient de voir. Nous ne sommes point autorisez à en dire davantage, mais ce ne sera point nous écarter du but de cette Histoire, si après avoir été témoins de toute la dispute, nous osons rappeller ici quelques-unes des ré-

flexions qu'elle nous a fait naître.

Il n'est rien qu'on allègue plus volontiers, & à mon avis plus vigu ment, prar etablir la potlibilité des Munities, par accident, que la mollesse & la fluidité des substances qui composent le sœtus dans le sein de la mère. Les parties récipanjue de deux fœtus, par exemple, molles, tlexibles, & pourtant déjà organisées, peuvent, dit-on, se mêler aisément, s'ajuster ensemble sans se détruire, ou ne se détruire qu'en partie & dans l'un des fœtus, de manière qu'il en réfultera dans l'autre un tout monstrueux, ou un scetus autrement organisé qu'il n'auroit été dans l'ordre naturel. Mais approfondissons un peu cette idée, & voyons si elle n'est pas aussi difficile à concevoir que la formation même de l'animal ind p indumment de tout germe anterieur; car ne us l'avons dit, & les deux partis en conviennent, nul animal, nulle plante sans œuf ou sans germe qui en contienne toute la structure en petit. Quelque difficulte qu'un troilleme parti pat faire contre l'hypothèse des germes, il en faut toujours venir à quelque choie d'équivalent, c'est pourquoi nous n'intisterons pas davantage sur cet article.

Qu'on conçoive comme on voudra, les parties dont l'affin.bl., e doit taire le monstre ou l'animal, mit comme dures

& solides, soit comme fluides, ou, ce qui est plus consorme à la Nature, comme n'étant ni absolument dures, ni absolument fluides, ne faudra-t-il pas toujours que gaclqu'une de ces parties déterminée telle, & organifice de telle manière, aille se placer tout juste, ou se trouve auprès de telle autre également déterminée & par son espèce & par son organisation, pour y sormer le monstre, une seconde tête, par exemple, sur un seul tronc, un seul cœur dans deux poitrines jointes l'une à l'autre, un fixième doigt bien articulé sur une main, ou la plus petite portion d'un doigt? car il y a mille exemples de toutes ces fingularités, & il n'est aucune des parties qui les constituent, qui ne contienne une infinité de vaisseaux, de tendons, de sibres & de neifs qui ont leurs configurations, leurs places & leur structure particulieres, & déterminées relativement à un tout sans lequel elles ne sçauroient subsister. Le cœur, par exemple, la première de toutes les parties où l'on aperçoit le mouvement, punclum: saliens, & qui est vrai-semblablement le principe du mouvement à l'égard de toutes les autres, comment a-t-il pû se détruire dans une poitrine nainfante, sans que cette poitrine ait été détruite; sans qu'elle ait cessé de croître! Ou comment le cœur d'une autre poitrine qui se trouve jointe à celle-ci. avec laquelle il n'avoit le moment d'auparavant aucune communication, a-t-il pû lui communiquer le fang, le mouvement & la vie? Conçoit-on la prodigieuse quantité de nouveaux canaux. & de nouvelles jonctions qu'il faut y ajoûter ou y disposer pour cela, & ne sera-ce que l'esset du defordre & du hafard? Les parties organiques d'un animal étant une fois défunies, détruites, & pour le moins altérées par-là, dispersées & flottantes dans un liquide, j'avoue que je n'v vois plus ni germe, ni animal, ni partie quelconque d'animal, & que leur rétablissement sortuit ou leur réunion en un tout organisé, me paroît quelque chose d'aussi inconcevable que la géneration des infectes qu'on attribuois autresois à la simple putrésaction. Peu s'en saut du moins que cette mollesse de parties à laquelle on a recours pour

60 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

imaginer la formation d'un monttre par la réunion des germes, ou de quelqu'une de leurs parties dans le fein de la mère, ne nous rejette dans la même abfurdité. Cette mollesse & cette espèce de sluidité qu'on reconnoît dans le seetus naissant, & qu'il saut en esset y reconnoître, ne me paroît donc pas plus propre à expliquer la formation des Monstres par accident, que l'idant se ce parties, e apparent it du moint mantenir plus aissement ces parties dans leur état naturel.

Mais puisque nous ne scaurions raisonner ici que tur ce qui est plus vrai-semblable d'un côté, & plus difficile à concevoir de l'autre, tàchons de faire sentir d'après des idées exactes toute l'étendue & toute la force des difficultés qui se rencontrent dans le système de la consusion des germes.

Quand on veut évaluer par le calcul le degré de possibilité d'un hasard, on compte tous les cas qui le produisent, & s'on y compare tous ceux qui lui donnent l'exclusion, en multipliant chacun des cas favorables & désavorables par tous les autres de la même classe. C'est ainsi, par exemple, qu'on démontre, que s'il s'agit d'amener quatre sois de suite deux as avec deux dez, il y a à parier près de seize cens quatrevingts mille contre un qu'on ne les amènera pas; car il y a d'abord 3 5 contre 1, ou \(\frac{1}{36}\) à parier pour les amener une seule sois; ensuite \(\frac{1}{36}\) multiplié par \(\frac{1}{36}\), ou \(\frac{1}{1296}\) pour les amener quatre sois; chacun des cas savorables devenant inutile, si un seul de ceux qui les composent vient à manquer.

Appliquons cette théorie à quelqu'un des Monstres dont il est fait mention dans le Mémoire de M. Winslow. Nous choisirons l'enfant à vingt-quatre doigts, qui nous sut apporté cette année à l'Académie par un paysan & une paysanne de Dauphiné, à qui il appartenoit. Cet ensant, âgé de quinze à seize mois, avoit, & a vrai-semblablement encore, car il étoit plein de santé, six doigts à chaque main & à chaque pied, bien articulez, & qu'il remue tous de concert & avec la même

liberté. Quand on lui pretente quelque chose, un doigt, par exemple, pour le serrer, on sent que son sixième doigt ne le serre pas avec moins de sorce que les cinq autres; ce sixième doigt s'articule sur un os du métacarpe à la main, & du métatarse au pied, avec cette disserence seulement que celui de la main droite est articulé sur le même os de métacarpe que se petit doigt ordinaire, cet os se terminant par deux petites éminences ou têtes qui les soûtiennent tous les deux, tandis que celui de la main gauche a son os surnuméraire de métacarpe, & qui sui est propre. Mais le sixième doigt de chaque pied a son os propre de métatarse; de sorte qu'au sieu de cinq os à l'ordinaire, chaque métatarse en a six. Et de tout cela il résulte des mains & des pieds qui n'ont rien de dissorme, & qui paroittent seulement un peu plus larges qu'a l'ordinaire,

quand on y regarde de près.

A quelle prodigieuse quantité de hasards ne faut-il pas avoir recours pour produire un feul de ces doigts furnuméraires? Il faut d'abord que ce doigt se détache du germe ou du fœtus jumeau qui se détruit sans que la structure, la fituation réciproque & l'harmonie de tout ce qui le compose en soient altérées ou détruites, il faut qu'il s'en détache avec son métacarpe ou son métatarse, cet os qui le joignoit à la main ou au pied, ou qu'il trouve un métacarpe ou un métatarfe tout fait pour le recevoir fur la nouvelle main ou fur le nouveau pied où il va se greffer, & ce métacarpe ou ce métatarse quelconque doit être garni de ses tendons, de ses mulcles, de ses ners, en un mot, de tous les cordages & de tous les tuyaux nécessaires pour saire jouer la nouvelle machine. Eh en combien d'endroits ce doigt détaché par accident pouvoit-il être porté plûtôt qu'à cette jointure qui sembloit lui être destince sur une main ou sur un pied de l'autre fœtus! Mais encore à quoi servira tout ce méchanisme si industrieusement préparé si l'on ne met dans le bras, par exemple, auquel appartient cette main, & jusque dans le cerveau du lujet, de quoi donner le mouvement à une partie pour laquelle son bras & son cerveau n'avoient pas été faits?

62 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

Abrégeons ce détail de circonflances innombrables, n'en prenons que dix, & supposons à l'égard de chacune qu'il y ait seulement à parier cent contre un qu'elle n'arrivera pas; ce sera assurément mettre les choses, & de beaucoup, sur le plus bas pied. Cependant voici ce qui en résulte, en suivant la méthode indiquée ci-dessus, 100 multiplié dix sois par lui-même, donne 100000 00000 00000. D'une sur cent mille millions de millions multipliez par mille d'atsemblages de hasards possibles, il n'y en aura qu'un seul pour produire cet ensant avec une main ou avec un pied à six doigts, par le système des accidens. C'est donc sur ce degré de possibilité qu'il faudroit établir le pari.

Mais achevons le monstre, & donnons-lui fix doigts à chaque main & à chaque pied. La difficulté de le produire que nous venons d'évaluer par l'unité suivie de vingt zéro, devra dès-lors être multipliée quatre fois par elle-même, & il faudra ranger quatre-vingts zéro bout à bout après l'unité, pour l'exprimer; car la langue n'a pas d'autres termes pour

énoncer de pareils nombres.

Ce n'est rien encore, & ce nombre immense va disparoître devant celui qu'on doit lui substituer pour se faire une juste idée de la dissiculté d'après l'hypothèse, & selon les règles prescrites par les Géomètres pour déterminer le degré de

possibilité dans les événemens contingens.

Celui-ci ne peut arriver par le système de la consussion des germes sans qu'il n'y ait en même temps dans le sein de la mère au moins deux germes développez ou deux embryons tout prêts à croître; & autant que le cas est rare, autant faut-il diminuer le degré d'attente pour le phénomène en question. La singularité des accidens qui vont détruire l'un des deux jumeaux sans attaquer la vie de l'autre, doit aussi entrer dans le calcul. De plus nous n'avons jusqu'ici considéré & calculé l'aditiente que sur les hatard de quatre doigte que l'on pac de l'un des sœtus, qui vont se placer & recevoir une nouvelle vie sur les mains ou sur les pieds quelconques de l'autre sœtus; mais par l'inspection du lait il saut que chaque doigt tel de

l'un se soit allé articuler sur chaque main telle, droite ou gauche, de l'autre, & de même à l'égard de chaque pied; puisqu'il y a tel deigt de la main droite, par exemple, qui ne conviendroit point à la gauche & encore moins à un pied. Il paroit ici que c'est le petit doigt de chacune de ces parties qui fait le doigt surnuméraire, ce qui donne 625 cas, parmi lesquels il n'y en a qu'un seul qui soit savorable & qui résulte du concours de chacun des quatre exprimé par -, en supposant, comme nous devons suire, que le sœtus détruit avoit cinq doigts à chaque main & à chaque pied. Mais chacun de ses quatre petits doigts pouvoit être porté à telle main & à tel pied du fœtus vivant, où il auroit produit une difformité qu'on n'y a point observée, & quatre choses jetées au hasard donnent vingt-quatre changemens d'ordre differens; c'est donc encore un élément à introduire dans la composition générale du cas fortuit. Nous pouvons faire grace des combinaisons dont les os de métacarpe & de métatarfe de ces doigts avec tous leurs accompagnemens font fulceptibles. Done il faudra multiplier par l'expression numérique de tous ces élémens & de tous ces produits la difficulté repréfentée ci-dessus par quatre-vingts zéro précédez de l'unité, & par conséquent il saudra, comme on le voit assez, y en ajoûter des centaines.

Si des présomptions de cette espèce contre le système proposé ne sont pas une certitude morale, je ne sçais ce qu'on pourra qualifier de ce nom. Voilà cependant ce qu'on supposé, & les prodiges qu'il saut dévorer, lorsqu'on dit du bout des lèvres que la formation des Monstres peut être expliquée par

la confusion des germes.

Répondra-t-on que l'enfant à vingt-quatre doigts n'étoit pas un Monstre, puisqu'il n'avoit rien de dissorme ni de choquant? autre distinction peu philosophique, & sur laquelle nous ne ferons que renvoyer à ce que nous avons déjà dit en pareille occasion sur le Soldat des Invalides, à qui l'on trouva toutes les parties internes situées à contre-sens. Ce sera donc un germe bien extraordinaire, une conformation dissernte de celle de l'espèce commune, & dissernte d'origine. Mais

64 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE Feniant à deux teles que M. L'imery examina dans son premier Mémoire, étoit certainement un Monstre. Voyons ce qu'il fan appoler de hitards, & de hafards com liquez, qui en renserment cent autres, pour le former, pour saire que deux poitrines qui s'écrasent ou qui se compriment l'une contre l'autre, viennent à ne faire qu'une poitrine entière & paridic; que de deux cœars il nen demeure qu'un qui donne le mouvement & la vie à cette poitrine par tous les vaisseaux, tous les nerfs, tous les signmens & toutes les membranes qui doivent s'y rapporter; que les débris adjacens de tout ce qui vient de se détruire, ne nuisent ni au mouvement, ni à la circulation des liqueurs dans ce qui est conservé; qu'une seconde suite de vertèbres, une seconde épine du dos s'élève du milieu des lombes à côté de celle du fœtus épargné, & que les deux partant symmétriquement de ce point commun, comme deux branches qui poussent d'un même tronc, aillent chacune soûtenir une tête vivante bien organisée sur un corps unique à tous autres égards; car c'est-là le Monstre de M. Lémery. Comment la tête & l'épine du dos du jumeau dont le reste a péri, ont-elles pû se débarrasser de leur poitrine & s'aller transplanter au dessus, & dans une autre poitrine sans la faire périr ou fans périr elles-mêmes? Si l'on se donne la peine d'appliquer ici la méthode & le calcul dont nous venons de donner un exemple sur l'enfant à vingt-quatre doigts, j'ose assurer qu'on n'y trouvera pas de moindres disficultés.

Mais qu'oppose-t-on ensin à des dissicultés si énormes? des raisons d'analogie & de convenance. On ne conçoit pas que l'Auteur de la Nature, si fage, si régulier & si constant dans ses productions, ait voulu directement produire des Monstres, en créant des germes monstrueux; comme si nous étions dans le conseil de l'Auteur de la Nature, & si le monde entier ne nous offroit pas mille autres irrégularités plus importantes, à en juger d'après des vûes aussi bornées que ses nôtres. Nous cherchons la volonté du Créateur dans nos lamières, tandis qu'elle se manises des vies merveilleux, malgré

le nom

le nom odicux de Monstres que nous leur avons impose, à une Sagesse infinie qui nous cache ses motifs, nous aimons mieux les regarder comme l'ouvrage du hasard ou d'une vertu formatrice aveugle. Et si l'on insiste que le Créateur ne produit des Monstres que pour satisfaire à la simplicité des loix de la Nature dont ils sont une suite nécessaire, nous repondrons que ses loix de la Nature ne sont point différentes des volontés du Créateur.

On objecte encore que la plûpart des Monstres vivent peu, & qu'ils n'engendrent point. Mais ces faits sont tout au moins sujets à mille exceptions, & seur examen nous conduiroit bien au delà des bornes que nous nous fommes prescrites ; sans compter que la difficulté qui en peut resulter est d'un ordre tout différent de celle que nous avons exposée contre la formation des Monstres par cas fortuit. Le peu de soin qu'on prend communément des ensans monstrueux. apres leur naissance, une mauvaise honte & nos préjugés ne leur coûtent que trop souvent la vie. Aussi est-il plus ordinaire de trouver dans les forêts & parmi les brutes, des Monstres vivans, à deux têtes ou avec d'autres membres doubles, que parmi les hommes. Mais après tout, qu'importe à la Nature si riche & si séconde en individus merveilleusement organifez, que la vie de quelques-uns soit si courte? elle en produit à tous les instans des milliers qui n'ont à vivre qu'un jour, & il en périt chaque jour d'autres milliers sous nos pas, ou qui n'étoient nez que pour servir de pâture à Heurs femblables. Quant à la génération ou à la propagation de l'espèce à l'égard des Monthres, c'est encore une grande question, & sur laquelle nous manquons d'expériences.

Les insectes qu'on a découvert qui se reproduisent dans chacune de leurs parties après avoir été coupez par morceaux, les plantes qui se multiplient par boutures, si analogues par-là & par tant d'autres endroits aux insectes, & sur-tout les fruits doubles ou monstrueux & les plantes irrégulières, ont paru à quelques personnes sournir des inductions savorables à la production des Monstres par accident; inductions vagues,

Hist. 1743.

& qui la plûpart roulent sur des effets dont la cause est encore très obscure. Il ne faut qu'un léger examen pour en

diffiper l'illution.

Car ou ces infectes & ces plantes naissent de germes déjà tout formez selon l'ordre commun. & contenus dans chacune des parties qui reproduisent l'insecte ou la plante, ou il se forme dans ces parties de nouveaux germes, ou il naît de nouveaux infectes & de nouvelles plantes sans l'intervention des germes? L'alternative ne foutlie point d'exception; il faut nécessait lieu, ou que deux d'entr'elles ou que toutes les trois concourent à la formation du Monstre.

Le premier cas n'influe en rien sur la question, puisqu'il ne porte que sur des productions dues à des germes anterieurs dont la nécessité est reconnue de part & d'autre. Le second & le troisieme supposent ce qui est egalem nu rejete dans les deax systèmes, scavoir, la formation accidentelle des germes. ou de l'animal & de la plante sans germe preexittant : & à l'égard de la complication ou du concours de ces causes. deux à deux, trois à trois, & de quelque manière qu'on les prenne, on ne peut l'admettre, parce qu'il y en aura toujours au moins une des deux dernières qui sont incompatibles avec

l'hypothèse.

Les végétations irrégulières ne sont si communes, & les fruits monttrueux, qu'on peut même se procurer par art, ne sont si fréquens qu'à cause de la multitude infinie de germes que renferment toutes les parties des plantes*, & par la facilité avec laquelle on peut faire couler & circuler le suc nourricier de l'une dans les vairleaux de l'autre. Le développement de quelques-uns de ces germes qui se trouvent accouplez par leurs capfules ou par leurs parenchymes, s'acheve aitement sans que leur organisation en soit détruite, & il en résulte un fruit monstrueux. La même chose arrive, quoique plus rarement, à certains fœtus doubles qui ne tiennent l'un à l'autre que par leurs tégumens; mais deux têtes sur un seul trone, deux cœurs dans une seule poitrine ou dans un seul

} 42.

péricarde, font des Monttres d'une toute autre espèce, & qui exigent visiblement une structure préexistante qui n'est ni moins déterminée, ni moins admirable que celle des animaux les plus parsaits. Dans tous les Monstres qui ont été examinez, disoit M. Duverney, & sans exception, il y a toujours eu une structure interne aussi extraordinaire que leur figure extérieure l'exigeoit & paroitioit disserente de celle des autres animaux de la même espece. Qu'après cela les plantes ayent aussi seurs Monttres d'origine, il n'y aura rien que de très-conforme à l'ordre général de la Nature.

On ne sçauroit donc tirer aucun avantage de tous ces exemples, ni de toutes ces convenances en saveur du système des productions monstrueuses par le mélange & par le désordre des germes dans le sein de la mère : les dissicultés qu'on vient de voir ne balanceront point celles que nous y avons opposées d'après ses idées de méchanique les plus claires &

les plus exactes.

Si nous nous montrons là-dessus un peu plus décisifs que M. Winslow, notre guide & notre maître, ce n'est pas cependant que nous nous flattions d'avoir mis la question hors de doute. Nous reconnoitsons que c'est ici une espèce d'enchère où il ne s'agit que de donner la présèrence à celui des deux partis qui alléguera de meilleures raisons, c'est-à-dire, plus vrai-semblables; car de preuve sans replique, ou de démonstration absolue, il ne sçauroit y en avoir. C'est là le sort de toutes les questions de Physique qu'on ne peut soûmettre à des expériences réglées, & qu'on ne sçauroit éclairer du slambeau de la Géométrie; mais il est toújours utile de les discuter, &, s'il est possible, d'en apprécier l'incertitude: les esprits en seront d'autant plus disposez à recevoir les nouvelles connoissances que les temps peuvent y amener.

M. Winflow nous fait espérer, en simillant son Mémoire, qu'il nous donnera bien-tôt les observations particulières qu'il avoit promises sur les essets attribuez à l'imagination des mères enceintes. Ce sera de quoi jeter un nouveau jour sur la question des Monstres, malgré la résolution qu'il dit avoir

68 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE prite de n'en plus parler. Nous olons affurer M. Winflow que le public ne lui tiendra pas rigueur fur ce dernier engagement.

SUR LE STRABISME.

V. les M. p. 231.

E Strabisme ou le regard louche consiste dans cette disposition vicieuse de l'organe de la vûe, qui fait que quand l'un des deux yeux se dirige vers l'objet, l'autre s'en écarte & se dirige sensiblement vers un autre point. Les Autron de Medecine & de Phytique ont imagine différentes causes de cette disposition, & ils en ont donné dissérentes explications en conséquence de leurs hypothèses. M. de Boffen, pres aveir mentre l'infufflance de leurs idees fur ce sujet, prouve d'après un grand nombre d'observations, que la cause ordinaire du Strabisme est l'inégalité de force dans les deux yeux. Lorsque l'un des deux yeux se trouve être beaucoup plus foible que l'autre, on écarte cet ceil foible de l'objet qu'on veut regarder, ou l'on ne fait pas l'effort nécessaire pour l'y diriger, & l'on ne se sert que de l'œil le plus fort. Cett tans doute par un semblable sentiment de force dans une partie plus que dans l'autre, que le commun des hommes se sert plus volontiers d'une main que de l'autre, & d'ordinaire plus aisément de la droite que de la gauche, soit par une suite de l'éducation, soit parce qu'en général la disposition intérieure y est plus favorable; car l'éducation même & l'usage immémorial des Nations à cet égard doit avoir une cause qui n'est pas vrai-semblablement le hasard, & encore moins une convention expresse ou tacite entre des peuples qui dissèrent si fort de lieux, de temps & de coûtumes. Quoi qu'il en soit, il ne résulte de là aucune difformité, au lieu que le regard Jouche gâte les plus beaux visages. M. de Busson détermine le degré d'inégalité qui le produit, & les cas où l'on peut esperer de diminuer ce défaut, & même de le corriger entièrement. Le moven en est tort simple, & a l'avantage d'avoir

réuffi pluficurs fois. Il ne s'agit que de couvrir pendant quelques jours le bon œil avec un bandeau d'étoffe noire. C'est à peu près comme fi on lioit le bras gauche à un enfant qui de naissance ou par éducation se trouveroit être gaucher; car dans le cas d'une inégalité où la plus grande force n'est pas insurmontable ni la foiblesse sans ressource, l'art, la contrainte, & enfin l'habitude viennent à bout de modifier, de changer même la Nature ou une autre habitude, de manière que le sang & les esprits se portent ensuite vers la partie la plus foible avec plus de facilité qu'ils n'auroient fait par un premier sentiment. M. de Buffon a guéri par cette pratique un grand nombre d'enfans & quelques adultes. Nous renvoyons au Mémoire où l'on en lira avec plaisir la théorie & les détails, tous fondez sur des observations & des inductions délicates. qui perdroient beaucoup à être séparées de leurs preuves.

SUR LA FORMATION DES OS.

SUR LA REUNION DE LEURS FRACTURES.

T ES Recherches & les Découvertes de M. du Hamel V. les M. If fur la formation & l'accroiffement des Os, fur la cause pp. 87, 111, & sur la guérison de leurs maladies, & principalement sur la réunion de leurs fractures, méritoient d'être portées aussi loin qu'elles pouvoient l'être par les nouvelles observations & les nouvelles remarques dont il les a accompagnées. Nous avons donné une idée de sa théorie sur ce sujet dans l'Histoire de 1741*, & nous avons indiqué la continuation de son travail sur ce même sujet dans celle de 1742*. Comme il avoit commencé de méditer sur cette importante matière dès l'année 1739, à l'occasion des os teints en rouge dans les animaux qui avoient été nourris d'alimens où l'on avoit mêlé de la racine de garence, & qu'il en avoit aussi donné un Mémoire, celui de 1 = 42 faifoit le troificme. Nous voici prefentement au feptième par les quatre autres qu'on troavera dans ce volume.

* Page 45. * Page 40. 70 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

On a vu en 1-41 que la ginération & la structure des deux espèces de corps vivans, les plantes & les animaux, & en particulier la réunion de leurs parties par le cal, se ressemblé ient extremement, celt ce qui est beaucoup plus approfondi dans les quatrième & cinquieme Memoires. M. du Hamel se propose dans le quatrième d'établir sur de nouvelles preuves, que les Os croissent en grosseur par l'addition des couches oficules qui tirent leur origine du periothe, comme le corps ligneux des arbres croit en grosseur par l'addition des couches ligneuses qui se sorment dans l'écorce.

L'accroiffement des Os en longueur oft traité dans le cinquième. Il s'opère auffi par un mechanisme très-approchant de celui que fuit la Nature pour l'alongement du corps ligneux

dans les bourgeons des arbres.

D'habiles Chirurgiens avoient demandé à M. du Hamel l'explication de quantite d'operations de Chirurgie & d'observation, anatomiques qui leur paroiffoient inexplicables par ses principes; il y taalstat dans le fixième Memoire, & c'est par cinquante & une observations toutes aussi detaillees qu'elles doivent l'etre, & auxquelles il a joint des reflexions pour montrer qu'elles s'accordent parsaitement avec sa théorie.

Enfin le leptième Mémoire contient le détail d'une maladie fingulière, pendant laquelle une fille a perdu à différentes fois presque tout [Language], cet os qui s'étend depuis l'épaule jusqu'au coude, sans que son bras se soit accourci, ni qu'elle

en ait été aucunement estropiée.

Nous n'entreprendions point de donner un extrait de ce nombre immente d'obtervations, & nous pouvons d'autant plus nous en difpenser qu'on en trouvera une récapitulation & un resumé à la page 3 1 5 de ce volume, de la même main qui en a preparé les matériaux avec tant de lumiere & par un travail si redoublé & si utile.

Ous as voyons entièrement aux Mémoires, L'Observation Anatomique de M. du Hamel sur le Squelette de la traction animal que les Indiens du Maduré,

V. les M. p. 191. pays naturel de cet animal, appellent le Renard armé, & que M. d'Après de Mannevillette Lieutenant des Vaitleaux de la Compagnie des Indes, & Correspondant de l'Académie, avoit apporté de son dernier voyage.

Un troifième Memoire de M. Petit, renfermant plusieurs V. les M. observations sur une maladie du Siphon lacrymal, dont les P. 399.

Auteurs n'ont point parlé.

DIVERS OUVRAGES

ET

DIVERSES OBSERVATIONS D'ANATOMIE.

I.

Sur la Respiration.

A correspondance sensible & continuelle des mouve-mens de la Poitrine ou du Thorax, avec les contractions & les dilatations du Poumon, en quoi confifte la Respiration, a fait croire avec beaucoup de vrai-semblance que la respiration ou les mouvemens du poumon étoient absolument dépendans de ceux de la poitrine. On fçait cependant que les plaies qui pénètrent dans la capacité de la poirrine, pourvû qu'elles n'intéressent point le poumon, n'empêchent pas la Respiration, & souvent même ne la genent pas. Mais comment peut-on respirer, c'est-à-dire, inspirer & expirer en cet état? L'air qui entre alors fibrement dans la poitrine, & qui appuie sur les poumons, ne doit-il pas y produire un perpétuel affaitsement, s'ils n'ont de quoi se relever d'eux-mêmes & indépendamment du thorax? Ces curieufes & importantes questions font le principal objet d'un Mémoire que M. Hériffant Médecin de la Faculté de Paris, ett venu lire à la Compagnie sur la Respiration, & dont nous allons rendre compte.

Un de ces hafards dont les habiles gens sçavent profiter.

72 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

engagea M. Héritlant dans cette recherche. Un homme s'étoit cassé deux côtes, dont l'une se caria dans la suite, de manière qu'on sut obligé de la lui enlever; cette opération qui ne put se saire sans ouvrir la poitrine au malade, à qui l'on sut aussi contraint d'emporter une portion de la plèvre qui se trouvoit adhérente à la côte cariée, n'empêcha pas qu'il ne vécùt long-temps depuis, & en bonne santé. A cette occasion M. Héritsant se rappella ces blessures reçues dans la poitrine, dont nous venons de parler, & ensin l'opération de l'empyème, où l'on ouvre le thorax, & après laquelle on ne laisse pas de vivre & de respirer comme auparavant. Il résolut dès-lors d'en faire des expériences sur les animaux, & il choisit les chats, comme ceux qu'il jugea avoir la vie plus dure, & se plus capables de soûtenir long-temps les

opérations nécetlaires à son dessein.

Ce n'est pas que de sçavans Anatomistes n'ayent formé de semblables doutes sur la correspondance des mouvemens de la poitrine & du poumon, & n'ayent fait diverses expériences pour s'en éclaircir; mais M. Hérissant y remarque un défaut qui les rend défectueuses, & qu'il croit, non sans fondement, avoir jeté ces Anatomisles dans l'erreur, c'est qu'en ouvrant la poitrine des animaux ils ont enlevé le sternum; d'où il est arrivé que les poumons de l'animal se sont affaitlez, sans qu'on soit en droit d'en conclurre, comme ils ont fait, que cet affaissement étoit causé par l'ouverture de la poitrine. Car d'un côté, dit-il, la perte du fang qui fort en abondance & avec impétuolité par l'ouverture des artères sternales & médiastines, & du diaphragme où ce stuide trouve moins de rélitance, affoiblit & dérange extrêmement le cours de la circulation; de l'autre le médiastin & une partie du diaphragme étant coupez, les contractions du cœur alors dépourvû de ses points fixes, & qui nage sans appui dans la poitrine, cessent de pousser le sang avec la même force dans tous les vaisseaux, & de produire les essets qui en sont la fuite.

M. Hériffant s'est donc contenté dans ses expériences, de

73

faire une incision longitudinale sur la peau, sur la graitse & sur les muscles du côté droit ou gauche de l'animal, à un doigt de distance du sternum, en ménageant le plus qu'il lui étoit possible tous les vaisseaux sanguins de ces parties, & il a brisé ensuite plusieurs côtes qu'il a renversées à plat sur la table où il faisoit la dissection.

A la première ouverture de la poitrine il a vû le poumon, qui, loin de s'affaisser au moment où l'air est entré dans la capacité du thorax, s'est aussi-tôt présenté pour sortir, comme s'il se fût trouvé trop resserré dans ce lieu; ce qui est arrivé. non dans le temps de la contraction ou du resserrement du thorax, mais dans le temps de sa dilatation, & il a observé plusieurs de ces mouvemens opposez & alternatifs, toûjours très-réguliers. Il est vrai qu'ils n'étoient pas bien considérables, & qu'ils diminuoient peu à peu dès que l'animal commençoit à entrer en convulsion, par le délabrement énorme que l'ouverture du thorax & la rupture des côtes avoient caufé dans toutes ces parties, & par l'hémorragie inévitable qui s'en ensuivoit; mais il est certain, ajoûte M. Hérissant, que les mouvemens alternatifs d'inspiration & d'expiration. tels qu'on vient de les décrire, s'y exécutoient du plus au moins, plusieurs fois après le thorax ouvert: ce qu'il a vû encore plus long-temps en ne faifant qu'une petite ouverture de chaque côté, & en y introduisant une petite cannule de plomb; car par-là l'animal répandant beaucoup moins de fang inspiroit & expiroit long-temps affez régulièrement, & avoit encore la force de pousser de grands cris. M. Hérissant pansa ensuite les deux petites plaies, & malgré cette opération, quoiqu'affez rude, l'animal vécut en fanté comme auparavant.

Ces expériences & ces observations concourent à prouver que le poumon ne s'affaisse pas par l'ouverture de la poitrine, qu'il continue ses mouvemens d'inspiration & d'expiration, que ces mouvemens ne dépendent donc pas de l'exacte clôture de la poitrine, & qu'ensin la Respiration a nécessairement une autre cause qu'il faut chercher dans le

Hifl. 1743.

74 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

méchanisme des organes que la Nature a destinez à cette fonction. Cette qu. M. Heritlant s'est propose à expliquer.

It tait precéder fon explication par une description detaillée du poumon & des parties qui fervent aux mouvemens de ce vifecre; après quoi il diffingue trois fortes de Respiration.

La première, qu'il nomme spontanée, est celle qui se sait dès l'instant que nous venons au monde, & qui ne sinit qu'avec la vie.

La seconde est celle qui s'exécute plus soiblement & avec

difficulté lorsque la poitrine est ouverte. La troisième est purement volontaire.

La structure du poumon bien entendue, ainsi que nous le supposons, il paroit que la cause de la première espèce de respiration, ou de la respiration proprement dite, doit se prélenter d'elle-même. Nous abrégerons encore ici le détail, quoique curieux, qu'on trouve sur ce sujet dans le Mémoire de M. Hériffant. Le fœtus venant à faire des efforts pour sortir de la matrice, contracte tous les muscles de son corps, & par confequent les muscles inspirateurs; l'air entre des sors dans les bronches, les alonge & les soulève; les branches de l'artère pulmonaire éprouvant le même changement de figure, doivent recevoir, & reçoivent en effet, une plus grande quantité de fang dont l'impulsion les développe & les alonge encore; ce nouvel alongement des artères en occasionne à son tour un nouveau dans les bronches qui en se développant augmentent de plus en plus de capacité, & admettent par conféquent un nouveau volume d'air proportionné à la dilatation de plus qui leur est survenue; & comme en même temps elles fe font auffi fort alongées, M. Heriffant prétend qu'elles causent sur les filets nerveux du plexus pulmonaire un tiraillement qui se communique aux nerfs des muscles intpirateurs; voilà donc les muscles inspirateurs contraclez, & la première inspiration exécutée. L'expiration suivra bientôt par l'inverse de cette méchanique. Le sang qui avoit été poussé dans les artères pulmonaires s'étant vuidé dans les veines de même nom, & la caule qui tenoit les bronches

atongées & dilatées n'ayant plus lieu, leur propre ressort les fera se raccourcir & se rétrécir tout-à-la fois, & alors plus de tiraillement dans les nerss, ni de contraction dans les muscles intercostaux, le thorax se resserre, & voilà la première expiration faite & l'entière Respiration achevée. Or il est clair que ces mouvemens une sois établis doivent se perpétuer pendant toute la vie de l'animal, puisqu'ils dépendent de la circulation du sang. Du reste, l'irritation des nerss du poumon que M. Hérissant considère comme la cause qui détermine les muscles inspirateurs à se contracter & à produire l'inspiration spontanée, ne diffère de celle qui excite le bâillement, la pandiculation, la toux, l'éternuement, &c.

qu'en ce qu'elle est moins vive & moins prompte.

La feconde espèce de Respiration, cette soible dilatation & confliction du poumon, qu'on remarque après avoir fait une large ouverture à la poitrine de l'animal vivant, s'exécutera à peu près selon les mêmes principes, si ce n'est qu'elle fera caufée par la feule impulsion du sang dans l'artère pulmonaire. Cette artère se ramissant presque par-tout à angles fort aigus, & dont les branches sont extrêmement rapprochées dans le temps de l'expiration, le premier esset du sang qui y sera poussé avec force, sera de soûlever, d'alonger ces branches, de les écarter les unes des autres; & comme la même construction règne dans tout le corps du poumon, le même effet aura lieu dans toute sa substance, il sera dilaté dans tous ses points, & sa distation ouvrira de toutes parts une entrée à l'air qui se présente continuellement à l'orifice de la trachée artère, & qui est contraint d'y entrer pour en remplir le vuide. Ce raisonnement est encore appuyé d'une expérience. Si l'on met un petit corps léger, du duvet, par exemple, à l'orifice de la trachée artère d'un animal qui vient tout récemment de mourir, & qu'on injecte l'artère pulmonaire avec de l'eau tiède, on verra à chaque coup de piston le duvet faire un mouvement pour entrer dans la trachée artère; l'injection produifant ici le même effet que l'impulsion du sang.

La troisième enfin & dernière espèce de Respiration, est celle que nous failons venir à notre secours quand il s'agit de parler, de chanter, de crier, & en général pour toutes les inspirations fortes & laborieuses. La volonté seule suffit alors pour déterminer les muscles inspirateurs à entrer en contraction, au lieu que dans la respiration ordinaire tout se passe indépendamment de notre volonté & à notre insqu. D'où l'on voit que la contraction des muscles inspirateurs est tantôt volontaire & tantôt involontaire. Elle n'est volontaire cependant, comme on sçait, que jusqu'à un certain point & pour un temps fort limité. Cette espèce de respiration, aufli-bien que la première, ne s'exécute avec facilité qu'autant que la capacité de la poitrine est bien close; car s'il s'y trouvoit quelqu'ouverture, les inspirations & les expirations feroient genées & laborieuses, mais elles ne seroient point détruites, comme on l'a vû par les expériences de M. Hérissant.

L'Académie, toute réfervée qu'elle est sur les systèmes, a jugé celui-ci digne d'être communiqué au public, & a trouvé une grande connoissance de la matière dans le Mémoire où il est exposé. Les expériences sur lesquelles il est fondé, sui ont paru faites avec beaucoup de soin & de ménagement, & présérables à celles des autres Anatomisses, en ce qu'elles mettent l'animal dans un état moins éloigné du naturel. Non seulement le sternum n'y est point enlevé, mais il y en a plusieurs où M. Hérissant s'est contenté de saire une

ouverture à la poitrine sans en briser les côtes.

Si les expériences de M. Hérissant ont quelque rapport avec celles qu'ont exposé Mrs Housson & de Bremond, ce qui ne pouvoit guère être autrement, les uns & les autres ayant travaillé sur le même sujet, elles en dissèrent par bien

des circonstances, & sur-tout par les résultats.

M. Houston conclut des siennes, qu'une plaie qui pénètre dans la poitrine d'un chien sans offenser le poumon, n'empêche pas l'animal de respirer ni même d'aboyer, & que le poumon ne s'affaisse pas pour cela, ce qui est confirmé par eclles de M. Hérissant; mais il prétend que les mou-

vemens du thorax & du poumon sont simultanez & se font dans le même ordre de contraction & de dilatation; au lieu que, selon M. Hérissant, c'est tout le contraire, ces mouvemens paroissent opposez, la contraction du poumon répondant à la dilatation du thorax, & sa dilatation à la contraction de celui-ci.

Le résultat des expériences de M. de Bremond, qui sont fort nombreuses, est plus réservé & moins positif. Il se contente de dire que si le mouvement du thorax & celui du poumon sont, comme il y a grande apparence, simultanez dans l'état naturel, il paroît tout le contraire dans l'état violent où les expériences ont mis l'animal, & par le délabrement de sa poitrine, comme on peut voir dans le Mémoire qu'il donna sur ce sujet à l'Académie *.

* Mém. 1739, P. 333.

Sur l'introduction de l'Air dans le corps animal.

Les liquides s'évaporent dans l'air, l'air réciproquement s'évapore ou s'infinue dans les liquides. On en a vû la cause & l'explication d'après M. Bouillet, dans l'Histoire de l'année dernière *. Le corps animal est une machine hydraulique, * Hid. 1742, composée d'une infinité de tuyaux remplis de dissérentes P. 18. liqueurs, & ces liqueurs font certainement chargées d'une grande quantité d'air. Comment s'y est-il introduit? Est ce par les alimens? Personne ne doute qu'il ne puisse entrer & qu'il n'entre par ce moyen beaucoup d'air dans le chyle, dans le sang & dans les autres humeurs; mais l'air ne peutil point encore s'y introduire à travers les véficules du poumon par la respiration, & même à travers la peau qui revêt l'habitude du corps? C'est ce qui est ici en question & ce qui fait le sujet d'un second Mémoire présenté par M. Bouillet, & que nous annoncames en finitlant l'article cité ci-deslus.

On trouve parmi les Ouvrages de l'Académie, année 1707, un Mémoire de M. Méry, où l'attirmative de cette

question est supposée comme certaine, quoique cet habile Anatomiste y ait principalement pour objet de montrer que l'air que nous respirons ne sçauroit passer à travers les vésicules du poumon ni s'échapper par les pores de la peau: contradiction apparente qui est fort bien éclaircie dans ce Mémoire, & qui ne roule que sur la dissérence qu'il faut mettre entre l'air considéré dans son état naturel, l'air en masse ou en bulles, & l'air intimement mèlé avec les siqueurs; ear on sçait que cette dissérence est très-grande, & que le dernier passe librement avec ces siqueurs à travers une infinité de corps que le premier ne peut pénétrer. Mais outre que le fait ne sçauroit être trop bien prouvé ni trop détailsé à l'égard du corps animal, il s'agit encore ici de le lier avec la théorie

propofée de l'évaporation des liquides.

M. Bouillet avoue d'abord qu'il croyoit autrefois avec Mrs Pitcarne & Boerhaave, que l'air ne pouvoit point entrer dans les humeurs du corps animal, ni à travers les vésicules du poumon, ni à travers la peau qui revêt l'habitude du corps, & il ajoûte qu'il n'a changé de sentiment que depuis qu'à l'occasion des expériences de Mrs de Reaumur, Petit & Hales, il a pensé que cela n'étoit pas impossible à de l'air dissout dans un liquide & qui en est déjà chargé, &, comme il l'explique, de la même manière que le coton se charge d'huile lorsqu'on le passe à plusieurs reprises sur cette liqueur. Il ne prétend pas que l'air, tel qu'on le respire, puisse pénétrer les vésicules du poumon & s'infinuer dans le sang, mais il ne doute point que ce même air imbibé de sérosité ou dissout dans l'humeur bronchiale qui tapisse les parois intérieures des rameaux & des vésicules par où se termine la trachée artère dans le poumon, & dont ces véficules font continuellement abreuvées, ne puisse en pénétrer les membranes, s'infinuer dans les humeurs de l'animal, & ne s'y infinue en effet. Le corps humain est perméable à l'eau, aux décoctions des plantes, au mercure, comme on le prouve par les effets du bain & des frictions: pourquoi ne le seroit-il pas à l'air, & sur-tout à l'air revêtu, pour ainsi dire, de toutes les propriétés pénétrantes des liqueurs & intimement mêlé avec elles? Mais voici quelque chose de plus positif: une expérience saite par Sylvius, Swammerdam & Thruston, & vérissée par Bergerus, nous apprend que l'eau seulement tiède, colorée & versée à plusieurs reprises dans les bronches des poumons d'un chien ou d'un autre animal, pénètre ses membranes des tuyaux bronchiques, & revient par la veine pulmonaire, sans qu'on y ait employé aucune force ou qu'on ait comprimé ses sobes du poumon.

Le poumon recevra donc continuellement de l'air, qui, selon cette théorie, en pénétrera les vésicules, & qui passant

dans les veines, s'y mêlera avec le fang.

Il ne refle qu'à découvrir par quelles voies cette eau versée dans les vésicules pulmonaires ou la sérosité qui en abreuve les parois, passe à travers leur tissu & s'insinue dans les veines; & c'est ce que M. Bouillet conçoit qui arrive par le moyen des vaisseaux absorbans de M. Vieussens, après avoir résuté le sentiment de quelques Médecins qui vouloient y

employer d'autres voies.

Ces vaisseaux, que nous n'entreprendrons point de décrire ici & dont on comprend affez l'usage par le nom qui leur a été donné, étant supposez, il est naturel de penser que dans l'inspiration les vélicules pulmonaires venant à s'étendre, les orifices des vaisseaux exhalans ou excrétoires, découverts par M. Ruisch, se trouvent moins pressez, & donnent un libre passage à la matière transpirable ou à l'humeur bronchiale qui se sépare du sang de l'artère pulmonaire, & que dans l'expiration ces mêmes vésicules venant à se resserrer, une partie de l'humeur est emportée au dehors avec l'air groffier & élastique qui resort des poumons, pendant que l'autre est obligce d'enfiler les orifices des vaitseaux absorbans avec le nouvel air qu'elle a bû & qui y adhère, pour rentrer dans les vaisseaux lymphatiques de cette partie. Et tout cela se sait par la pression des vésicules ou par le ressort de l'air qui n'en a pas été entièrement chassé dans l'expiration, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la force attractive, supposée par M¹⁵ Jacques Keill & Hales. C'est à-dire, qu'à travers le vésicules des poumons & par les vaisseaux exhalans il sort continuellement des vapeurs aëriennes ou de l'air absorbé dans la matière de la transpiration qui se sépare du sang, & qu'à travers ces mêmes vésicules & par les vaisseaux absorbans il entre continuellement dans le sang de nouvel air mouillé ou une sérosité imbibée de l'air qu'elle a absorbé; car la matière transpirable contient beaucoup d'air, comme on le voit dans la machine pneumatique, & il est constant d'ailleurs par les expériences de M. Hales qu'une grande partie de l'air respiré est absorbé dans les poumons, & qu'il y perd son jeu de ressort.

Il ne faut présentement qu'appliquer à l'habitude du corps & aux membranes qui revêtent extérieurement les fames cribleuses de l'os ethmoïde qui occupe le milieu de la base du front & le haut de la racine du nez, ce qu'a dit M. Bouillet des vaisseaux exhalans & absorbans des vésicules pulmonaires, & imaginer que l'air mouillé & absorbé dans la sérosité qui abreuve toutes ces parties, ne fait avec elle qu'un même fluide. On comprendra aisément par-là que d'un côté il doit continuellement fortir par les vaisseaux exhalans du corps animal des vapeurs aëriennes sous la forme d'une transpiration insenfible, & que de l'autre il doit aussi continuellement entrer dans le corps animal de nouvel air mouillé & déguisé sous la forme d'une vapeur subtile, non seulement par les vaisseaux absorbans de la peau, mais encore par ceux des productions mammillaires du cerveau, d'où il doit pénétrer jusque dans ce viscère par les pores de la membrane qui en tapisse les ventricules. En un mot, on verra, dit M. Bouillet, que ce n'est pas sans sondement qu'Hippocrate a avancé qu'il se faisoit dans tout le corps, à peu près comme dans les poumons, une expiration & une inspiration continuelles, & que M. Keill a eu raison de dire qu'il y entroit & qu'il en sortoit continuellement de l'air.

Mais quel est l'usage de cet air mouillé qui entre dans le corps animal par toutes les voies dont nous venons de parler?

M. Bouillet

M. Bouillet croit qu'il sert principalement à réparer celui qui fait partie de la constitution naturelle des humeurs en leur donnant le degré de fluidité nécessaire, & que si ce dernier n'étoit continuellement renouvellé, il s'épuiseroit bien-tôt par la transpiration, soit cutanée, soit pulmonaire, soit cérébrale; ce qui feroit décheoir les humeurs de leur état naturel.

D'où il suit, ajoûte M. Bouillet, 1° Que Jorsque par quelque cause que ce soit les humeurs reçoivent dans ses intersfices de leurs parties plus ou moins de cet air étranger qu'à l'ordinaire, ou que celui qui y étoit déjà logé vient à se dégager, à se réunir en petites bulles & à reprendre son reffort, la confiftance naturelle des humeurs, leur fluidité, leur mouvement & le jeu des parties solides de l'animal en doivent confidérablement fousffrir; ce qui donnera naissance à différentes sortes de maladies. 2° Que lorsque cet air est plus chaud ou plus froid, plus ou moins humide qu'il ne doit être, il produit dans les humeurs différens changemens que l'on comprend affez par les esfets ordinaires qui en résultent. 3° Enfin que lorsque cet air se trouve chargé d'exhalaisons nuifibles, il doit causer dans les humeurs différentes altérations capables de déranger extrêmement l'économie animale; d'où l'on peut le faire une idée de la cause générale de certaines maladies épidémiques.

C'est à de semblables applications qu'en vouloit venir M. Bouillet, lorsqu'il nous exposa son idée sur l'Evaporation des Liquides; car quels que soient ses talens & ses connoissances dans la Physique, il a toûjours subordonné cette Science à la Médecine qu'il exerce, & dans laquelle il ne s'est pas rendu moins recommandable par ses heureux succès

que par ses ouvrages.

III.

Elémens de Médecine pratique.

Le même M. Bouillet a encore présenté cette année à l'Acul mie des Elémens de Médecine pratique, tirez des E'erits Hist. 1743.

82 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

d'Hippocrate & de quelques autres Médecins anciens & modernes, où l'on traite des maladies les plus ordinaires à chaque âge, dans les différentes faifons de l'année, felon les différentes conflutations de l'air, fous divers climats, & en particulier fous chi de Béziers. Avec des remarques de théorie & de pratique pour fervir de Prodrome à une histoire générale des maladies.

M. Bouillet s'étoit proposé de donner cette Histoire selon le plan qu'il en publia en 1737, & qu'il a joint ici; mais les occupations journalières de la pratique l'ayant arrêté jusqu'à présent, & pouvant l'arrêter long-temps encore, il a cru devoir se borner aujourd'hui à ces Elémens. Le manuscrit qu'il nous a envoyé n'en est que l'essai qui sera retouché &

confidérablement augmenté.

Cet ouvrage est divisé en quatre parties. Les trois premières sont formées, ainsi que l'annonce le titre, de différens morceaux que M. Bouillet se contente d'indiquer dans le manuscrit, mais qui seront insérez en tout ou en partie dans l'imprimé. La quatrième partie est son ouvrage propre. On y donne d'abord une idée du climat, de la fituation, & de la température de l'air de la ville de Béziers, des vents, des pluies qui y règnent, des eaux & des alimens dont on s'y nourrit, & des maladies qu'on y éprouve communément. Après ces préliminaires, suit, année par année, la liste des maladies qui y ont régné en 1730, 1731, 1732 & 1733. M. Bouillet décrit les symptomes de ces maladies, & la méthode qu'il a suivie dans seur traitement. Il examinera avec le même détail celles qui ont régné depuis 1734 jusqu'en 1742 inclusivement. Et tout cela sera accompagné de Remarques qui jetteront un nouveau jour sur différens endroits de ces Elémens, ou qui serviront à les concilier, à les ramener à la même théorie & à la même pratique.

L'Académie, sur le rapport que lui en ont sait ses Commissaires, a trouvé beaucoup de choix & de discernement dans les trois premières parties de cet ouvrage, & beaucoup d'abliete dans la dernière, toit en l'int passitien Medicine.

IV.

Sur la question si le Cour se raccourcit en s'il s'alonge lorsqu'il se contracte.

On sçait que les ventricules du Cœur en se resserrant chassent le sang qui y est contenu & le poussient avec sorce dans deux artères, dont l'une va au poumon, & l'autre, se divisant en une infinité de rameaux, le porte jusqu'aux extrémités du corps; que les veines le rapportent dans le cœur; que le cœur se dilate en le recevant de nouveau dans ses ventricules, & que ce mouvement alternatif de contraction & de dilatation s'exécute continuellement & ne sçauroit être interrompu sans que l'animal ne cesse de vivre. On concoit sans peine qu'il doit arriver quelque changement à la disposition des parties intérieures du cœur lorsqu'il passe de la dilatation à la contraction, qu'il faut que les parois de ses ventricules se rapprochent & qu'ils diminuent de capacité pour forcer le sang d'en sortir & d'entrer dans les artères. Il n'y a nul doute sur ce sujet; mais quand on considère attentivement la thructure du cœur, les spires ou les contours de ses fibres, on ne voit pas de même si son volume extérieur doit changer, & en quel fens, & fi les ventricules & le cœur même doivent perdre ou acquerir plus de longueur en diminuant de largeur ou de diamètre : l'inspection de la partie dans l'animal vivant ne présente rien de bien décidé sur ce point. C'ett-là le problème, & un problème qui a beaucoup exercé les Anatomistes anciens & modernes. M. Person Médecin de la Faculté de Paris, entreprend de le résoudre dans un Mémoire qu'il a présenté à l'Académie sous le titre de Recherches sur le mouvement du cœur, et experiences qui prouvent que le cœur se raccourcit dans la contraction.

Il rapporte d'abord les dissérens sentimens des Anatomistes sur le raccourcissement du cœur dans la contraction ou dans la systole, & donne l'histoire de cette question depuis Galien; car auparavant l'Anatomie étoit trop peu cultivée

HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE pour fournir de quoi décider ou même de quoi douter làdeffus avec intelligence. Galien s'étoit déterminé en faveur de l'alongement du cœur dans la systole, comme un méchanilme vague & dénué de l'exacte connoitlance de ce viscère pouvoit le faire penser, puisqu'un corps élastique que l'on serre & qu'on rétrécit en un sens, semble devoir s'alonger en sens contraire. Vefale, Gaspard Bartholin & plusieurs autres ont suivi Galien, & en ont souvent copié jusqu'aux expressions. Harvé, Wallée & Lower oserent se déclarer contre. & leur autorité paroiffoit avoir emporté tous les suffrages & fixé les esprits lorsque l'illustre Borelli proposa une nouvelle opinion qui tenoit un milieu entre celle de Galien & de Lower. Il entreprit de prouver que dans la systole & dans la diaftole la groffeur & la longueur du cœur demeuroient les mêmes extérieurement, & que tout le changement qui lui arrivoit, consistoit en ce que dans la systole les sibres charnues se raccourcissoient, épaississoient les parois des ventricules, & par-là faisoient disparoître leur cavité en la rempliffant.

Quoiqu'il foit affèz difficile de concevoir toutes ces contractions de fibres fans que le volume extérieur du cœur en reçoive aucun changement, & qu'on n'imagine pas trop comment Borelli, qui étoit Géomètre, les a conçues, fon fentiment n'a pas laissé d'avoir ses partisans. Ensin l'opinion de Galien a aussi retrouvé les siens, & a été vigoureusement

défendue depuis quelques années.

" Page 25.

On a pû voir dans l'Histoire de 1731* la contestation qui s'éleva sur ce sujet entre deux prétendans à une chaire de Médecine de Montpellier; l'Académie sut consultée & prise pour juge; honneur dont elle n'abusa pas, & qu'elle recevra encore aujourd'hui sans s'écarter de la même retenue. Elle se contenta de charger un de ses plus habiles Anatomisses, M. Hunauld, d'examiner les raisons de part & d'autre, & de saire à ce sujet de nouvelles expériences. Il en résulta un sçavant Mémoire où cet Académicien, ainst que nous l'avons rapporté dans son Eloge, parut se déterminer pour

le raccourcissement dans la systole; & le tout sut envoyé

sur ce pied-là sans autre décision.

M. Ferrein, aujourd'hui Associé de l'Académie, & qui étoit alors l'un de ces prétendans, soûtenoit le raccourcissement. M. Person digne élève de cet habile maître, ayant embrassé la même opinion, mais indépendamment du poids que sui pouvoit donner une telle autorité, nous l'expose dans tout le Mémoire qui fait le sujet de cet article, revêtue de nouvelles preuves & de nouvelles expériences. Nous n'entrerons pas dans une discussion anatomique d'un si grand détail, il nous suffira de dire que M. Person y montre une parfaite connoissance de la structure des fibres charnues du cœur, & beaucoup de fagacité à démêler l'action fimultanée de ces fibres, conformement à ce qu'en a donné M. Winflow dans son Anatomie; qu'il décrit avec beaucoup d'exactitude les expériences faites par lui-même fur un grand nombre d'animaux d'espèces dissérentes, sçavoir, le moineau, le chat, le chien, le cochon d'Inde, la tortue, la grenouille, la carpe, la tanche; & qu'enfin ses recherches sur cette sameuse question lui ont mérité des éloges de la part de l'Académie.

V.

Organe de l'Ouïe.

M. Mastiani, Médecin Sicilien, Pensionnaire du Sénat de Palerme, & envoyé à Paris par ce Sénat pour y recueillir les nouvelles connoissances de Chirurgie, est venu montrer à l'Academie plusieurs pièces en bois, de grandeur quadruple par rapport au naturel, pour démontrer l'organe de l'Ouie, qui est, comme on sçait, si composé, & d'une structure si délicate. Il a fait voir aussi de semblables pièces, de grandeur double, pour l'organe de la Vûe, le tout conformément à l'exposition anatomique de M. Winslow. L'Académie a été fort contente de son travail, qui lui a paru être utile, & marquer autant d'adresse que d'intelligence de la part de l'auteur.

V 1.

Sur le dedans extraordinaire de la bouche d'un enfant né Bec-de-lièvre.

M. Hérissant dont nous avons déjà parlé, est venu lire à la Compagnie un Mémoire sur la structure singulière du dedans de la bouche d'un enfant qui étoit Bec-de-lièvre. Il y a quantité d'exemples de ce vice de conformation qui consiste principalement dans la division de la sèvre supérieure, & qui est quelquefois accompagné de l'écartement des deux os maxillaires & palatins, & même de la division de la luette en deux portions dont chacune demeure attachée à chacun des os du palais. Ce qui a paru extraordinaire dans le sujet observé par M. Hérissant, consiste en ce que les cornets inférieurs du nez manquoient, & que vers la partie movenne & à chaque côté de la division du palais il y avoit un trou oblong très-sensible. C'étoient les orifices des canaux excrétoires très-gros de deux glandes placées au voisinage des deux parties de la luette. De cette construction extraordinaire s'ensuivoient plusieurs essets singuliers & fort bien décrits par M. Hérissant, soit dans la déglutition des alimens solides & liquid - decet enfant, l'it dans la respiration. Par exemple, une grande partie de ce qu'il bûvoit lui refluoit par le nez, & quelquesois aussi en se jouant il emplissoit sa bouche d'eau, & la tenant exactement sermée, il faisoit jaillir cette eau par ses narines en forme d'arcade, comme sont ces poissons cétacées qu'on nomme Souffleurs.

VII. Double Matrice.

M. Morand a lû à la Compagnie une lettre de M. Cruger Chirurgien du Roi de Danemarck, contenant l'observation qu'il a faite de deux Matrices dans une semme morte en couche, ayant chacune une trompe, un ligament large, un ligament rond, un orifice, le tout pour un feul vagin qui lear ctoit commun. On 15, it que le Matrice dans la tructure ordinaire a deux trompes ou conduits qui naissent des côtés de son sond & vont aboutir aux ovaires, & qui portent communément le nom de Fallope, Anatomisse Modénois mort en 1562, comme le premier ou un des premiers qui les ait décrites. Elle a aussi deux ligamens larges qui vir ment des sombes, & deux ligamens ronds qui vont se ren ire aux aînes. C'est donc ici une de ces Monstruosités singulières dont il est si dissicile de concevoir la génération par la consusion des germes dans le sein de la mère, & par la juxtapposition de leurs parties réciproques. L'Académie en attend un plus grand détail.

On a vû un autre exemple de deux matrices dans un même sujet, observées par M. Littre en 1705°, & dont •117.17.5. chacune n'avoit qu'une trompe & un ovaire, qu'un ligament 19.47. large, & qu'un ligament rond. M. Winslow en a fait usage

dans un de ses Mémoires sur les Monstres.

VIII.

Muscle singulier.

M. de Courcelles, Médecin de la Marine à Brest & Correspondant de l'Académie, a sait part à M. du Hamel d'une variété singulière qu'il a rencontrée dans l'un des trois cadavres qu'il a dislequez. C'est un muséle bien distingué du cubital interne, du radial interne, & du long palmaire, qui a son attache superieure par un tendon grele au bord intérieur du condyle interne de l'humerus. Il descend le long de la partie interne de l'avant-bras, & il est presqu'entièrement consondu avec le sublime sléchisseur des doigts. Arrivé à la partie inférieure de l'avant-bras, & à son passage sur le ligament annulaire interne & commun, il soussire une diminution considérable dans ses sibres qui se resserrent & forment une espèce de tendon continu jusqu'à un autre corps charnu assez considérable. Ce second corps va s'inserer par un petit

SS HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

tendon à la face interne de la base de la première phalange du petit doigt, en traversant le muscle hypothenar duquel il reçoit quelques sibres: il en reçoit aussi quelques unes du palmaire. Ce muscle est un nouveau digastrique, qui par sa situation & par ses attaches ne peut avoir d'autre sonction que celle de stéchir le petit doigt. M. de Courcelles ne l'a point trouvé dans les deux autres sujets.

Les gens de l'art, pour qui nous venons de rapporter ici cette fingularité, fans nous écarter des termes de l'Observateur, seront à portée de vérisser jusqu'à quel point elle

mérite ce nom.

IX.

Ovaires où l'on a trouvé des cheveux, des os & des dents.

Nous rapporterons ici une Observation curieuse qui avoit été omise en 1741, & que M. Morand nous a communiquée d'après M. le Riche Chirurgien major de Strafbourg. A l'ouverture du corps d'une femme de cette ville M. le Riche trouva dans le bas-ventre une poche très-groffe qui remplifsoit presque l'hypocondre gauche & qui paroissoit avoir des attaches à la matrice, à la vessie & à l'intestin colon. Cette poche contenoit une matière jaunâtre, figée en certains endroits à peu près comme de l'huile, & une pelote de cheveux de la grosseur d'un citron. Les cheveux étoient presque de la longueur du doigt, & liez entreux par la matière grasse. Vers le fond étoient plusieurs cellules remplies d'une espèce de suif, & au milieu un os de sigure trèsirrégulière, à l'extrémité duquel il y avoit trois dents bien distinctes enchassées dans leurs alvéoles. Toute cette poche ayant été disséquée avec soin, M. le Riche reconnut que c'étoit l'ovaire du côté gauche. L'ovaire du côté droit étoit rempli d'une semblable matière, & contenoit aussi vers le centre un os pareil à celui de l'oyaire gauche.

Ruisch a rapporté plusieurs exemples d'os trouvez avec des cheveux dans des ovaires, mais il n'y en a point de cette fingularité dans les deux ovaires d'une même personne.

Χ.

Taille latérale.

Quand des opérations aussi importantes que celle de la Taille & les différentes manières de la pratiquer, ont été suffisamment éclaircies, il reste encore à consulter l'expérience, & à voir de quel côté se trouvent les plus grands & les plus nombreux succès; car nos théories sur une machine aussi compliquée que le corps humain, sont très-désectueuses. C'est dans cet esprit que M. Morand, après avoir étudié toutes les méthodes connues de la Taille, & principalement celle qu'on nomme de frère Jacques ou Taille latérale, nous donne depuis plusieurs années, & pour l'ordinaire de deux en deux ans, un dénombrement des opérations que lui ou ses Correspondans ont faites selon cette dernière méthode*.

Entre les Correspondans que M. Morand a sur ce sujet, & qui le sont aussi en titre de l'Académie, M. Vacher a sait l'opération de la Taille latérale à Beaune en 1741, sur un 1737, 71 27 enfant à qui il étoit resté une fissule d'une première taille par 1740, P. 54. la méthode ordinaire, ou du grand appareil, & l'a guéri de la pierre & de la fittule. Employé à l'armee de Wettphalie en 1742, en qualité de Chirurgien major consultant, le même M. Vacher a aussi taillé latéralement un Soldat qui ctoit dans un état déplorable, lui a tiré une pierre murale assez grosse, & l'a parfaitement guéri. M. le Cat à Rouen a taillé de même en 1741 fix malades dont un seul est mort, & en 1742 fept, dont deux sont morts.

M. Darigran Chirurgien major du Régiment de Bourbon, élève de M. Morand, en a taillé deux en 1741, dont un a péri.

Voilà donc à ajoûter à l'Histoire des Tailles latérales faites dans les années précédentes, 17 opérations, dont 13 ont très-bien réuffi.

* 1'oy. l'Hul. 1728, p. 2

X L

Douzième Vertèbre du dos d'un homme, traversée par le bout d'une lame d'épée qui s'y cassa.

M. Ferrein qui nous a donné l'histoire de cette bleffure & des accidens dont elle sut suivie, la tient de M. Cuvilliers

Médecin de l'hôpital de Niort.

Un Soldat qui étoit à Clermont en Auvergne sut blessé d'un coup d'epce à la partie inferieure du dos. Un Chirurgien de cette ville pansa la plaie assez simplement & la guerit, du moins en apparence, en fort peu de temps, après quoi le Soldat partit pour aller joindre son Régiment qui ctoit alors à l'Ille de Ré. Il fit ce voyage, qui est bien de 80 lieues, avec beaucoup de peine, ne pouvant marcher que difficilement à cause des violentes douleurs qu'il retientoit dans la partie où il avoit reçu le coup. Du reste il paroissoit jouir d'une fanté parfaite, & son Capitaine, qui l'avoit fait visiter par plusieurs Chirurgiens, crut sur leur rapport que ces douleurs ne venoient que de la cicatrice nouvellement formee, & qu'elles se dissiperoient avec le temps. Cependant le Soldat peu après son arrivée sut attaqué du Scorbut; on l'envoya à l'hôpital des Frères de la Charité de Niort; il y fut traité & parfaitement guéri de cette miladie en un mois ou environ. Comme il n'avoit pù faire entendre le sujet de ses justes plaintes par rapport à sa blessure, il demanda instamment qu'on l'examinat de nouveau; car outre les vives douleurs qu'il y fentoit, il se plaignoit encore de la tête, & d'un engourdissement assez considérable dans les extrémités inférieures: il ajoûta qu'il ne pouvoit se tenir debout, s'affeoir, ou se plier, sans reffentir une espèce de déchirement à l'endroit de cette blessure. On y découvrit en effet une fluctuation affez profonde, & l'ouverture en ayant été faite, il en fortit un bon verre de liqueur screuse de couleur rousse. Lorsqu'on eut dilaté la plaie, le Frère Chirurgien de la Charité y porta le doigt indice, il sentit un corps dur

& étranger, il le faisit avec ce doigt & le pouce, & tira avec beaucoup de surprise de la part & de celle des spect iteurs le bout d'epee long de deux pouces qui étoit resté dans la plaie sans qu'on en eut rien soupçonne jusque la. Le malade tut saisi de mouvemens convultifs très-violens, & il se vuida beaucoup par toutes les voies; la tranquillité succéda quelque temps après, avec l'espérance d'une prompte guérison. Mais douze heures après cette opération, la fièvre s'alluma, le délire survint, il tomba ensuite dans un état léthargique, & il mourat trente-fix heures après, malgré les saignées & les autres secours. On reconnut par l'examen du cadavre, que l'épée avoit percé la partie postérieure de la douzième vertèbre du dos, entre l'apophyle épineuse & les apophyses obliques du côté gauche; que le tronçon qui étoit resté dans la plaie faite à la vertèbre, traversoit le corps de la moëlle de l'épine, & le canal des vertèbres; que la pointe alloit même se loger au delà, du côté droit de la onzième & douzième vertebre du dos, comme on peut encore l'observer dans la pièce même, qui a été envoyée par M. Cuvilliers, & que M. Ferrein a montrée à la Compagnie. On y voit aussi les bords offeux de la plaie qui ont pousse & végété autour du tronçon pendant le temps qui s'est écoulé depuis la blessure jusqu'à la mort. Cette végétation attesle les saits avancez ci-dessus, & dissipe tout soupçon de supercherie.

XII.

Suites d'une Blessure à la tête.

Un homme âgé d'environ vingt-huit ans tomba du côté gauche sur la tête, & y reçut une blessure pour laquelle il sut saigné deux sois; après quoi il passa dix-huit mois sans s'en ressentir. Au bout de ce temps-là il sut attaqué d'une douleur violente dans l'oreisse gauche, d'où il sortit du pus. Cette douleur plus ou moins vive dura jusqu'à la mort arrivée dix-huit mois après. Pendant cet intervalle il sui survint huit dépôts en dissertes parties de la tête, du côté blessé,

HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE qui percèrent en dehors & furent suivis d'autant de trous Intoleux. On imagina différens vices dans le fing du malade, pour leiquels on lui donna les remèdes convenables, mais sans succes: la maladie toujours rebelle aux remedes connus le conduisit au tombeau. La tête sut ouverte par M. Vacher qui y trouva du coté affecte un depot dont la matière purulente mouilloit toute la surface externe de la dure-mère, jusqu'à la selle du Sphénoïde, qui est un os commun au crâne & à la mâchoire supérieure. Cette matière avoit percé le crâne du dedans au dehors vis-à-vis les huit fistules extéricures. Un intervalle de dix-huit mois entre la bletfine & les premières apparences du dépôt, s'il fut produit par la bletiure, ett digne de remarque; & un pireil intervalle de temps entre la mort & un dépôt capable de causer de si grands ravages, est encore plus fingulier.

Cette relation a etc envoyée a M. Morand par M. Vacher Chirurgien à Befançon, Correspondant de l'Academie, dont

il a été parlé plusieurs sois dans notre Histoire.

XIII.

Paralysie sans sentiment, queique les mouvemens de la partie insensible ne soient point détruits.

Il y a quelques années que la relation suivante me sut remise. Je la gardois en attendant que j'en connusse mieux l'auteur, sorsque M. Helvetius premier Medecin de la Reine & Inspecteur general des Hopitaux de Handre, l'envoya à M. Wintlow, comme di ne d'avoir place parmi ses observations, & par elle-même, & par la main dont elle venoit, sçavoir, de M. Britseau Medecin des Hopitaux militaires de cette province. Nous avons déjà parlé de M. Brisseau dans

*1 1 1741, l'Eloge de M. Petit *.

Un Soldat du Régiment Suisse de Séédorf, en garnison à Douai, âgé de trente-deux ans, sut attaqué de la Paralysie dont il s'agit, & dont voici l'origine & les symptomes, d'après les quettions que lui nt M. Briticau, à qui il s'at

présenté en 1739, & d'après les réponses du malade.

Il étoit entré à l'Hôpital militaire de Douai au commencement de Décembre 1730, pour s'y faire traiter d'une fièvre intermittente opiniâtre, & accompagnée d'une fluxion catarreuse qui l'avoit fort abattu & amaigri. Il en sortit vers la fin du même mois.

2° Dans les premiers jours de Janvier suivant il sentit une douleur très-vive au pliant du bras gauche: cette dou-leur dura environ trois jours, à peu près de la même sorce & sans relâche. Elle se dissipa néanmoins entièrement; mais quatre ou cinq jours après il lui en prit une autre pour se moins aussi violente à l'épaule, qui occupoit toute l'articulation de la tête de l'humerus avec l'omoplate, & qui dura cinq jours sans interruption. C'est toûjours de l'épaule, du bras & de la main du côté gauche qu'il s'agira ici.

3° Quelques jours après il lui vint des espèces de physièmes, bubes ou pustules, dans tout le dedans de la main, qui crevèrent bien-tôt & rendirent beaucoup de sérosité claire &

sans odeur.

4° C'est dans ce temps-là, c'est-à-dire, vers la sin de Janvier 1731, que le malade s'aperçut qu'il perdoit chaque jour & de plus en plus le sentiment dans tout le bras.

5° Au commencement du mois de Mai de la même année, il lui étoit furvenu dans toute l'étendue du bras, de l'avant-bras, & à la main, une dartre confidérable, & avec des croutes fort épaifles, qui suppura beaucoup pendant près

d'un mois, & dont la matière étoit très-fétide.

6° Il guérit de la dartre, mais il demeura tout-à-fait privé de sentiment depuis la partie insérieure du même côté de l'occiput, & depuis l'épaule jusqu'à l'extrémité des doigts de la main, & il étoit encore dans cet état en 1739 où se termine la relation. Il avoua cependant qu'il avoit une petite sensation de froideur dans toutes ces parties, sensation constante qui ne diminuoit ni n'augmentoit jamais, ni en été ni en hiver, ni même lorsqu'il s'approchoit du seu, ou qu'il prenoit de la glace dans sa main.

M iij

7° On lui mit une tabatière dans cette main insensible; il li terra fortement du pouce contre ses autres doigts; mais c'étoit, comme il le dit à M. Brisseau, uniquement par habitude, & sans que le sentiment y eût aucune part. Il empoigne de même ton suit & son epée, il met le suit sur l'une & l'autre epaule, & en general il remplit sort bien les sonctions de son état. Il joue à la boule, il send du bois, en y employant les deux bras, sans que celui qui est intensible y sasse remarquer de la peine ou de la contrainte.

8° Au mois de Janvier 1739, il leva par mégarde avec la main infentible le couvercle d'un poéle de ter très-ardent & presque rouge, il le posa ensuite tranquillement, & il ne s'aperçut point du tout, du moins par le sentiment, qu'il s'étoit brusé tout le dedans de la main. Les tégumens internes, les tendons, & le périotte de l'index en furent tout-à-fait détruits: la gangrène se mit à la plaie, & l'on y sit bien des incissons auxquelles il ne sourcilla pas, non plus que lorsqu'on lui appliquoit la pierre infernale. Il en étoit

demeuré estropié de deux doigts.

Enfin quelque temps après, & malgré toutes ces démonstrations d'une insentibilité parfaite, M. Brisseau voulut voir encore ce Soldat, & il fit sur lui diverses épreuves où la furprise ne pouvoit manquer de le déceler, s'il y avoit eu de la fourberie, & si, comme quelques-uns de ses semblables, dont M. Briffeau dit avoir vu des exemples, il avoit joué le Paralytique pour obtenir son congé; mais il parut toujours que son mal n'étoit que trop réel. Le jeu auroit été bien long, bien cher, & d'ailleurs assez inutile par la manière dont cet homme faiioit son devoir de Soldat. L'aventure du poèle & les fuites iroient de pair avec tout ce qu'on nous raconte de plus étonnant de la constance de quelques Sauvages d'Amérique dans les tourmens que leur font fouffrir leurs ennemis. Da refle cette forte de Paralyfie qui ne tombe que sur les organes du sentiment, quoique très-rare, n'est pas inconnue aux modernes; Willis & Junker en ont parlé dans leurs ouvrages. On en va voir un second exemple qui ne DES SCIENCES.

fournit aucun sujet de doute de la part de celui qui en est atteint.

Nous supprimons quelques raisonnemens qui accompagnoient la relation précédente, & plus volontiers encore ceux que nous pourrions y ajoûter.

XIV.

Autre Paralysie de même nature.

Rien ne prouve mieux la nécessité indispensable de nos fens, & de la douleur même, pour la conservation de notre corps, que les suites sunestes de la privation du sentiment dans le Tact. Le plus subtil Physicien, le plus sçavant Anatomiste, l'homme le plus attentif à ce qui peut sui nuire, ne sçauroit ordinairement le prévoir avec cette promptitude que l'occasion requiert presque toûjours, & avec laquelle le Toucher l'en garentit. Encore moins pourroit-il se promettre que rien ne détournera jamais son attention d'un danger qui

échappe à tous ses autres sens.

M. Garcin dont nous avons rapporté les curieuses observations sur l'étincellement des Fixes * est lui-même le sujet * Page 29. du nouvel exemple que nous allons donner de cette espèce de Paralysie, & c'est encore à M. de Reaumur qu'il s'adresse, en lui mandant qu'une brûlure qu'il avoit reçue au pouce l'avoit empêché jusque-là de lui écrire. Tous ses doigts sont insensibles, sans être privez de mouvement. Il est obligé d'en prendre un soin infini, & à peu près, dit-il, comme une nourrice à l'égard de son ensant, pour les garentir de mille atteintes auxquelles ils sont continuellement exposez; mais malgré tous ses soins il lui arrive frequemment de s'oublier, & de s'y méprendre. Cette fois il avoit trop approché sa main d'un petit poële où il vouloit la réchausser, & où le feu étoit plus ardent qu'il ne pensoit. Car un des principaux symptomes de son mal est que ses doigts sont toujours plus froids que ne comporte la température actuelle de l'aic où il est, & du reste de son corps; ils ne peuvent jamais se

HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE réchauffer d'eux-mêmes, il faut nécessairement avoir recours à une chaleur extérieure, & il les tient d'ordinaire sur sa poitrine à laquelle il les applique fous ses habits. Quand il veut reconnoître leur état, il les porte sur son visage, ne les sentant jamais par eux-mêmes ni froids ni chauds. Il ne s'aperçut de cette brûlure que deux heures après, par une grosse vessie qui en occupoit la moitié de la circonférence. Ce qui est encore à remarquer, c'est qu'il se brûle les doigts à une plus grande distance du seu que celle où on les tient communément dans l'état naturel. Il faudroit avoir éprouvé une pareille incommodité pour imaginer tous les inconvéniens qu'elle entraîne après elle en mille rencontres où l'on n', pas le loifir de faire toutes ces attentions. Auffi M. Garcin avoue qu'il y manque fouvent, & qu'il en est souvent puni. Il n'oseroit presque rien entreprendre dans l'obscurité, sans risquer de se meurtrir ou de s'écorcher à ces doigts insenfibles, faute de voir ce qu'il touche, & comment il le touche. Comme ce n'est que succinclement, & par occasion que M. Garcin a parlé de cette maladie, nous ne sçaurions en dire davantage. Elle mériteroit cependant un détail plus particulier, tant par rapport à son origine, qu'à la durce, & à toutes ses autres circonstances.

C'est de quoi réveiller l'attention des Anutomistes sur cette question delicate s'il y a des nerts qui répondent directement au tact & au sentiment, & qui n'entrent pour rien dans les mouvemens; & au contraire, &c. Les exemples qu'on vient de voir, semblent le supposer; mais on n'a encore rien découvert de positif sur ce sujet.

X V.

Odeurs communiquées au corps animal.

Rien ne seroit plus curieux & plus utile que de sçavoir par quelle méchanique, par quels conduits ou par quels véhicules certains fluides subtils ou même les odeurs, qu'on pent regarder comme une ofpece de fluides, s'infinuent dans

le corps

le corps animal & s'y communiquent rapidement d'une partie à l'autre. Le premier pas vers cette connoissance est sans doute de s'affurer par des faits bien avérez que cette michanique, que ces conduits ou ces vehicules, quelqu'imperceptibles qu'ils soient, existent. M. Sloane a écrit à M. de Reaumur à l'occasion de quelques Curiosités Naturelles, qu'ayant appliqué sur sa langue de la réfine de ces Pins sauvages qui croissent près de la mer dans le voisinage de Montpellier, elle donna presque dans le moment une odeur de violette à son urine. Ce phénomène lui parut singulier, il le communiqua à M. Cowper qui lui en rapporta un autre de même espèce & non moins remarquable. Ce célèbre Anatomisse ayant été appellé au fecours d'un homme qui venoit de tomber en apoplexie, & qui mourut peu de temps après avec une gouffe d'aif dans la bouche, il fentit dans tout le cadavre, en le maniant pour le disséquer, une forte odeur d'ail. Pour voir s'il ne se trompoit point, & si cette odeur ne s'y seroit pas répandue par quelqu'autre voie que par la bouche, if coupa un morceau de la partie intérieure du musele de la cuitle, que les Anatomisses nomment Glateus major, & il le donna à sentir à quelques personnes, sans les prevenir sur le sujet de cet essai; ils s'accordèrent tous à dire qu'ils y sentoient une odeur d'ail très-forte. M. Cowper assura cependant que l'ail n'avoit pas passé la bouche.

Il refleroit à sçavoir si cet homme ne saisoit pas depuis long temps un grand usage de l'ail dans ses alimens, & si une pareille cause n'auroit pas pû entrer pour beaucoup dans

la production d'un tel effet.



عهده والمعالمة المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالم

CHYMIE.

SUR LES EAUX MINERALES DE SAINT-AMAND EN FLANDRE.

V. les M. p. 1.

I N Voyage fait en Flandre avec la Maison du Roi, ayant donné occasion à M. Morand d'examiner les principes & les vertus des Eaux minerales de Saint-Amand, il a cru avec raison devoir en faire part à l'Académie & au public. Cett auffi dans une de nos Attemblees publiques que son Mémoire sur ce sujet a été lû, & comme il a été composé à cette intention, & orné de tout ce que l'on y pouvoit desirer de curieux & d'intéressant, nous ne serons presque ici qu'en étendre le titre, en renvoyant le lecteur au Mémoire même. On y trouvera, outre l'examen des trois fontaines differentes que renferment ces eaux, celui des boues noires & sulfureuses qui sont auprès de celle qu'on nomme Fontaine d'Arras, la manière d'imiter ces boues avec du charbon de terre & de l'eau, les bons essets qu'on a déjà éprouvez de ces boues artificielles, & dans les cas où l'on voudroit en avoir de ferrugineuses, l'excellence des boues noires qui le ferment sous les paves des rues dans les grandes villes où les pieds des chevaux & les roues des voitures laissent un ser extrêmement assiné: on a tout proche de soi & sous ses pas ce que l'on va souvent chercher bien soin & à grands frais. C'est avec aussi peu de sondement que de fuccès, qu'on avoit imaginé que les eaux d'une de ces fontaines pouvoient être falutaires pour les cancers, les écrouelles. les dartres invétérées, &c. M. Morand fait voir combien il faut rabattre de leurs merveilles à cet égard; mais il nous découvre en même temps leur efficacité dans la cure de certaines maladies pour lesquelles on n'avoit pas coutume

99

de les ordonner. Les maladies du genre nerveux, si bizarres, si variées dans leurs symptomes, & si dissiciles à traiter, sont de ce nombre.

Ous renvoyons entièrement aux Mémoires,
Les differens moyens de rendre le Bleu de Prusse V. ses M.
plus solide à l'air, & plus facile à préparer, par M. Geosseroy.

C'est un supplément à ce que M. Geosseroy Médecin, son

Mém. 1725,
frère, avoit donné sur ce sujet en 1725*.

Le fecond Mémoire de M. Malouin sur le Zinck. Ce V. les M. que nous avons dit du premier * sournit une idée sussifiante p. 70.

*Hight 1742
fur cette substance métallique.

M. Hellot a continué de lire dans nos Affemblées fon Traité de la Teinture, conformément à ce que nous en avons annoncé les deux années précédentes*.

* Hil 17416

2.53.

DIVERSES OBSERVATIONS CHYMIQUES.

I.

Esset remarquable du Remède de Mue Stephens.

Na vû dans l'Histoire de 1741*, que M. Geosstroy travailloit conjointement avec M. Morand à s'assurer des proprietes du remède Anglois pour la Pierre, connu sous le nom de Mse Stephens, à l'analyser, à le rendre moins degoutant, & à constater ses essets sur les personnes qui en ont usé. C'est à la suite de semblables observations que M. Geosstroy a fait voir à l'Académie une Pierre que M. le Dran, tameux Chirurgien de Paris, a tirée d'un homme qui après avoir pris le remède de Mse Stephens en boisson pendant six mois, se sit ensint tailler l'année dernière.

Nij

Ce remède avoit eu les plus heureux succès, le malade délivré de ses douleurs marchoit, montoit à cheval, alloit en voiture, soûtenoit toute sorte d'exercices & de fatigues. sans en ressentir la moindre incommodité, & cet état dura environ un an. Vers la fin de 1-41 il eut quelques cuiflons à la vessie, & des ardeurs avec fréquence d'urine, mais une faignee, quel jues bouillons, & des buillons rufnachitimes le remirent dans son premier état de tranquillité jusqu'au printemps de 1742. Il sembloit que les changemens de failon portoient dans fon lang une agitation qui pouvoit cependant être calmée par le repos, & par le regime dont nous venons de parler. Mais dès le temps que nous venons d'indiquer, tous ces secours commencerent à devenir inutiles, & la difficulté d'uriner & les douleurs se faisant sentir de quinze en quinze joure, le milade prit courageulement la resolution de le time sonder & taller tout de suite; ce qui fut exécuté le 2 Septembre de la même année. La Pierre qu'on lui tira, & que nous avons vûe, pesoit une once deux gros & un scrupule: elle étoit de sorme ovale un peu applatie, grenue vers fes bords & un peu litfe à la partie plate; son tissu étoit serré, & sa couleur semblable à celle de la rouille de fer ou de certaines pierres d'aigle. On n'y a rien remaqué qui put faire croire que le remède eut agi fur sa substance, ni qu'elle en cut reçu aucune diminution, elle étoit trop dure pour cela. Le foulagement que le remède avoit procuré au malade, ne peut donc être attribué qu'à la dépuration qui s'étoit faite dans son lang. En effet pendant l'usage de ce remède les urines avoient toujours deposé un sédiment blanc fort fin, & dans la suite, après que le malade eût cessé de le prendre, elles charioient un petit sable extremement fin, rougeatre, & de la couleur même de la pierre qu'on lui a tirée.

M. Geoffroy conclut de tous ces faits, que le remède de Mile Sies hens peut foulager pour un temps certains malades, en nettovant la vessie, & qu'il empèche du moins l'accroiffement de la Pietre pendant qu'ils en sont usage. Un autre

malade qui l'a pris pendant trois ans, d'abord journellement, & qui le prend encore aujourd'hui lorsqu'il resient la moindre douleur, s'en est toujours fort bien trouvé. On est affuré de plus par un grand nombre d'observations que ce remède ne faisse aucune mauvaise impression sur la vessie, & que les malades qui en usent, sont toujours en état d'en venir à l'opération de la taille, sans qu'il en arrive aucun accident de la part du remède, comme nous l'avons plus particulièrement remarqué en parlant du Recueil d'expériences & d'observations que M. Morand donna l'année dernière sur ce sujet*. * Hill. 1742, Le premier des deux malades dont nous venons de parler. P. 50. jouit d'une lanté parfaite depuis qu'il a été taillé, & le second qui a pris le remede pendant plusieurs années, se porte aussi fort bien, & a même engraissé.

II.

Sur deux espèces d'Etains alliez.

Il ne tient pas à l'Académie que le public ne soit en garde contre les magnifiques promesses qu'on lui fait si souvent sur la transmutation ou sur le perfectionnement des métaux. On a vû en 1741* ce qu'il falloit penser d'un * Hill. p. St. nouvel Etain dont on se proposoit d'établir la fabrique, & qui étoit bien éloigné de remplir l'idée avantageuse qu'on en vouloit donner. Voici quelque chose de tout semblable.

Un Particulier a fait présenter à l'Académie deux Étains alliez, sous le titre d'Étain purifié, & purifié de telle sorte, felon l'Auteur, qu'on ne doit pas même le regarder comme de l'étain, mais plûtôt comme un résultat singulier de divers autres métaux, fer, acier, cuivre, &c. enfin comme une espèce de transmutation à laquelle on pourroit donner le nom de similargent, parce qu'avec ce métal on feroit en blanc tout ce qu'on fait en jaune avec le tombac que le Sr Renty * a nommé * Hist. 1729, fimilor. L'examen de ces deux étains ayant été encore confié à p. 92. Mrs Geoffroy & Hellot, ils en ont rendu compte à la Compagnie, & nous ne ferons presqu'ici que transcrire seur rapport.

De ces deux Étains qui avoient été envoyez en deux lingots larges & plats, avec deux affiettes qui paroiffoient en avoir été moulées, l'un que nous appellerons le premier, est fort aiguillé à sa surface, ce qui annonce beaucoup d'aigreur. En esset il casse fort aisément lorsqu'on le frappe sur une enclume où on le fait porter à faux. On reconnoit à 11 c. liare qu'il est compose de plusieurs matieres métalliques mal liées, & dont la plus pesante, qui se trouve au dessous pendant la sonte, est d'un grain sin & de couleur grise, tandis qu'on aperçoit dans celle qui est montée au dessus une infinité de facettes striées & aiguillées qui ressemblent à des aiguilles antimonices, mais plus tines & dans des directions différentes de celles de l'antimoine. Le zinck ajoûté à un étain pur en fait un métal dur & sec dont l'intérieur est disposé à peu près comme l'intérieur de celui-ci.

Le second lingot ne se rompt pas si aisément: il a fallu lui donner plusieurs coups de marteau sur l'enclume, où il portoit à faux, & même le retourner pour achever de le rompre. Cependant quoique plus mou & plus pliant, il l'est encore moins que l'étain pur, & il n'est si dissicile à rompre que parce qu'il est coriace comme le zinck; car il se gerce sous le marteau, comme ce semi-métal. Son grain est sin, mais d'un gris sale, au lieu d'être blanc & argentin. On n'y voit point d'aiguilles comme au premier, mais on y aperçoit avec la loupe des couleurs sort semblables à celles d'une marcassite ou pierre métallique cuivrente, bleues, jaunes, rouges, violettes, &c. ce qui paroît indiquer que le cuivre qu'on y a fait entrer, est mal lié avec les autres matières du mélange.

Le premier étain, plus difficile à fondre que le second, & encore plus que l'étain fin de Potier, ne coule pas comme doit couler l'étain qui se met en sonte. Au même degré de chaleur qui sait sondre le bon étain celui-ci se réduit sous la sorme d'un amalgame qu'on peut couper avec le couteau, & diviser en autant de parties qu'on voudra, sans qu'elles se regoiment. Il ne devient liquide que quand le tond de la

cuillier de fer où se sait la sonte, est tout-à-sait rouge; mais alors il s'en scorifie une portion très-confidérable qui prend une couleur bleue, & qui ne s'est point réduite ou revivifiée en métal, quoiqu'on y ait ajoûté de la cire & de la réfine, moyen ordinaire de rétablir les parties métalliques disjointes ou déguifées par la scorification. Ainsi il y auroit beaucoup de déchet sur ce métal toutes les fois qu'on le fondroit pour le couler en moule. Comme il est presque impossible de lui donner la liquidité convenable pour en faire l'Essai à la pierre, selon l'usage des Potiers. expliqué dans l'Hittoire de 1741*, la queue des essais qu'en Page 82. ont fait, Mr. Geoffroy & Hellot, cette partie du métal qui a coulé dans le canal ou la rainure de la pierre, n'a jamais été nette & déliée comme elle le doit être quand l'étain est de bon alloi. L'écusson ou culot qui se fige dans le creux hémisphérique de la pierre, s'est couvert à sa surface d'un nombre infini d'aiguilles; ce qui est toujours la marque d'un mauvais étain, & dont la vieille vaisselle n'est presque d'aucun prix. Le même étain se coule aussi fort difficilement en lingot: sa surface s'aiguille, prend un œil gris, & se ternit à l'air. On a la preuve que les deux étains dont il s'agit, font difficiles à employer, dans les deux affiettes gaudronnées qu'on en a présentées. L'une qui paroît sortir du moule, est plus graveleuse & plus pleine de creux que ne l'est une assiette d'étain sin des Potiers sortant également du moule. L'autre qui a été planée & polie, laisse voir encore des marques de ce premier défaut, & de plus elle a pris à l'air un ceil plombé que ne prend pas si vîte l'étain ordinaire.

Le second étain se fond plus aisément que le premier : il ne se met pas d'abord en forme d'amalgame, mais il se réduit de même en pellicules scorifices que les matières grasses ne revivifient pas. Ainfi il doit y avoir encore dans celui-ci un déchet confidérable par la fonte & par la refonte. L'écusson de l'essai à la pierre en a coulé aussi dissicilement que celui de l'autre. En répétant plusieurs sois ces essais. & toujours avec perte par les scories, nos Chymistes n'ont pû

104 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE le rendre affez coulant pour lui faire avoir une queue déliée.

D'où l'on peut conjecturer qu'il ne pourra jamais se mouler aisément pour des ouvrages délicats. Mrs Geotfroy & Hellot pensent aussi qu'il ne se moulera pas sans soustilures dans les moules destinez à faire de la vaisselle ordinaire, l'écusson de son essai se trouvant plein de petits trous, quoique rien n'empêche la sortie de l'air sur la pierre d'essai, comme il arriveroit dans un moule qui n'auroit que quelques évents. Le lingot de ce second étain n'a pas pris un œil mat & gris à l'air comme celui du premier; mais la grande quantité de métal scorisié qui est venu à sa surface dans la cuillier dont on s'est servi pour en saire la sonte, s'a empêché également de couler à la manière du bon étain.

M¹³ Geoffroy & Hellot ont cru pouvoir se dispenser de pousser plus loin leurs expériences sur un métal si imparfait. Cett de l'étain, mais de l'étain allie centre les règlemens.

III.

Huile caustique pour marquer le linge.

On se sert dans l'Inde d'une huile tirée par expression de la substance onctueuse & en même temps caustique, qui est entre les deux écorces d'une espèce de noix, nommée Bibo, pour marquer le linge d'une couleur noire ineffacable à toutes les fortes de blanchissages dont on use dans le pays. Le Bibo est le fruit du Saravcoté, arbre des Indes qu'on a reconnu être le même que celui qu'on appelle ici plus communément l'Anacarde, & dont l'amande ou la noix est par sa figure fort semblable à un cœur. Ce sait qui nous avoit été envoyé par M. Coffigny Ingénieur général des Comptoirs de la Compagnie des Indes & Correspondant de l'Académie, fut d'abord vérifié par M. Hellot; les marques de l'huile de Bibo sur du linge déjà blanchi ou mis aux lessives ordinaires ne s'esfacèrent point. Ce succès & quelques autres épreuves firent espérer à M. Hellot qu'on pourroit se Levir de la meme liqueur pour maiquer les pieces de toile

qu'on envoie aux blanchieries; mais les nouvelles exp riences qu'il en a faites lui ont appris que l'huile de Bibo, toute mordante qu'elle est, n'y tient pas, & que les favonnages au savon noir, le séjour de la toile dans le lait, &c. sont entièrement disparoître toutes ces marques.

IV.

Pierre de Bologne.

La Pierre de Bologne, ainsi nommée parce qu'elle se trouve près de Bologne en Italie au pied du mont Paterno, est une matière gypleuse & talqueuse qui etant calcinée par les Chymitles, s'imbibe de la lumière au grand jour ou au Soleil, & reluit ensuite à l'obscurité pendant quelques minutes, comme un charbon ardent. Ces sortes de Phofphores qu'on fait par la calcination, & qui étoient autrefois en si petit nombre, ont été bien multipliez par M. du Fay. La plûpart des pierres fines, les bols, la craie, le moëllon, la pierre de taille & de liais, tout est devenu phosphore entre scs mains*. Cependant la Pierre de Bologne a toujours confervé dans cette classe le premier rang qu'elle y tenoit de la secondarie de la confervé dans cette classe le premier rang qu'elle y tenoit de la confervé dans cette classe le premier rang qu'elle y tenoit de la confervé dans cette classe le premier rang qu'elle y tenoit de la confervé dans cette classe le premier rang qu'elle y tenoit de la confervé dans cette classe le premier rang qu'elle y tenoit de la confervé dans cette classe le premier rang qu'elle y tenoit de la confervé dans cette classe le premier rang qu'elle y tenoit de la confervé dans cette classe le premier rang qu'elle y tenoit de la confervé dans cette classe le premier rang qu'elle y tenoit de la confervé de la conf par la force & par la durce de la lumière, autant que par la célébrité. Elle devient lumineuse aussi étant exposee au clair de la Lune, à la lumière d'un flambeau, & même du crépufcule. Mais, ajoute M. du Fay, plufieurs Auteurs ont douté de ces expériences, apparenment parce qu'ils se sont servis de Pierres qui avoient peu de vertu. En voici une qui rend le fait certain: elle fut donnée à M. l'Abbé Nollet a l'urin en 1739, & par un grand Prince, toute préparée par la calcination. On la gardoit depuis quelques annees dans une petite boîte de carton garnie de flanelle en dedans. Cette Pierre s'imprégnoit non feulement très-bien de la lumière du jour, comme ont coûtume de faire toutes celles de son espèce. mais encore, quoique plus foiblement, de la lumière d'une fimple bougie, lorsqu'elle y avoit été exposée pendant quelques minutes à 4 ou 5 pouces de distance. Ces Phosphores Hift. 1743.

106 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE que l'on conserve dans de la laine ou du coton, en les désendant soigneusement des impressions de l'air, durent plus ou moins selon diverses circonstances, selon qu'on les expose moins ou plus souvent au jour, & périssent ensuite communément après quelques mois, s'exfolient, se pulvérisent d'eux-mêmes comme la chaux, ou ne reluisent plus & veulent être renouvellez par la calcination. Mais la pierre de M. l'Abbé Nollet luisoit encore en 1743, s'imbiboit même encore de quelque lumière dans le temps qu'on alloit imprimer ce que nous venons d'en rapporter, c'est-à-dire, six à sept ans depuis qu'il l'a reçue, & peut-être dix à douze ans depuis qu'elle sut préparée. Est-ce par sa nature ou par sa préparation qu'elle a été douée d'une vertu si forte & si durable, ou par l'une & l'autre à la fois? C'est ce que nous ignorons.

Sels Neutres.

M. Rouelle, Apothicaire & Démonthrateur en Chymie au Jardin du Roi, est venu lire à la Compagnie un Memoire sur les Sels neutres, moyens ou salez, où l'on a trouvé bien des recherches neuves & curieuses. Nous n'en dirons pas davantage: M. Rouelle ayant été reçu peu de temps après à l'Academie, on verta son Mémoire imprimé parmi ceux du volume de l'année prochaine.



BOTANIQUE.

OBSERVATIONS DE BOTANIQUE.

I.

Sur la culture du Riz.

E Riz, ainsi que la plûpart des autres plantes, demande une culture particulière, & qui doit être d'autant mieux circonstanciée qu'on veut en transmettre la pratique en des pays où il ne croît pas naturellement. Cette plante pousse des tiges ou tuyaux de trois ou quatre pieds de hauteur, plus gros & plus sermes que ceux du bled, nouez d'espace en espace; ses seuilles sont longues, charnues, assez semblables à celles de la canne ou du poireau. Ses sleurs naissent à ses sommités, & ressemblent à celles de l'orge; mais les graines qui les suivent, au lieu de former un épi, sont disposées en pamicule ou en bouquet, ensermées dans une capsule jaunâtre ou coque formée de deux balles rudes au toucher, & dont l'une se termine en un long silet. On seait que ces graines sont blanches & oblongues.

En général le Riz se cultive dans des lieux humides & marécageux, & dans des pays chauds, du moins à en juger par les contrées où il est le plus en usage, & où il fait la principale nourriture des hibitims. Tout le l'evant, l'Egypte, l'Inde, la Chine, sont dans ce cas. Les Etats de l'Europe où l'on en recueille davantage sont l'Espagne & s'Italie, & c'est de là que nous vient presque tout le Riz que l'on confomme en France. M. Barrere, Docleur & Protesseur Roy al en Médecine dans l'Université de Perpignan, & Correspondant de l'Académie, ayant sait beaucoup d'attention à sa culture de cette plante, tant à Valence en Espagne, qu'en

Catalogne & dans le Roussillon, nous en a envoyé un Mé-

moire dont voici la partie la plus essentielle.

Pour élever utilement le Riz & en multiplier le produit, on choisit un terrein bas, humide, un peu sablonneux, facile à dessécher, & où l'on puisse faire couler aisément l'eau. La terre où on le seme doit être labourée une fois seulement, dans le mois de Mars. Enfuite on la partage en plufieurs planches égales, ou carreaux, chacun de quinze à vingt pas de côté. Ces planches de terre sont séparées les unes des autres par des bordures en forme de banquettes d'environ deux pieds de hauteur fur environ un pied de largeur, pour y pouvoir marcher à sec en tout temps, pour saciliter l'écoulement de l'eau d'une planche de Riz à l'autre, & pour l'y retenir à volonté sans qu'elle se répande. On applanit aussi le terrein qui a été foui, de manière qu'il soit de niveau, & que l'eau puisse s'y soûtenir par-tout à la même hauteur.

La terre étant ainsi préparée, on y sait couler un pied ou un demi-pied d'eau par-dessus, dès le commencement du mois d'Avril; après quoi on y jette le Riz de la manière suivante. Il faut que les grains en ayent été conservez dans leur balle ou enveloppe, & qu'ils ayent trempé auparavant trois ou quatre jours dans l'eau, où on les tient dans un fac, jusqu'à ce qu'ils soient gonflez, & qu'ils commencent à germer. Un homme pieds nuds jette ces grains sur les planches inondées d'eau, en suivant des alignemens à peu près semblables à ceux qu'on observe dans les sillons en semant J. Hed. Le Riz ainti gontle, & toujours plus petant que l'eau, s'y précipite, s'attache à la terre, & s'y enfonce même plus ou moins, selon qu'elle est plus ou moins délayée. Dans le Royaume de Valence, c'est un homme à cheval, qui ense-

mence le Riz.

On doit toûjours entretenir l'eau dans les champs ensemencez jusque vers la mi-Mai, où l'on a soin de la saire écouler. Cette condition est regardée comme indispensable pour donner au Riz l'accroissement nécessaire, & pour le faire pousser avantageusement.

Au commencement du mois de Juin on amène une feconde fois l'eau dans les Rizières, & l'on a coûtume de l'en retirer vers la fin du même mois, pour farcler les mauvaises herbes, sur-tout la prêle & une espèce de souchet, qui naitlent ordinairement parmi le Riz, & qui l'empethent de prositer.

Ensin on lui donne l'eau une troisième sois, sçavoir, vers la mi-Juillet, & il n'en doit plus manquer jusqu'à ce qu'il soit en bouquet, c'est-à-dire, jusqu'au mois de Septembre. On fait alors écouler l'eau pour la dernière sois, & ce desséchement sert à faire agir le Soleil d'une saçon plus immédiate sur tous les sucs que l'eau a portez avec elle dans la Rizière, à faire grainer & meurir le Riz, & à le couper ensin commodément; ce qui arrive vers la mi-Octobre, temps auquel ce grain a acquis tout son complément.

On coupe ordinairement le Riz avec la faucille à scier le bled, ou, comme on le pratique en Catalogne, avec une faux dont le tranchant est découpé en dents de scie sort déliées.

On met le Riz en gerbes, on le fait sécher, & après qu'il est sec on le porte au moulin, pour le dépouiller de sa balle.

Ces fortes de moulins ressemblent assez à ceux de la poudre à canon, excepté que la boîte ou chaussure du pilon y est dissérente. Ce sont pour l'ordinaire six grands mortiers rangez en ligne droite, & dans chacun desquels tombe un pilon dont la tête, qui est garnie de ser, a la figure d'une pomme de pin de demi-pied de long, & de cinq pouces de diamètre : elle est tailladée tout autour comme un bâton à faire moussier le chocolat. Nous ne nous arrêterons pas à décrire la sorce motrice qu'on y emploie, & qui peut distièrer solon la commodite des lieux. En Espagne & en Citalogne on se sert d'un cheval attache à une grande roue, &c.

Le Riz qu'on sème dans une terre falée y pullule ordinairement beaucoup plus qu'en toute autre. On en retire jusqu'à trente ou quarante pour un. Par conséquent, &

toutes choics d'illeun quiles, les ettes & les pive multimes

y seront les plus propres.

Du reste il ne s'agit pas présentement de discuter, s'il convient de favoriser, de permettre ou de désendre la culture du Riz dans le Royaume. Il y a quelques années qu'elle a été défendue en Roussillon par un Arrêt du Conseil fouverain de cette Province, sur ce qu'on a cru que les exhalaifons des lieux marécageux où l'on sème le Riz, y causoient des maladies & des mortalités. M. Barrere donne bien des raisons capables de rassurer les esprits sur ce sujet, & propose en même temps des moyens pour prévenir tous les inconvéniens que l'on en pourroit craindre. Mais quoi qu'il en soit, & dans une quettion qui peut avoir tant de branches par elle-même, & relativement au Commerce, il est toûjours utile de sçavoir comment il saudra s'y prendre pour se procurer une plante de si grand usage, lorsqu'on jugera à propos de la cultiver.

H.

Sapins fossiles.

M. Sloane, dans une lettre dont nous avons déjà rapporté * Fage 97. un article *, a fait part à M. de Reaumur d'une curiofité que M. Soutwell Secrétaire d'Etat en Irlande lui avoit envoyée. C'est une corde assez longue & aussi grosse qu'un cable de navire, qui avoit été achetée au marché de Nenry, petite ville au nord de ce Royaume, où on en vendoit beaucoup de pareilles à vil prix. Elle est faite des sibres ligneuses du tione d'un de ces gros Sapins souterrains qu'on trouve fréquemment dans les marais de ce pays-là, quelquefois en Angleterre, & qui paroissent être si anciens que quelques Naturalistes les ont jugez antérieurs au Déluge. Comme M. Sleane n'eft pas timplement potletieur de la plus riche collection d'Histoire Naturelle qu'il y ait en Europe, & que personne ne connoît mieux que lui l'origine, les propriétés & l'usage de ce qu'il possède, il a voulu sçavoir

de quelle espèce étoient ces arbres Antediluviens ou réputez tels, & il a fait à cette occasion bien des recherches de Botanique. On trouve dans les troncs de ces arbres une réfine fort semblable à celle que donne le Pinus Silvestris maritima, conis firmiter ramis adhærentibus de Jean Bauhin. & qui croît auprès de la mer dans le voisinage de Montpellier; ce qui lui fit penser que ce pourroit être la même espèce de Pin, mais il a changé d'avis, & il ne doute point aujourd'hui que ce ne soit le Pinus Silvestris, foliis brevibus glaucis, conis parvis albentibus de Ray, qui croît au nord de l'Écosse & en Norvège, & qui, selon toute apparence, sait partie de ces Pins ou Sapins que des Voyageurs ont observez. dans plusieurs contrées du Nord-est. La preuve n'en est pas douteule; c'est d'après le fruit même que M. Stoane en a jugé. On a trouvé dans la province de Lancastre, & auprès de quelques-uns de ces troncs d'arbres fossiles, des cones ou pommes de pin, tout-à-fait semblables à celles du pin de Ray que nous venons d'indiquer. M. Sloane ne nous dit point à quelles marques on a reconnu l'antiquité des arbres dont il s'agit. Ce qui est certain, c'est que parmi ce nombre prodigieux de substances sossiles, tant animales que végétales, qui sont répandues dans la terre, & souvent à de trèsgrandes profondeurs, celles qui paroifient les plus anciennes le trouvent presque toûjours appartenir aujourd'hui à des continents fort clorgnez du notre. C'est ainsi, par exemple, qu'entre toutes ces pierres de Saint-Chaumont dans le Lionnois, où l'on voit l'empreinte de plusieurs plantes, & dont M. de Juffieu l'ainé nous a donné la description*, il n'y a pas *M-1711. une seule de ces pierres qui porte l'image d'une plante du l'acces. pays, & qu'elles reprétentent toutes des plantes qui ne croif-

sent aujourd'hui que dans les Indes.



ARITHMETIQUE.

SUR IIIS NOMBRES PREMIERS, & fur les différentes puissances des termes de la suite naturelle des nombres, avec la manière d'en dresser des Tables.

I is nombres font diffilheez en différentes chilles, en pairs, impairs, simples ou premiers, composez ou multiples, quarrez, cubiques, & polygones quelconques, parlaits, amiables, &c. tous compris dans la suite naturelle, 1, 2, 3, 4, 5, &c. & qui ont tous des propiétés particulières dont la connoissance est d'un très-grand secours dans les calculs difficiles, & dans pluficurs rechardles mathematiques. Coux qu'on nomme Simples ou l'ieniers, en tant qu'ils ne peuvent être formez par aucune multiplication, & qu'ils ne sont divisibles que par l'unité, tels que 1, 3, 5, 7, 11, &c. sont des plus importans à connoitre, non sculement parce qu'ils entrent dans la composition de tous les autres, mais aussi parce qu'ils font le terme de la plûpart des réductions, & des rapports ramenez à leur plus grande simplicité. Les quarrés, les cubes, tels que 1, 4, 9, 16, &c. 1, 8, 27, 64, &c. qui résultent de la multiplication simple, ou réitérée des nombres 1, 2, 3, 4, &c. par eux-mêmes, reviennent à tout moment dans la resolution d'une infinite de quellions d'Arithmétique & de Géométrie. Tous ces nombres cependant se trouvent répandus affez irrégulièrement dans la fuite naturelle, & ce n'est pas sans art qu'on les peut démèler dans le cours un peu avancé de cette suite. Il seroit donc trèscommode pour la pratique, & très-curieux pour la spéculation, d'en avoir des Tables où ils sussent tous indiquez, depuis 1, par exemple, jusqu'à 100 000 ou au delà, soit

dans la fuite même des nombres mure's, foit seprément. Nous avons de pareilles Tables pour les nombres Premiers, & pour les nombres quarrez, & cubiques; mais elles ne passent pas 10 000; ce qui est très-borné, & qui oblige trop souvent le calculateur à refaire les opérations prescrites, pour reconnoître, ou pour se procurer de semblables nombres. Voici du moins en partie ce qu'on pouvoit defirer fur ce fujet.

Ha été préfenté cette année à l'Académie un grand ouvrage d'Arithmétique, intitulé la Nouvelle Science des Nombres, ou Traité des grandeurs constantes dissérentielles qui sixent les caractères des Nombres, &c. par le P. Guillaume le Vaillant

de la Bassardries, Jésuite des Pays-bas.

Quoique cet ouvrage ne donne pas, à beaucoup près, tout ce que semble promettre son titre, l'Académie n'a pas laisse de le juger utile, & d'y reconnoître beaucoup de fagicité

de la part de l'Auteur.

Le P. le Vaillant s'y est restreint à trouver 1° tous les nombres Premiers depuis 1 jusqu'à 100 000; 2 la manière la plus facile de former les différentes puissances des termes de la suite naturelle; 3° à construire des Tables de tous ces nombres. La matière étant utile & de pratique, nous en donnerons ici une idée d'après le rapport qui en a été fait à la Compagnie par ses Commissaires; car le manuscrit n'est plus entre nos mains.

Pour trouver tous les nombres Premiers entre 1 & 100 000, il ne s'agit que d'avoir tous les multiples qui sont entre deux, après quoi la méthode d'exclution donnera les nombres qu'on cherche. Le P. le Vaillant exclut d'abord tous les nombres pairs, & tous ceux qui sont terminez par un 5, & qu'on sçait être divisibles par 5. Il observe ensuite que tous les autres nombres dont on doit chercher les multiples, font renfermez dans les quatre progressions arithmétiques suivantes, où la dissérence des termes est 10,

7. 17. 27. 37. 47. 57. 67, &c. 9. 19. 29. 39. 49. 59. 69, &c.

& que par conféquent tous les multiples qu'on cherche, font les produits de chacun des termes de ces progressions, multiplié successivement par chaque terme des autres.

Il prend garde que les produits de ces multiplications font terminez par un caractère qui revient toujours le même après la quatrième multiplication. Par exemple, que 37 multiplié tout de fuite par les premiers termes de ces progressions, par les seconds, par les troissèmes, &c. c'est-à-dire, par 1.3, 7, 9, ensuite par 11, 13, 17, 19, puis par 21, 23, &c. a pour ses produits 37, 111, 259, 333, 407, 481, 629, &c. tous terminez successivement par 7, 1, 9, 3;

7, 1, 9, 3, &c.

Jusqu'ici il n'y a rien de nouveau dans cette recherche; mais le P. le Vaillant a trouvé en examinant les progressions dont la dissérence constante est 10, que les dissérences consécutives des caractères qui précèdent le dernier caractère de ces produits, c'est-à-dire, les dissérences des dixaines, reviennent aussi toûjours les mêmes après le quatrième produit. C'est ce qu'il appelle des dissérentielles constantes, comme il les annonce dans le titre de son ouvrage. Il donne des formules générales fort simples, pour trouver sur le champ les quatre dissérentielles constantes de tous les multiples d'un nombre proposé. Il y a seize de ces formules, sçavoir, quatre pour chaque quaternaire des dissérentielles d'un nombre quelconque, selon qu'il est terminé par 1, par 3, par 7, ou par 9.

Ainsi l'on trouve par les quatre sormules qui conviennent à tous les nombres terminez par 7, que les dissérentielles constantes des produits de 37 par tous les termes des quatre progressions, sont 8, 14, 8, 7; car 3 qui précède le dernier caractère ou la dernière sigure de 37, étant ôté de 11 qui précède la dernière 111, il reste 8; & de même 11 qui précède la dernière sigure de 111, ôté de 25 qui

précède la dernière de 259, il reste 14, &c. & par-là rien n'est plus facile que de trouver tous les multiples de 37, qui sont impairs, & non terminez par 5. Il faut mettre dans une ligne verticale toutes les figures finales 7, 1, 9, 3; 7, 1, 9, 1, Sc. trouvers ci-dellus, & ayant with a foundle du premier 7, ce qui donne le premier produit impair de 37, c'est-à-dire 37 par 1, il faut à 3 ajoûter la première différentielle 8, à leur somme 1 1 ajoûter la seconde dissérentielle 14, à cette nouvelle somme qui est 25 ajoûter la troisième différentielle 8, & à cette dernière somme qui est 33 ajoûter la quatrième différentieile 7; & ainfi de suite, à 40 la première différentielle 8, &c. Toutes ces sommes 3, 11, 25, 33, 40, 38, 62, &c. clant cerites verticalement a cauche des figures finales 7, 1, 9, 3; 7, 1, 9, &c. formeront les produits confecutifs qu'on cherche, scavoir 37, 111, 25), 333, 407, &c.

Dans le dessein de construire une Table des nombres Premiers depuis 1 jusqu'à 100 000, le P. le Vaillant a donc cherché par une méthode quelconque ou par tâtonnement tous les nombres premiers depuis 1 jusqu'à 317 exclusivement, nombre Premier dont le quarré, 100 489, excède 100 000; après quoi il a calculé par sa méthode tous les multiples impairs de ces nombres jusqu'à 100 000, moyennant quoi il a eu tous les nombres impairs qui ne sont pas Premiers, & par la voie d'exclusion tous ceux qui le sont; car excepté 2 il est clair qu'aucun nombre pair ne sçauroit être premier, étant tout au moins divisible par 2. Il a trouvé par ce moyen 9385 nombres Premiers entre 1

& 100 000.

Ainsi l'on voit que sur 100 000, il n'y a pas la dixième partie des nombres qui soient premiers, 9385 n'en étant

que la 101230me.

Selon les Tables des nombres Premiers que nous avons déjà, & qui vont depuis 1 jusqu'à 10 000, il y en a 1226 dans cet intervalle, c'est-à-dire, que les nombres Premiers n'en sont que la 8 (4) me partie. On en trouvera 169 depuis 1

116 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE jusqu'à 1000, 26 depuis 1 jusqu'à 100, &c. ce qu'on peut mettre ainsi sous les yeux, en écrivant ces rapports sous la progression géométrique décuple,

1. 10. 100. 1000. 10000. 100000, &c.

1. 5. 26. 169. 1226. 9385, &c.

$$\frac{1}{1}$$
. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3\frac{11}{11}}$. $\frac{1}{5\frac{155}{100}}$. $\frac{1}{8\frac{26}{015}}$. $\frac{1}{10\frac{1310}{1877}}$, &c.

cù je ne seiche pas qu'on ait rien decouvert de constant ni de réglé d'où l'on puisse tirer une Formule.

Les progressions arithmétiques, ou les centaines, par exemple, priles de suite, quoiqu'elles procédent d'abord par une diminution assez réglée, & qu'en général les derniers termes contiennent moins de nombres simples que les premiers, présentent bien-tôt une irrégularité encore plus visible : car la première centaine contenant 26 nombres Simples ou Premiers, la seconde 21, la troissème 16, ce qu'on pourroit exprimer ainse, 100 plus 4 divisé par 4, 100 plus 5 divisé par 5, 100 moins 4 divisé par 6, la quatrième sournit encore 16 nombres Premiers, & la cinquième 17, la vingtquatrième 15, la vingt-cinquième 10, &c. où l'on ne voit plus vestige de règle quelconque.

M. Frenicle dont l'extrème sagacité dans tout ce qui concerne les nombres est si connue, avoit aussi beaucoup travaillé sur les nombres Premiers; mais ses recherches sur ce sujet n'ont pas été données au public. M. l'Abbé de Molieres présenta en 1704 à l'Académie un Mémoire sur la même matière, qui a été inscré depuis dans ses Leçons de Mathématique imprimées en 1725. On peut ensin consulter ce que M. Traytorens d'Yverdun avoit pensé sur ces nombres, & dont l'Histoire de l'Académie a sait mention *...

Du reste entre toutes les Tables des nombres Premiers, que nous connoissons, il n'y en a point qui nous paroisse mieux entendue que celle du P. Guldin dans son excellent livre du Centre de Pesanteur. Il a mis de suite tous les

31147, ---

nombres impairs depuis 1 jusqu'à 9999, & à côté de chacun de ceux qui font des multiples, tous ou quelques uns de leurs divifeurs. Les nombres Premiers qui s'y trouvent feuls sont par-là fort aisez à reconnoître. Ce qui seroit encore mieux. à mon avis, & d'une très-grande commodité, ce seroit, en conservant la même méthode, d'y mettre généralement tous les nombres de la suite naturelle, tant pairs qu'impairs, & d'vajouter quelque marque aux nombres quarrez & cubiques. & même une ou deux autres colomnes pour les guarrés & les cubes de la suite naturelle, sans préjudice à une Table particulière des nombres Premiers tout seuls. Le travail étant déjà fait séparément jusqu'à 10 000, il n'y auroit qu'à en assembler les parties, & ce qui reste jusqu'à 100 000 ne seroit pas bien mal-aisé, ou est même encore fait, comme on verra tout-à-l'heure. Si l'on se détermine à publier le livre dont il s'agit, comme il est à desirer, ne sut-ce que pour les Tables, nous espérons que les éditeurs auront quelqu'égard à cette remarque.

Revenons au P. le Vaillant, & passons à sa Table des differentes puissances. Il prend encore ses progressions arithmétiques, il en élève les premiers termes à leurs puissances fuccessives, & il observe 1°, que les sigures sinales des termes des mêmes puissances dans une même progression sont constantes; 2° que les sigures pénultièmes, antépénultièmes, &c. ont des périodes réglées, & très-courtes; de sorte qu'ayant trouvé & constaté leur retour, il est facile de pousser la Table aussi loin qu'on voudra. Il a donc mis aussi dans son livre une Table des quarrés de tous les nombres depuis 1 jusqu'à 100 000, qui, suivant cette méthode. n'a coûté d'autre peine que de l'écrire. Il auroit pû même la faire composer par un Ecrivain qui ignoreroit les premiers

principes d'Arithmétique.

L'observation des périodes de retour des mêmes figures est un artifice assez connu de ceux à qui le calcul des nombres est familier; ils s'en servent presque toûjours, non sculement pour abreger leurs operations, mais encore pour éviter l'erreur. Ces retours ne sont jamais plus sensibles que dans les fractions décimales, & dans les combinaisons des termes des progressions arithmétiques dont la différence commune est 10. Mais l'idée du P. le Vaillant facilite aux calculateurs l'usage de ces périodes en leur faisant remarquer que tous les nombres de la suite naturelle pouvant être partagez en neuf progressions arithmétiques de cette espèce, lorsqu'ils auront à combiner plusieurs termes consécutifs, ils doivent les réduire en progressions, moyennant quoi ils trouveront presque sur le champ la loi des retours des mêmes figures; au lieu que cette loi est beaucoup plus enveloppée lorsqu'on ne se serve pas de ces sortes de progressions.

Nous ne parlerons point des peines & du travail que peuvent avoir coûté toutes les préparations qui amènent ces facilités: la compensation en devient avantageuse au public. Car, toutes choses d'ailleurs égales, plus la méthode qu'on aura suivie pour dresser des Tables de quelqu'espèce que ce soit, sera lumineuse, exempte d'erreur, ou savorable à la vérification de l'erreur, plus elles seront utiles, la sureté étant tout ce qui est le plus à desirer dans un secours dont on ne pout veritablement prositer qu'autant qu'on y a pris consiance.



ALGEBRE.

SUR LE CAS IRREDUCTIBLE DU TROISIE ME DEGRE.

M. Nicole nous donne ici une addition à fon Mémoire V. les M. imprimé dans le volume de 1741, où nous avons p. 225. expliqué ce que l'on entend par le Cas irréductible du troisième degré, & la méthode employée par M. Nicole pour effaver de le réfoudre . De nouvelles tentatives sur Militaries une des suites infinies qu'il y avoit mise en œuvre, & dont 1.89. on ne peut faire évanouir les imaginaires que dans un feul cas, font aujourd'hui le fujet de sa recherche. Il avertit qu'il ne s'est déterminé à la donner que pour empêcher ceux qui voudroient encore tenter la question par cette voie, d'y perdre autant de temps qu'il y en a perdu. Mais nous osons assurer que ce n'est pas la seule utilité qu'on peut retirer de la lecture de son Mémoire, par tout ce qu'on y trouve d'inftructif sur cette question, & par la singularité des dissicultés qui la rendent si rebelle à toute l'industrie des Algébrisses. Spectacle qui n'eft pas seulement curieux, mai, très utile, dans une Science dont un des plus importans usages est d'exercer Telprit, & sur-tout de le rendre attentif & insatigable dans la recherche des vérités abstraites.



GEOMETRIE.

NOUVELLES DEMONSTRATIONS

des principales propriétés de la Cycloide.

A funplicité, l'élégance & un nouveau tour dans les démonstrations des vérités déjà connues, font une espèce de nouveauté qui n'est pas d'un petit mérite en Geometrie. M. le Marquis de Courtivron, Aide-Marchal-des-logis dan l'armée de Biviere, & qui ne possède pas seulement les parties de Mathematique nécessaires au grand art de la guerre, mais encore celles d'une sp cul tien plus profonde, se trouvant en lieu peu propre à vérisser ce qui avoit été donne sar la Cycloïde, courbe sameuse du dernier siècle, & maniée depuis par tant de mains & si sçavantes, s'est mis à en chercher lui-même les principales propriétés. If a envoyé ses recherches à M. Clairaut, qui en a fait part à l'Académie. On y trouve trois manières dissérentes & fort simples de démontrer que l'aire de la Cycloïde est triple de celle du Cercle générateur. La troisième de ces démonstrations sur-tout est entièrement nouvelle, & a de plus cet avantage qu'elle peut être appliquée à d'autres espèces de Cycloide que celle qu'on entend communément & qui est ioimée par le reulement du Cercle, la seule dont il s'agit ici. M. le Marquis de Courtivron prouve avec la même I riéveté & la même clégance qu'un are quelconque de cette courbe est double de la corde correspondante de son Cercle genérateur: c'est par la méthode synthétique, dont il observe en paffant qu'il feroit à fouhuiter que les Géomètres voulufsent faire plus d'usage. Toutes ces recherches ont paru à l'Acad mie marquer beaucoup d'invention & de capacité dans l'Auteur.

AN BUCH

ASTRONOMIE:

秦宗等等等的 "全年,不是你你是不是一个人。"

ASTRONOMIE.

SUR L'INEGALITE' DES HAUTEURS DU SOLEIL AU SOLSTICE D'ETE,

Et sur l'Augmentation apparente de l'obliquité de l'Écliptique depuis quelques années.

N ne doit pas s'étonner que les Astronomes reviennent fans cesse à de semblables tentatives, pour déterminer p. 67. avec toute la précision possible les hauteurs solsticiales, &, par le moyen de ces hauteurs, l'obliquité de l'Ecliptique: c'est le premier élément de l'Astronomie, le terme de com-

paraison de toutes les positions célestes.

ll a été remarqué en 1741* que cette obliquité, si long- * Hill.p. 108. temps regardée comme invariable par le plus grand nombre des Astronomes, paroissoit aujourd'hui sujette à quelque variation, & qu'on y foupconnoit une forte de libration qui la rendoit tantôt plus petite, tantôt stationnaire, & tantôt plus grande, & nous avons dit en même temps d'après M. de Thury, qu'elle avoit augmenté d'environ 1 2 secondes depuis une douzaine d'années; ce qui est directement contraire à l'hypothèse de M. le Chevalier de Louville, scion laquelle l'obliquité de l'Écliptique va conflamment en diminuant depuis quinze à vingt fiècles à raison d'une minute par fècle. Il s'en faut beaucoup sans doute qu'aucune de ces hypothèses, en tant qu'elle renfermeroit une marche ou une inégalité réglée & périodique, foit pleinement justifice, & le puisse être si-tôt; mais on peut dire que l'inégalité en général, & fur-tout cette dernière, l'augmentation d'obliquite qui réfulte des différentes hauteurs du Soleil au solslice d'eté depuis

Hijl. 1743.

quelques années n'est plus douteuse; en voici un second

exemple, & plus marqué que le premier.

Page 361.

M. le Monnier, dont on a vû en 1738* un Mémoire plein de recherches curienfes fur cette quellion. & où il infirmoit deja beaucoup l'hypothete de M. le Chevalier de Louville, nous en donne aujourd'hui la fuite avec de nouvelles remarques. Il y prouve par ses propres observations & par plutieurs autres qu'il compare entr'elles & avec les siennes, que la plus grande hauteur du fossifice d'été, qui et eit en 1738 de 64 degrés 54 minutes 20 secondes, se trouve être en 1743 de 64 degrés 54 minutes 35 secondes, ou, ce qui revient au meme, que l'objiquite de l'Ecliptique, conclue des différentes hauteurs de ce solstice, a sensiblement augmenté d'un quart de minute ou de 15 secondes en cinq ans.

Il ne faut pas croire qu'on osât se fonder sur des dissérences si délicates, si elles n'étoient, pour ainsi dire, confonnantes à un grand nombre d'autres, telles, par exemple, que certains passages des Fixes dont on sçait, ou dont on peut prendre avec certitude la déclinaison. Cependant M. le Monnier nous assure qu'il a fait toutes ses observations solssticiales avec un excellent micromètre appliqué à la lunette de son quart-de-cercle, & tel qu'il croit pouvoir répondre de leur exactitude à moins de 5 secondes près, sur-tout en prenant un milieu entre diverses opérations réstérées plusieurs

jours de suite avant & après le solstice.

Remarquons aussi que quoiqu'on ait toûjours regardé l'Écliptique comme partagée en deux moitiés égales par ses nœuds avec l'Équateur, & également inclinées à ce cercle, M. le Monnier ne croit pas qu'on puisse absolument conclurre la même obliquité de l'observation du solstice d'hiver, non seulement à cause des réfractions qui y sont beaucoup plus considérables, mais encore par quelque variation physique qu'il soupçonne pouvoir s'y trouver, n'étant pas, dit-il, encore prouvé que la distance réciproque des Tropiques ait augmenté sensiblement dans l'espace de cinq à six ans. C'est ce qu'il nous expliquera sans doute dans une autre occasion, & qui mérite bien un Mémoire particulier.

Quant au système de M. le Chevalier de Louville, que ces observations semblent détruire, & qui est le même à peu près que celui de Rheticus, de Longomontanus & de Wendelin, & appuyé sur les mêmes fondemens, nous ne croyons pas qu'il faille si-tôt le perdre de vûe. La diminution d'obliquité de l'Écliptique pourroit être bien réelle & bien sentible sur de grandes masses de temps, comme elle paroît l'être en esset, & soussirir cependant par intervalles, des variations, des retours opposez, en vertu des causes particulières & accidentelles qui s'y mêlent. L'inclinaison de l'axe de la Terre, & en général des axes des Planètes aux plans de leurs Orbites, ou plûtôt la déclinaison de ces axes à leur perpendicularité sur ces plans, semble être l'effet de quelqu'effort violent & contraire à un méchanisme qui tend sans cesse à se rétablir. Mais c'est ce que nous n'approfondirons pas ici davantage, & en attendant il n'y a rien de mieux à faire que de s'en tenir aux observations.

DE L'ORBITE DE LA LUNE DANS LE SYSTEME NEWTONIEN.

ASTRONOMIE ne squiroit se passer de certaines théories v. les Monde générales & hypothétiques qui donnent tous les cas possibles des situations d'un Attre, dont les observations ne sont que nous indiquer un nombre borné de cas particuliers. La Lune qui est de tous les corps célestes le plus proche de nous, & celui dont le cours nous paroît par cela même expose à de plus grandes variations & plus fréquentes, exigeroit aussi plus que tout autre une espèce de système qui les rentermat toutes. C'est ce qu'on obtiendroit, si l'on pouvoit déterminer l'Orbite de cette planète relativement à toutes les circonstances qui en sont varier la courbure & la grandeur, & c'est ce que M. Clairaut se propose dans le Mémoire qui a cette Orbite pour objet, & dont nous allons tàcher de donner une idée en remontant un peu plus haut.

Q ij

Toute Orbite planétaire, selon le système Cartésien, tel qu'on le conçoit communément & indépendamment des corrections que de célèbres Auteurs y ont faites, n'est que la courbe circulaire ou elliptique décrite par un point du Tourbillon ou du fluide qui entraîne la planète autour du Soleil; &, s'il s'agit d'un Satellite ou d'une planete fecondaire, c'est la combe que decrit un semblable shide autour de la planete principale. Mais felon le sytleme Newtonien, qui Suppose le vuide, ou un fluide non resistant & par confequent incapable d'entraîner, dans ces espaces immenses où se meuvent les corps célestes, l'Orbite d'une planète principale ou secondaire est la courbe qu'elle décrit autour du point central de son mouvement, en vertu de sa projection & de la sorce attractive ou impulsive qui l'attire ou qui la pousse continuellement vers ce point. Nous disons sorce attractive ou impulfive, pour éviter toute discussion sur la cause physique quelconque, que M. Newton a eu la prudence de ne point spécifier, en avertissant qu'il ne partoit que des saits, & qu'il ne parsoit qu'aux Géomètres. L'attraction du point central, du Soleil, par exemple, eu égard à la planète principale, ou de la planète principale à l'égard de ses satellites, étant donc plus commode, plus expéditive pour le calcul, qu'une impulfion extérieure vaguement imaginée, nous ne ferons nulle difficulté de nous servir de ce terme, conformément aux sages restrictions dont M. Newton l'a accompagné.

Selon cette idée une planète telle que la Lune qui est le satellite de la Terre, se meut autour d'elle comme seroit un boulet de canon tiré selon la direction d'une tangente de l'orbite lunaire d'occident en orient, & avec la sorce requise pour la même vîtesse que nous voyons à la Lune. Son mouvement ou sa tendance rechiligne l'écarteroit sans cesse de la Terre, sa pesanteur ou la sorce attractive du point central l'y seroit bien-tôt tomber, mais le concours & la composition des deux le maintiennent autour de la Terre, & la même distance que l'orbite ou la courbe de projection

qui en résulte.

La force de la pesanteur ou de l'attraction est la même à de semblables distances du point central d'où elle est centée partir, elle change ensuite lorsque les distances viennent à changer, & en raison inverse de leurs quarrés. Donc la grandeur & la tigure de la courbe de projection décrite par boulet, & ses dissérentes distances à la Terre ne dépendront que de la force primitive plus ou moins grande imprimée au boulet, & de sa vîtesse.

Mais développons cette idée, voyons quelle sera cette courbe, & de quelles variétés elle est susceptible; & pour rapprocher encore l'exemple de ce qui se passe tous les jours sous nos yeux, imaginons le canon d'où sort ce boulet, pointe horizontalement sur le sommet d'une haute montagne. Nous pourrions prendre toute autre direction, mais l'horizontale est la plus simple & la plus commode pour ce que

nous avons à faire entendre.

Si la force ou la vîtesse imprimée au boulet en sortant de la bouche du canon, est infiniment petite, il est clair qu'il tombera verticalement sur la terre, & en ligne droite; & au contraire, que si cette sorce est infiniment grande, il se mouvra éternellement selon sa direction, perpendiculaire à la précédente, & encore en ligne droite. Ce sont les cas extrêmes; voici les moyens qui ne nous donneront plus que des courbes.

Soit la force finie, telle, par exemple, qu'est ordinairement celle du canon, en saisant toûjours abstraction de la résistance de l'air & de tout autre obstacle étranger. On sçait que la courbe décrite par le boulet à de petites distances, & dans la supposition des directions de la Pesanteur sensiblement parallèles, sera une Parabole dont l'amplitude ou la distance depuis la bouche du canon où est le sommet de cette courbe, jusqu'au point où elle rencontre la terre, croîtra d'autant plus que vous serez la sorce de l'impussion plus grande. Mais vous pouvez ensin augmenter cette sorce à tel point que le boulet ne retombera plus sur la terre, qu'il patsera par delà, & qu'après en avoir sait le tour, il reviendra

Q iij

au point de projection d'où il étoit parti, & ainfi de fuite & sans cetie, si aucune cause extérieure ne trouble sa revolution ou ne l'arrête. Et voilà une véritable orbite Newtonienne.

Entre une infinité de degrés possibles de force ou de vîtesse qui feront décrire une courbe autour de la Terre, il n'y en a qu'un seul déterminé tel, & d'après la distance déterminée, qui paisse donner un cerele partait concentrique à la Terre: tous les autres, jusqu'à un certain degré, donneront des ellipses dont le centre de la Terre occupera l'un des soyers. D'où l'on voit pourquoi il est si rare, pour ne pas dire sans exemple, qu'un corps céleste décrive un véritable cercle autour de son centre de révolution.

Toutes ces ellipses peuvent être divisées en deux classes. La première classe tera de celles dont le sommet ou le point de projection se trouve plus soin du point central que le sommet oppose, & la seconde, de celles dont le sommet de projection est plus près, selon que la sorce impulsive a cté plus petite dans le premier cas que celle qui donne le cercle, & plus grande dans le second. Ainsi toutes les premières ellipses seront rensermées dans ce cercle unique de projection, & toutes les autres s'étendant plus ou moins au delà, rensermeront ce cercle, depuis le point touchant & commun de la projection jusqu'au sommet opposé.

On détermine le degré de force ou de vîtesse nécessaire pour saire décrire au boulet, & le cercle & chacune de ces ellipses, par le vitesse qu'on imagine qu'auroit acquise un corps en tombant d'une certaine hauteur relativement à la distance du point de projection au point central qui est ici le centre même de la Terre. Nous n'entrerons point dans

une explication plus particulière sur ce sujet.

Mais nous ferons observer que si le degré de sorce ou de vîtesse étoit tel que sa hauteur de la chûte supposée pour l'acquerir dût être infinie, se mobile, le boulet, ou le globe planétaire ne décriroit plus que des Hyperboles, & ne reviendroit jamais au point d'où il étoit parti; & c'est-là peut-être le cas de certaines Comètes dont l'extrême rapidité ne

s'accorde pas avec leur distance observée, par rapport au point central & à l'hypothèle de l'elliple ou de la parabole. On n'imagineroit pas aisement differentes hauteurs infinies de chute, mais on peut fort bien supposer différens systèmes de pelanteur & d'accelération; c'est pourquoi l'on doit concevoir ici une infinité de ces hyperboles partant du point touchant ou sommet commun, & comprises dans l'angle mixtiligne, depuis la dernière elliple potlible jusqu'à la droite horizontale de contingence.

L'Orbite de la Lune, formée en conséquence de la théorie que nous venons d'expliquer, & confidérée indépendamment de toute autre cause, sera donc elliptique, & rien ne sçauroit jusqu'ici altérer la figure ou changer la grandeur qui sui conviennent, & qui résultent de la vîtesse qu'on imagine avoir été imprimée au globe de la planète par la projection. Cette Orbite, dis-je, fera elliptique, parce qu'elle est trèssensiblement excentrique à la Terre, & que la vîtesse du mobile qui la décrit est bien au dessous de celle qui auroit pu engendrer quelqu'une des hyperboles dont nous venons

de parler.

Mais la Lune, & la Terre dont elle est le satellite, se meuvent ensemble autour du Soleil, & tendent ou pèsent conjointement vers ce point central de leur commune révolution, à raison de leurs masses & des guarrés de leurs distances réciproques, conformément à la loi générale de La Pefanteur & au système Newtonien. Or la masse du Soleil qui ett, seton ce syttème, près de 170 mille fois plus grande que celle de la Terre, & de 7 millions de fois plus grande que celle de la Lune, & qui, malgré sa distance d'environ trente millions de lieues, agit très-puissamment sur chacun de ces corps, ne sçauroit manquer d'altérer le mouvement du plus petit, & la figure de son orbite autour du plus grand, dans tous les changemens de distance de l'un & de l'autre autour de ce point central. Car l'orbe annuel de la Terre est excentrique au Soleil, & de plus l'orbite de la Lune n'est pas dans le même plan que cet orbe, elle le coupe en deux points

qui sont ses nœuds, & s'en écarte ensuite de part & d'autre

d'environ 5 degrés.

Les irrégularités & les variations sans nombre qui doivent naître de cette complication de tendances & de vîtesses, font le sujet de l'un des plus beaux morceaux du livre des Principes de Newton; mais avec toute la sagacité que ce sublime Mathematicien y fult paroitre, il refle encore bien des chotes à desirer dans la détermination de l'orbite lunaire : les Tables dressées d'après ses Principes ne s'accordent pas toûjours exactement avec les observations actuelles, pierre de touche ordinaire de ces sortes de théories. M. Machin, l'un des grands Géomètres d'Angleterre, Membre de la Société Royale & Profesieur d'Aftronomie au Colle, ede Gresham, essaya d'y suppléer dans un ouvrage qui sut donné il y a treize à quatorze ans à la suite de la Traduction angloise des Principes, intitulé Les loix du mouvement de la Lune, conformément à l'hypothèse de la Pesanteur. Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce Traité, après le système de Copernic, & celui de l'Aitronomie elliptique de Kipler, adopter aujourd'hui de presque tous les Astronomes, & sur-tout par Newton, c'est que M. Machin y fait revivre les Épicycles, p ur expliquer tous les mouvemens & toutes les inquil rités Junaires. Mais on verra par le Mémoire de M. Clairaut que cette i l'e est encore affez cloignée de fatifaire à tentes ces irrégularités.

M. Clairaut fait de la détermination de l'Orbite de la I une un vrai Probleme de Dynamique tout semblable à ceux * Page 125. dont nous avons parlé dans l'Histoire de 1742*, qui sont aussi de M. Clairaut, & où nous avons comme indiqué d'avance la route qu'il tient pour résoudre celui-ci. Son Mémoire porte absolument sur ce Lemme fondamental.

Supposant que trois corps, S, T, L, soient lancez avec des vitesses & des directions quelconques, que leurs masses soient aussi quelconques, & qu'elles s'attirent en raison réciproque du quarré des distances; on demande les forces accé-Teratrices qui a iffent fur un de ces corps, L, par exemple,

DOUL

DES SCIENCES.

129

pour lui faire décrire la courbe qu'il décrit autour d'un autre,

T, de ces corps.

Où il est visible que S, T, L, d'abord considérez selon cette acception générale & abstraite, vont devenir le Soleis, la Terre, & la Lune; que les forces accélératrices ne sont que les gravitations ou les dissérentes pesanteurs de ces corps entr'eux, on de l'un d'eux, tel que la Lune, vers la Terre & vers le Soleil, à raison de sa masse & du quarré de ses dissances; que la courbe décrite par L autour de T est l'orbite même de la Lune, d'où résultent ses nœuds, ses simites, & c. Nous n'en dirons pas davantage; tout le reste n'est que corollaires & détail de calcul.

SUR LA CONJONCTION DE MARS AVEC SATURNE ET JUPITER.

E toutes les Configurations, de tous les Aspects ou V. le M. de toutes les fituations que les Planètes & les Etoiles PP-159 & peuvent avoir les unes à l'égard des autres en diverses parties 318. du Zodiaque, il n'y en a pas de plus utiles à observer pour l'avancement de l'Astronomie que les Conjonctions : ce sont autant d'époques qui servent à déterminer les mouvemens des corps célestes, les chemins qu'ils tiennent, & la durée de leurs cours. La Conjonction d'une Planète avec une autre, ou avec une Etoile fixe, arrive lorsque cette Planète vûe de la Terre, se trouve en même temps sur le même rayon visuel avec cette autre, ou avec une Etoile fixe, ou, plus généralement, à la même longitude, c'est à-dire, vis-à-vis le même point de l'Écliptique, terme de comparaison & chelle commune de tous les orbes planétaires. Les éclipses ou les conjonctions celiptiques sont de la première classe, & toutes les autres, de beaucoup plus nombreuses, sont de la seconde. Comme les Conjonctions en général font préférables à tous les autres aspects, les éclipses l'emportent de même sur toutes les autres Conjonctions, parce que la rencontre longitudinale

Hifl. 1743.

130 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE
y cit plus prochaine de l'Echiptique, & pur la meme raifent
les écliples qu'on nomme centrales, & qui, lorsqu'il s'agit
du Salut, tembent au d'ument sur le meme point de l'ecliptique & sont voir les deux astres conjoints par leurs centres
sur une même ligne, sont de toutes les conjonctions & de
toutes les éclipses les plus précieuses.

Il n'y a guère eu d'année plus féconde en Conjonctions remarquables, que celle-ci. Mars, Jupiter & Saturne, la Lune avec les Fixes, & ensin Mercure vû dans le disque

du Soleil nous en ont donné le spectacle.

Il faut cependant remarquer que l'on qualifie quelquesois du nom de Conjonction de simples rencontres successives. mais renfermées dans un court intervalle de temps, & dans une petite portion du Zodiaque, sur-tout à l'égard des Planètes supérieures, dont les conjonctions proprement dites font, toutes choses d'ailleurs égales, d'autant plus rares, que les périodes de leurs cours sont plus longues. La Conjonction de Mars avec Saturne & Jupiter, dont il s'agit ici, est de cette espèce, ces trois Planètes ayant été vûes plusieurs mois ensemble dans la constellation du Lion, mais ne s'étant trouvées que successivement à la même longitude & en opposition avec le Soleil, scavoir, Mars le 16 Février, Saturne le 21, & Jupiter le 28; ce qui ne fait qu'un intervalle de douze jours, & qui arrive très-rarement en un grand nombred'années ou même en plusieurs siècles. L'œil placé successivement sur chacune de ces Planètes auroit donc vû dans le même ordre trois Conjonctions de la Terre avec le Soleil.

Non sculement les trois Planètes étoient rensermées dans la constellation du Lion aux momens de leurs Conjonctions, mais encore, ce qui est très-heureux & très-commode pour en déterminer plus surement les rapports, elles se sont trouvées sort proche du Cœur du Lion ou Regulus, qui est la principale étoile de cette constellation & l'une des plus brillantes du ciel.

Autre circonstance favorable, remarquée par M. Cassini, 31 dont il n'a pas négligé de tirer avantage, ces observations

DES SCIENCES.

ont été faites près des moyennes distances de ces Planètes entre leurs Conjonctions & leurs Oppositions avec le Soleil, où les inégalités qu'on en veut connoctre font les plus grante.

M. Cassini s'étoit aperçu autresois de certaines irrégularités dans la situation du périhélie de Saturne, déduite des observations faites avant & après le passage de cette planète par ce point, & il avoit jugé que ce pouvoit être l'esset de quelque libration dans l'axe de Saturne, causée par sa position actuelle à l'égard des autres planètes; sa conjecture paroit être justifiée aujourd'hui par ces dernières observations. Mais il cspère encore s'en procurer de nouvelles, pour eclaireir plus particulièrement ce fait.

PASSAGE DE MERCURE PAR LE DISQUE DU SOLEIL,

le 5 Novembre 1743.

pur le Soleil, depuis l'invention de grandes funettes, P2-173, -1,

c'est-à-dire, depuis environ l'an 1610.

La première de ces observations ne remonte pas au delà de 163 1. Elle sut faite à Paris par Gassendi, le 7 Novembre de cette année, &, comme ajoûte ce Philosophe, selon le veu èr l'avertissement de Képler; car Képler avoit prédit ce passage ou cette conjonction inscrieure écliptique, & en avoit publié un Ecrit l'année précédente qui sut celle de sa mort. Il est vrai que le même auteur avoit rapporté dans son Optique, d'après une ancienne histoire de la vie de Charlemagne, qu'en 807 ou 808, la planète de Mercure sut vûe dans le Soleil, comme une petite tache noire, pendant hair jours; mais le sait est manisestement saux ou équivoque, cette planète ne pouvant demeurer tout au plus que six à sept heures sur le disque soluire. Et quoique, selon Képler, il faille lire huit sois, véloties, au lieu de huit jours, octo dies, on sçait aujourd'hui que cela n'est pas plus possible, & que

419.

132 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE bien que les conjonctions écliptiques de Mercure avec le Soleil soient aflez fréquentes, il ne sçauroit y en avoir huit, ni même deux dans un si court intervalle. Aussi Képler revint-il bien-tôt de cette erreur, après qu'il eut mieux connu la théorie de cette planète, & qu'il se sut convaincu de l'existence des taches solaires. Car on peut en esset quelquesois voir ces taches à la vûe simple par un très-petit trou, ou, avec le secours des grands tuyaux, comme en avoient les Anciens, & mieux encore dans un lieu obscur, en y recevant l'image du Soleil sur un papier à quelques pieds de distance du trou: mais on ne s'avisoit pas même de les imaginer avant l'invention des funettes, & ne les imaginant pas, on n'y regardoit pas, on ne les voyoit pas, ou lorsqu'on les voyoit par quelque cas fortuit, on les prenoit pour toute autre chose, & peut-être pour une illusion de la vûe. Le prétendu passage de Mercure par le Soleil en 808, n'aura donc ete viui-semblablement que l'apparition de quelque grosse tache dans le Soleil.

Il devoit y avoir cu cependant trois autres conjonctions écliptiques de Mercure, depuis l'invention des luncttes jurqu'en 1631, sçavoir, en 1615, en 1618, & en 1628; toutes visibles de quelqu'endroit de la Terre, & celle de 1618 le pouvant être même de divers lieux de l'Europe. Mais, ou l'on n'étoit point en ces temps-là assez au sait de la théorie de Mercure, ou, s'il m'est permis de le dire, il n'y avoit pas assez de foi sur ces sortes de phénomènes pour obliger les Observateurs à s'y préparer, & moins encore à les aller chercher dans des pays lointains. Un pareil exemple de persuasion & de ferveur étoit réservé à l'année 1651, où un Astronome Anglois nommé Shakerley alla exprès à Surate dans les Indes orientales, pour y observer un de ces passages de Mercure devant le Soleil, qui ne devoit arriver

que la nuit en Europe.

Ce sut la seconde des neus observations. Elle sut suivie des six autres, en 1661, 1677, 1690, 1697, 1723, 1736, & l'a été ensin de cette dernière le 5 Novembre

1743, qui est la neuvième. Nous en aurions cinq ou six de plus, si l'on avoit imité le zèle de Shakerley.

Nous remarquerons encore que tous ces passages de Mercure par le disque du Soleil tombent dans le commencement de Mai & de Novembre, seur retour périodique en tant qu'il résulte des révolutions de la Terre & de Mercure autour du Soleil, & du voisinage des Nœuds, se trouvant jusqu'ici rensermé dans ces limites. Ils arrivent toûjours pendant la rétrogradation apparente de cette planète; parce que son mouvement relatif à celui de la Terre & dans sa même direction, étant alors plus vîte, doit y paroître opposé. Ces retours ont aussi dissérentes périodes, par la complication de toutes ces circonstances, de six à sept ans, de dix, de treize, &c. mais qui reviennent les mêmes après un certain nombre d'années, consormément à la théorie de M. Halley,

le premier qui ait ainsi approsondi cette matière.

Pendant l'éclipse du Soleil par Mercure, car c'est une véritable éclipfe, on voit dans son disque une petite tache noire & circulaire, de quelques secondes de diamètre, plus petite encore qu'elle ne l'est réellement; parce que le rayonnement des corps lumineux les faisant toûjours paroître plus grands qu'ils ne sont, il faut par la raison contraire qu'un corps opaque & obscur vû sur un fond lumineux. y paroisse plus petit qu'il n'est, & qu'il perde autant par ses bords que la lumière qui l'entoure gagne sur le trou obscur qu'il semble y former. Le diamètre de Mercure, qui n'est tout au plus que le tiers de celui de la Terre, ne fait guère par conséquent que la 300me partie de celui du Soleil; fon aire ou fon disque n'en seroit donc qu'environ la 90000me; d'où ôtant ce que la radiation ambiante peut en retrancher, on peut juger de quelle extrême petitesse sera cette apparence. Aussi lorsque dans l'observation de 1631 Gassendi vit pour la première sois Mercure dans le Soleil, il le prit d'abord pour une petite tache qu'il n'y avoit pas aperçue le jour précédent, quoiqu'il y eût bien regardé, ou qui s'y étoit formée depuis, ne pouvant s'imaginer

134 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROTALE

cue le globe de cette planète pût produire une su petite ombre fait l'acceptant de la différentes diffances du cette ombre & son mouvement par rapport au centre & aux bords du Soleil, le convainquirent bien-tôt que c'étoit Mercure

même & cette Conjonction si desirée.

La route ou la ligne que suit ce point noir sur le disque solaire, son entrée & sa sortie qui s'y montrent par une petite échancrure, & la durée de son passage, sont les principaux objets du calcul & de l'observation. C'est delà qu'on tire mille inductions importantes pour les élémens de la théorie de Mercare, pour le determination des longitude de différens lieux de la Terre, & même pour la parallaxe du Soleil, ou, ce qui revient au même, pour sa distance. Car les rapports de distance de Mercure & de la Terre au Soleil étant donnez par la Règle de Képler ou par les temps connus de leurs révolutions, & la distance moyenne de Mercure au Soleil faisant environ 38710 cent millièmes de celle de la Terre, on opère alors, par rapport à la parallaxe du Soleil, comme s'il n'étoit pas plus éloigné de nous que l'est actuellement la planète de Mercure, c'est à-dire, de 100000 parties moins 38710, ou de 61290.

Íl s'en faut bien que dans les neuf observations de Mercure dont il a été parlé ci-dessus, on ait pû voir sa route entière sur le disque du Soleil, son entrée & sa sortie. Cela est très-rare, par les circonstances des lieux, de l'heure & du temps, & ne se trouve que dans trois de ces observations, sçavoir dans celle de 1677, saite dans l'Isle Sainte-Hélène par M. Halley, dans celle de 1736, saite à Paris & en divers autres endroits du Royaume & de l'Europe, & ensin dans celle-ci, de 1743. Sur quoi M. Cassini remarque que nous n'en devons espérer de semblable à Paris qu'à la fin du siècle, en 1799. On voit par-là combien le dernier passage de Mercure dans le Soleil a dû être précieux à nos Astronomes.

La première observation qui s'en présente dans les Mémoires, est de M. l'Abbé de la Caille, & se trouve parmi celles qu'il a s'atte cette année au Collège Mazuin sur les

conjonctions de Jupiter, Saturne & Mars, sur l'Apogée du

Soleil, & fur divers autres fujets.

Suivent les observations de Mrs Maraldi, le Monnier & Cassini. M. Delitse nous a autil envoyé un Memoire à cette occasion, dans une lettre adressée à M. Cassini, de Petersbourg le 24 Août 1743, & qui, comme on voit par cette date, ne sçauroit contenir une observation qui n'auroit pû être faite que deux ou trois mois après; mais il y donne une méthode pour tirer de ce phénomène la Parallaxe solaire, par manière de supplément à son Mémoire de 1723*.

M. Cassini s'est beaucoup attaché à déduire cette parallaxe de sa propre observation, & il en indique une methode sort simple. Il ajoûte que si l'on pouvoit s'assurer par le calcul de la durée du passage de Mercure à 23 secondes près, comme il résulte dans cette observation, on pourroit sans autre secours déterminer assez précisément la Parallaxe du Solcil. C'est ce qu'il saut voir dans son Mémoire. Il la trouve de 15 secondes, plus grande de 3 secondes que par les dernières observations de l'opposition de Mars evec le Solcil, arrivée en 1736*.

Mercure commença de toucher le disque du Soleil & de 1739.
d'y entrer vers les 8 heures 39 minutes 45 secondes du matin, à 3 ou 4 secondes de plus ou de moins, selon les quatre Astronomes dont nous avons indique les Memoires à la tête de cet article, & il en fortit entièrement à 1 heure 12 minutes après midi. Ainsi la durée totale du passage sut d'environ 4 heures 32 \frac{1}{4} minutes, ce qui en donne se milieu

à 10 heures 55 \frac{1}{2} minutes.

On conclut le diamètre de cette planète du temps qu'elle emploie à entrer dans le disque du Soleil, depuis l'instant qu'elle le touche jusqu'à celui de son immersion totale, & de même depuis l'instant qu'elle commence d'en sortir jusqu'à son entière émersion. Nous avons supposé ci-dessus ce diamètre d'environ \(\frac{1}{3}\) de celui de la Terre, ou la 300me partie de celui du Soleil, ce qui fait environ 6\(\frac{1}{2}\) secondes de grandeur apparente ou an plaite, le Soleil etant stantist.

+ Page 105.

* V. les Mén. le 1739 . 136 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

en avoir 3 2 ou 3 3 minutes; mais M. Cassini le réduit sci à 6 secondes : d'où résulte la grandeur réelle du diamètre de Mercure à peu près égale à celle du diamètre de la Lune,

qui n'est guère que 1 ou 3 de celui de la Terre.

Pendant que le globe de Mercure traversoit le disque du Soleil en 1736, M¹⁵ de la Société Royale de Montpellier y observerent une espèce de limbe ou d'anneau lumineux qui l'entouroit; circontlance à laquelle M. Cassini a été trèsattentif dans le paffage de 1743. Il a cru aufli, dit-il, y apercevoir une atmosphère très-déliée, à peu près semblable à celle qu'on voit autour des taches du Soleil, & il continua de l'observer dans tout le cours du passage; mais il n'oseroit rien assurer là-dessus, & il soupçonne que le brouillard qui s'étoit élevé le matin pouvoit avoir laissé dans le ciel des vapeurs très-capables de produire cette apparence.

La manière dont on déduit de ces observations l'inclinaison de l'orbite, le mouvement horaire de Mercure, &c.

nous jeteroient dans une trop longue discussion.

Mais nous ne devons pas omettre que plufieurs autres Astronomes, tels que le P. Pezenas Jésuite, Professeur d'Hydiographie à Muteille, M. Zanotti, Chet de l'Obiervatoire de l'Inditat à Bologne, & M. Bote, Profetieur a Wittemberg nous ont aussi fait part de leurs observations, de leurs calculs & de leurs recherches astronomiques sur ce phénomène dont ils ont très-sçavamment détaillé les circonstances.

SUR LES DEUX COMETES

Qui ent para cette annee, & far l'Orbite de celle de 1729.

V. les M. p. 193.

A PRÈS tout ce qui a été dit l'année dernière sur les Comètes en général*, nous ne parlerons que succinc-*Hil. 1742, p. 75 of fav. tement des deux qui ont paru cette année.

La première est une de ces petites Comètes qui n'intérefient que les Affronomes, & qui vrai-femblablement n'aura été vûe que par eux. M. Maraldi l'aperçut le 12 Février; il en prit la configuration ou la fituation par rapport aux étoiles de la grande Ourse où elle étoit, & dès le lendemain il l'annonça à l'Académie qui se trouvoit assemblée ce jour-là. Il n'a pû l'observer depuis, que le 17 & le 18 suivans, le ciel ayant été presque toûjours couvert le reste du mois, & la Comète ayant disparu. Elle étoit sans queue, & sous la forme d'une de ces étoiles qu'on nomme nébuleuses. Elle alloit du nord au sud, & dans l'espace de quatre jours 1/4 elle avoit parcouru 6 degrés 1 minute en longitude, selon l'ordre des Signes, & 14 degrés 37 minutes en latitude. C'est donc une de ces Comètes qui s'écartent, ou qui paroissent le plus s'écarter de la route des planètes, en coupant l'éclip-

tique sous un très-grand angle.

La seconde a été la plus grande, la plus brillante, & une des plus remarquables qui aient paru depuis la fameuse Comète de 1680, par l'étendue de sa queue, par la grosseur de sa tête ou de son globe, & par sa proximité du Soleil. Mais comme elle n'a commencé de se montrer que dans le mois de Décembre de cette année, c'est à l'année suivante, 1744, où elle a été vûe dans toute sa splendeur, que se rapportent la plupart des Mémoires qui en ont eté donnez à l'Academie, & qu'on en trouvera les observations & le détail. Nous apprimes peu de temps après que d'étoit à M. de Chefeaux, petit-sils de M. de Crousaz, & très-connu dans notre Histoire, qu'en étoit dûe la première découverte, du 13 Décembre 1743. Il en avoit déjà calculé & prédit presque toutes les apparences avec une pénétration & une exactitude peu communes à tout age & intiniment rares dans une auffi grande jeunesse que la sienne.

M. Maraldi finit son Mémoire sur la Comète du 12 Février par la recherche de l'orbite de celle de 1729. Cette Comète étoit fort petite & à peine visible à la vûe simple; mais elle a mérité l'attention des Astronomes par sa longue durce, & elle intéresse particulièrement M. Maraldi, étant

la première qu'il ait observée.

138 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

On sçait que l'orbite d'une Comète, de même que de toute planète, n'est autre chose que la courbe décrite par le centre de son globe autour du Soleil, & en général dans le ciel autour de quelque centre ou soyer. C'est aussi ce qu'on appette plus parteulierement Trajadan all'égard de Comète. La détermination d'une orbite planétaire ou cométique comprend donc sa sigure, la distance de ses divers points au Soleil, son excentricité, ses nœuds, & l'inclinaison de son plan à l'écliptique. C'est ce que M. Maraldi donne ici pour la Comète de 1729, par ses observations & ses calculs, & par une Table des longitudes & des latitudes de cette Comète pendant le cours de son apparition, depuis le 31 Août 1729

jusqu'au 18 Janvier 1730.

On ne doute presque plus aujourd'hui que les Comètes ne se meuvent dans des ellipses fort alongées, & fort excentriques au Soleil qui en occupe l'un des foyers, conformément à la doctrine de Mrs Newton & Halley, & aux observations les plus exactes. Les sommets & une portion de ces orbites elliptiques où se trouvent les Comètes, lorsqu'arrivant dans notre lyfteme tolane elles deviennent vilibles pour nous, se confondent sensiblement avec des paraboles. à cause de leur grande excentricité par rapport au Soleil, & on les prend pour telles dans le calcul pour le rendre plus facile. Car outre que l'équation à la parabole est plus simple que celle de l'ellipse, toutes les paraboles sont semblables & quarrables, d'où il résulte encore d'autres avantages qui simplifient beaucoup la forme de ce calcul. Et à l'égard de leur identité supposée avec l'ellipse dans le cas dont il s'agit, elle est fondée sur ce que les deux soyers de cette dernière, s'ils étoient infiniment éloignez entr'eux & de son centre, la tere ient abtoloment femblible a une parabole, d'inschaeune de ses moitiés prises de part & d'autre de ce centre, comme les deux foyers infiniment proches la changeroient en un véritable cercle. Mais on voit bien que cette supposition ne va ici qu'à un à-peu-près, puisqu'on suppose en même temps que la plupart des Cometes tont pluticuis revolutions, Iclon

cies périodes plus ou moins grandes, dans leurs orbites, & par conséquent qu'elles se meuvent dans des courbes rentrantes en elles-mêmes, telles que l'ellipse. Il y a cependant des Comètes dont la Trajectoire observée ne sçauroit s'accorder avec le calcul hypothétique de la parabole, qui s'éloigneroit trop du vrai, & où il faut nécetlairement partir de l'ellipse même; il y en a d'autres ensin dont tous les points observez donneroient à la rigueur une hyperbole, ou une courbe qui en excluroit absolument le retour; comme il a été expliqué ci-dessus*, en parlant des orbites ou des courbes * Page 126. de projection decrites par les Planètes. La Comete de 1729, selon les calculs de M. Bouguer, dans son Mémoire De la détermination de l'Orbite des Comètes*, tomberoit dans Mém. 1733. ce dernier cas, conclu de ses distances & de la rapidité de 1. 349. son mouvement, d'après les observations de M. Cassini*: Mem. 1729. mais M. Maraldi la ramène aujourd'hui à la théorie g'nérale 🔭 🦠 des Comètes qui se meuvent dans des trajectoires elliptiques, ne concevant pas ce que deviendroit un corps céleste qui parcourroit une hyperbole, ni que les Cometes seient des corps jetez au hasard.

La différence des réfultats en pareille matière, ne surprendra point ceux qui sont instruits de l'extrême difficulte de déterminer le lieu physique des Cometes dans le ciel : des différences presqu'insensibles & souvent inobservables dans ses angles qui donnent ce lieu & qui sont presque toujours fort aigus, sufficent pour la produire. Du reste il n'y auroit rien d'incompatible avec tout ce que nous connoissens de l'immentité & de la variété infinie de l'Univers, qu'il existat des corps celetles qui, par la disposition generale, ou par quelqu'accident qui en fut la fuite, seroient destinez à n'avoir qu'une scule & unique révolution, mais sans bornes, dans toute la durce des fiècles, ou jusqu'à quelqu'autre accident. Eh! qui scait d'ailleurs si de semblables Comètes n'appartiendront pas à un autre système, à un autre Soleil autour duquel elles forment des ellipses, tandis que par le sommet de ces courbes, qui est tourné vers nous, & en vertu du raccour-

140 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE cissement optique, elles ne nous présentent que des hyperboles ou des courbes sans retour? Mais il ne saut recourir à ces sortes d'explications qu'après avoir épuisé toutes les retsources des hypothèles connues, & consimmes par le plus grand nombre d'observations.

SUR LES REFRACTIONS ASTRONOMIQUES.

V 1∈ M. p. 249.

NI muière li importante, & qui influe fi fort sur toutes les Observations astronomiques, ne sçauroit être trop approfondie. On a vû dans l'Histoire de 1742*, ce que M. de Thury avoit déjà sait sur l'altération que les dissérentes températures de l'air pouvoient causer à la résiaction de la lumière des Astres vûs à la même hauteur, & que toutes ses observations conspiroient à lui donner cette réfraction plus grande en hiver qu'en été. C'est ce qu'il a encore suivi dans les circonstances les plus savorables, & il en a tiré le même résultat. Les grands froids de Janvier 1742, peu dissérens de ceux de 1709, & les chaleurs du mois de Juillet suivant, sort approchantes de celles de 1724 & 1738, lui ont sourni là-dessus deux termes de comparaison très-sensibles.

Entre toutes les Fixes qui en ont fait le sujet, nous choisirius, & la luisante de la Lyre; deux étoiles qui avoient été souvent observées à même intention par seu Mrs Cassini & de la Hire, mais inutilement, saute sans doute d'instrumens aussi parsaits que ceux qu'on y emploie aujourd'hui, ou d'avoir connu l'Aberration des Fixes.

Pour ne laisser aucun sujet de doute dans les dissérences que M. de Thury avoit à conclurre de ses observations sur la hauteur apparente de ces Fixes aux deux saisons les plus opposées de l'année, l'hiver & l'été, il a pris grand soin d'y démêter toutes les autres causes de variation qui pouvoient compliquer celle de la retraction, telles, par exemple, que le

mouvement propre des Fixes, ou plutôt de l'axe de la Terre, dont la révolution s'achève en vingt-cinq mille ans, & l'aberration ou le mouvement successif de la lumière des Fixes, dont nous venons de parler, & qui en change le lieu

apparent dans les différentes saisons de l'année.

Après toutes ces précautions, & sur l'inspection du thermomètre, instrument assez nouveau en Astronomie, M. de Thury a trouvé que la dissérence des hauteurs, à compter des plus grandes chaleurs de l'été aux plus grands froids de l'hiver qu'on éprouve communément dans notre climat, étoit à l'égard de Sirius de 1 minute 21 secondes, & à l'égard de la Lyre de 26 secondes, & ainsi des autres étoiles, plus ou moins, relativement à leurs dissérentes hauteurs méridiennes.

Sirius ne s'élève qu'à environ 25 degrés sur l'horizon, mais la Lyre va à près de 80 degrés. Ainsi il n'est pas étonnant que la réfraction de l'hiver à l'été de l'une soit si dissérente de celle de l'autre. Cette dissérence est cependant bien éloignée de se trouver en même rapport que les deux résractions absolues à ces mêmes degrés de hauteur méridienne, l'une étant, selon la Table insérée dans la Connoissance des Temps, de 2 minutes 6 secondes, & l'autre seulement de 10 secondes, c'est-à-dire, à peu près en raison de 13 à 1; au lieu que la dissérente variation de résraction des deux étoiles de l'hiver à l'été, n'est guère que comme 3 à 1. Ce qui pour roit saire le sujet de plutieurs restexions sur le rapport de quantité, de rarésaction & de condensation de la matière réfractive à la matière propre de l'air.

Le Mémoire de M. de Thury finit par la détermination du folffice d'été de 1742, tirée de tous ces principes, & des divers passages des Fixes qu'il avoit observez. Il l'établit de 64 degrés 54 minutes 3 1 ½ secondes de hauteur, & l'obliquité de l'Écliptique qui s'en déduit, de 2 3 degrés 28 minutes

3 1 ½ secondes.

SUR LE GNOMON ET L'OBELISQUE

MERIDIENNE DE SAINT SULPICE.

V ! M.

Tour Sale de calian libline, teate partie de fivle, toute ouverture qui montre l'heure actuelle par un point d'ombre ou de lumière sur un cadran ou sur une méridienne. en est le Gnomon. Mais on donne principalement ce nom, & en prenant quelquesois la partie pour le tout, aux Gnomons ou aux Méridiennes qui par leur grandeur servent à déterminer le cours du Soleil, les Solstices, les Equinoxes, l'obliquité de l'Écliptique, &c. Les Méridiennes de Saint Pétrone à Bologne en Italie, des Chartreux à Rome, de l'Observatoire, & any and halcelle de Stint Sulpice a Paris, font legale celebres. Dans toutes ces espèces d'instrumens, les plus grands dont les Astronomes se soient servis, le Gnomon proprement dit est une ouverture d'environ un pouce de diamètre, pratiquée à la voûte ou en quelqu'autre endroit de ces édifices, par où patient les ravons du Soleil dont l'image vient le projeter sur le plan horizontal de la Méridienne. Chez les Anciens ce qu'on appelloit des Gnomons confilloit ordinairement en de grands Obelifques elevez en plein air et dans quel jue grande place, au sommet desquels étoit un globe ou une figure quelconque qui faisoit l'estice de cette auverture, & dont l'ombre tenoit lieu de l'image solaire: en cela très-insérieurs à nos Méridiennes, puisque cette ombre ainsi environnée de la lumière du Soleil ne pouvoit qu'être fort mal terminée, & d'autant plus mal, que le Gnomon étoit plus grand, & le Soleil plus bas, comme il arrive autour du solflice d'hiver.

I. M ridienne de Saint Sulpice fut confluite il y a quinze à vingt ans, peu de temps après la nef de l'église, & par les soins du même Pasteur, dont le zèle éclairé se porte sans relache sur tout ce qui tient au bien spirituel & temporel

de l'humanite. Henry Sully fameux Horloger Anglois le chargea de l'ouvrage. L'ouverture en fut placée aux vitraux du bras méridional de la Croisée à 75 pieds de hauteur. Le mur opposé du bras septentrional n'en étoit intérieurement qu'a 180 pieds; d'où il fuit que l'imige du Soleil qui paffoit par cette ouverture, ne pouvoit porter sur la ligne méridienne tracce horizontalement sur le pavé de l'eglise que jusque vers le commencement du mois de Novembre. Car on scait que le point du folttice d'hiver fur une pareille ligne à la latitude de Paris, s'éloigne du pied du Style ou du Gnomon de plus du triple de sa hauteur: ce qui donne plus de 225 ou de 2 3 o pieds. Le Soleil se peignoit donc alors sur le mur opposé, & la Méridienne continuée devenoit une ligne verticale.

M. le Monnier ayant pris garde à cette espèce d'inconvénient, n'en a été frappé que pour le tourner au profit de l'Astronomie; & secondant les dispositions généreuses de M. le Curé de Saint Sulpice, il en a obtenu sans peine que tout l'ouvrage fût refondu & perfectionné felon le nouveau

plan dont nous allons rendre compte.

Il a fait hautser de 5 pieds & reculer de 2 la grande plaque de métal, ce soleil dore qui en portoit l'ouverture, ou plutôt il y en a substitue une autre qui est scellée dans l'epaisseur du mur & qui n'en déborde que pour prefenter aux rayons du Soleil l'ouverture d'un pouce de diamètre; ce qui la rend d'autant moins sujette à se dilater par le chaud & à se resierrer par le froid; & l'on a entièrement supprimé le jour de la fenêtre. Cette ouverture est donc présentement à 80 pieds de hauteur au dessus du pavé de l'église. A la partie intérieure du mur septentrional, où répond désormais la portion verticale de la nouvelle Méridienne qui se trouve à 18 pouces vers l'occident de la précédente, on a encastré en saissie un Obélisque de marbre blanc de 30 à 35 pieds de hauteur sur une base ou piedestal de 4 à 5 pieds de largeur. Et à la face antérieure & exactement verticale de cet Obelifque, fur la Méridienne qui la coupe par le milieu, sont gravées les transversales de ; minutes & de leur subdivision de ;

144 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE en 5 secondes, qui répondent aux bords supérieur & inférieur du Soleil au folflice d'hiver. Voici les avantages qui

résultent de toute cette construction.

L'image folaire qui se peint sur un plan horizontal vers les temps du folflice d'hiver étant très-alongée fur le grand axe de l'ellipse de projection, se trouve par-là mal bornée fur cet axe, donne une grande pénombre, & ne peut par conféquent qu'indiquer affez imparfaitement la hauteur apparente du Soleil. Ici au contraire l'image du Soleil est presque ronde à ce solstice, & sa projection, qui est d'environ 20 pouces de diamètre en hauteur, approche d'autant plus d'être directe, qu'elle eût été plus oblique sur le plan horizontal: elle est aussi d'autant moins assoiblie par ses bords.

Cette image au folflice d'hiver parcourt 2 lignes par seconde fur l'Obélisque où elle monte à environ 25 pieds au deflus du pavé de l'église, & un peu plus de 3 lignes, lorsque, le Soleil étant au parallèle de Sirius, elle est descendue plus bas. Ainst l'on y peut ordinairement déterminer l'instant du midi, en prenant le milieu entre le passage des deux bords, à moins d'une demi-seconde, ou même d'un quart de seconde.

On doit sur-tout se servir de ce grand instrument pour déterminer les Ascensions droites du Soleil en hiver, & le véritable lieu de cet affre dans son perig e, ou, ce qui revient au même, dans le périhélie de la Terre, ses divers diamètres d'uns les différentes faitons de l'année, les diffances apparentes du Tropique ou du solstice d'hiver à l'Equateur, & enfin l'obliquite de l'Ecliptique pour ce sossièce; car nous avons * 1 : 122. vu ci deffus apre M. le Monnier soupconnoit cette obli paité de n'y être pas absolument la même qu'au solstice d'été.

Reste la partie horizontale de la Méridienne, qui est la plus ciendue, & où le trouve mirque le solilice d'ite avec les divitions qui en indiquent l'approche. Toute cette partie de La ligne, ainti que la verticale far l'Obelique, est indiquée par une lame de cuivre de 2 lignes d'épaisseur, mise & en-

soncée de champ dans le marbre.

Un inconvénient commun à toutes les Méridiennes est

que,

que, par le peu de distance du point solsticial d'été au pied du flyle, en comparaison de l'éloignement du point solfficial d'hiver, les divisions y sont extrêmement resterrées, & qu'il est d'autant plus dissicile par-là d'y déterminer le temps & le point précis où le Soleil y arrive. La Méridienne de Saint Sulpice n'est pas exempte de ce défaut, quant à la partie qui répond au folflice d'été & à son Gnomon de 80 pieds de hauteur. Il y a plus, l'entablement de la corniche inférieure empêche le Soleil d'y arriver, & en intercepte les rayons pendant plufieurs jours avant & après. Mais M. le Monnier a parfaitement remédié à tous ces défauts, & en a même tiré avantage par une seconde ouverture qu'il a ménagée 5 pieds plus bas que la première, & en deça vers le dedans de l'église, dans le même plan du méridien, & il y a ajusté & scellé un verre objectif de 80 pieds de foyer, au moyen duquel l'image solaire projetée sur la partie correspondante de la Méridienne, est exactement terminée & sans pénombre sensible. Cette partie est distinguée des autres par une grande table quarrée de marbre blanc de près de 3 pieds de côté. L'image du Soleil n'y parcourt qu'environ 1 \frac{1}{2} ligne en 2 secondes, mais aussi on l'y détermine par ses bords à un demi ou à un quart de seconde près. Ce qui produit le même esset ou approchant que si l'image moins bien terminée y parcouroit trois ou quatre lignes en une seconde, ou si le point du sosstice d'été étoit à la même distance que celui du solstice d'hiver, ou enfin si l'on observoit avec un quart-de-cercle à lunette de 80 pieds de rayon : avantage qu'aucune autre Méridienne que nous connoithons n'a eu jusqu'ici. L'objectif qui constitue cette nouvelle ouverture, & qui est d'environ 4 pouces de diamètre, est rensermé dans une boîte ou espèce de tambour qui ferme à clef, & que l'on n'ouvre que quand il s'agit de faire l'observation du solstice.

Comme il ett fouvent difficile de trouver de grands objectifs d'une mesure précise & telle qu'on la demande, on s'est servi sans doute de celui de 8 o pieds qu'on avoit & qui étoit excellent, faute d'un de 82 a 8 ; pieds qu'il auroit fallu employer 146 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

pour un inomon de 75 pieds de hauteur; car c'ett le la diffance du point ichticial d'etc tur l'horizontale à l'objectif; mais le foyer de ces grands objectifs n'ett pas compris dans des limites si étroites, qu'ils ne rassemblent encore fort bien les rayons de la lumière à quelques pieds de distance plus ou moins, & l'essai qu'on a déjà sait de celui-ci justisse cette théorie.

Ce que nous ne devons pas omettre, & qui est ici de la dernière importance, c'est la solidité de tout l'ouvrage, & sur-tout de cette partie de la Méridienne qui répond au folstice d'été & à l'ouverture de 75 pieds de hauteur. Rien n'est si ordinaire que de voir le pavé des grands vaisseaux tels que les l'emples, s'affaitler par fuecetion de temps. Cet accident a obligé plus d'une sois de retoucher à la sameuse Méridienne de Saint Pétrone, & ce ne peut être jamais qu'avec bien de la peine, & avec beaucoup de risque pour l'accord & la justesse du tout ensemble. Mais on n'a rien de pareil à craindre pour la Méridienne de Saint Sulpice. Tout ce pavé fait partie d'une voute qui est soutenue de gros piliers, & l'un de ces piliers qui se trouve, non sans dessein, placé sous le point du foltlice d'ete, foutient la table de marbre blane sur Laquelle sont tracces les divitions qui repondent a ce solssice & aux temps qui le précèdent ou qui le suivent de près. M. le Curé de Saint Sulpice en avoit fixé la place à cet endroit & pour cet usage, dès le temps qu'il sit construire le portail méridional & le mur où devoit être attaché l'objectif. Et comme les marbres, & sur-tout les marbres blancs, viennent enfin à s'user sous les pieds des passans, on a couvert celui-ci d'une grande plaque de cuivre qui n'est levée qu'au temps de l'observation. Toutes ces précautions jointes à tant de nouvelles sources d'exactitude, sont de la Méridienne de Saint Sulpice un influment for olier, & l'un de plus utiles qui ayent jamais été procurez à l'Astronomie.

Si les Anciens avoient pû observer avec assez de justesse par le moyen de seurs gnomons & de seurs obélisques, ils auroient dû nécessairement conclurre de seurs observations sollisses, que les deux trops que n'écoient pas acguse distance

de l'Equateur, ou que l'Ediptique n'étoit pas également inclinée à ce cercle dans les deux parties qui y répondent, en hiver & en été. Car les Anciens ignoroient totalement les réfractions astronomiques, qui, en élevant le Soleil, l'écartent de l'Equateur au solstice d'été, & l'en rapprochent au folflice d'hiver, & d'autant plus que l'Observateur se trouve à une plus grande latitude. De sorte qu'à Marseille, par exemple, où Pytheas se rendit si célèbre par de semblables observations, cette inégalité apparente auroit dû monter, & être conclue comme réelle, à 3 ou 4 minutes, en y comprenant la variation qui naît des différentes températures de l'air.

Ous renvoyons entièrement aux Mémoires Les Observations sur une Conjonction de la Lune à V. ses M. l'étoile 7 du Sagittaire, avec des Recherches fur la plus grande P 403. inclinaison de l'orbite au plan de l'Écliptique, & sur la plus grande latitude de la Lune, par M. le Monnier.

A Théorie des Comètes de M. le Monnier, que nous Théorie des annonçames l'année dernière, a paru celle-ci. Comètes.

Cet ouvrage peut être conçu comme divisé en cinq parties. Dans la première qui a pour titre Discours sur la théorie des Comètes, M. le Monnier expose les principaux phénomènes du mouvement des Comètes, & les plus importans préceptes de l'Astronomie qui leur est propre. Il remarque d'abord que les Comètes n'ayant point de parallaxe diurne, c'est une preuve incontestable, comme l'avoit déjà fait voir Tycho-Brahé, qu'elles sont sort clevées au dessus de la l'une, & qu'en même temps la parallaxe de l'orbe annuel étant trèssensible dans ces astres, il s'ensuit qu'ils sont dans la région des planètes, forsque nous les voyons. Il donne ensuite un précis de la doctrine de M. Newton sur les Comètes, & il termine ce discours par le calcul de l'orbite de la Comète de 1742, d'après la belle méthode contenue dans le troifième livre des Principes de ce Philosophe. On sçait que cette méthode confifte à déterminer d'abord à peu près la diffance

148 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE de la Comète au Soleil, réduite à l'Écliptique; ce qu'on peut saire de dissérentes manières. Celle dont se sert M. le Monnier est de prendre quatre observations, & de regarder comme une ligne droite la portion de l'orbite parcourue pendant ces observations. On détermine ensuite plus exactement les lieux véritables, par deux approximations réitérées où l'on suppose la Comète mûe dans une Parabole; ainsi ? Pose 13 8. qu'il a été expliqué ci-dessus *. Ensin on examine si le mouvement de la Comète dans la portion supposée parabolique s'accorde avec le mouvement observé; & si ces deux mouvemens ne s'accordent pas, on corrige l'orbite de nouveau, & l'on réitère la correction jusqu'à ce que l'accord soit parfait. C'est seulement sur ce dernier article que M. le Monnier s'écarte de M. Newton, en vérifiant & corrigeant l'orbite selon une méthode particulière que M. Bradley lui a communiquée, & par le moven de laquelle il détermine très-exactement les élémens ou les principaux points de cette orbite, non graphiquement, comme on a coutume de faire, mais uniquement par le calcul. Il fixe le périhélie, les nœuds, &c. de la Comète de 1742, ainsi que nous l'avons rapporté dans * 15. 174=, l'histoire de cette Comète*.

La feconde partie contient l'abrégé de l'Astronomie cométique de M. Halley, avec ses Tables, & les notes de M. Wiston insérées dans le texte, traduit du latin & accompagné

des remarques & explications de M. le Monnier.

Nous prendrons pour la troissème partie le supplément qui suit, & qui contient une histoire abrégée de ce que l'on a fait depuis le commencement de ce siècle pour persectionner la théorie des Comètes. L'Aberration des Étoiles fixes, le mouvement irrégulier qu'on a découvert dans quelques-unes, ne peuvent qu'instuer beaucoup sur cette théorie, & tiennent ici une place considérable. M. le Monnier nous donne à cette occasion une Table générale du mouvement des Étoiles de la première grandeur.

On a vû en 1742, & selon la remarque de M. le Monnier,. que la plupart des Étoiles auprès desquelles avoit passé la

Comète de cette année, & dont il falloit se servir pour en déterminer la route, ne se trouvoient point dans les Catalogues les plus amples & les plus exacts; M. le Monnier nous en donne aujourd'hui la position d'après tout ce qu'il a fait ou pû recueillir d'observations de cette Comète. C'est le fujet de la quatrième partie.

La cinquième enfin nous présente les Tables du Soleil de Flamfleed, & leur usage, avec quelques changemens, tels. par exemple, que l'Apogée du Soleil avancé de 8 minutes. & la plus grande Equation de son centre diminuée d'une minute. Ce n'est point, comme on pourroit le penser d'une première vûe, quelque chose d'étranger à la théorie des Comètes: le lieu du Soleil & celui de la Terre sont réciproques, & c'est de la Terre, elle-même en mouvement. que nous fommes obligez de déterminer le mouvement & le lieu des Comètes.

Cet ouvrage est encore orné des deux planisphères célestes de Flamsteed, réduits en petit avec beaucoup d'art & de propreté, & de celui de Wiston où sont représentées les trajectoires de toutes les Comètes les mieux connues. Ainsi l'on peut assurer qu'il est peu de livres qui, dans un si petit volume, contiennent tant de choses utiles & curienses sur la Science qui en fait l'objet.

TEU M. Desplaces, sçavant Calculateur Astronome, pu- Ephémérides I blioit depuis 1715, de dix en dix ans, des Ephémé- des mouverides des mouvemens célestes, qu'il a poussées jusqu'en 1745. & qui ont été très-favorablement reçues du public. M. l'Abbé de la Caille vient de nous en donner la continuation depuis 1745 inclusivement jusqu'au commencement de 1755, & avec plusieurs additions importantes. Voici ces additions; une colonne où l'on trouve jour par jour l'instant du midi moyen au midi vrai; une colonne pour la déclinaison de la Lune; les demi-diamètres du Soleil de cinq en cinq jours tant en parties de degré qu'en parties de temps employées à son passage par le Méridien; les demi-diamètres & les

parallaxes de la Lune de deux en deux jours; le temps du passage des Planètes par le Méridien de trois jours en trois jours evec leurs declinations; les ceaples de lecond, trollième & quatrième Satellites de Jupiter; une colonne qui indique les phénomènes particuliers qui arrivent dans les mouvemens des Planètes & les Observations astronomiques les plus intéressantes; des calculs des éclipses du Soleil pour les principale vittes de l'Europe, & une signe univertelle du passage de la pénombre de la Lune sur la surface de la Terre. Ces I plumérides sont precedees d'une la troduction qui en donne l'intelligence & qui peut mettre tout lecleur mediocrement instruit en état de s'en servir.

DIVERSES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.

I.

Comète de 1742 observée à la Chine.

Na vû dans le volume précédent* les observations du P. Pereyra Jésuite Portugais, sur la Comète qui parut à Pékin en 1742, & qui nous vinrent de Petersbourg. Nous avons reçu en 1743 des observations semblables de la même Comète, faites de même à Pékin par le P. Gogails Jésuite Bavarrois, & celles-ci nous ont été envoyées de Pékin par le P. Gullist de la meme Compagnie, connu par ses excellens ouvrages sur l'Astronomie & la Chronologie Chinoises.

Nous ne sçaurions nommer ici le P. Gaubil avec qui nous numer depais pluticurs annecs en correspondance, sans nous rappeller le souvenir de celui qui nous a procuré cet avantage, le P. Parrenin, cet homme rare qui joignoit aux vertus héroïques du Missionnaire les qualités & les connoissances les plus estimables du Sçavant. Il mourut à Pékin le 27 Septembre 1741, à l'âge de soixante & seize ans accomplis, regretté du Ches & des Membres de ce vaste Empire à la

conversion duquel il avoit consacré ses jours, pleuré par le peuple, par les infidèles même qu'il n'avoit pu convertir. Nos Histoires de 1726* & de 1732* font mention d'une * Page 17. partie de ce que lui doit l'Académie. La plupart des lettres * Page 21, qu'il nous a écrites ont été inférées dans le Recueil des Lettres éditiantes & curieuses; c'est-là qu'on verra plus particulièrement tout ce que nos doutes & nos questions sur la Chine ont valu de sa part au public.

Anciennes Observations de la Chine sur l'obliquité de l'E'cliptique.

Nous trouvons avec une des lettres du P. Parrenin, qui n'a pas été publiée, une note du P. Gaubil sur le changement d'obliquité de l'Écliptique & sur le système du Chevalier de Louville, dont nous aurions dû faire mention cidessus en traitant la même matière, & que nous allons

rapporter ici en substance.

Le P. Boudier Jésuite François, Missionnaire dans le Royaume de Bengale, avoit cru voir par les observations que l'obliquité de l'Écliptique changeoit & alloit en diminuant sclon la proportion établie par M. le Chevalier de Louville. Les observations qui lui étoient venues de Pékin lui paroissoient appuver son sentiment, & à cette occasion il pria le P. Gaubil d'y être attentif aux temps proches des folflices, & à l'un & à l'autre folflice; car il pretendoit aussi que la hauteur folfliciale d'été surpatsoit de pres de 2 minutes celle d'hiver. Le P. Gaubil fit en 1733 les observations que souhaitoit le P. Boudier, & il les trouva savorables à l'hypothèse de ce Père & du Chevalier de Louville, en supposant l'obliquité de l'Écliptique de 23 degres 29 minutes. Mais le P. Gaubil fentoit trop bien la delicateffe & l'incertitude d'un pareil refultat pour l'adopter si promptement. Il nous dit même qu'il étoit persuadé avec le P. Riccioli & M. de la Hire que l'obliquite de l'Estiptique ne changeoit

152 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

point, quoiqu'à fon départ de France pour la Chine il fut trèsinstruit du système de M. le Chevalier de Louville. Cependant il consulta les anciennes observations méridiennes de l'ombre des Gnomons saites à la Chine, & malgré son penchant à croire l'Écliptique immuable, il avoue que ces observations se trouvèrent encore savorables au nouveau système.

La première de ces observations, dit le P. Gaubil, remonte jusqu'à près de 1100 ans avant l'Ere chrétienne. Elle sut faite dans un lieu de la province de Honan appellé Poyam, & qui subsisse encore. Les autres observations se rapportent à des années postérieures à cette Ere, & surent saites à Nankin en 461 & 462, à Sigan-sou capitale du Chensi en 629, à Pékin d'aujourd'hui en 1277, 1278, 1279 & 1280, du temps des Tartares Mogols. Celles des temps moins reculez ne sont ni si sûres ni si détaillées; & nous pouvons ajoûter, ni si concluantes, par cela même qu'elles sont moins anciennes, & que le changement dont il s'agit, étant supposé réel, y doit être moins sensible.

Ce font ces détails avec les remarques du P. Gaubil & les observations mêmes qui seroient en cette occasion de trèsgrande importance. Il avoit promis de les envoyer l'année suivante; mais soit qu'elles ne nous ayent pas été adressées, ou qu'elles se soient perdues, elles ne sont point parvenues jusqu'à nous. Il est à desirer que le P. Gaubil veuille bien

nous dédommager de cette perte.

Nous ajoûtons ici deux articles qui ne répondent pas exactement au titre d'Observations astronomiques, mais qui, se rapportant à l'Astronomie ou à ses dépendances, iront à la fuite de ces Observations.

III. Carte céleste.

L'occasion que la Comète de 1742 a fournie aux Astronomes d'examiner les Cartes des Étoiles circumpolaires Arctiques par où elle a passé, & les désectuosités qu'ils y ont trouvées,

DES SCIENCES. trouvées, ont fait naître à M. Ladoubedent d'Herouville le dessein d'en dresser une plus compléte de toute cette partie du ciel comprise entre le zénith de Paris & le Pole. Cette Carte, qui a été présentée à l'Académie avec un Mémoire, contient un nombre d'Étoiles plus que double de celui que Bayer & Flamsteed y ont marqué dans les feurs. Les deux Poles, de l'Equateur & de l'Ecliptique, s'y trouvent place? fur la ligne ou fur le méridien qui partage la Carte en deux également. Les nouvelles Constellations, telles que la Giraile, les Chiens de chasse, le Lézard marin, que nous devons à Hevelius, & le Renne que M. Ladoubedent y a ajoûte tout proche de la queue de la petite Ourse, y sont seusement tracées par des points, les anciennes étant plus fortement marquees par les ombres. On peut regarder cette Carte comme un résumé de toutes les observations de nos Astronomes sur les Fixes, pendant & après l'apparition de la Comète de 1742. L'Académie a jugé ce travail utile & très-bien exécuté.

IV.

Petit Calendrier.

M. de Sauvages d'Alais nous a adressé une lettre où il donne la manière de résoudre très-promptement, & par le moyen de quelques Tables abrégées écrites sur une carte à jouer, deux questions qui regardent le Calendrier. Dans la première, il s'agit de trouver la lettre Dominicale de l'année; dans la seconde, la lettre Dominicale étant donnée, avec le jour du mois, de désigner le jour de la semaine. La solution de la première est connue, & M. de Sauvages en convient; à l'égard de la seconde, le grand nombre de Calendriers qui paroissent tous les ans nous empèche de décider si elle est nouvelle, mais nous pouvons assurer que l'opératione en est très-simple & très-ingénieuse.

M. M.

GEOGRAPHIE

ET

HYDROGRAPHIE.

Cartes de la France.

Buache a présenté cette année à l'Académie une Carte en deux feuilles de l'Archevêché & de l'Election de Paris, à laquelle il a joint un plan des environs, en une feuille, avec un petit livre qui en contient tout le détail, tant pour la Jurisdiction ecclésiastique que pour la civile. Cet ouvrage fait partie d'un autre plus confidérable que M. Buache nous promet, & qui est déjà fort avancé, où seront comprises toutes les divisions de la France par gouvernemens, généralités, &c. avec des itinéraires exacts de tout le Royaume, & des remarques sur les particularités d'Histoire Naturelle qui s'y rencontrent. La Compagnie a jugé ce projet utile, & digne d'être mis en exécution.

CARTES DES COSTES ET DES MERS DES INDES ORIENTALES ET DE LA CHINE,

Avec des Mémoires sur ces Côtes & sur ces Mers, & des Instructions concernant les voyages qu'on y peut faire.

7. 114.

* Hgl. 1742, OUS avons annoncé l'année dernière * & avec confiance, 1 \ ce fruit des voyages & des observations de M. d'Après d. Mannevillette, Lieutenant des Vaiffeaux de la Companie des Indes, & Correspondant de l'Academie. Le public sera bien-tót convaincu par lui-même que nous ne lui avons pas fait de vaines promesses. Les Cartes dont il s'agit, exécutées avec autant de soin que d'intelligence, & que M. d'Après nous avoit déjà fait voir en partie, ont été présentées cette

année en plus grand nombre à l'Académie, avec des Mémoires sur les observations & les principes qui ont servi à les conffruire. Il a joint a toutes ces recherches geographiques & hydrographiques d'utiles inthructions pour les Navigateurs qui auront à parcourir ces Mers, soit en allant d'Europe dans les Indes orientales, soit en revenant; car le retour a aussi ses dissicultés particulières, ne fût-ce que par la circonstance des vents tout disférens dont on y a besoin. On voit affez dans quel détail immente il a fallu entrer pour cela, & tout ce que renferme une pareille navigation; combien de caps à doubler, de détroits à passer, de courans, d'écueils & de bancs dangereux à éviter entre ce nombre infini d'isses & de presqu'illes dont cette partie du globe terrestre est entrecoupée. Toutes ces connoissances rassemblées formeront un corps d'Hydrographie & de Navigation, qui sera donné au public sous le titre de Neptune oriental.

Vingt ou vingt-cinq Cartes particulières plus ou moins détaillées par les vûes, les sondes, les roches & les bancs, felon l'importance des lieux, & fubordonnées à deux grandes Cartes générales, renferment ici toutes les mers, tous les parages où l'on a coûtume de naviger dans les Indes orientales, depuis les côtes d'Arabie, le golfe Perfique & la Mer rouge, jusqu'aux côtes de la Chine vers le nord, & des isses de la Sonde vers le sud. L'attention scrupuleuse de M. d'Apres à n'admettre que des Mémoires dont l'exactitude & la fidelité lui fussent connues, l'a empèché d'embrasser une plue grande

partie de l'hémisphère austral.

La première des deux Cartes générales s'etend du détroit de Babelmandel dans la mer rouge, jusqu'au dela de l'ifle de Ceylan & du royaume de Golconde, & depuis l'Equateur julqu'au 28 me degré de latitude septentrionale. La seconde qui commence en deçà de l'isse de Ceylan, comprend les cotes du Continent, & tout ce vafle Archipe que defigne par les itles de la Sonde, les Philippines, & les Moluques. jusqu'au delà de l'itle l'ormose, & des nouvelles Carolines, sur environ 60 degrés de longitude, & plus de 40 de 156 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE latitude, sçavoir, 27 degrés de latitude nord, & 14 degrés de latitude sud.

M. d'Après a dressé ses Cartes particulières sous la forme ordinaire de Cartes plates & de Plans, & ses Cartes générales se son la méthode des Cartes réduites. Il ne sera peut-être pas inutile d'ajoûter ici en saveur de quelques lecteurs une explication succincle de ces sortes de Cartes affectées à l'Hy-

drographie & à la Navigation.

Toute Carte, soit géographique, soit hydrographique, universelle, generale, ou particuliere, n'est jamais autre chose qu'une projection ou un développement de la surface sphérique du globe terrestre, ou d'une de ses parties, sur une surface plane, avec les méridiens & les parallèles qui s'y rapportent, & qui fervent a determiner les politions des lieux, lears longitudes & leurs latitudes. La principale difference entre les Cartes geographiques & hydrographiques, contifle en ce que dans les Cartes géographiques universelles, dans les Mappemendes, ou dans les Cartes genérales, comme celles des quatre grandes parties de la Terre, ou de quelque grand Royaume, les meridiens & les paralleles sont ordinairement projetez par des courbes, entre lesquelles les arcs des méridiens qu'elles représentent concouvent visiblement au pole de l'hémisphère dont ces Cartes sont une portion. Au lieu que dans les Cartes hydrographiques ou marines quelconques, plates, & réduites, les méridiens sont représentez par des droites pualleles, qui pur configuent ne le arolent concourir vers le pole, & de même les cercles paralfèles par d'autres droites qui coupent celles des méridiens à angles droits.

La fréquente nécessité de cingler sur un même rumb de vent pendant une longue route, c'est-à-dire, de naviger sur une ligne qui coupe toûjours les méridiens sous un même angle, a fait imaginer cette espèce de projection, moyennant luquelle te ut est représente sur la Carte matine par des lignes droites, méridiens, parallèles, rumbs de vent; & rien n'est plus commode, ni plus expéditif pour un Pilote, qui n'est pas toujours homme de théorie, que d'avoir sinti sous ses veux

la route de son vaisseau, & l'objet de toute sa manœuvre.

Si les degrés de latitude marquez sur le méridien, & ceux de longitude sur les parallèles que renferme la Carte, sont égaux entr'eux & à ceux de l'Equateur, car nous ne confidérons ici la Terre que comme spherique, c'est ce qu'on appelle

une Carte plate ou commune.

Mais si les degrés de latitude marquez sur le méridien vont en croissant de l'Equateur vers le Pole, en même raison que ceux de longitude sur les parallèles auroient dû aller en décroissant, la Carte est appellée réduite, ou de réduction: & alors les degrés de chaque parallèle se trouvant de même grandeur que le degré correspondant de latitude, diminuent autant en nombre qu'ils auroient dû diminuer de grandeur: ce qui par rapport à l'évaluation des routes & des distances, corrige du moins en grande partie les erreurs qui nainfoient

de la projection précédente.

L'invention des Cartes plates, qui eff le premier pas qu'on ait fait pour se procurer des Cartes à l'usage de la Marine, n'est venue que dans le quinzième siècle, & on la donne à l'Infant Dom Henri de Portugal, l'un des Princes du monde à qui la Navigation est le plus redevable. Celle des Cartes réduites est attribuée à Gerard Mercator fameux Géographe du fiècle suivant; mais le P. Fournier dans son Ilydrographie la revendique en faveur d'un Dieppois nommé le Vatfeur, homme de génie, qui avoit été tisserand; soit que celui-ci l'ent tirée de son propre fonds, soit qu'il l'ent prise de quelques Navigateurs étrangers avec qui il étoit en commerce. Mrs de Chazelles & de Lagny eurent il y a quarante ans au sujet des Cartes réduites une dispute qu'on peut voir dans nos Mémoires *. Quoi qu'il en soit, ces Cartes, telles qu'on * V. les Men. a coûtume de les construire, sont tout ce qu'on a trouvé de Hill. p. 86, plus ingénieux en ce genre, & de plus commode pour les :: 1 Navigateurs.

Cependant la courbure des cercles de la sphère, la convergence des méridiens, & l'inégalité des degrés des parallèles à differentes latitudes n'etant pas fentibles dans les Cartes qui

17. 95. 99, High p. 92.

158 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

me renserment qu'une fort petite portion de la surface de la Terre, sur-tout à mesure qu'on approche de l'Equateur & qu'on s'choigne des Poles, on retient altez souvent la methode des Cartes plates, comme plus sumple, & d'une sidelite suffitante, pour les Cartes particulieres. Ainsi M. d'Après nous a donne la pointe de la peninsole de l'Inde, l'isse de Ceylan, le fond du golte de Bengale, l'isse de Java, &c. sous la sorme des Cartes plates.

Que fi la Carte particulière le devient encore davantage, on neglige d'y marquer les degres de latitude & de longitude, on y ajoute une échelle à leur place, comme dans nos Cartes Topographi pues ordinaires, & on la qualifie alors de Plan ou de Carte dressée par rumbs de vent & par distances. La rade d'Achem à la pointe nord ouest de l'ule de Sumatra, la baye de Manille capitale de l'îste de l'ucon & des Philippines, l'iste Condor, & le port d'Emoui tur la cote orientale de la Chine, se presentent ici sous cette forme de Plans, la plus exacle de toutes en tant qu'elle resulte des distances immédiates.

Mais M. d'Après nous a autil donné plutieurs Plans, qui, outre leurs cehelles, ont les degres de latitude marquez à coté comme les Cartes plates, & plusieurs Cartes plates, qui, outre leurs degrés de latitude, portent leurs echelles comme les plans, & qui, les uns & les autres, comprennent une assez vaste étendue d'isles, de côtes & de mers. Ses Cartes du detroit de Malaca & d'une grande partie de l'itle de Sumatra, de l'isle de Java & du détroit de la Sonde sur plus de deux cens ileaes marines en longitude, & plufieurs autres, sont de ce genre mixte. La raison qu'il a eue de le pratiquer ainsi, est sans doute que la plupart de ces côtes, de ces irles & de ces mers, sont presquentièrement rensermées entre les Tropiques de part & d'autre de l'Equateur, ou ne s'en éloignent que peu, & qu'ainsi que nous l'avons déjà dit, les de pres de longitude des paralleles voitins de l'Equateur ne different par bien sentiblement de ceux de ce grand cercle, n in plus que des degres de latitude du méridien. Car à un plus grand éloignement de la Zone torride, & sur une étendue un peu contiderable en latitude, une même échelle ne sçauroit convenir à toutes les parties de la Carte, & induiroit le Pilote en erreur sur les distances qu'il en pourroit conclurre.

Cette digression servira du moins à faire connoître le choix & le discernement que M. d'Après a apportez à la

construction de ses Cartes hydrographiques.

Dun the it n'a négligé aucun de secour, que l'Astronomie pouvoit lui sournir pour déterminer les longitudes & les latitudes des lieux; il a observé lui-même les immersions & les ensertions des Satellites de Jupiter, & les éclipses de Lune, toutes les sois qu'il en a eu la commodité; & lorsque les des minations astronomiques lui ont manqué, ce qui n'artive que trop souvent, il y a supple par les voies d'induction & de comparaiton, & par mille recherches que ses longues navious tions, ses lectures & ses correspondances sui ont sournies, & dont il rend compte dans les Mémoires qu'il a pré-

sentez à l'Académie sur ce sujet.

Pour déterminer la route du Vaisseau, & pour en déduire les distances, il s'est attaché aux latitudes & aux rumbs de vent, plûtôt qu'au chemin estimé, cette route étant bien plus farement connue par feur moven: p ursu cependant qu'on évite d'y employer les angles tropaique qu'elle pourroit faire avec les parallèles & l'Equateur; car en ce cas le véritable point de leur interfection feroit trop difficile à connottre. Avant supprimé ainti l'indication trompeute de l'estime, & les moyens arbitraires, M. d'Après leur en substitue de plus certains. Il nous fait remarquer qu'il y a grand nombre de compartifons dont les réfultat ne duivent être adopte, qu'autant qu'on est affuré de la fongit de & de la latitude des points de depart, ou de l'un dec de la termes. Encore faut-il cholfir ces termes les moins cloignez qu'il foit possible entre les unciennes déterminations que l'on veut corriger.

C'est sur cos principes, & sur les routes & les relevement

de plusieurs Journaux, qu'il établit d'abord comme un des principaux sondemens de sa première Carte générale, le gisement ou la situation de la côte de Malabar, qui s'étend presque en ligne droite du nord nord ouest vers le sud sud est. Il y découvre des erreurs commisés par les plus sameux Hydrographes Hollandois & Anglois, tels que Pieter Goos & Thornton, sur des positions importantes, & que l'on auroit eru des plus exactement connues.

Par exemple, Pieter Goos ne donne que 1 ½ degré de dissérence en longitude entre Goa & Cochin, au lieu de 2 degrés 20 minutes, c'est-à-dire, 50 minutes de moins qu'il ne faut, comme on le déduit du gisement de la côte, & de la disserence en latitude de ces deux villes; de manière que supposant Goa bien placé, le Vaisséau qui seroit voile vers Cochin, devroit se trouver à terre, lorsqu'il n'en seroit

seulement pas à la vûe.

La latitude de Surate sur les Cartes Angloises n'est que de 20 degrés 56 minutes. Elle y devroit être de 21 degrés 10 minutes, & sa longitude de 22 minutes plus orientale

par rapport à Goa.

Cet amas prodigieux de petites isles, connu sous le nom de Maldives & de Laquedives, & qui s'étend sur plus de deux cens lieues de longueur nord & sud, à cinquante ou soixante lieues en deça de Malabar & du cap Comorin, n'avoit été distribue sur les anciennes Cartes que consultement & comme au hasard. M. d'Après y a déterminé un grand nombre de positions, tant par lui-même, que par le moyen d'un plan particulier qu'il s'en est procuré sur les voyages que les François, les Anglois & les Maures sont tous les ans à cet Archipel, pour le commerce d'une espèce de coquillage appellé Cauris, qui sert de monnoie à Bengale & en Guince.

Au défaut des observations astronomiques sur les côtes de l'Inde, les Géographes ont eu recours à plusieurs points de comparaiton, deja connus, ou qu'ils ont taché de connoître, sur les côtes d'Afrique, d'Arabie & de la Mer Rouge. C'est sur quoi M. d'Apres est encore entré dans un fort grand

détail,

détail, ayant fait à ce sujet le dépouillement de plus de 50 journaux de navigation. La principale difficulté étoit de bien déterminer la distance du cap Guardasui, qui est à l'extrémité la plus orientale de l'Afrique, au cap d'Aden tout proche de l'entrée de la Mer Rouge, & de voir ensuite comment cette diffance s'accordoit avec les traversées faites de l'un à l'autre cap, & jusqu'à la côte de Malabar. Il falloit donc aussi pour cela sçavoir la véritable longitude du cap Guardasui. M. Delisse qui s'est servi de ce cap pour déterminer la situation de la Mer Rouge felon fa longueur*, le place à 5 1 degrés *3/2 1/22 du méridien de Paris. Cependant pluficurs Geographes ne P. 3776 l'ont établi depuis qu'à 48 degrés de la même longitude, fans qu'on sçache trop sur quelles observations ils se sont fondez pour s'écarter si fort de la détermination de ce fameux Géographe. Mais M. d'Après fait voir aujourd'hui par cinq routes de navigation d'environ cinq cens lieues chacune, que la véritable longitude du cap Guardafui est de 50 degrés.

Quant à la distance de cette pointe de l'Afrique au cap d'Aden sur la côte opposée de l'Arabie, distance à laquelle on n'avoit donné que 85 lieues marines de France, ou de 20 au degré, M. d'Après l'augmente de 35 de ces lieues, & cela contre le sentiment de Pieter Goos, de Thornton, & de presque tous les Hydrographes. Nous ne prononcerons point sur une correction de cette importance; mais nous pouvons assurer que les preuves qu'en apporte l'auteur méritent grande attention, que ces preuves sont sondées sur un grand nombre de navigations qui ont été faites depuis peu dans ces mers, & qu'ensin la Carte réduite d'Edouard Wigh publice à Londres en 1734, se rapproche beaucoup de son sentiment. L'Océan Oriental que M. le Chevalier d'Albert nous donna en 1740, dressé sur les Cartes & Journaux du Dépôt de la Marine, & dont nous avons parlé dans l'Histoire de 1741*, met ces deux caps à environ 100 lieues * 294 l'un de l'autre.

Les corrections que M. d'Après a faites aux côtes de l'Arabie, qu'il rapproche du fud d'environ 47 minutes, à Hist. 1743.

162 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE celles de Coromandel, à la baie de Trinquemale dans l'isse de Ceylan qu'il rapproche du nord de 2 minutes, &c. sont établies, ou sur des hauteurs observées, & ne souffrent par-là aucune dissiculté, ou sur des distances connues & qu'il a pour la plúpart rectifices dans ses derniers voyages.

Ce que nous venons de dire sur cette première Carte sussition pour faire juger des autres, & des Mémoires qui les accompagnent. On trouvera par-tout le Navigateur attentif qui joint à une grande pratique une excellente théorie, & cet esprit d'observation & de recherche sans lequel la théorie

& la pratique demeurent souvent infructueuses.

Mais nous ne devons pas omettre que toutes les hauteurs en mer, & une partie de celles que M. d'Après a observées fur terre, ont été prises avec le nouveau Quartier Anglois de Réflexion qu'il a simplissé & rectifié, & dont il publia la description & l'usage en 1739. Instrument qui par la justesse & la commodité dont il est, l'emporte de beaucoup fur tout ce que l'on avoit dans ce genre, & ne sçauroit manquer de procurer à la Navigation plus de sûreté, & à la Géographie une infinité de latitudes qu'on ne connoîtroit jamais ou de long temps sans cela. L'Astrolabe Nautique, l'Arbalestrille, & l'ancien Quartier Anglois ne donnoient guère les hauteurs qu'à 12 ou 15 minutes près dont on pût répondre; au lieu qu'avec celui-ci il est aisé de pousser la précision jusqu'à 2 minutes. A quoi il saut ajoûter qu'on peut s'en servir pendant que la mer est agitée, & que l'observation ne perd alors de son exactitude qu'autant que les vagues cachent une partie de l'horizon à l'observateur.

Les moyens croissent à peu près en même raison, que les dissicultés & les objets du sçavoir se multiplient. Aussi les Sciences utiles & de détail, comme la Géographie & l'Hydrographie, ouvrage des temps & des Nations, avancent-elles toûjours, quoique lentement. En cela bien dissérentes des Sciences & des Arts d'imagination & d'agrément, qu'un génie heureux, des circonstances savorables, & un petit nombre de préceptes ont portez quelquesois à un si

DES SCIENCES. haut point de persection, qu'on peut douter si les siècles à venir auront à cet égard quelqu'avantage sur ceux qui ses

ont précédez.

Nous avertirons ici d'une erreur de fait qui est restée dans l'ouvrage de M. d'Après, mais qui ne doit nullement être mise sur son compte, cet ouvrage étant déjà imprimé & gravé avant que les Mémoires de 1742 où cette erreur alors inconnue a été corrigée, eussent été rendus publics. Il s'agit du Pic de Ténérisse, qui est marqué sur le livre de la Connoissance des Temps & dans plusieurs autres Tables, à 18 degrés juste de longitude occidentale par rapport au méridien de Paris, & qui devoit l'être à 18 deg. 53 minutes. Or l'isle de Ténérisse, l'une des Canaries, est presque opposée à la partie du globe terrestre que les voyages & les observations de M. d'Après ont eue pour objet. Remarquons encore, que les observations du P. Feuillée faites dans cette isle, & d'où M. le Monnier a conclu le Pic à 18 degrés 53 minutes vers l'occident de Paris*, n'ont pû aussi redresser M. d'Après, n'ayant pas été publices. Cependant comme la position du Passe. Pic de Ténérisse, qu'on voit de quarante lieues en mer, & par où passe le premier méridien des Cartes Hollandoises, est très-importante pour les Navigateurs, M. d'Après avoit jugé à propos d'avertir dans ses Instructions, & sar quelquesunes de ses Cartes, que ceux qui voudroient rapporter les longitudes au Pic de Ténérisse n'auroient qu'à y ajoûter 18 degrés. Il faut donc augmenter cette addition de 53 minutes, & tout sera dans l'ordre, sans qu'une pareille correction puitle rien changer aux déterminations de M. d'Après, toûjours relatives au méridien de Paris.



MECHANIQUE.

 $L_{\epsilon} \cdot \cdot \cdot - M$

l'Alle de la Ceille a donne cette année au public troduction à toutes les Sciences Physico-mathématiques. L'ordre qui règne dans cet ouvrage, le choix des matières qu'on y traite, l'exactitude & la précision des démonstrations concourent à le rendre utile. Après ce jugement, qui est celui de l'Académie, nous remarquerons en passant, que rien ne marque mieux les progrès qu'ont fait les Mathématiques depuis un siècle, que cette qualification d'Elémens qu'on est obligé de donner aujourd'hui à des Traités qui renserment des connoissances très-élevées, & dont autresois les plus habiles Géomètres avoient à peine quelqu'idée. Telles sont ici les leçons qui terminent cet ouvrage, & qui enseignent les principes des mouvemens curvilignes, des forces centrales, de la descente des corps le long de la Cycloïde, du centre d'oscillation des Pendules, &c.

A Dynmique, ainti que mous l'avent d'a cep'isput, a pour ciret le mechanique du mouvement le p'us gon'rale, le plus altitraite & la plus transcendante. Nous n'avons rien à retrancher de tout ce que comprend cette idée, en annonçant le Traité de Dynamique que M. d'Alembert vient de donner au public. La première partie de cet ouvrage contient les loix générales du mouvement & de l'équilibre des corps; la seconde, qui est la plus considérable, & qui doit porter plus particulièrement le nom de Dynamique, expose d'abord un Principe général auquel M. d'Alembert a eu l'art de réduire tout ce qui constitue cette Science. Il montre ensuite la sécondité de ce Principe par des applications choistes aux plus importans problèmes qu'on

a coûtume d'y traiter, & à quelques autres qui sont entièrement nouveaux; & tous ces problèmes se réduisent encore à trouver le mouvement de plusieurs corps qui agissent les uns sur les autres d'une manière quelconque. Une métaphysique lumineuse dont M. d'Alembert a touché les principaux points dans sa présace, par rapport à ces recherches, y jette toute la clarté dont elles étoient susceptibles.

Corderie auquel il travaille, & dont il avoit déjà lû quelques chapitres dans nos Assemblées dès 1742. Cet ouvrage, où il a principalement en vue la Marine, & qui est de la dernière importance, paroîtra dans un volume séparé de nos Mémoires.

PROBLEME DE DYNAMIQUE.

'Académie a vû avec plaisir M. d'Arcy mériter une feconde fois * fes fuffrages par la folution synthétique * 11 ? 1742 du Problème suivant. Ce Problème avoit eté propose par M. 1000 Daniel Bernoulli, fils du célèbre Professeur de Basse, & célèbre lui-même par les ouvrages qu'il a donnez au public, & par les Prix qu'il a remportez dans cette Académie.

Tout corps qui descend, qui glisse ou qui roule le long d'un plan incliné à l'horizon, presse ce plan aux points où il le touche, & cette pression peut être décomposée en deux tendances ou directions dont l'une est perpendiculaire, & l'autre parallèle à l'horizon. Selon cette dernière, le corps tombant le long du plan incliné tend à le faire reculer parallèlement à l'horizon, & le fera reculer en effet, si l'on suppote ce plan comme faisant partie de la surface d'un corps mobile qui par une autre de ses faces planes porte sur un plan horizontal infiniment poli. Si le plan incliné étoit incbrantable, il est clair que le corps qui roule ou qui glisse

dessus décriroit une droite parallèle à ce plan; mais dans la Supposition que le plan incline est mobile de la maniere que nous venons d'expliquer, il n'est pas moins clair que le corps tombant dont le mouvement devient des-lors composé du sien propre & de celui du plan incliné qui le soutient. descendra selon une direction différente ou différemment inclinée à l'horizon, & qu'il décrira dans l'espace absolu où il se ment, une droite ou une courbe qu'on pourroit demander de déterminer. Que si pour rendre la question plus générale, on imagine, au lieu du plan incliné, une surface ou une rainure curviligne, on conçoit que la ligne droite ou courbe décrite par le corps tombant le long de cette rainure sera encore différente. Enfin on peut supposer que la vîtesse du corps qui commence à gliffer de la partie la plus élevée de la rainure, soit telle qu'on voudra, comme s'il y étoit tombé auparavant d'une hauteur quelconque, faisant toûjours abstraction de tout ressort & de tout frottement, & alors les masses, la courbe de la rainure, & la vîtesse initiale du corps tombant étant données, demander quelle est la ligne droite ou courbe que le corps tombant doit décrire.

On peut donc encore énoncer ainsi le Problème. Trouver la ligne décrite par un corps qui tombe ou qui glisse le long de l'hypotenuse droite ou courbe d'un triangle reclangle, matériel & mobile, posé sur un de ses côtés, & élevé perpendiculairement sur un plan harizontal in branlable. C'est sous cette forme qu'il a été proposé, & que M. d'Arcy l'a

résolu.

Où il nous sussira de remarquer, 1° que dans le cas du plan incline ca de l'hypotenute reclisique, le corps tombant décrit une droite disséremment & moins inclinée vers l'horizon que ce plan. 2° Que dans le cas où l'hypoténuse est un arc de courbe, la ligne décrite est aussi un arc de courbe dont la soûtendante est moins inclinée à l'horizon que celle de l'arc par où le corps est descendu. Ce qui est évident, puisque dans le cas où la masse & la résistance du triangle material de contrait nucles, le corps tombant descendroit par une

DES SCIENCES. 167

perpendiculaire, & que dans tous les autres cas finis il doit venir rencontrer le plan horizontal entre cette perpendiculaire & le point où le fommet de l'angle aigu du triangle reculant touchoit ce plan avant que de reculer. 3° Que l'analogie des deux courbes est telle, que les ordonnées de la première au côté perpendiculaire du triangle qui en est l'axe, font divisées par la seconde en raison donnée de la masse du corps descendant à la masse du corps reculant. 4° Ensin, que pendant la chûte de l'un des deux corps & le recul de l'autre, seur centre commun de gravite descend par une droite perpendiculaire à l'horizon.

Ce Problème se trouve résolu analytiquement dans le

quatrième tome des Œuvres de M. Bernoulli.

MACHINES ET INVENTIONS APPROUVE'ES PAR L'ACADE'MIE EN M. DCCALIII.

I.

Machines à faire remonter les Bateaux, & à brifer la Glace des Rivières.

Lavier Architecte a présenté à l'Académie sept modèles de Machines dont les six premières sont destinées à faire remonter les Bateaux contre le courant des rivières, & la septieme a briser les Glaces dans les grandes gelees.

Les fix Machines à remonter les bateaux font honneur à l'invention de l'auteur, mais comme il y en a eu déjà quelques-unes de construites à peu près sur le même principe pour la navigation de la Loire, & qui n'ont pas entièrement réussi, il y a tout lieu de douter que celles-ci réussissient.

A l'égard du Brife-glace, comme le nomme M. Lavier, l'Académie a jugé qu'on pouvoit s'en servir utilement, & qu'il pouvoit être exécuté avec succès. On éviteroit par ce

moyen une partie des accidens qui menacent la vie des ouvriers employez à rompre les glaces, lorsqu'ils montent dessus; ce qui ne se pratique que trop communément pour

la Seine, & au milieu de Paris.

Cette Machine confille en une espèce de Mouton suspendu à une Chévre qui peut s'incliner plus ou moins en s'avançant hors du bateau fur lequel elle ett posce, & même se coucher tout-à-fait pour paffer fous les ponts. Le plancher fur lequel porte toute la machine est mobile, & peut tourner par le moyen d'un Treuil qui est à l'arrière, & de quelques cordages; de sorte que sans remuer le bateau on peut faire décrire à ce plancher un demi-cercle. Le Mouton est sufpendu à un cordage qui s'entortifle par l'autre bout à une poulie mobile fur fon axe, & qui n'est entraînce par cet axe, qu'au moven d'une espèce de verrouil a restort, qu'on peut lacher par une corde qui y est attachée & qui sort par l'autre bout de l'axe: les hommes appliquez aux manivelles qui tiennent à cet axe, peuvent toûjours tourner du même sens & fans s'arrêter, & l'on est maître de lacher le Mouton quand on veut, & de telle hauteur qu'on veut.

On peut autil le servir d'une parcille Machine comme de Pilon, pour écraser des matières sort dures ensermées dans une boite. Mais à l'égard de l'emploi que M. Lavier croit qu'on en peut faire pour battre des pilotis, outre que les Moutons de cette espèce ne sont pas nouveaux, on pourroit craindre que celui-ci n'apportât de la lenteur dans l'opération, à moins qu'on n'y employat un nombre d'hommes constidérable, auquel cas la Sonnette ordinaire seroit preserable.

I J.

Machine hydraulique.

Cette Machine, que M. l'Abbé Geffrier a présentée à s'Academie, est compose d'un Reservoir qui a quatre saces egales, plus hautes que larges, & paralleles entr'elles. Il est fermé par embas, & sur le fond d'enhaut il doit y avoir

un tuyau montant pour porter l'eau que la Machine élève. Deux des faces parallèles du réfervoir sont percées, & portent des soupapes qui s'ouvrent en dedans. Ces mêmes saces forment avec deux panneaux mobiles qui y sont attachez, deux espèces de soufllets de cuir, auxquels on donne un mouvement alternatif par le moyen d'un chassis qui tient un panneau ouvert pendant que l'autre est fermé, & ces panneaux

sont aussi percez & refermez par des soupapes.

La Machine étant placée & enfoncée dans l'eau de manière que les foufflets en foient couverts, son jeu est tel que si l'on pousse un des chassis, le sousselet correspondant s'ouvre & s'emplit d'eau par la soupape du panneau, de même qu'un sousselet ordinaire s'emplit d'air, & que si on le repousse, ce même sousselet vuide son eau dans le réservoir par la soupape de la face à laquelle le panneau du sousselet est attaché. Cette eau en entrant dans le réservoir ferme par son impulsion la soupape de la face opposée, & l'autre sousselet qui y répond, s'ouvre par le mouvement du chassis, s'emplit d'eau, & la vuide à son tour dans le réservoir, quand le chassis vient à être repoussé en sens contraire. C'est par ce mouvement alternatif que les sousselets remplissent le réservoir, & qu'ils y obligent l'eau à monter par le tuyau jusqu'à la hauteur où il monte lui-même.

Hest certain que cette Machine élevera d'autant plus d'eau à la sois que les sousseles seront plus grands. Mais si le tuyau montant a seulement huit ou dix pieds de hauteur perpendiculaire, comme il doit répondre alors à une grande base, il saudra une très-grande puissance pour faire mouvoir la Machine, & l'on aura tout lieu de craindre que les cuirs des sousseles ne puissent pas soutenir long-temps le poids de l'eau, ou que si on les double pour les rendre plus sorts, ils ne maquent de la flexibilité nécessaire. Ces deux inconvéniens ont sait abandonner plusseurs Machines où l'on avoit em-

ployé des peaux pour soûtenir l'effort d'un sluide.

Celle-ci cependant ne paroît pas devoir être abandonnée. Il y aura des cas où l'on pourra s'en fervir utilement, en Hist. 1743.

170 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE proportionnant ses dimensions aux efforts du moteur, à la résistance du sluide, & à la hauteur où l'on voudra l'élever; & quoique d'aisseurs le principe sur lequel elle est sondée ne puisse passer pour neuf, il a été trouvé asser ingénieusement appliqué pour mériter à l'auteur l'approbation de l'Académie.

III.

Machine pour doubler les Soies & pour leur donner le Tors, à l'usage des Fabricans de Bas au métier.

Cette Machine a été inventée par M. Griefer, Allemand. Elle est de bois & composée d'un tambour ou cylindre creux, portant dans son intérieur une bobine perpendiculaire à l'axe. A cet axe est fixé un pignon qui, par le moyen de deux roues dentées, fait tourner la bobine sur elle-même, pendant que le tambour tourne aussi lui-même sur son axe. Un autre pignon fixé sur l'axe de la bobine, mène avec deux autres roues dentées un rouleau aussi sixé sur le tambour, & garni de deux palettes courbes, semblables, mais posées en sens contraire, qui rencontrent & menent alternativement les deux talons d'un rateau mobile autour d'un point fixe. La tête de ce rateau porte les Soies assemblées, & les fait répondre successivement à tous les points de la bobine, allant & revenant sans cesse, mais très lentement, d'une extrémité à l'autre, pendant que la bobine dévide les Soies en tournant sur elle-même, & que la révolution du tambour sur son axe leur donne légèrement le tors. Cette Machine s'applique au rouet ordinaire à la place de l'instrument connu fous le nom d'Epinglier. Elle ne fait pas plus d'ouvrage, mais elle le fait plus surement, plus commodément, & l'Académie l'a jugée préférable à plusieurs égards dont nous supprimons la liste & le détail.

IV.

Pantographe.

Le Pantographe ou Singe est un instrument qui sert à copier le trait de toutes fortes de Desseins & de Tableaux. & à les réduire, si l'on veut, en grand ou en petit. Il est composé de quatre règles mobiles ajustées ensemble sur quatre pivots, & qui forment entr'elles un parallélogramme. A l'extrémité de l'une de ces règles prolongées est une pointe qui parcourt tous les traits du tableau, tandis qu'un crayon fixé à l'extrémité d'une autre branche semblable trace légèrement ces traits de même grandeur, en petit, ou en grand, fur le papier ou plan quelconque sur lequel on veut les rapporter. Cet instrument n'est pas seulement utile aux personnes qui ne sçavent pas dessiner, il est encore très-commode pour les plus habiles, qui se procurent par-là promptement des copies fidèles du premier trait, & des réductions qu'ils ne pourroient avoir sans cela qu'en beaucoup de temps, avec bien de la peine, & vrai-semblablement avec moins de sidélité.

Cependant de la manière dont le Pantographe avoit été construit jusqu'ici, il étoit sujet à bien des inconvéniens qui en faisoient négliger l'usage. Le crayon porté à l'extrémité de l'une des branches ne pouvoit pas toûjours suivre les inégalités du plan sur lequel on dessinoit; souvent il cessoit de marquer le trait, & plus souvent encore sa pointe venant à le briser, gatoit une copie déja fort avancée : lorsqu'il talloit quitter un trait achevé pour en commencer un autre, on étoit obligé de déplacer les règles; ce qui arrivoit à tous

momens.

M. Langlois Ingénieur du Roi & de l'Académie pour les inflrumens de Mathématique, a très-heureusement corrige tous ces défauts dans le nouveau Pantographe qu'il est venu présenter à la Compagnie; & c'est principalement par le moyen d'un canon de métal dans lequel il place un portecrayon qui pressant seulement par son poids & autant qu'il

le faut le plan sur lequel on copie, cède aisément & de luimême en s'élevant & s'abaissant, aux inégalités qu'il rencontre sur ce plan. A la tête du porte-crayon s'attache un sil avec lequel on le soulève à volonté, pour quitter un trait & en commencer un autre, sans interrompre le mouvement des

règles, & sans les déplacer.

Outre ces corrections M. Langlois ajuste la pointe à calquer de son Pantographe, le porte-crayon, & le pivot des règles, sur des espèces de boites ou coulisses qui peuvent se combiner differemment sur ces règles, selon qu'on veut copier en grand ou en petit, plus ou moins, & il rend ensin tous ces mouvemens beaucoup plus aisez en faisant soûtenir les règles par de petits piliers garnis de roulettes excentriques. On ne voit pas qu'il reste rien à desirer dans cet instrument pour copier & réduire en grand & en petit toute sorte de figures, de plans, de cartes, d'ornemens, &c. très-commodement & avec beaucoup de précision & de promptitude.

V.

Horloge d'une demi-minute pour l'opération du Lok.

Quelques tentatives qu'on ait faites pour se procurer une Horloge qui mesure le temps juste en mer, & malgré tout ce que se Prix proposé par l'Académie sur ce sujet a produit d'ingénieux, il s'en saut beaucoup encore qu'on ait obtenu ce qu'on desiroit. Mais ce qu'on n'oseroit se promettre d'une Hall, a combreite pour aller vingt quatre heures ou plusieurs jours de suite, on peut l'espèrer d'une Machine de même espèce qui ne seroit destince qu'à aller une demi-minute ou 30 secondes, & telle, par exemple, que celle qu'on emploie à l'opération du Lok, pour estimer le chemin d'un Vaisseau par sa vîtesse. La meilleure manière de mesurer le chemin d'un Vaisseau, indépendamment des observations astronomiques, sait encore un des sujets proposez par l'Academie pour perfectionnes la Navigation, & sur lequel elle a couronné une excellente pièce de M. le Marquis Poleni.

Mais quelle que soit l'espèce de Lok qu'on emploie à cette opération, il en faut toûjours venir à une mesure actuelle du temps, la vitesse du mouvement d'un corps quelconque n'étant que l'expression abrégée & collective de l'espace parcouru dans un temps donné.

Lorsqu'on a jeté le Lok en mer pour mesurer la vîtesse du Vaisseau, on lâche la Ligne de Lok, ou la petite corde à laquelle le Lok est attaché, pendant que le Vaisseau s'en éloigne, & l'on connoît par la quantité de corde qu'on a dévidée en une demi-minute, le chemin que le Vaisseau sait par heure

avec la vîtefle qu'il a.

L'instrument dont on se sert pour mesurer cette demiminute, est un sable nommé l'Ampoulette, où l'on ne met qu'autant de sable qu'il peut s'en écouler d'une fiole à l'autre en une demi minute. Mais malgre tous les foins qu'on apporte à la construction de l'ampoulette, à la rendre exacte, & à la garantir des impressions de l'air, il arrive presque toûjours, soit par l'humidité que prend le fable, soit par le rétrécissement ou par l'aggrandissement du trou par où il passe, qu'il y a plusieurs secondes d'erreur dans le temps de l'écoulement, & que cette erreur en produit une assez considérable dans l'estimation de la vîtesse du Vaisseau.

Ces inconvéniens ont fait souhaiter un instrument plus parfait, & M. Gourdain horloger, à qui M. du Hamel en avoit parlé, a cru pouvoir affez compter sur la justesse de son Echappement à repos, dont nous avons rendu compte l'année dernière*, pour substituer à l'ampoulette qui est en usage, *Hist. 1742.

une petite Horloge à roue, faite sur le même principe.


La Machine qu'il propose & que nous avons vûe trèsbien exécutée, est donc une espèce d'Horloge ou de Montre à secondes, dont l'aiguille fait le tour du cadran en une demi-minute. Le balancier battant quatre coups par seconde. chaque intervalle du cadran qui répond à une seconde est divifé en quatre parties égales, de sorte qu'on peut régler cette Machine plus exactement qu'à un quart de seconde près. On la remonte par l'aiguille même que l'on tourne à contre-sens

du mouvement que lui donnent les reflorts. La tige de cette algun, princaturités un barriflet girni d'un reflort auquel elle est attachée comme le sont les arbres ordinaires des ressorts. Enfin la tige de l'aiguille porte une roue plate qui engrène dans la roue de rencontre où aboutit l'échappement à repos dont nous ne répéterons pas ici la construction.

On connoît la petite Machine qui sert à arrêter les Montres à secondes jusqu'au moment où doit commencer une observation. Outre cette pièce M. Gourdain ajoûte à son Horloge d'estime un cliquet brisé qui sert à arrêter la demi-minute lorsqu'elle est écoulée; & la brisure de ce cliquet fait qu'on peut aisément le sorcer à sortir de la coche où il est engagé,

quand on veut remonter la demi-minute.

Cette Machine a paru ingénieuse, propre à l'usage auquel elle est destince, & l'on ne doute pas qu'elle ne soit plus juste que l'ampoulette ordinaire. Ce qu'elle coutera de plus sera avantageusement compense par l'utilité qu'on en peut esperer.



E' L O G E

DE M. LE CARDINAL DE FLEURY.

A NDRÉ HERCULL DE FLEURY, ancien Evêque de Fréjus, Précepteur du Roi, Grand Aumônier de Affemblée pu-la Reine, Cardinal, Ministre d'État, l'un des quarante de Saint Martin. l'Académie Françoise, Honoraire de l'Académie Royale des Sciences & de celle des Belles-Lettres, naquit à Lodève le 22 Juin 1653, de Jean de Fleury E'cuyer, Seigneur de Die, de Valquieres & Vernasobre, & de Diane de la Treille de Fosieres d'une ancienne noblesse de Languedoc.

1743.

Tout ce qu'une heureuse naissance peut promettre de pénétration & d'agrément dans l'esprit, de douceur dans les mauis, d'intelligence & de talent pour les Belles-Lettres, se montra des la plus tendre jeunctie de M. le Cardinal de Fleury. Il fut amené à Paris à l'âge de fix ans; on le mit d'abord au collége de Clermont, aujourd'hui de Louis le Grand, & ensuite au collége d'Harcourt où il sit sa Philofophie. C'étoit l'ancienne Philosophie prétendue d'Aristote, toute scholastique & dénuée de lumière. Il y suppléa par l'érudition, & il soûtint des Thèses en Latin & en Grec. où il exposa avec beaucoup de sçavoir les principaux dogmes des Philosophes d'Athènes.

Destiné à l'état Ecclésiastique il sut reçu & installé Chanoine de l'église de Montpessier en 1668, & cette même année le Chapitre flatté de la réputation que le jeune Abbé de Fleury s'étoit déjà acquife, lui permit de venir continuer ses Etudes à Paris. Beaucoup de justesse dans l'esprit, un discernement sin & délicat, une belle mémoire & une imagination brillante faifoient concevoir des-lors les plus

grandes espérances en sa faveur.

Il commença sa Licence en 1676, & il ne prit le bonnet de Docteur que long-temps après.

Déjà connu dans le monde par le témoignage que sui rendoient plutieurs personnes de distinction, il y entra avec toutes les qualités propres à s'y distinguer lui-même, & sur-tout à s'y faire aimer. Sa sigure annonçoit avantageusement les graces de son esprit; il plaisoit par ses manières nobles & aisées, & il ne paroissoit vouloir plaire qu'autant que l'exige une politesse bien entendue & l'amour propre de ceux dont on veut gagner les suffrages. Aussi se sit-il bien-tôt un grand nombre d'amis à la ville & à la Cour. Ces derniers le déterminèrent à demander une charge d'Aumônier de la Reine. Il l'obtint n'étant pas encore Prètre, & n'ayant qu'environ vingt-deux ans. Il su ensuite Aumônier du Roi, & en cette qualité il tint se poêse au mariage de

feu M. le Duc d'Orléans, en 1692.

La Cour, ce théatre des vices & des vertus qui conduisent tour à tour à la fortune, de quelques couleurs dont la fatyre ait accoûtumé de le peindre, ne manque guère d'être favorable au mérite sous un Roi vertueux. Louis XIV goûta le caractère de l'Abbé de Fleury & en démêla parfaitement le fonds. Les qualités extérieures du Courtisan ne pûrent ni en imposer au Monarque, ni, ce qui n'étoit peut-être pas moins dangereux, le prévenir contr'elles: il sçut percer jusqu'aux qualités folides, jusqu'aux vertus que l'on croiroit presque incompatibles avec les graces & avec ce qu'on appelle l'art de plaire. C'est que cet art, ou plûtôt ce don précieux de la Nature peut avoir sa source dans des principes bien différens. Il est quelquesois le partage d'une ame vile & intéressée que la crainte & les desirs ont formée de bonne heure à la flatterie, d'un esprit frivole & superficiel qui brille par quelques fullies heureufes, d'une imagination tècrile par elle-même & seulement riche des idées d'autrui qu'elle faisit avec complaisance & qu'elle fait valoir avec grace; mais il peut être aussi, & à plus juste titre, une émanation des plus sublimes vertus & des plus rares talens, toûjours aimables, & to jour simez lorf grune mo leftie fincère feait les mettre à convert de l'envie. Alors le don de plaire se trouve le plus fouvent

fouvent confondu avec celui de persuader, de conduire les hommes, de les ramener de leurs egaremens, de les assermir dans leurs devoirs & de les rendre heureux.

C'est sous ce point de vûe que Louis XIV aperçut un digne Prélat dans l'Abbé de Fleury, & qu'il le nomma à

l'Evêché de Fréjus le 1er de Novembre 1698.

Les succès justifièrent pleinement le choix du Prince. Transporté d'une Cour brillante au fond d'une province éloignée, au milieu des montagnes & des rochers, l'Evêque de Fréjus put hardiment s'y montrer avec toute sa politesse; c'étoit moins en lui une parure acquise & étrangère, que les dehors naturels d'une ame tendre, généreuse & compatissante, toûjours prête à effectuer ce que ses dehors promettoient. Bien-tôt chéri de son peuple, il l'édifie par ses exemples, il le réforme par ses instructions, il le soulage par ses largesses; enfin il le garantit des fureurs de la guerre par sa prudence, & par cet art de se concilier les cœurs, qu'il exerce sur tous les hommes & jusque sur l'ennemi armé. Ce dernier trait, cet évènement de la vie du Cardinal de Fleury est connu; mais il ne l'est pas assez & dans toutes ses circonstances : c'est cependant un de ceux qui caractérisent le mieux son esprit & son cœur, & nous allons le rapporter ici d'après des témoins oculaires & irréprochables.

On sçait l'entreprise instructueuse que le Duc de Savoie à la tête d'une puissante armée d'Alliés, secondé par une ssoute de quarante-huit Vaisseaux de guerre, sit en 1707 sur la ville & sur le port de Toulon. Ce Prince ne se sur pas plûtôt mis en marche pour entrer dans la Provence, qu'une consternation générale s'empara des esprits dans tous les lieux par où il pouvoit passer. Les habitans de Fréjus, d'autant plus allarmez que leur ville étoit sans désense & l'objet le plus prochain du pillage, voulurent l'abandonner & se retirer loin des côtes où se portoient toutes les sorces des ennemis; & vrai-semblablement ils auroient pris ce parti si M. de Fréjus ne leur eût sait entendre que par-là ils alloient exposer leur ville à être saccagée & brûlée, & qu'au

Hist. 1743.

contraire, en y attendant le Duc de Savoie, ils pouvoient se flatter d'en obtenir un plus doux traitement. Ce discours accompagne de prometies affectueuses de la part d'un homme en qui ils avoient une entiere confiance, les avant raflurez, il le prepara à remplir les devoirs & les formalités que lui imposoient les loix de la guerre, sans blesser la sidelité qu'il devoit à son legitime Souverain. Il fit nommer trois Deputés pour aller au devant du Prince, & pour lui representer trèsrespectueusement combien il étoit digne de S. A. R. d'user avec modération de la victoire: c'est d'un de ces Députés, homme éclairé & plein de probité, que nous tenons ces mémoires *. La réponse sut savorable, mais conditionnelle par la difficulté de retenir le Soldat en pareille occasion & dans une armée composée de nations dissérentes. M. de Fleury eut ensuite plusieurs conférences particulières avec S. A. R. pendant trois jours qu'elle demeura à Fréjus, & il ne cessa point d'être admis à sa table, où se trouvoient en mime temps le Prince Eugène & le Prince de Heffe Caffel aajourd'hui Roi de Suede. La fagetie & le charme fecret de fon entretien, lei gagnérent enfin l'estime & la bienveillance de tous ces Princes: le captif devenu favori obtint tout sans peine de ceux à qui le sort des armes l'avoit soûmis: une contribution d'abord modique & réglee a vingt mille livres fut encore réduite; la ville n'éprouva aucun défordre dans son enceinte, & la campagne des environs sut épargnée. Cependant le Duc de Savoie étant parti, & la tête de l'armee ayant décampé, le Général Spingel qui en commandoit l'arrière-garde, homme violent & peu touché des égards que M. de Fréjus s'étoit attirez de la part de S. A. R. & des deux autres Princes, voulut fous divers prétextes mettre le feu à la ville; mais M. de Fréjus l'étant allé trouver, le

^{*} Tout ceci est tiré d'une lettre ou relation qui nous a été communiçue, p. M. d'a Tour Premier Pre, le 1 du Prelanar d'Aix, Iorendure et Commundant pour le Roi en Provence; & cette relation, qui est trèscirconstanciée, vient de M. Suffret, alors habitant domicilié à Fréjus & Pun des trois Députés dont on vient de parler, aujourd'hui Subdélégué de M. de la Tour.

ramena à la douceur, & garantit encore les habitans du péril

qui les menaçoit.

Dans l'incertitude si Toulon résisteroit à tant de sorces réunies par mer & par terre, ou s'il succomberoit, M. de Fréjus s'étoit muni d'un passeport & avoit obtenu une escorte de trente cavaliers pour aller à Aix, & pour y attendre l'évènement du siège. Dans le premier cas il retournoit à son diocèse; dans le second, qui pouvoit entraîner la perte d'une grande partie de la Provence, & furement celle de la ville de Fréjus, il se retiroit dans l'intérieur du Royaume, bien résolu à ne prêter jamais le serment de sidélité à aucun autre Prince qu'au Roi son maître. Il prit donc le chemin d'Aix quelques jours après le départ de Spingel & après avoir donné dans la ville les ordres & les avis les plus convenables en pareille conjoncture; mais les prompts secours amenez à Toulon & la retraite de l'ennemi rendirent bien-tôt M. de Fréjus à son troupeau. Il seroit difficile d'exprimer avec quels transports de joie il y fut reçu. L'armée des Alliés en repaffant par Fréjus avoit fait quelques défordres dans la ville & brûlé quelques maisons à la campagne, il repara tous ces dommages en homme libéral & en pasteur charitable.

Ce n'étoit pas une impression passagère & sondée sur de vains agrémens que celle qu'avoit sait l'Evèque de Fréjus sur l'esprit du Duc de Savoie; les sentimens d'estime & de bienveillance dont ce Prince demeura pénétré pour lui, disséroient peu de ceux que son Sang auguste devoit concevoir un jour pour ce même Prélat en le comblant de gloire. M. de Fréjus étoit à Lodève en 1714, pour y recueillir la succession du Baron de Pérignan son srère, lorsqu'il apprit que le Duc de Savoie, depuis peu Roi de Sicile, devoit debarquer à Nice en revenant de prendre possession de son nouveau Royaume. Il en écrivit sur le champ aux Magistrats de Fréjus, & il les engagea à lui faire une députation sur son avènement à la Couronne, & pour lui renouveller les assurances de son respect & de sa reconnoissance. Les Deputés,

du nombre desquels étoit encore celui qui nous sournit ces anecdotes, obtinrent une audience particulière dans le cabinet de S. M. & cette audience, qui dura près de deux heures, se passa toute entière à parler de l'Evêque de Fréjus. Quant à la succession du Baron de Pérignan, M. de Fleury s'en démit peu de temps après en saveur du Marquis de Roquesel son neveu.

Tant de vertus & de talens si glorieusement exercez ne pouvoient demeurer ensévelis au fond d'une Province, & vont être bien-tôt à portée de se montrer avec plus d'éclat. Louis XIV près de finir sa course glorieuse, plein du desir de rendre ses peuples heureux après sa mort, n'eut rien de plus à cœur que d'assurer une éducation digne du trône au Prince que le Ciel leur avoit conservé. Il porte ses regards sur tout ce qu'il y a d'hommes rares dans ses Etats, il balance les talens & ses caractères, & il désigne par un codicille de son testament l'Evèque de Fréjus Précepteur de Louis XV.

Pour fentir tout ce que renferme un tel choix en faveur de M. de Fleury, de la part d'un Monarque qui a régné soixante & douze ans, qui aime ses sujets, à qui sa Famille est chère, & qui se voit sur le bord du tombeau, osons pénétrer

une seconde sois dans les pensées de ce grand Roi.

L'éducation des Princes, des enfans des Rois, peut fans doute avoir de grands avantages sur celle des simples particuliers. Les plus excellens génies dans chaque genre, rassemblez de toutes parts auprès de leur personne, concourent à les instruire, veillent pour eux, & leur prodiguent les fruits de leurs veilles; les exemples les plus frappans, recueillis de l'hittoire de tous les succles, sont sans ceste etalez à leurs yeux; les merveilles de la Nature, les chef-d'œuvres de l'art, tout, jusqu'aux divertissemens même, est tourné pour eux en leçons utiles; mais ce ne sont ensin que des leurs. En general, & par une suite naturelle de leur grandeur, l'éducation des Princes est trop marquée, se montre trop comme éducation, & ne peut être assez familière. Entourez, respectez de leurs courtisans & de leurs maitres même, ils

ne scauroient presque jamais rien entendre qui ne soit préparé avec soin ou prononcé avec circonspection, la vérité se cache déjà pour eux. Le tribut de louange qu'arrache la vertu, se mépris qu'excite le vice, n'éclatent point devant eux avec cette liberté qui persuade, avec ces traits prompts & naïs qui pénètrent, mais qui n'échappent qu'entre les égaux. La louange & le blame sont trop gènez dans un lieu où ils tirent

si fort à conséquence.

S'il est cependant quelque moyen de procurer à un jeune Prince tous les avantages d'une éducation privée, c'est sans doute de le confier à des maîtres qui sçachent également & l'instruire & sui plaire, former & gagner son cœur, à des maîtres qui paroissent toûjours devant lui, moins comme précepteurs que comme confidens, & qui, sans oublier les égards dûs à sa naissance, deviennent, s'il est permis de le dire, ses amis, ses compagnons de jeux & d'études. C'est ainsi que le goût des connoissances utiles & souables, que la conviction de ses devoirs, que la justice & l'amour de la solide gloire entrent sans peine dans une ame qui se développe, & s'y confondent avec l'ouvrage de la Nature. La fagesse même se cache pour dicter ses lecons aux mortels: Minerve n'instruisoit Télémaque que sous la forme de Mentor & dans un libre entretien que les circonstances &: le hasard sembloient toûjours saire naître.

Voilà ce que demandoit Louis XIV, voilà l'Évêque de Fréjus, si ce n'est, qu'il sut le Mentor d'un plus grand Prince que Télémaque, d'un Prince actuellement assis sur un des premiers trônes du monde, & dont la vertu étoit par cela même environnée de plus d'écueils que ne le sut jamais celle

du fils d'Ulysse.

Nous ne nous arrêterons point sur les suites d'une éducation qui fait aujourd'hui le bonheur de la France; encore moins nous étendrons-nous sur les marques éclatantes de reconnoissance & de tendresse que l'auguste Disciple a données à son maître. C'est à l'histoire de cet Empire, ou à des plumes consacrées à l'Esoquence, qu'il appartient de Z jij transmettre à la possérité les vertus de Louis XV, & les évènemens qui ont signalé le minissère du Cardinal de Fleury. La chaire, & plus d'une Académie ont déjà retenti des éloges de ce sage Ministre; notre tour est venu trop tard, & nous avons été prévenus jusque dans la partie qui regardoit directement nos sonctions. L'Académie des Sciences, en se rappellant ici tout ce que le Cardinal de Fleury sit pour elle, tout ce qu'elle entreprit sous ses auspices, tout ce que dans ce court intervalle elle a fait de découvertes dans le Ciel & sur la Terre, près du Pole, tous l'Equateur, ne pourroit que retracer au public des saits qui par leur célébrité mème lui ont été déjà présentez de mille

Avouons cependant que le Cardinal de Fleury n'eut pas de grands obttacles à furmonter pour fervir les Sciences & les Arts fous un Prince qui les connoît & qui les charit; mais le Minittre retrouve sa gloire dans celle du Precepteur qui les sit connoître & charir au Prince qui devoit les proteger.

facons différentes, ou se jeter dans des détails superflus.

C'est en éclairant son Roi que le Cardinal de Heury en avoit acquis toute la confiance; c'est à cette confiance eclairée qu'il a du toute son elevation. Arrive au Ministère sans effort, disons mieux, malgré ses efforts pour s'en desendre, il l'exerce sans contradiction, il s'y maintient sans trouble: son autorité coule de source, & se ressent de la simplicite des moyens qui la firent naître. Ses mœurs, son caractère, ses inclinations n'en souffrent aucune atteinte; canemi du fatte & de l'opulence, sa maison, sa table, auparavant modelles, demeurent les menies. L'Abbé de Fleury revêtu de la pourpre, & à la tête des affaires de l'État, semble n'être encore, hors de les fonctions, que l'Abbé de Fleury dans la Cour de Louis XIV, doux, affable, accessible, &, ce qu'il ne faut pas confondre avec les titres & les honneurs, content. Tout entier à l'Etat dans le cabinet & dans les Conseils, tout entier à la fociété & à ses amis dans le commerce ordinaire, par-tout tranquille & à lui-même, il sçait allier l'homme & le Ministre, & les rendre l'un & l'autre heureux. On peut

dire que la Fortune se plut à le savoriser, & qu'elle l'éleva par degrés jusqu'au saîte des grandeurs, sans lui saire jamais éprouver ses revers, si l'on veut appeller Fortune l'esset d'une conduite sage & mesurée qui échappe aux yeux du vulgaire.

Les principes & les maximes de gouvernement de M. le Cardinal de Fleury étoient pacifiques. Il ne s'en est jamais ecarté; il a cédé feulement au cours inévitable des évènemens qui applique le guerre.

qui amènent la guerre.

Le fecret & le filence, un visage toûjours égal & serein lui timent lieu de la diffimulation que quelques Politiques

ont cru si nécessaire pour gouverner.

Il fut peu touché du desir d'immortaliser son nom par des actions d'eclat. Il ne chercha point à illustrer son Ministère par de nouveaux établissemens; mais il employa son pouvoir, il donna tous ses soins à faire revivre, à mettre en exécution, ou à perfectionner les établissemens utiles qui avoient été imaginez sous les Ministères précédens, & dont il n'avoit été ni l'inventeur, ni le promoteur. Sacrisse trop rare d'un amour propre qui nous a si souvent ravi le fruit des anciens travaux, sans nous procurer de nouveaux avantages.

Fidèle & rigide économe des biens de l'État, il a foûtenu avec une généreuse indifférence le murmure & les plaintes de l'avidité sussifié de son attente. C'est dans ses propres sonds qu'il a puisé ses libéralités & le soulagement des mal-

heureux.

Il a fait voir dans plufieurs rencontres délicates, que la fermeté qui naît de la patience & de la douceur, est toujours la plus sure par son principe, & la plus utile par ses succès.

Les temps & les circonflances lui ont plus fouvent fourni fes maximes, qu'ils n'y ont été foûmis. Aussi n'a-t-il été l'émule d'aucun de ses predécetseurs dans le Ministère: mais il a marché sur les traces des uns sans penser à les imiter, comme il s'est cloigné de la conduite des autres sans songer à les reprendre.

M. le Cardinal de Fleury parloit purement & avec facilité; fa manière de raconter ctoit élégante & naïve. Il rempliffoit

adroitement ces vuides que la réferve indispensable aux grandes places jette ordinairement dans la conversation. Il écartoit, autant qu'il lui étoit possible, la gêne du cérémonial, & il en rompoit volontiers le sérieux par un aimable badinage. La raillerie devenoit toûjours entre ses mains une maque de sixeur pour ceux qu'elle sembloit attaquer. C'est dans ce goût qu'il écrivoit quelquesois à ceux de ses amis les plus distinguez par l'esprit & par les talens; il entroit en lice avec eux, & il ne se montroit pas inférieur à de pareils adversaires.

On voit par les mandemens qu'il publia dans son diocèse, par les discours qu'il a prononcez dans les Assemblées du Clergé & devant le Roi, qu'il étoit Orateur, ou né pour l'être. Il avoit écrit quelques morceaux d'Histoire, de Politique & de Morale pour l'éducation de Sa Majessé; mais il a toûjours moins aimé à rédiger ses connoissances qu'à

les mettre en pratique.

Les années s'étoient accumulées sur sa tête sans affoiblir son esprit & sans en chasser les graces. On ne sçauroit dire si son heureux tempérament a été la cause ou l'esset de l'égalité de son ame. Sa vie a coulé uniformément au milieu de la Cour, parmi les plus grandes affaires, & malgré la vicissitude des temps, comme la vie d'un particulier qui cultive en paix le champ de ses ancêtres.

Il vit enfin approcher la mort, il l'attendit avec une constance chrétienne, & il expira le 29 Janvier 1743,

dans la quatre-vingt-dixième année de son âge.





E'LOGE

DE M. L'ABBE BIGNON.

TEAN-PAUL BIGNON, Abbé de Saint-Quentin en l'Isse, ci-devant Doyen de Saint Germain l'Auxerrois, Affemblée pu-Conseiller d'Etat ordinaire & Doyen du Conseil, Biblio-Saint Martin. thécaire du Roi, l'un des quarante de l'Académie Françoise, & Honoraire des Académies des Sciences & des Infcriptions & Belles-Lettres, sut baptisé dans l'église de Saint Nicolas du Chardonnet à Paris le 19 Septembre 1662. Il étoit fils puîné de Jérôme Bignon Confeiller d'État ordinaire, Avocat général au Parlement de Paris, & Maître de la Librairie du Roi, & de Suzanne Phelypeaux de Pontchartrain; & petitfils de Jérôme Bignon, cet illustre Magistrat que les derniers fiècles peuvent hardiment opposer aux plus grands personnages de l'Antiquité.

L'enfance de M. l'Abbé Bignon sut marquée par une ardeur infatigable pour le sçavoir, & par le sçavoir même. Il ne lui manque que d'avoir plûtôt vécu pour être placé. parmi les enfans célèbres dont un Auteur du dernier siècle nous a donné l'histoire. Cependant les dix premières années de la vie ne furent presque qu'un tissu de maladies & d'infirmités. Son tempérament se fortifia depuis & devint même affez robutle; mais sa vûe, qui étoit si basse qu'à peine pouvoit-il écrire, demeura à peu près dans le même état; & malgré ce défaut dans un organe si nécessaire à l'étude. peu d'hommes ont tant étudie, tant lu & tant cerit. On fit de vains efforts pour l'empêcher de s'appliquer, il étoit toûjours surpris un livre à la main; auteurs chassiques, historiens, orateurs, poësses, romans, tout ce qui dans ces divers genres peut instruire ou amuser des hommes saits, étoit de son ressort. Une excellente mémoire ne lui laissoit

Hist. 1743. . Aa 1743.

rien échapper de ce qu'il avoit lû, & mettoit également à profit ce qu'il entendoit dans la maison de fon père, de tout temps consacrée aux Lettres & le rendez-vous des Scavans.

Ses paren l'avoient de flim de bonne beure à l'état Eccléflattique; il l'embratta lui-même par choix, & il finit avec autant de succès que de rapidité les études prescrites à cet état. Il entra enfuite dans la Congregation des PP. de l'Oratoire, où il demeura quelques années dont nous ignorons la date & le nombre. Ce qui est certain, c'est que le desir d'y travailler plus tranquillement ne fut pas un des moindres motifs qui l'y engagèrent. La maison de son père, toute favorable qu'elle étoit à sa passion dominante, sui parut trop fréquentée, même des gens de Lettres; il vouloit acquerir le sçavoir dans le recueillement & le silence, avant que de songer à le rectifier ou à le polir par le commerce de ceux à qui une longue habitude en a rendu l'uface familier. Cependant M. l'Abbe Bignon le trouva encore trop exposé aux visites de ses parens & de ses amis chez les PP. de l'Oratoire, au centre de Paris où il étoit, & il se choisit, sans sortir de chez eux, une autre retraite où il étudioit quatorze heures par jour. La Theologie, la Juri prudence, les Langues sçavantes, la Critique, la Phi-Josophie, qui l'avoient deja fait briller sur les banes & dans le monde, y furent tout autrement appretondies; & cest après cette ample moisson de connoissances qu'il se vous à la Prédication.

Il se diffingur bien tôt dans ce genre sublime d'eloquence, en un temps ou les Bourdaloues & les Matsillons s'y fait sient admirer. Des Avents & des Carèmes préchez dans les principales églises de Paris y mirent ses talens au grand jour, & la Cour voulut l'entendre. Il prêcha devant le Roi Louis XIV, & il sut retenu en l'état & charge de Prédicateur de S. M. par Lettres du 17 Février 1693. Dans un même jour il prononça un Panégyrique de Saint Louis à la Chapelle du Louvre devant l'Académie Françoise, & un autre toat

différent aux PP. de l'Oratoire devant les Académies des Sciences & des Inferiptions; & des personnes qui ont passé une partie de leur vie avec lui, nous ont assuré avoir lu de sa façon quatre Panégyriques tout disserens de ce même Saint.

Cette fécondité de M. l'Abbé Bignon, quoique peu commune, étoit moins remarquable que la facilité merveilleuse qu'il avoit de parler sans préparation. Nos Atlemblées publiques, telles que celle-ci, sui en ont sourni la matière pendant plusieurs années. On sçait qu'il y présidoit ordinairement & qu'il résumoit tout ce qui s'y sisoit, & toûjours à l'avantage des Sciences, de l'ouvrage & de l'auteur. Combien de sois une partie de ceux qui me sont l'honneur de m'écouter, témoins de ce que j'avance, l'ont-ils entendu saire ici leur éloge! Combien méritoit-il que le sien y sut

tracé aujourd'hui par une main plus habile!

Ce n'est pas cependant pour exposer des faits, pour analyfer des raifonnemens philosophiques, & pour en discuter tranquillement les conféquences, que le don précieux de parler fur le champ fut accordé à un petit nombre d'hommes choisis; ce n'est pas là du moins qu'il brille le plus. Le talent proprement dit de la parole, pour se déployer dans toute la force, veut être excité par des objets plus puissans, il veut des passions à sentir, à émouvoir, ou à combattre par d'autres passions. C'est-là qu'il éclate; c'est alors qu'il perfuade, qu'il entraîne; c'est alors que le pathétique & le sublime, debarrassez de la gêne de la composition & aussi peu cherchez qu'attendus, produiront leurs effets les plus étonnans. Le vrai triomphe de l'Eloquence n'exista peut-être jamais sur le papier; & l'on pourroit présumer avec assez de sondement, que Démosshène étoit moins Démosshène dans ces Ecrits où nous l'admirons, que dans les traits foudains & hardis qui lui echappoient en voyant les entreprises de Philippe, & l'indolence des Athéniens.

Des intérêts mille fois plus importans que ceux qui délièrent la langue de l'Orateur de la Grèce peuvent animer 188 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROTALE aujourd'hui nos Orateurs, & font l'objet de la chaire. C'est-là ensin que M. l'Abbé Bignon donna des preuves éclatantes du rare talent que nous venons de décrire; non dans ces Panégyriques, dans ces Sermons d'apparat où règne un ordre sévère & une correction de style qui ne sçauroient être le fruit que de la méditation & du travail, mais dans ceux que des cas imprévûs l'obligèrent souvent d'accepter. Il prècha presque journellement dans ce goût, & avec un applaudissement général, à Saint Germain l'Auxerrois, pendant tout le temps qu'il en sut Doyen, c'est-à-dire, depuis 1710 jusqu'en 1721.

Le ic Juin

Sa réception à l'Académie Françoise sut encore une de ces occasions qui lui sirent le plus d'honneur. Il en étoit au milieu de son remerciment, lorsque M. de Harlay Archevêque de Paris & Membre de la même Compagnie, entra dans l'Assemblée. M. l'Abbé Bignon s'arrêta, attendit qu'il sût placé, & sit dans le moment une récapitulation de tout ce qu'il venoit de dire, en lui adressant la parole à dissérentes reprises. C'étoient des politesses pour le Prélat, & un tour nouveau dans ce qu'il avoit déjà dit; après quoi il reprit le sil de son discours. On ne peut exprimer combien M. de Harlay sut charmé de ce qu'il venoit d'entendre, lui qui possédoit éminemment ce qu'il admiroit aussi salousie dans le nouvel Académicien.

M. l'Abbé Bignon avoit affiffé aux Affemblées du Clergé de 1693, 1694 & 1695, tantôt comme Député de la province de Paris, & tantôt en qualité de Promoteur. Il fut député deux fois de la part de l'Affemblée vers le Roi; marque de diffinction & de confiance que le Clergé n'accorde guère qu'à ses Agens. A la seconde députation Sa Majesté témoigna publiquement combien Elle étoit satisfaite du compte qu'il lui avoit rendu, & lui donna bien-tôt après l'Abbaye de Saint-Quentin, valant au moins trente mille

livres de rente.

In 1701.

Comme Conseiller d'Etat, après la mort de M. l'Evêque de Noyon dont il avoit en la place, & ensuite comme Chef

du Bureau des affaires Ecclésiastiques du Royaume, il s'y

diftingua dans plusieurs occasions importantes.

Mais la réputation que M. l'Abbé Bignon s'étoit acquile par l'affemblage de tant de connoissances, & dans l'exercice de tant de talens, quelque brillante qu'elle ait été, est presque déjà oubliée, & disparoîtra dans les siècles suturs devant le nom immortel qu'il velt tait par la pretection constante qu'il accorda aux Sciences & aux Sçavans, par les saveurs signalées qu'il attira sur elles & sur eux, & par le sameux renouvellement de l'Académie des Sciences & de celle des Belles-Lettres.

C'est dans l'Histoire de ces deux célèbres Compagnies, & dans les Ecrits de tous les Sçavans de l'Europe, & des autres parties du monde, si l'on y écrit, qu'il saut chercher l'éloge de M. l'Abbé Bignon. On le trouvera à la tête de mille excellens ouvrages procurez par ses soins ou mis au jour sous ses auspices; & au désaut de son nom on le reconnoîtra à celui de Mécène de son siècle & d'Ange tutélaire des Sciences & des Sçavans, qu'on lui donne par-tout.

Les beaux Arts ne lui furent pas moins redevables. Il étoit de l'Académie de Peinture & de Sculpture, & il ne pouvoit en être, sans aider de ses lumières, sans favoriser de tout son crédit un établissement si digne de marcher après les Sciences & ses Belles-Lettres, & qui par sa nature en est presqu'inséparable. Il n'est point d'art, sibéral ou méchanique, dont il n'ait tâché de reculer les bornes, & qui n'ait eu part à ses biensaits. On peut dire aussi que toutes les Muses ont chanté sa gloire, & que la Renommée pouvoit avec justice ouvrir ses cent bouches pour la publier.

Dans quels détails pourrions-nous entrer après tout ce qu'on vient d'entendre, qui ne sussent superflus? Le Journal des Sçavans cessoit de paroître par la mort du Président Cousin qui en étoit chargé depuis plusieurs années, M. l'Abbé Bignon le rétablit en 1702; la Bibliothèque du Roi manquoit d'une infinité de livres, tant imprimez que manasseries, il en sit venir de toutes les parties du monde; il prit

de justes mesures avec les Sçavans de tous les pays, avec les Amballadeurs, les Envoyes, & les Confula de toutes les Cours. afin que rien de curieux & de raie ne pût échapper à ses recherches; il obtint que deux Membres de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres fillent à ce dessein. & avec tous les secours nécessaires, un voyage dans la Grèce & dans le Levant premier berceau de notre Littérature, d'où ils rapportèrent en effet quantité d'ouvrages inconnus, & d'utiles instructions sur ceux qu'on se flatteroit en vain d'y trouver. Ce fut enfin à sa sollicitation que la Bibliothèque du Roi, qui étoit trop à l'étroit & l'on peut dire avec indécence dans une ou deux maisons de la rue Vivienne, sut transportée à l'Hôtel de Nevers rue de Richelieu où elle est depuis 1721: vaste & magnifique Palais où il imagina mille arrangemens utiles, foit par les places qu'il y procura à quelques-uns des Sçavans les plus distinguez, soit par les commodités qu'il y donna à tous, pour puiser dans ce trésor des secours qu'ils chercheroient vainement ailleurs.

La charge de Bibliothécaire du Roi, telle qu'elle est aujourd'hui & que M. l'Al be Bignon la potiedoit, comprend celle de Maître de la Librairie & celle d'Intendant ou Garde du Cabinet des Livres, Manuscrits, Médailles & Raretés antiques & modernes, & Garde de la Bibliothèque du Roi. qui faisoient autresois deux charges distinctes & séparées. La première, de Maître de la Librairie ou de Bibliothécaire en chef, supérieure par le titre, mais d'un moindre revenu. fut créée par François Premier. C'est celle qu'avoit le sameux Jérôme Bignon & M. Bignon fon fils. M. l'Abbé Colbert avoit la seconde, comprise sous le titre de Garde de la Bibliothèque, lorsque les deux furent réunies en faveur de M. l'Abbe de Louvois. M. l'Abbe Bignon fon fuccetiour les eut non seulement sur le même pied, mais il obtint encore en 1720, que la Garde du Cabinet particulier des Livres du Louvre, qu'avoit M. Dacier, & celle de la Bibliothèque de Fontainebleau, vacante depuis quatorze ans par la mort de M. de Sainte-Marthe, futient reunies. Ainfi la plice DES SCIENCES. 191

de Bibliothécaire du Roi n'avoit jamais été si brillante, ni revêtue d'autant de titres & de prérogatives qu'elle l'a été en la personne de M. l'Abbé Bignon; &, ce qui est plus important, la Bibliothèque du Roi ne fut jamais, à beaucoup près, si riche par le choix & par le nombre des livres. A l'avenement de Louis XIV à la Couronne, on n'y trouva que 5000 volumes; il y en avoit environ 70000 après la mort de ce Prince, c'est-à-dire, trois ans avant qu'elle sut consice à M. l'Abbé Bignon; & s'on en compte aujourd'hui plus de 135000, dont près du quart sont manuscrits.

Mais on pourroit demander comment la charge de Maître de la Librairie Royale accordée au fameux Jérôme Bignon, & conservée à son fils, étoit sortie d'une samille si digne de la posseder & dans liquelle on avoit M. l'Abbé Bignon? C'est une anecdote qu'il nous a apprise lui-même. Il étoit seul dans sa chambre un jour que son père y entra brusquement: Mon fils, sui dit M. Bignon, je devrois me mettre En 1684. à genoux devant toi pour te demander pardon du tort irréparable que je te viens de faire : je viens de donner ma démission de la charge de Maître de la Librairie, charge que je te destinois, & que tu aurois remplie avec honneur; mais M. le Marquis de Louvois me l'a demandée pour l'Abbé de Louvois son fils, & il m'a fait une espèce de violence à laquelle je n'ai pû résister. Là dessus il embrassa l'Abbé Bignon, & se retira les yeux baignez de farmes.

Aussi M. l'Abbé de Louvois n'eut pas plûtôt expiré que En 1718. S. A. R. M. le Régent fit donner à M. l'Abbé Bignon la charge de Bibliothecaire du Roi, & lui annonça cette grace en disant, qu'il ne faisoit que lui restituer son propre bien. Il y ajoûta peu de temps après un brevet de retenue de cinquante-deux mille écus.

M. le Marquis de Louvois Ministre de la guerre étant mort en 1691, M. de Pontchartrain alors Contrôleur général, & depuis Chancelier de France, prit l'Académie des

Sciences sous sa protection. Sur quoi notre ancien Historien M. du Hamel remarque que l'un des premiers & des plus grands fruits que la Compagnie en reçut, sut d'avoir M. l'Abbé Bignon son neveu pour Ches. Il ignoroit ce que nous devrions encore un jour au nom & à la postérité de ce Ministre. M. l'Abbé Bignon étoit donc entré à l'Académie dès l'année 1691. Ainsi il en connoissoit parfaitement la constitution & l'utilité, lorsque, huit années après, il en procura le renouvellement.

Organe de la Cour, si ce n'est par lui-même, du moins par M. de Pontchartrain qui se repoloit entièrement sur lui de tout ce qui regardoit la Littérature du Royaume, M. l'Abbé Bignon devint le dépositaire de toutes les graces accordées aux gens de Lettres. Il entretenoit des correspondances dans tous les pays du monde en faveur des Académies de Paris & des Provinces, & même par rapport aux Académies étrangères. Le Czar Pierre le Grand lui faisoit souvent écrire par M. Areskins fon premier Médecin, pour le consulter fur celle qu'il vouloit établir ou qu'il avoit déjà établie à Petersbourg, & qui est devenue une des plus storissantes de l'Europe. On eût dit que le département de l'esprit & du sçavoir lui étoit échû en partage du consentement unanime des Nations. Ajoûtons que pendant tout le temps que M. de Pontchartrain fut Contrôleur général & Chancelier de France, M. l'Abbé Bignon soûtenoit le poids d'une infinité d'autres affaires d'espèce toute dissérente: rappellons-nous les soins qu'exigeoit le Journal des Sçavans, auquel il présidoit, les détails, les discussions de la Librairie, & les longues & fréquentes audiences qu'il falloit donner sur toutes ces matières, & l'on sentira de quel travail il étoit capable, & quelle facilité de génie demandoit l'exercice continuel de tant de fonctions disférentes, même avec le plus grand travail.

La Régence d'un Prince tel que M. le Duc d'Orléans qui partient l'amour des Sciences & des beaux Arts judqu'à

les mettre lui-même en pratique, n'étoit guère propre à foulager M. l'Abbé Bignon dans cette partie; le gouvernement qui suivit la Régence, ne sut pas moins savorable aux Lettres, & n'avoit garde d'en remettre la conduite en d'autres mains. Cependant M. l'Abbé Bignon se procura ensin ce repos qui termine si dignement la vie des grands hommes, mais dont les grands hommes ne veulent jouir & ne jouissent en esset qu'après mille services rendus à la patrie & au genre humain.

Il tit d'abord de fréquens voyages à son château de l'Issebelle près de Meulan, & souvent de longs séjouis; ensin il s'y retira entièrement en 1741, & il y mourut le 14 Mars

1743 dans les dispositions les plus édissantes.

Il avoit appris quelques jours avant sa mort, celle de M. Bignon de Bianzy son neveu, Intendant de Soissons, à qui il avoit sait obtenir en 1722 la survivance de la charge de Bibliothecaire. Cette charge su accordée incontinent après à M. Bignon de l'Isle-belle, puine du précédent, Maure des Requêtes, ci-devant Avocat général au Grand-Conseil, l'un des quarante de l'Académie Françoise.

M. l'Abbé Bignon a laissé parmi ses papiers un grand nombre de lettres de Sçavans, & les minutes de ses réponses. On doit aussi y avoir trouvé plusieurs de ses Sermons qu'il avoit revûs & mis en ordre pendant sa retraite, pour être publiez après sa mort, si sa samille & ses amis le jugeoient


à propos.

Il le proposoit de célèbrer au mois de Juin de cette année la Cinquantième de su reception à l'Académie Françoise, par une superbe sête qu'il vouloit donner à tous les Académiciens, dans cette ssele qu'il habitoit, & qu'il avoit extrêmement embessele. Il les y auroit invitez par un discours cloquent & affectueux dont il avoit déjà communiqué l'ébauche à d'excellens connoisseurs; il les y auroit retenus le plus longtemps qu'il lui auroit été possible, & chaque jour auroit été marqué par des plaisses de cet illustre Corps.

Hist. 1743.

B b

M. l'Abbé Bignon avoit trois frères qui sont morts avant Iui; l'aîné étoit Jérôme Bignon Conseiller d'État ordinaire & ancien Prévôt des Marchands; le second, Louis Bignon ancien Capitaine aux Gardes & Inspecteur général de l'Insanterie; & le troissème Armand-Rolland Bignon Conseiller d'État & Intendant de la Généralité de Paris. Ce dernier est le seul qui ait laissé des enfans, c'est le père de M. Pignon aujourd hui Bibliothecaire du Roi, & le seul qui reste du nom.



E'LOGE

DE M. LEMERY.

TICOLAS LÉMERY, l'un des anciens Membres de 1743.

cette Compagnie & père de celui dont nous avons Affemblée publique d'après la blique d' à parler, fut un de ces hommes rares que les préjugés de Saint Martin. leur fiècle n'ont pu feduire, qui portent la lumière dans tout ce qui devient l'objet de leurs recherches, le Descartes de la Chymie. Il tira cette Science des ténèbres mystérieuses où elle demeuroit ensévelie depuis tant de siècles, il l'affranchit de cette superstition cabalistique qui en faisoit les prétendus fondemens & qui en cachoit les véritables, & il la foûmit le premier aux principes clairs & certains de la Méchanique. Louis Lémery son fils que nous venons de perdre n'a pas été seulement le plus fidèle disciple de ce grand maître, mais par son goût déterminé pour la saine Philosophie, & par les principes lumineux qu'il puisoit dans son propre fonds, il nous a souvent donne lieu de penser qu'il auroit été capable de faire ce que son père avoit fait, s'il eût trouvé les mêmes erreurs à combattre & les mêmes obstacles à surmonter.

Il naquit à Paris le 25 Janvier 1677 de ce célèbre Chymitte, & de Magdeleine Belanger. Il fit ses études au college d'Harcourt, & il s'y diffingua parmi ses pareils. Quelques heureux effais d'eloquence le portèrent d'abord vers le Barreau: un de ses oncles, Louis Lémery fameux Avocat l'y attiroit encore; mais son père, & un goût plus décidé le ramenèrent à la Chymie, & lui firent embraffer la profession de Médecin.

A l'avantage inestimable de se trouver tout-à-coup initié dans les secrets de la Chymie, ou plûtôt dans une Chymie qui faifoit gloire de bannir les fecrets, il joignit mille

connoissances infiniment propres à étendre l'objet de cette Science, quoique déjà si étendu. Il saisit avec ardeur la Philosophie moderne qui n'étoit autre en ce temps-là que celle de Descartes; & son père, soin de dédaigner des secours qu'il n'avoit pas eus, ou de les sui envier, ne négligea rien pour les sui procurer. M. Lémery étoit Docseur en Médecine dès l'âge de vingt-un ans, & il n'en avoit que vingt-trois sorsqu'il entra à l'Académie en qualité d'Elève, d'abord de

M. de Tournefort, & ensuite de son père.

Deux années après, c'est-à-dire en 1702, il sit paroître son Traité des Alimens, ouvrage enrichi d'analyses chymiques, & où brille beaucoup d'ordre & de clarté. Il jouissoit en paix de sa réputation naissante, & il travailloit sérieusement à l'augmenter par son application à l'étude & à la pratique, Iorsqu'un Médecin journaliste, trop connu par son esprit critique, se déclara contre lui. M. Andry, car il seroit inutile d'en taire le nom, attaqua le Truité des Alimens par un de ces extraits, où l'ironie règne d'un bout à l'autre, & qui n'étant faits que pour divertir le lecteur oifif & malin, sont aussi peu propres à l'instruire, qu'à corriger l'auteur. Le nombre d'attentions triviales & de détails abjects en apparence, fur lesquels il avoit fallu insister dans un semblable Traité, donnoient beau jeu à la plaisanterie. Mais que répondre à des censures de cette espèce, quand on n'a pas du temps à perdre en paroles? Comment foûtenir ce genre d'eferime avec un homme qu'i tient en quelque sorte la plume du public, & qui, par l'abus qu'il en fait, peut tous les huit jours lancer impunement les traits contre vous, directement ou indirectement, dans une page, dans une ligne, par un seul mot? Je ne dispute point, disoit le P. Malebranche, avec des gens qui font un livre toutes les semaines on tous les mois. Cependant M. Lémery ne se laissa pas si aisement désarmer. Il prit bien le parti d'abandonner la désense de son ouvrage, & de faisser à cet égard le champ libre à son aggresseur; mais il sit en même temps comme ces grands Caritaines, qui pour delivrer plutot leur pays de la guerre,

la portent tout-à-coup & avec tous ses ravages au milieu de l'Etat ennemi. M. Andry avoit donné en 1700 un Traité de la génération des Vers dans le corps de l'homme. Cet ouvrage, quoique muni d'un grand nombre d'approbations, & qui n'est peut-être pas d'ailleurs sans mérite, sut donc séverement examiné par M. Lémery, dans une lettre adressee à M. Boudin premier Médecin de Monseigneur, & insérée dans le Journal de Trévoux du mois de Novembre 1703. De vingt-neuf fautes que M. Lémery y reprend, & parmi lesquelles il se trouvoit de vraies bévûes, M. Andry sut contraint de passer condamnation sur une quinzaine, dans la réponse qu'il donna sous le titre d'E'claircissement sur le Traité des Vers. Il y annonçoit, & sans doute pour de bonnes raifens, que quoiqu'on put lui objecter de plus, il ne repliqueroit pas davantage. Mais M. Lémery bien réfolu à ne lui faire aucune grace, revint à la charge par deux autres lettres encore adressees à M. Boudin, où il discute de nouveau toute cette matière, principalement les quatorze fautes dont M. Andry n'avoit pas voulu convenir, & il les met dans un tel point d'évidence, qu'on ne pense pas que le livre de M. Andry se relève jamais du coup mortel qui sui sut porté dans cette rencontre. Quoi qu'il en soit, le Critique tint parole, il garda le filence, & M. Lémery eut la paix avec lui pour le reste de ses jours.

Nous ne devons pas omettre que M. Andry ayant ajoûté dans son éclaireitiement quelques résentions contre l'opinion de ceux qui croient que la moëlle ne nourrit pas les os, M. Lémery l'avoit attaqué encore sur cet article qui sit le sujet d'une Dissertation imprimée en 1704, à la tête du même volume avec les trois lettres dont nous venons de parler. Il prouve dans cette dissertation que la moëlle ne sert qu'à humecter les oc, à les rendre plus souples & moins cassans; que les vaisseaux sanguins versent dans le corps même de l'os un sur nouvrieier d'une nature tout à sait dissertente; que ce suc est une lymphe visqueuse ou une colle qui n'a besoin que de chaleur pour devenir semblable par

sa consist nece aux parties qu'elle doit nourrir. Ce qu'il appuie de plusieurs observations, tant chymiques qu'anatomiques.

En 1708 M. Fagon Premier Médecin du Roi, chargea M. Lémery de faire le Cours de Chymie au Jardin Royal, à la place de M. Berger qui étoit tombé dangereusement malade. Quoique M. Lémery n'eût que huit jours pour s'y préparer, il s'en acquitta avec le plus grand succès; car il avoit une facilité merveilleuse à débiter & à mettre en œuvre son sçavoir, qu'il animoit d'ailleurs par un son de voix éclatant, & par tout ce qui est capable de se concilier l'attention d'une grande assemblec. Cependant M. Berger étant mort quelques années après, la chaire de Chymie du Jardin Royal sut donnée à seu M. Geossroy, & c'est à sui que M. Lémery succéda en 1731.

Il étoit monté à la place d'Associé de l'Académie des Sciences en 1712, & il eut en 1715 celle de Pensionnaire Chymitle, vacante par la veterance de son père qui mourut

la même année.

En 1722 il acheta une charge de Médecin du Roi. C'est en cette qualité qu'il fut nomm pour accompagner l'Infante Marie Anne-Victoire d'Espagne, aujourd'hui Princetie du Brefil, loriqu'elle retourna à Madrid. En paffant par Amboife il voulut sçavoir ce que c'étoit que ce prétendu & immense bois de Cerf que l'on y garde suspendu à la voûte de la Chapelle du château. Il profita apparemment de la curiosité de la jeune Princesse, ou il la sit naître, pour se procurer la faculté de voir de près le prodige, & de le voir avec des yeux de Physicien. On le descendit, il en sit scier un morceau, espèce d'attentat qu'il n'eût osé proposer de son chef, & qu'on n'auroit peut-être pas même souffert alors, si l'on s'étoit un peu plus désié du succès. Après un court examen il démontra sans replique que ce n'étoit que de véritable bois ordinaire. Merveille de moins pour la France à qui l'Académie ne manque guère d'en enlever de semblables toutes les sois que l'occasion s'en présente. M. I emery ne fut pas plutot de retour à Paris que la Reine d'Espagne l'honora d'un brevet de Medecin Consultant de

Sa Majesté.

M. Lémery a été trente-trois ans Médecin de l'Hôtel-Dieu. Il y étoit toûjours suivi d'une soule d'Étudians en Médecine, qu'il instruisoit avec plaisir en s'instruisant lui-mème. L'habitude qu'il avoit contractée dans cette grande ecole, d'observer & de traiter en un même jour mille maladies différentes dans le même sujet, & la même maladie dans mille sujets différens, lui avoit acquis ce pronostic sûr, & cette connoissance délicate du pouls qui sont tant d'honneur à ceux qui les possedent, & qu'on ne remarque en esset que dans

un petit nombre de Médecins du premier ordre.

Cependant personne ne sut jamais plus réserve à prononcer sur la vie ou sur la mort de ses malades. Il desespéroit rarement de leur guérison, sondé sans doute sur la connoissance qu'il avoit des ressources de la Nature, ou, ce qui revient au mème, sur notre ignorance, car il sçavoit trop pour n'en être pas convaincu. Mais aussi ne se trompa-t-il jamais quand il sit tant que de déclarer une maladie mortelle. On voit assez combien cette saçon de penser jointe à une sensibilité tendre que l'exercice de sa profession n'avoit pû lui ôter, devoit l'engager à de fréquentes visites, & à des soins sur le motif desquels on auroit pu se méprendre, si le désintéressement le plus parsait & le plus marqué n'avoit sait un des principaux traits de son caractère.

M. Lémery fut particulièrement attaché à Madame la Duchesse de Brunswick qu'il visitoit souvent dans le Palais du Luxembourg. Medecin de S. A. S. Madame la Princesse de Conti seconde Douairière, il en avoit toute la consiance, &, s'il est permis de le dire, il en possédoit l'amitié. Il passoit régulièrement toutes les nuits à l'Hôtel de cette Princesse, depuis 9 heures du soir jusqu'à 9 heures du matin; & c'est là, comme dans un asyle savorable aux Sciences, qu'il a composé plusieurs de ses Memoires; car il retrouvoit par-tout son sçavoir, son cabinet, & presque son laboratoire.

Sans cette extrême facilité dans le travail, & sans un grand

tende de comprendre comment M. Lémery auroit pû districle de comprendre comment M. Lémery auroit pû sournir à ce prodigieux nombre d'engagemens que nous venons de lui voir, & avec cela trouver du temps pour faire des expériences, pour méditer & pour écrire; en sur quelles matteres! avec quelles discussions! en un mot, pour être Academicien de l'Academie des Sciences, & Academicien assidu & laborieux.

Nous allons entin le confiderer plus particulièrement par ce côté qui nous touche de si près, & donner une idée des excellentes pièces dont il a enrichi nos Memoires. El liftoire succincle que nous en serons se trouvera nécessairement lice avec celle de plusieurs contestations sçavantes qui en ent louvent été l'origine ou la suite, & qui sont devenues auffi timeules dans cette Academie qu'intéressantes pour le public. Rien ne resiemblera ici à la contention satvrique & influctueufe à laquelle nous avons vu qu'il s'étoit si sagement refuté. Ce sont de vraies disputes que les differens aspects fous lesquels se montre la Nature ont fut naitre, & que le defir de voir triompher la vérite fait soutenir. Cette espèce de guerres entre les Scavans, comme celles qui remplissent Thittoire des Princes belliqueux, peuvent être de même justes ou injuttes, bien ou mal foutenues, favorables ou pernicieuses à ceux qui les excitent ou qui les soûtiennent : mais il y a cette difference que les guerres proprement dites sont tout au plas avanta_cufes pour le Vainqueur, pour un pays ou pour un peuple; au lieu que des guerres littéraires il réfulte presque toujours une utilité commune, une nouvelle lumiere qui l'appind for le monde entier. Les decouvertes des Scavans sont les conquêtes du genre humain.

Non avent qui inte Memoires de M. Lamery, la plup irt d'une ctendue confiderable, fans compter les morceaux qu'on ne trouve que dans l'Histoire & par extrait. Ceux qui regardent la Chymie, & qui font le plus grand nombre, roulent principalement sur la nature du Fer & sur sa production, sur la Niue & quel que autres Sels, sur les analytés ve, teles

& animales;

& animales; trois sujets où M. Lemery s'est montré un

Chymiste de la première force.

Il est très-naturel de penser que la matière n'a rien d'essentiel en soi & d'absolument indestructible si ce n'est l'etendue & l'impénétrabilité, & que tout ce qu'elle préfente de variétés à nos sens, ne consiste qu'en des modifications dissérentes dans ses parties. Toute espèce de matière quelconque, végétale, animale, ou minérale, pourroit donc, spéculativement parlant, être décomposée & détruite, &, par l'inverse du principe, recomposée & rétablie sous la forme qu'elle avoit avant fa destruction. Cette composition & cette recomposition des corps ont sait de tout temps un des grands objets de la Chymie, & l'on sent assez l'affinité qu'elles ont avec ce qu'on appelle le grand œuvre. C'est sur ce sondement & fur des expériences réitérées que feu M. Geoffroy, l'un des plus sçavans Chymistes qu'ait eu l'Académie, s'étoit flatté de pouvoir produire du fer. Il méloit ensemble certaines matières où auparavant on n'apercevoit ce métal, ni par voie d'analyse, ni par le coûteau aimanté; pur exemple, de l'argille avec de l'huile de fin, & après quelques opérations assez simples, il en retiroit du ser. D'où il concluoit que c'étoit donc là un nouveau fer produit dans la Nature, & qui devoit toute son existence à l'art. Mais M. Lémery attaqua la conséquence, & soûtint dans plusieurs Memoires qui sont partie des volumes de 1706, 1707 & 1708, que le fer étoit actuellement dans l'argille, que l'huile de lin ne faisoit que le développer & le rendre fusceptible des impressions de l'aimant auquel on sçait d'ailleurs que le fer ne s'attache point quand il est réduit à certains états, & enfin qu'on étoit toûjours en droit de l'y foupçonner. Le principe phyfique ou métaphyfique de l'essence de la matière indisserente par elle-même à toutes ses modifications, ne l'embarrassoit pas, & fera toûjours aifé à éluder devant des faits bien avérez. Car foit qu'on reçoive ou qu'on rejette ce principe, ne peut-on pas croire, & mille expériences ne nous y invitent-elles pas, . Cc Hill. 1743.

202 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

que les forces achielles de la Nature aidees de tout notre art, dans le tourbillon folaire ou terrestre que nous habitons, sont egliement insufficientes, & pour subdiviser les metaux au delà de leurs parties intégrantes, & pour rassembler ou lier assez etroitement les principes desunis qui doivent constier assez etroitement les principes desunis qui doivent constier assez etroitement les principes desunis qui doivent constier assez etroitement les principes desunis qui doivent constitutions.

tituer ces mêmes parties?

La question maniée & remaniée de mille saçons dissérentes, & les saits qu'on apportoit en preuve de part & d'autre étant bien discutez, l'Académie parut se déterminer en saveur de M. Lémery, & nous ne voyons pas que M. Geoffroy ait appellé de ce jugement; quoique, telon quelques-uns des juges mêmes, il ne manquât pas encore de ressources pour s'y opposer. Ce qui est certain, c'est que les deux antagonistes firent parotte reciproquement autant d'amour pour la verite, & autant de politetie que de sagacité

& de sçavoir.

C'est apparemment à la dispute sur le Fer que nous devons cette végétation fingulière, cet Arbre de Mars que M. Lémery donna dans le même temps à l'Académie, & qui fut une des principales curiofites dont cette Compagnie prit soin de se parer, quand le Czar Pierre le Grand lui fit Thonneur de venir aflitter à une de les Atlemblées. On feait que les Chymitles qualifient du nom de regétations, certaines cryflallilations particulières, foit d'un métal, foit d'une matiere quelconque, lorsqu'elles prennent exterieurement la figure d'un arbre ou d'une plante. Le premier de ces arbres metalliques dont il soit fait mention, est celui de Diane cu d'argent, attribué à M. Homberg en 1682, quoiqu'il fut connu plus de trente ans auparavant. Il étoit réservé à M. Lémery de decouvrir le second, & le seul qu'on ait trouvé depuis, malgre les efforts que de scavans Chymistes ont faits pour cela avant & depuis cette découverte. C'est cet Aibre de Mars dont nous venons de parler, & qui se fait avec de la limaille de fer, par la dissolution de l'esprit de nitre. Il expola d'abord l'expérience toute simple, mais il y joignit

bien-tôt une théorie ingénieuse qui a mérité l'approbation

des Physiciens.

Il fembloit que M. Lémery fût destiné à briller dans ces sêtes de l'Académie, où les plus grands Monarques sont venus illustrer nos travaux par seur présence. Ce sut lui encore qui sournit, ou qui exécuta les Détonations chymiques & quelques-unes des autres expériences de cette espèce qui surent saites devant le Roi dans l'Assemblée du 22 Juillet 1719.

M. Lémery ne s'étoit pas arrêté à une spéculation stérile sur le ser; il avoit examine la manière dont ce métal opère sur les liqueurs de notre corps, & comment il doit être préparé pour certaines maladies. Son A thiops martial, connu sous le nom de la Poudre noire de M. Lémery, est une des préparations du fer, qu'on emploie le plus utilement dans la Médecine.

Venons à ses Recherches sur le Nitre, & sur quesques autres Sels. L'hypothèse du nitre aërien s'étoit sort accréditée sur la foi du Docteur Mayou seavant Médecin Anglois; M. I émery la combat victorieusement, en saisant voir que le nitre peut bien être soutenu dans l'air à quesques toises au dessus du terrein, mais qu'il ne sait nullement partie de s'air. Ce sel ne vient pas non plus de la terre, puisqu'on n'en trouve les mines nulle part, & qu'on ne voit point d'eaux minérales qui en contiennent. Les deux grands magasins du nitre sont, dit-il, les plantes & les animaux, & ces deux nitres disserent beaucoup entr'eux, la base de l'un étant un alkali sixe, & celle de l'autre un alkali volatil. C'est du nitre animal qu'on fait le salpètre. Mais ces disserences, & les preuves de toute cette théorie nous conduiroient dans un trop grand détail.

M. Lémery ne sut pas si heureux sur l'origine & sur la fabrique du Sel ammoniac. La manière dont on fait ce sel, ainsi que plusieurs autres drogues qui nous viennent des pays étrangers, étoit absolument inconnue. M. Geoffroy le cadet la devina en 1716, s'il ne sit mieux, car il la trouva par une

204 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

fuite railonn e d'experiences entreprifes à ce deffein. Il montra à la Compagnie un petit pain de ce sel en tout semblable à celui qu'on nous apporte du Levant, excepté qu'il paroiffoit résulter de la sublimation, comme il en résultoit en esset. & comme M. Geoffroy en convenoit dans son Mémoire. Or on avoit cru jusque-là, & M. Lémery soûtenoit vigoureusement l'assirmative, que le sel ammoniac étoit fait par voie de précipitation. Grande contestation sur ce point décifif; mais comment la terminer? il s'agissoit d'un fait inconnu, & tout au moins fort incertain. Enfin l'incertitude fut levée par une lettre que M. le Mere Consul en Egypte écrivit à l'Académie en 1719, & par une autre lettre du P. Sicard Jésuite, où toute la fabrique du sel ammoniac est expliquée. M. Geoffroy eut gain de cause; son Mémoire fur lequel l'Academie avoit suspendu son jugement, & qui n'avoit pas été imprimé dans le temps, le fut en 1720, avec sa véritable date, du 22 Avril 1716, & M. Lémery ayoua de bonne grace qu'il s'étoit trompé. Aveu qui cou-Tonne peut-ctre micux qu'un nouveau triomphe les victores qu'il avoit remportées jusqu'alors.

Les observations de M. Lemery sur les analyses des plantes & des animaux, ne nous sourniroient pas un champ moins vaste que ce qu'il nous a donné sur le fer & sur le nitre. On dit que rien ne fait plus d'honneur à un homme que de démentir les désauts de son pays; on pourroit ajoûter, & de sa profession. Voici un Chymiste qui écrit contre l'abus des analyses chymiques, contre ces même, analyses qu'il a si souvent employees dans son Traite des Alimens. Ce n'est pas que les analyses soient totalement inutiles, M. Lémery lui-même nous promettoit d'en montrer l'utilité & l'asige, & l'Academie ne cesser point de regarder comme un trésor inestimable quatorze ou quinze cens analyses de plantes, qui firent en partie l'objet de ses premiers travaux; mais rien n'est moins sondé que la connoissance qu'on prétend acquerir par-là du tissu interieur, de l'assemblage &

des propriétés des substances qu'on soumet à l'action du seu. Le seu, en même temps qu'il décompose & qu'il dissour les corps, altère ou détruit la forme de leurs parties, & dissipe même souvent les plus subtiles, malgré toutes les précautions de l'Artiste: de manière que deux plantes, par exemple, dont l'une est très-salutaire & l'autre un poison, ne donneront quelquesois par leur analyse que le même résultat, soit pour l'identité des principes, soit pour leur quantité. C'est l'arrangement des parties qui fait les propriétés des mixtes.

M. Lémery avoit encore exercé son fourneau & sa plume sur plusieurs autres matières, sur les différentes espèces de vitriols, sur les sels & les esprits acides, par rapport à leurs précipitations & à leurs volatilisations, sur l'alun, sur le borax, sur les différentes couleurs des précipités de mercure, sur le sublimé corrosif, sur l'antimoine, sur la poudre dite des Chartreux, & sur quelques autres matières qui font le sujet d'autant de Mémoires. La Physique aidée de la Chymie lui en avoit auffi fourni quelques-uns; tel est son système sur la matière du feu & de la lumière en 1709, le même que celui qu'on a vû depuis avec quelques additions dans la Chymic de M. Boerhaave. C'est-à-dire, que le seu & la lumière, quoique très-agitez, ne consistent pas, selon lui, dans l'agitation de la matière en général, ni en particulier dans les promptes vibrations de l'éther, mais que c'est une vraie matière distinguée de toutes les autres, cachée plus ou moins dans les interstices de tous les corps, qui en a toutes les propriétés, l'impénétrabilité, la pesanteur même, & dont le Soleil est le grand réservoir. Il découvrit en 1726, & comme il l'avoue, par un pur hasard, que le plomb, forsqu'il a une certaine figure, fort approchante d'un fegment sphérique ou d'un champignon, devient presqu'aussi sonore que le métal dont on fait les timbres d'horloge: hafards cependant qui ne se présentent guère qu'aux gens studieux & habiles, ou qui ne sont remarquez que par eux; car combien de fois du plomb ainfi figuré n'avoit-il pas pitic pir d'autres

Cc iij

mains? M. de Reaumur ayant répété & approfondi l'expérience, y observa encore cette singularité, qu'il saut que la sigure requise vienne au plomb par la sussion, & que toute autre manière de la lui donner le laisse aussi sourd qu'il l'est endinairement. Les Recherches anatomiques de M. Lemery sur l'usage du Trou ovale, cette ouverture qu'on voit dans le cœur du sœtus & qui se bouche après la naissance, & de quelques autres parties du corps humain, sui ont sait honneur. Il méditoit plusieurs autres ouvrages, & sur-tout un l'inite complet de Chymie, auquel il avoit grand regret de n'avoir pas plûtôt travaillé.

Nous passons rapidement sur tous ces sujets, pour en venir à 1. dispate sar l'origine & la formation des Monthres; dispate qui vrai-tent l'ablement ne tera pas si-tot terminee, & qui sui avoit de j. foarni la mitière de sept à huit grands Memoires, les derniers qu'il nous ait donnez. Elle commença du temps de M. Duverney; c'est M. Winslow qui l'a relevée en dernier lieu, consormement a l'idee hardie de M. Duverney; « e'est

à de pareils adversaires que M. Lémery faisoit tête.

Le système général, reçu de part & d'autre, est que toutes les générations se sont par des œus ou des germes aussi anciens que le Monde. Il s'agit seulement de sçavoir, si le sœtus monstrueux n'est tel que par les accidens qui lui arrivent dans le sein de la mère, ou si le monstre étoit contenu dans l'œus. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire, selon Mrs Duverney & Winslow, un ensant, par exemple, qui naît avec deux têtes, viendra d'un germe à deux têtes; au lieu que selon M. Lémery & la plupart des Anatomistes & des Phyticiens modernes, ces deux têtes ne seront que celles des deux embryons parsaits, mais jumeaux, qui par les divers accidens du choc & de la pression se seront ajustées sur le reste du corps de l'un des deux.

L'opinion des germes primitivement monstrueux tranchoit tout d'un coup la difficulté peut-être insurmontable, de concevoir que les débris de deux corps organisez &

composez de mille millions de parties organifées, puissent en produire un troilleme par cette voie. Difficulté qui fit dire à quelqu'un dans la Compagnie, qu'on imagineroit aussi-tôt que de deux pendules écrafces l'une centre l'autre il fe format une nouvelle pendule, ou que les germes eux-mêmes monftrueux ou non monstrueux ne se seroient formez dans se corps des animaux que par des hafards tout femblables : ce qui prouveroit trop, & infirmeroit le système général. Mais l'opinion commune a aussi cet avantage, que ceux qui la rejettent sont contraints d'avouer qu'il y a des Monstres & des parties monstrueuses dont la formation est visiblement dûe au contact accidentel, ou que du moins on explique affez heureulement par-là & sans remonter jusqu'à l'œuf. Les plantes en fournissent encore des exemples, & c'est ici que l'analogie en faveur du système des accidens est portée par M. Lémery au plus haut degré de vrai-semblance dont elle étoit susceptible. Un autre principe qu'il mettoit en œuvre, mais dont on né sçauroit user avec trop de circonspection, c'est que rien d'imparfait n'ayant pû sortir des mains du Créateur, il n'y a nulle apparence qu'il eût voulu directement créer les Monstres par des germes destinez à les produire. Car enfin nos lumières font trop courtes pour décider de ce qui est perfection ou imperfection dans l'ordre de la Nature, & si les Monstres tels que nous les voyons n'ont pas été préparez avec le Monde par la même Sagetie qui les y a soufferts.

Quant à M. Winflow, il attendoit patiemment que M. Lémery eût fini tout ce qu'il avoit à dire sur ce sujet, & il s'est contenté de temps en temps, sans toucher aux conséquences, d'exposer des faits qui paroissent incompatibles avec le système de la constition des germes dans le sein de

la mère.

La dispute en étoit là lorsque M. Lémery fut attaqué de la maladie dont il mourut le 9 Juin 1743.

Il s'étoit marié en 1706 avec Catherine Chapotot. De

208 HIST. DE L'ACAD. ROYALE DES SCIENCES. trois enfans qu'il eut de ce mariage, il n'est resté qu'une sille, l'objet de ses complaisances. Il avoit pris un soin extrême de son éducation, & il paroît qu'il n'avoit rien oublié de tout ce qui pouvoit affortir l'esprit & les graces dont elle a été pourvûe par la Nature.

Il étoit doux & poli dans le commerce, capable d'amitié, généreux & libéral. Tout ce qui fouffroit avoit droit sur son cœur & sur ses biens, & il a quelquesois donné aux pauvics des sommes exorbitantes pour un particulier d'une

fortune si modique.





MEMOIRES

DE

MATHEMATIQUE

ET

DE PHYSIQUE,

TIREZ DES REGISTRES

de l'Académie Royale des Sciences,

De l'Année M. DCCXLIII.

SUR LES EAUX MINERALES

DE

SAINT-AMAND EN FLANDRE.

Par M. MORAND.

NE des premières époques de la réputation des 24 Avil Eaux minérales de Saint-Amand, fut la guérison d'un Archiduc Léopold Gouverneur des Pays-bas vers l'année 1648; cependant ce n'est que depuis la conquête de la Flandre par Louis XIV qu'elles ont eu une Mem. 1743. Si l'on en juge par les morceaux d'Antiquités qui se sont présentez en grand nombre dans le voisinage de la principale sontaine lorsqu'on a souillé la terre, il faut que cet endroit ait été habité par les Romains. On y a trouvé des modailles des Empereurs Verpasien & Frant, un petit autel de bronze avec les principaux traits de l'histoire de Rémus & Romulus en relief, dont j'ai fait l'acquisition, une petite statue du Dieu Pan, plusieurs de Cupidon, & quantité de fragmens de vases antiques faits d'une terre bolaire, sine &

rougeâtre, telle que celle des Bucaros.

Les noms de Celius & Cestius inscrits dans un petit quarré long au milicu de plutieurs de ces vales, ont thit imaginer que c'étoient des noms de quelques grands personnages, & tout au moin de lamilles Consulaires; mais ceux qui se connoitient en Antiquités, sçavent que ces inscriptions ne sont pour la plûpart que les noms des ouvriers qui faisoient ces vases: ce sentiment est sondé sur le grand nombre de ceux que l'on trouve en différens endroits & qui ne portent point de noms sameux; j'en ai rapporté des morceaux de cette espèce, & j'en avois déja dans mon Cabinet. Il passe aussi pour constant que les ornemens en relief qui se trouvent aux bords de la plûpart de ces vases, ne sont autre chose que la marque de l'ouvrier; un de ceux que j'ai rapportez de Saint-Amand, a des ornemens pareils à ceux d'un vase de Bucaros antique que l'on voit au Cabinet de Sainte-Géneviève.

Au reste, quand on resuseroit à ces fragmens de Bucaros l'utilianticité accessaire pour faire preuve d'antiquité, il paroit assez par les autres pièces, que les Eaux de Saint-Amand ont été connues des anciens Romains; & comme il y a dans le même lieu des eaux froides & des eaux tièdes, on pourroit profumer que les premieres leur tervoient de boition, & les autres de bains. Personne n'innote que les bains etoient des

endroits où ils laissoient assez ordinairement des monumens de leur domination, ou des marques de leur magnificence.

Quoi qu'il en foit de l'origine de ces Eaux, elles font aujourd'hui fi accréditées, que les Etrangers & les François y vont avec une égale confiance pour être foulagez de différens maux qui ont réfiffé aux remèdes ordinaires. Il y a un Hôpital entrelenu par le Roy pendant quatre mois de l'année, pour les foldats qu'on y envoie de toutes les gar-

nisons de la Flandre & du Haynaut.

Les eaux de Saint-Amand sont à trois lieues de Valenciennes, & à trois quarts de lieue de la ville de Saint-Amand, situées dans une prairie qui depend d'une ferme appartenante à l'Abbaye du même nom, & presque contigues à un hameau qu'on appelle la Crascette; c'est dans cet endroit que la Nature a ouvert ses trésors salutaires avec une sorte de prosussion, car on y trouve trois espèces d'eaux & des boues minérales: l'Art y a ajouté ses commodités de la vie, tant pour s'habitation que pour la promenade, & l'on sçait assez de quoi il est capable entre ses mains des François, quand il a pour objet la conservation des citoyens, & pour aiguillon ses regards d'un Prince biensaisant.

Le voyage que j'ai fait l'année passée en Flandre avec la Maison du Roy m'ayant donné occasion de saire quelques remarques sur ces Eaux, je les ai cru assez intéressantes pour

être communiquées à l'Académie.

En examinant d'abord la nature du fol, on observe en plusieurs endroits trois lits de matières différentes, dont le premier & le plus superficiel est d'une terre noire, le second d'une espèce de marne, & le troissème d'un suble très sin qui

dans le voisinage des eaux est fort mouvant.

La matière noire du premier lit se lève quelquesois par seuillets, & il s'est trouvé de ces seuillets, durs, pesans & chargez de parties métalliques; j'ai rapporté un échantillon de cette terre qui a servi, dit-on, à découvrir la première sontaine: lorsqu'on en jette sur des charbons ardens, elle s'enslamme & répand une odeur de soutre; on a rencontré

4 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE Rent de premier lit de visites mucatilites, & M. Migniot qui

a donné un petit Traité de ces Eaux, rapporte qu'en cassant de ces marcassites on a découvert dans quelques-unes de la ikur de sous e ramassite duns des tillons, comme il en pareit e use ses bois de charpente autour du bassin des Eaux d'Aixla-Chapelle.

Ce simple exposé annonce une terre abondante en principe, mineraux, nous verrons ce qui en resulte par rapport aux Laux dont nous allons considerer séparement chaque cipece.

Fontaine du Bouillon.

La première fontaine & la plus anciennement decouverte, s'appelle du Bouillon, à cause des bouillons qui s'élèvent pretique continuellement du s'ind du bassin à la superficie de l'eau.

Il y avoit anciennement plus près de la fource une fontaine qui avoit eté negligée jusqu'à l'épeque de la guerifen d'un Archidue I copeld. Depuis ce temps la Dem Dubois qui a cte Abbe de Saint-Amand pendant cinquante ans, & qui a fait bâtir la superbe église qu'on y voit, y avoit fait faire un bassim octogone pour ratiembler les eaux, mais on n'en voit plus aujourd'hui que les ruines; on dit que la maconnerie faite alors etant mal soutenue, s'est détruite, & que les décombres ayant détourné les eaux pour quelque temps, elles ont été jaillir à quelques toises plus soin où elles sont actuellement.

C'est en 1698 qu'on a construit le nouveau bassin & le pavillon au moyen duquel les eaux sont à l'abri de la pluie & de tout ce qui pourroit les altérer. Au dessus de la porte d'entre sont en marbre les armes du Marchal de Beutlers pour lurs Gouverneur géneral de la Province, avec une inscripti n qui apprend s'epoque de cet établissement. On dit que dans les travaux faits pour cela, s'on trouva en souillant le terrein, des statues de bois sort grandes, que les uns dissoient être des Idoles du Paganilme, d'autres des Images de Saints.

Le réservoir a environ six pieds de prosondeur depuis la superficie de l'eau jusqu'au sable qui torme un glacis plus élevé vers les bords: ce fable très-fin est d'une couleur d'ardoise lorsqu'on le tire de l'eau, & paroît mêlé de grains noirs & blancs lorsqu'il est sec; il est apporté par les eaux mêmes qui sortent d'une espèce de gousser & s'élèvent vers la superficie avec une sorce bien considérable. J'y ai plongé une perche de bois sort grosse & chargée de plomb à son bout supérieur: lorsque je cessois de la tenir serme, elle étoit renvoyée avec une vîtesse furprenante.

L'on sçait par une espèce de tradition que le sable a six à sept pieds d'épaisseur, & le gousser seize à dix-sept pieds de prosondeur, ce qui peut supposer un sond caverneux où l'on a soupçonné par les statues de bois qui en sont sorties, qu'il y a eu quelques temples pratiquez sous terre. C'est dans cette caverne qu'il se sait quelquesois des esservescences extraordinaires; alors l'eau est agitée, le glacis est dérangé, le sable est culbuté, & celui qui vient du sond, amène avec lui des matières étrangères parmi lesquelles il s'est trouvé plusieurs sois des morceaux de bois petristez; j'en ai rapporté un qui semble être sait de deux écorces appliquées l'une contre l'autre, & qui porte quelques grains métalliques.

Lorsque ces eaux sont tranquilles, elles sont belles & trèslimpides; en les considérant de la galerie qui sait le tour du réservoir, on n'est pas une minute sans voir les bouillons qui partent de dessous le sable qu'ils semblent trouer, l'élèvept à une certaine hauteur en forme de petits tourbillons, & viennent former à la superficie de l'eau de grosses bulles d'air lesquelles se dissipent en saisant un petit bruit. On peut se donner en petit une idée de ce phénomène, en versant dans un verre de l'esprit de Vitriol sur du sable de la sontaine; c'est ce que j'ai vû par hasard en saisant mes expériences.

On découvre encore un autre spectacle en regardant les caux dans quelques endroits où elles soient éclairces par un beau jour & dans un temps serein, on voit à la surface des espèces d'étincelles que l'on prendroit pour des paillettes d'or, & qui sont sans cesse dans un mouvement très-vif.

Voilà ce que l'on aperçoit à la simple vue: on le douter.

MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE 6

bien que j'ai passé à un examen plus approfondi; effectivement j'ai fait plusieurs expériences dont voici le détail.

D'abord je portai la main dans l'eau, & elle me parut un peu tiede & plus chaude que de l'eau ordinaire qui n'ett pas exposée au grand air ne le doit être au mois de Juillet que je l'alfois cet examen. Un petit thermomètre de mercure selon les principes de M. de Reaumur etc it alors à 14 degrés au dessus de la congélation, & ayant été plongé dans l'eau pendant dix minutes, le mercure monta d'un demi-degré.

Je les goutai, elles me parment auffi douces qu'elles étoient limpides & belles, & elles ne me fuifièrent dans la bouche

qu'un très-petit goût de soufre.

J'y trempai une pièce d'argent pendant quelques minutes,

& elle en fut un peu ternie.

Mélecs avec la noix de galle elles ne donnèrent point de teinture violette, encore moins de noire, & il n'en résulta qu'une couleur d'un jaune clair; cette eau ne verdit point le firop violat.

Son mélange avec de l'esprit de vin, de la teinture de

tournesol, de l'esprit de vitriol, ne produit rien.

Avec les acides, nulle fermentation.

Avec de l'huile de tartre par défaillance elle devient Jouche, laiteufe, donne une couleur de girafol, & dépose

un peu.

1030 57.

Les expériences indiquées dans l'Histoire de l'Acidémie, Annie 1699. m'ont paru ne présenter rien d'assez sûr pour en tirer des configuences, it wett dit que les Earx de Saint Am ind rendent l'eau de chaux un peu laiteuse, & qu'elles blanchissent assez le vinaigre de Saturne; je n'ai point trouvé à cet égard de dissérence entre les eaux de Saint-Amand & l'eau commune.

> Il n'y a pas plus à compter sur l'expérience rapportée dens le petit ouvrege de M. Briffirt, qui a vu avec furprise de beaux cercles de couleur d'iris que donne l'esprit de tés benthine verse sur nos e un. Pertonne n'ignore que cela arrive à toute eau naturelle, minérale ou non-

J'ai fait bouillir de notre eau avec du lait de vache, qui

n'en fouffrit aucune altération défagréable au goût, & non feulement le lait ne tourna point dans l'ébullition, mais le mélange étant refroidi & gardé, le lait le cailla moins vite que celui qui avoit bouilli en même temps avec de l'eau fimple.

Je l'ai pesée avec l'aréomètre ordinaire, elle s'est trouvée égale à celle de la seconde tontaine dont je parlerai, plus pesante que l'eau de pluie, plus ségère que l'eau de puits; mais ces deux différences sont d'une quantité à peine sensible.

Transportées à Valenciennes qui n'est qu'à trois lieues de Saint-Amand, dès le lendemain elles avoient un peu moins ce goût de soufre qui y domine, & elles le perdirent peu à peu tous les jours jusqu'au cinquième qu'on ne pouvoit plus y apercevoir de dissèrence sensible d'avec de l'eau congnune.

J'en ai fait évaporer 8 livres en douze heures de temps

dans un pot de terre vernissé.

La matière qui a fait résidence, détachée des parois du

vaisseau, pesoit 17 grains.

C'est une terre insipide & formée en poudre subtile, comme les résidences des Eaux de Forges.

J'y ai présenté le couteau aimanté sans y découvrir de ser. J'en ai mis dans du vinaigre distillé, elle a sermenté avec bruit, & il s'en est élevé une écume telle que le mélange avec les alkalis terreux en excite; peu à peu le vinaigre a dissous une partie de la terre, & le reste s'étant desséché, il s'est fait aux parois du vaisseau une crystallisation en croute qui a laissé au sond une matière de gypse avec quelques sels

où M. Geosfroy a reconnu de l'acide vitriolique.

J'ai examiné le sable sin qui se trouve au sond des eaux, après l'avoir dessecté j'y ai présenté le couteau aimante sans y découvrir de ser; calciné même avec des matières grasses, je n'en ai pas découvert davantage. J'en ai mis dans du vinaigre,

il n'y a point fermenté & ne l'a point adouci.

J'en ai mis dans de l'esprit de vitriol, & je n'ai point vû par cette expérience qu'il sermentat avec les acides, ainsi que M. Brassart le prétend.

Les expériences que je viens de rapporter, n'ont produit

8 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

de sensible que le petit goût de soufre qu'on aperçoit dans ces eaux, le changement qu'elles causent à l'huile de tartre & la qualité alkaline de la résidence laissée par l'évaporation.

On n'y a point découvert de fer, cependant il est bien dissicle qu'il n'y en ait point, quand on n'auroit pour le soupçonner que le voisinage d'une source purement serrugineuse qui n'en est éloignée que de 3 toiles; on n'y a pas trouvé en nature ce qu'on appelle le vrai sousce minéral, mais l'odeur qu'elles exhalent, le jout qu'elles donnent, l'unpression qu'elles font sur l'argent, ce qu'on rapporte des bois tirez des caves, qui étant brûlez sentoient le sousre, tout cela rassemblé sous un même point de vûe doit, ce me semble, établir leur qualité sulfureuse.

Si on n'a pû en séparer par l'analyse aucune partie sensible de fer & de sousre, il y a lieu de croire que c'est à cause de seur trop petite quantité par proportion avec la

terre alkaline.

Aussi M. Heroguelle qui le premier a traité de ces Eaux, vouloit-il en augmenter la force par l'addition des remèdes tirez suivant les dissérens cas, du ser, du nitre, de l'alun, du sousre, de l'antimoine; au moyen de quoi il trouvoit dans les eaux de Saint-Amand une panacée universelle.

Nous conclurrons de cet examen, que les eaux de la fontaine du Bouillon contiennent certainement une terre trèsfine, alkaline & absorbante, vrai-semblablement du soufre & du fer; nous allons voir qu'elles réunissent les propriétés

des eaux sulfureuses & serrugineuses.

En général ces eaux font douces, legères, rafraichitfantes,

apéritives & diurétiques.

Ceux qui en ont écrit, en ont rapporté des vertus sans nombre, on y envoie des malades indisséremment attaquez de toutes sortes de maux, mais il y a toûjours à rabattre des merveilles que chaque auteur attribue aux Eaux minérales qu'il entreprend de préconiser. J'y ai vû jusqu'à des gens incommodez de cancers & d'écrouelles, & qui les ont prises, comme on s'en doutera bien, sans succès.

II est

Il est sans contredit qu'une de leurs vertus principales est contre la gravelle, les maux de reins & les glaires des urines; effectivement elles en guériffent beaucoup de malades, mais je doute qu'elles foient d'une grande efficacité dans le cas de l'ulcère, & j'ai vû des malades qui en étoient attaquez, les prendre inutilement.

Elles sont encore vantées pour les maux d'obstructions, & j'ai vû des personnes attaquées de squirres dans le ventre, s'en bien trouver, ces deux propriétés principales sont assez établies par un grand nombre de fuccès; mais il est fingulier (& c'est la faute des observateurs) de voir qu'on les donne pour excellentes dans d'autres cas où elles réuffiffent peu, pendant qu'on ne dit pas un mot des bons essets qu'elles ont réellement en quelques maladies.

Par exemple, on les dit spécifiques pour des restes d'écoulemens vénériens; & d'un très-grand nombre de gens qui, de ma connoissance, les ont prises pour cela, pas un n'a

été guéri.

On en a grande opinion pour les dartres invétérées, cependant elles n'ont paru rien faire à plusieurs malades à qui

je les avois confeillées.

On ne les ordonne pas pour les maladies du genre nerveux, il semble qu'on ait oublié ce que rapporte M. Heroguelle, qu'elles guérirent le Religieux de l'abbaye d'une paralytic qui avoit succédé à une colique du Poitou dont ils furent tous cruellement tourmentez vers l'année 1685; cependant j'ai vû plufieurs malades attaquez de maux de nerfs en reffentir les effets les plus marquez. Il m'a paru enfin qu'elles n'étoient point favorables à ceux qui sont affectez de la poitrine.

Voilà les principales observations que j'ai faites sur leur

vertu.

Je passe à l'examen de la seconde sontaine.

A une très-petite distance de la fontaine du Bouillon est celle qu'on appelle la fontaine d'Arras, parce qu'un Evèque d'Arras. d'Arras l'a mise en crédit par sa guérison.

Cette eau sort dans l'endroit de la fontaine à 5 toises de Mem. 1743. . B

Fontaine

10 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROTALE

sa source, à 4 pieds de son réservoir, & 2 pieds ½ sous la surface de la terre; on dit que la source est à 3 toises de

profondeur sous terre.

Comme ces eaux ne sont point à découvert, on ne peut voir si elles donnent à seur surface les bouillons & les brillans qu'on voit sur celles de la premiere sontaine : on m'a affuré qu'il y avoit au sond un sable de même nature que celui de la sontaine du Bouillon.

Elles ne sont pas à beaucoup près si cluires ni si limpides que celles du Bouillon; leur couleur est jaune clair, telle que celle du Bouillon quand on y a mele de la noix de galle.

Elles ont un goût de soufre très-décidé & une odeur désignéable qui approche sort de celle que la poudre à canon Little si-tot après avoir été enssamme; cette odeur se sait quesquesois sentir à un quart de lieue, & les vapeurs qui s'elèvent de la sontaine, jaunissent & noircissent même les galons & les pièces d'argenterie qui y sont exposees; elles sont plus chaudes que celles du Bouillon, j'y plongeai un petit thermomètre de M. de Reaumur, dont le mercure haussa d'un degré en cinq minutes.

Mises à l'epreuve de l'arcomètre elles ont la même pesan-

teur que celles du Bouillon.

Une pièce d'argent que j'y trempai, fut couverte sur le champ d'une conseur de gorge de pigeon, comme celle qui gate l'argenterie exposee a la vapeur des latrines; après avoir frotté cette pièce la couleur sut essacée, mais la pièce resta dorée, & se conserva telle pendant plusieurs jours.

La noix de galle que j'y mis, augmenta la couleur jaune de l'eau fans en tirer aucune teinture, ni violette ni noiratre; milée avec le tirop violat elle donna un peu de couleur verte

& n'en fut pas plus agréable au goût.

Mélee avec l'esprit de vin, la teinture de tournesol, le lait, il en résulta les mêmes essets que du melange de ces siqueurs avec les eaux du Bouillon.

Elle ne sermente point avec les acides.

Mélée avec l'huile de tartre elle devient louche, laiteufe,

elle donne une couleur de girafol plus claire que celle qui est fournie par le mélange de cette huile avec l'eau du Bouillon.

Transportées à Valenciennes ces eaux conservèrent se

goût & l'odeur de foufre jusqu'au huitième jour.

J'en ai fait évaporer 8 livres en douze heures de temps

dans un pot de terre vernissé.

Elles laissèrent au fond du vaisseau 24 grains de résidence, c'étoit une terre alkaline plus grise que celle du Bouillon, bordée de petites lames brillantes que je crus être une espèce de sel de Glauber, mais qui cependant ne piquoit point du tout la langue.

Cette terre absolument insipide me parut plus légère que

celle du Bouillon.

J'y préfentai le couteau aimanté, & je n'y découvris point de fer.

Elle fermenta peu avec le vinaigre diflillé, au bout de quelques jours elle y fut diffoute presque en entier, & s'étant desséchée elle laissa aux parois du verre un peu de matière crystallisée, semblable à celle des eaux du Bouillon.

Il réfulte de ces expériences qu'elles contiennent une terre fine, alkaline & abforbante comme celles du Bouillon, mais qu'elles ont plus de foufre & un foufre bien plus développé,

& qu'elles sont plus chaudes.

La teinture un peu foncée que la noix de galle en tire, & le voifinage de la fontaine ferrugineule, permettent d'y foupçonner du fer. Comme elles font beaucoup plus fortes que celles du Bouillon, & qu'en général les malades les trouvent plus pesantes, il s'en fait une bien moindre conformation, & c'est peut-être ce qui sait qu'on n'a point pris pour les conserver & les couvrir, les mêmes précautions qu'on a prises pour celles du Bouillon.

Elles ont en gros les mêmes propriétés: lorsque les maux ont résisté aux eaux de la première fontaine, on a recours à celles de la fontaine d'Arras; mais il est difficile de les supporter seules, il y a même des gens à qui cela est impossible, on les coupe ordinairement avec celles du Bouillon, ou bien

12 MEMOTRES DE L'ACADEMIE ROYALE après avoir pris quelques verres de celles du Bouillon, on finit par celles d'Arras.

Elles paroissent ne pas convenir à ceux qui ont la poitrine affectée, ou qui sont d'ailleurs d'un tempérament délicat.

Source ferrugineuse.

Entre l'ancien bassin de la fontaine du Bouillon & le pavillon où elle est aujourd'hui, est une source d'eau serrugineuse qui a été découverte en 1720, on a trouvé en souillant la terre autour, des marcassites serrugineuses; aux bords de cette source la terre présente à la superficie une poudre jaune très-sine & semblable à de l'ocre, cette eau est froide & laisse en la buvant un goût de ser.

On la voit affez fouvent le matin couverte à sa surface d'une pellicule de couleur d'iris; cette pellicule enlevée avec une carte, y laisse en se desséchant une couleur d'or pâle qui

se dislipe peu à peu.

On en a fait bouillir, & elles ont laissé au fond du vaisseau

une terre extremement fine & jaunatre.

Mêlée avec la noix de galle elle donne sur le champ une couleur violette qui noircit peu à peu au même degré que la Reinette de Forges. Cette source est négligée, mais l'on espère qu'elle sera mise en état de servir aux malades qui n'ayant pas trouvé dans les deux sontaines d'eaux sussimire un remède propre aux maux d'obstructions, auroient recours à celle-ci où le mars domine essentiellement.

Boues minérales.

Près de la fontaine d'Arras sont des boues noires dont la vapeur sulfurente & l'odeur detagréable, temblable à celle des

œuss pourris, se répandent sort loin.

Le bassin qui les retient, est découvert, & comme l'on a présumé que le mélange des eaux de pluie avec ces boues devoit diminuer la torce de l'eau minerale dans laquelle estes sont délayées, on a tâché de les ramasser vers le centre du bassin qui est plus élevé que les bords; au moyen de quoi les eaux du ciel pénètrent peu les boues à cause de la pente qui les conduit aux bords du bassin, où elles trouvent une rigole circulaire trouée d'espace en espace pour les laisser échapper vers un puisard où elles vont se perdre.

Plusieurs Plantes aquatiques communes croissent sur les bords du bassin, & même sur les boues; j'y ai trouvé la Lenticula palustris vulgaris C. B. la Stellaria qua Lenticula palustris fruclu tetragono C. B. le Juncus palustris humilior ereclus J. R. H.

L'eau jaune qui tient ces boues dans une consistance de pâte claire, est vrai-semblablement la même que celle de la fontaine d'Arras, elle souffre les mêmes épreuves, & elle est probablement chargée des mêmes principes.

La matière en paroît très-fine, elle n'est point graveleuse

sous les doigts, mais assez douce.

Dans l'endroit où ces boues sont le plus liquides j'ai enfoncé de fort longues perches fans trouver de fond, & des malades qui s'y font plongez m'ont assuré que lorsqu'ils vouloient s'y enfoncer plus de la moitié du corps, ils se sentoient soûlevez & ramenez à la surface.

lls s'y tiennent comme ils peuvent, moyennant des chassis de bois quarrés, qui font des espèces de loges séparées pour chaque malade, & dont quelques-unes font convertes.

Pour éviter la diminution des boues autant qu'il est possible, on n'en laisse sur le corps des malades, lorsqu'ils en sortent. que le moins que l'on peut, & on en empêche absolument le transport; mais comme elles paroissent ne point diminuer du tout, je serois disposé à croire que quelque torrent soû-

terrain en apporte la matière au bassin.

Ces boues ne sont point chaudes, & un petit thermomètre de M. de Reaumur que j'y ai porté au fond d'un trou de 3 pieds de profondeur, y est resté pendant un quart d'heure sans que le mercure fist aucun mouvement : aussi eston obligé d'attendre les grandes chaleurs pour les employer; & je les croirois volontiers plus efficaces, si après les avoir échanices on les appliquoit en cataplasme, qu'en s'y plongeant comme l'on fait.

On sçait par une ancienne tradition établie dans le pays, que des Mineurs qui étoient employez à travailler à la fontaine du Bouillon, ayant cté commandez pour le fi de d'Ath, en revinrent affligez d'ulcères en différentes parties du corps. 14 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

& sur-tout aux jambes, & qu'après le siége ayant repris les travaux de la fontaine, ceux qui furent occupez au bassin

des boues y trouvèrent leur guérison.

Depuis ce temps-là elles font extrêmement vantées pour les maux de jambes, pour les foiblesses dans les membres, paralyties, tham thimes, telatiques, gontlemens dans les jointures, même les anchyloses; mais leur efficacité n'est en aucun cas si démontrée que dans les rétractions des tendons & des nerss à la suite des grandes blessures, & lorsque j'étois en Flandre j'en ai vû un exemple frappant dans un Hollandois qui étoit impotent d'une main depuis une blessure considérable qu'il y avoit reçue, & qui avoit recouvré la facilité des mouvemens.

On voit ailement par tout ce que j'ai dit dans ce Memoire, que les eaux & les boues de Saint Amand font fultureuses, mais comme les Eaux minerales doivent les principes dont elles sont chargées aux mines qu'elles traversent, il reste à deserminer d'où celles-ci tirent leur soulre; des i llexions sort simples m'ont porté à croire que c'est du charbon de terre.

Toute la Flandre est pleine de ce charbon, sur-tout aux environs de Valenciennes, Saint-Amand, Conde & Fresae où est cette pompe curieuse qui agit par le moyen du seu; par-tout la terre est ouverte pour en tirer le charbon sossille, communément appellé de la houille, & les grands chemins sont noircis des parties sînes de ce charbon qu'on voiture de tous côtés.

Ce charbon est une espèce de bitume sec, chargé de beaucoup de parties sulfureuses; je ne doute pas que nos eaux
& nos boues n'en tirent seur qualité médicinale. En comparant seurs esset avec les propriétés du bitume, on voit que
ce que rappontent les plus anciens Naturalisses de vertus du
bitume, s'accorde à merveille avec celles des boues de SaintAmand, pendant que les vertus des eaux reconnues sulfureuses & des eaux de Saint-Amand se rencontrent les mêmes;
c'est donc le bitume & le sousre sournis par le charbon de
terre qui paroissent être ici les principes dominans.

Mais ce que je n'avois faist d'abord que comme une conjecture, est devenu une démonstration par un moyen bien simple; j'ai imaginé de faire des boues artificielles avec du charbon de terre & de l'eau mèlez ensemble à la consistance des boues minérales, j'ai donné cette recette à plusieurs Chirurgiens des grands hópitaux de Flandre, je les ai engagez à l'estayer dans les maladies où ils auroient employé les boues de Saint-Amand, & j'ai eu la satisfaction de voir l'événement répondre à mes idées.

M. Giot Chirurgien de l'hôpital de Lille m'a envoyé depuis peu le détail de deux cures faites avec nos boues arti-

ficielles, dont voici le précis.

Une fille agée de 20 ans étoit incommodée depuis huit mois d'une tumeur accompagnée de vives douleurs dans la jointure du gros doigt du pied, aucun topique ne l'avoit foulagée, elle a été guérie en dix-fept jours en mettant le pied deux heures par jour dans les boues artificielles.

Un payfan étoit incommodé depuis long temps d'une anchylofe avec épanchement dans la jointure du genou à la fuite d'une chûte, des cataplasmes de charbon de terre l'ont

guéri en trois femaines.

Depuis que j'ai lû l'extrait de ce Mémoire à la féance publique, j'ai fait moi-même deux expériences, l'une fur un enfant qui avoit un gonflement avec anchylofe à l'articulation du coude, avec fistule à la suite d'une carie, & qui a été guéri en peu de temps par les boues artisticielles; l'autre sur un homme qui a été blessé à la main, dont les doigts sont restez roides, & qui a plus de facilité à les remuer depuis qu'il applique les boues.

Cette épreuve que je n'avois faite d'abord que par simple curiosité, est devenue, comme l'on voit, très-utile; elle nous donne le substitut des boues minérales sulfureuses qu'on emploie ordinairement comme une dernière ressource dans des maux dissiciles, elle établit un remède précieux par-tout où vient le charbon de terre & où l'on en porte, & nous donne lieu d'espérer des boues de Saint-Amand à peu de stais & sans

déplacer les malades.

16 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Cette idée m'a conduit à une autre qui n'est pas encore consirmée par l'expérience, mais qui est sondée sur une analogie raisonnable: les boues sulfureuses sont bonnes pour résoudre & amollir; dans les cas où il en faudroit de serrugineuses pour resserre & sortisser, je suis convaincu que nous en avons d'excellentes à Paris, on n'a qu'à lever les pavés des rues aux bords des ruisseaux, on trouvera abondamment sous ces pavés des boues noires chargées d'un ser très-assiné, que les pieds des chevaux & les roues des voitures laissent dans les rues; les taches que ces boues sont au drap d'écarlatte le prouvent de resse.

Au surplus j'espère avoir occasion d'éprouver les boues des rues dans des cas où elles me paroîtront indiquées, & j'aurai soin de communiquer mes expériences à l'Académie.

Voilà deux espèces de boues artificielles dont je donne volontiers le secret, & tout me porte à croire qu'elles s'accréditeront, à moins qu'elles n'ayent contr'elles d'être trop communes & trop faciles à acquerir. Il nous arrive souvent de touler aux pieds, & quelques ois sans le seavoir, des remedes puirlens auxquels it ne manqueroit pour avoir de la reputation, que de venir de bien soin & de coûter cher.



I .

DE L'ORBITE DE LA LUNE

DANS LE SYSTEME DE M. NEWTON.

Par M. CLAIRAUT.

k. 1.

LEMME FONDAMENTAL.

Upposant que les trois corps S, T, L, soient lancez avec des vitesses & des directions quelconques, que leurs masses soient aussi quelconques, & qu'elles s'attirent en raison réciproque du quarré des distances; on demande les sorces accélératrices qui agissen sur un de ces corps, L, par exemple, pour lui faire décrire la courbe qu'il décrit autour d'un autre, T, de ces corps.

Pour montrer bien clairement ce qu'on entend par la courbe que le corps décrit autour de T, foient E, ε deux étoiles placées dans un autre plan que celui des trois corps S, T, L, & supposées à une distance infinie de T, ce qui sait que les lignes TE, tE sont toûjours parallèles entr'elles, ainsi que $T\varepsilon$ & $t\varepsilon$.

Soient ensuite L & I les lieux où le corps L se trouve dans les mêmes instans où le corps T est en T & en t; si on transporte les angles ETL, Etl, εTL , εtl en

E'T'L', E'T'l', $\varepsilon'T'L'$, $\varepsilon'T'l'$,

en forte que ces derniers conservent la même position par rapport au plan $E'T'\varepsilon'$ que ses premiers par rapport au plan $ET\varepsilon$, la courbe L'I' sera celle que se corps L décrit autour du corps T.

Soient de plus Im, tu les petites droites égales à L1 & Mem. 1743.

18 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Fig. 3. à Tt que les corps L & T parcourroient dans le fecond inflant si les trois corps S, T, L, n'agissoient pas les uns sur les autres. Il est clair que si on prend la droite mq proportionnelle à $\frac{T}{It^*}$, ou, ce qui revient au même, à $\frac{T}{LT^*}$ la droite uo proportionnelle à $\frac{L}{LT^*}$, que s'on mène λq parallèle à sl, c'est-à-dire, à SL, & proportionnelle à $\frac{S}{LS^*}$, & ensin ub parallèle à ST & proportionnelle à $\frac{S}{LS^*}$, est clair, dis-je, que λ & θ seront les lieux où les corps L & I scront après le sécond instant dans l'espace absolu.

Soit maintenant menée tL' parallèle & égale à LT, soit custime prolongée L / jusqu'en i ou elle rencontre mi parallèle & eg de a th, & eu h = LL. De plus soit pris sur la droite it, i h = mq + qz + ou, λz étant parallèle à st ou à ST. Ensin soit mence $\lambda'h$ parallèle & eg de a χL , difference de λz à θo ; je dis que L'I & $I\lambda'$ feront les deux côtés consécutifs de la courbe décrite par L autour de T, pendant que les côtés LI & $I\lambda$ sont parcourus dans l'espace absolu.

Il est trop sacile de voir que L'l est le côté de la courbe décrite par L autour de T, pendant que Ll est parcouru dans l'espace absolu, pour qu'on s'arrête à le démontrer. Quant à ce que $l\lambda'$ est le second côté de la nœme courbe, pour s'en convaincre, il saut remarquer que ti est parallèle & égale à mu, & que hi étant par la construction, égale à $mq \rightarrow qz \rightarrow ou$, ht devient égale à zo ou $k\theta$. Or $h\lambda'$ étant aussi par la construction, égale & parallèle à λk , $\lambda't$ devient donc égale & parallèle à $\lambda \theta$, ou, ce qui revient au mème, $l\lambda'$ est le second côté de la courbe décrite autour de T.

Cela posé, en trouvera facilement les forces qui agissent sur le corps L dans la courbe apparente L'/λ' : il faut remarquer pour cela que puisque li = L'l seroit le côté parceuru par L si les forces des corps T & 3 magissoient par

DES SCIENCES.

fur lui, il faut que ih & ha' expriment les forces qui l'obligent de parcourir $l\lambda'$; il ne s'agit donc plus que de trouver la valeur de ces petites droites.

Il faut pour cela se servir des triangles semblables 297, STL, qui donnent $qz = \frac{\lambda q \times LT}{SL} = \frac{S}{SL^2} \times \frac{LT}{SL}$, & $\lambda z = \frac{\lambda q \times ST}{SI} = \frac{S}{SI^2} \times \frac{ST}{SI}$. Mais $kz = 0\theta = \frac{S}{ST^2}$, donc $h \lambda' = \lambda k = S \times \frac{ST}{SL^3} - \frac{S}{ST^2}$; & comme hi = mq + qz + uo, on aura donc pour sa valeur $\frac{T+L}{T^2} + \frac{S \times LT}{T^3}$

Ainsi pour trouver la courbe décrite par le corps L autour de T, il faut trouver seulement la position de son premier côté & la valeur de la vîtesse du corps L à ce point. ensuite regarder le corps L comme sollicité continuellement par deux forces, l'une poussant vers T & exprimée par $\frac{T+L}{LT^2} + \frac{S \times LT}{SL^3}$, l'autre tirant parallèlement à $TS \lesssim$ exprimée par $\frac{S \times ST}{SL^3} = \frac{S}{ST^2}$.

. II.

DÉTERMINATION DE L'ORBITE DE LA LUNE. en supposant que son excentricité soit nulle ou extrêmement petite.

Soient S le Soleil, T la Terre, L la Lune, Q la position Fig. 4. de la Lune dans la quadrature, QLO la partie de l'orbite de la Lune, comprise entre la quadrature & l'opposition, la Lune allant de Q vers L, tandis que le Soleil paroit aller de V vers S.

Comme ST est extrêmement grand par rapport à TL, on pourra mettre à la place des deux forces qui agissent sur

20 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE la Lune, suivant le Lemme précédent, Fig. 4.

$$\frac{T+L}{LT^1} + \frac{S \times LT}{ST^3} & \frac{3S \times HL}{ST^3},$$

HL étant une parallèle à TS, terminée par la droite TH

TAL CHILL HILL PRIMITED IN I CO, TOTALINE PAR IN CITY A
qui lui est perpendiculaire.
Cela posé, soient nommées
la masse du Soleil
In fomme des mattes $T \& L \ldots r$,
la distance ST supposée constante
la diffance $TQ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot p$,
le rapport des révolutions synodiques & pério-
diques de la Lune
Ie finus de l'angle $HTL \dots \dots$
le quarré de la vîtesse de la Lune en $Q \cdot \cdot \cdot \cdot \frac{1+r}{r}$
y étant une quantité très-petite & du même ordre que la dissérence qui doit être entre les distances de la Lune aux quadratures & aux syzygies,
In diffunce $TQ \dots p(1-p)$

La vîtesse de la Lune en L v.

On aura pour les deux forces précédentes qui agissent Suivant LH & LT.

$$\frac{3 \frac{rr}{s}}{a^3}$$
 & $\frac{r}{pp(1-o)^4} + \frac{pm(1-p)}{a^3}$ ou $\frac{r(1+2p)}{pp} + \frac{pm}{a^3}$, en négligeant les quantités de l'ordre de p^2 .

Décomposant présentement ces deux sorces suivant L1, on aura pour la partie de la force tangentielle produite par In force LH, $\frac{3mps V(1-s^2)}{s^3}$, regardant en cette occasion, à cause de la petitesse de la force LH, l'arc LI comme perpendiculaire à TL. On aura ensuite pour la partie de la force tangentielle produite par la force LT timplement, $\frac{7}{PP} \times \frac{P^d p}{dz}$ à cause que la petitesse de la différence de Fig. 4.

Pangle ILT à un angle droit fait évanouir les termes $\frac{z \, \rho \, r}{PP} \, \& \, \frac{P^m}{a^3}$. On aura donc par le principe ordinaire des forces accélératrices,

$$\left(\frac{3mps\sqrt{(1-ss)}}{a^3} + \frac{r}{p} \times \frac{d\rho}{dz}\right) dz = vdz.$$

Mais il est clair, à cause que le mouvement de la Lune diffère peu par la supposition de l'uniforme, qu'on pourra supposer l'angle QIL dans la même raison à l'angle IIL que le temps synodique est au temps périodique; donc on sera le maître de supposer $dz = \frac{n_P ds}{\sqrt{1-ss}}$. Or substituant cette valeur de z dans l'équation précédente, on aura $\frac{3PPmnsds}{a^3} + \frac{rd\rho}{p} = vdv$; d'où l'on tirera en intégrant $\frac{3PPmnsds}{a^3} + \frac{rd\rho}{p} = vdv$; d'où l'on tirera en intégrant $\frac{r}{r} = \frac{r}{l} \left(1 + \gamma - 1 - \frac{3mnp^3ss}{ra^3} + 2\rho\right)$, & cette quantifé divise par la torce normale devra exprimer le rayon de sa développée de l'Orbite cherchée en L.

Or à cause que l'angle TLI diffère infiniment peu d'un droit, & que la force HL est infiniment petite, il est clair que la force normale ne différera que d'un infiniment petit du second ordre de la force totale qui pousse L vers T, Laquelle force est exprimée par $\frac{T+L}{IT^2}+\frac{3LLT}{3D}-\frac{3LLLS}{3T^2+1T^2}$ le troissème terme de cette expression étant la force HL décomposée suivant LT.

Mettant cette expression en valeurs analytiques, on aura

$$\frac{r}{pp} + \frac{2r\rho}{pp} + \frac{mp}{a^3} - \frac{3mpss}{a^3},$$
ou $\frac{r}{10} / 1 - \frac{3p^3mss}{a^3} + \frac{mp^3}{ra^3} + 2\rho$, par laquelle.

22 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE divisant la valeur précédente de vv, on aura

 $p(1-\gamma + \frac{3m(n+1)p^3ss}{ra^3} - \frac{mp^2}{a^3})$ pour exprimer

le rayon de la développée en L. Il ne s'agit plus que de conflruire la courbe par une telle condition, ce qui se fera en cette sorte.

Ayant nommé a la fraction exprimée par $-\frac{3 m n \pi (n+1) p^3}{r a^3 (4-n \pi)}$

& mené une perpendiculaire à la direction donnée Q q de l'orbite en Q, on prendra sur cette perpendiculaire la droite

 $Qt = QT(t + \frac{2\alpha}{nn} - \alpha + \gamma - \frac{mp^3}{ra^3})$, ensuite on

decrira l'ellipse $Q \lambda \omega$ dont les axes Qt, $t\omega$ soient entreux dans le rapport de 1 à 1 — α . Cela fait, il ne faudra plus que prendre les angles QTL aux angles $QT\lambda$ dans la raison de n à 1, & les rayons $TL = T\lambda$ pour décrire l'orbite QL de la Lune.

Si on veut, ainti que M. Newton, confidérer l'orbite de la Lune fans excentricité, il faut supposer d'abord la direction Q_T perpendiculaire à Q_T , ensuite rendre la vitesse en Q_T telle que la petite distance Q_T soit égale à la plus grande TQ_T ,

ce qui arrivera lorsque $\gamma = \alpha - \frac{2\alpha}{nn} + \frac{mp^3}{ra^3}$. On trouvera alors pour le rapport des axes, celui de

I à I $\frac{3 m n n (n+1) p^3}{r a^3 (+-n n)}$,

qui, en faisant les subilitations nécessaires, s'accorde avec le rapport de 70 à 69, donné par M. Newton.

Si on nomme avec M. Machin (The laws of the meons motion, p. 11 & 12)

L la révolution périodique de la Lune,

M sa révolution synodique,

S la révolution périodique du Soleil,

D la différence des périodes du Soleil & de la Lune; on aura pour la différence des deux axes de l'orbite de la

Lune lorsqu'elle n'a pas d'excentricité, c'est-à-dire, pour le quantité α , $\frac{3L(M+L)}{4DD-3S}$, ce qui s'accorde avec ce que M. Machin a dit devoir résulter de la methode de M. Newton, mais nullement avec ce qui résulte de la méthode de M. Machin.

Pour faire la réduction de $\frac{3mn^2(n+1)p^3}{ra^2+nn}$ en $\frac{3L(M+L)}{4DD-33}$, il faut remarquer que $\frac{mp^3}{ra^2} = \frac{LL}{33}$, & que $n = \frac{S}{D} = \frac{M}{L}$.

S. III. REMARQUE

Sur la Courbe qui, fuivant M. Machin (The laws of the moo'ns motion) est décrite par la Lune.

Soient T la Terre, & AD le cercle que décriroit la Fig. ℓ . Lune si elle n'avoit pas d'autre gravité que celle qui la pousse vers la Terre, & qu'elle n'eût pas d'excentricité. Soit QNL une petite ellipse dont le petit axe QA soit soudouble du grand AL: on suppose que pendant que le point A marche uniformement dans le cercle AD, le point Q marche vers M dans l'ellipse QL. & parcourt l'aire QBM proportionnellement au temps, c'est-à-dire, en telle sorte que le secleur QBM est à QBL comme le secleur ABT au quart-de-cercle.

QA est pris à AT dans la raison doublée du temps périodique de la Lune autour de la Terre, au temps périodique de la L'erre autour du Soleil, ID prolongée est supposée la droite qui joint les centres du Soleil & de la Terre. Suivant M. Machin, la courbe QIN décrite par ce mouvement d'épicycle est l'orbite de la Lune autour de la Terre, pourvû qu'on supposée que cette orbite n'eut point d'excentricité indépendante de la force du Soleil, que le plan de son écliptique sût le même que celui de la Terre, & que le Soleil restat à la même place pendant une revolution entière de la Lune.

24 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROTALE

En examinant ce que M. Machin dit pag. 8 & 9, but fonce the real, &c. jusqu'à and this when considered, will require a motion in a small ellipsis, in the manner here described, & dans les pages 68 & 69, as to the motion of the moon, &c. Je crois

que son raisonnement a été celui-ci.

Suivant M. Newton, les forces qui agissent en un point quelconque N de l'orbite de la Lune, sont l'une l'attraction de la l'erre, l'autre l'attraction de la l'erre, l'autre l'attraction de l'a l'erre l'autre l'attraction de la l'erre l'autre l'attraction de la l'erre l'autre l'attraction de la l'erre la disserce des attractions que le Soleil exerce sur la Terre & sur la Lune, la puelle différence agit suivant NU Solon M. Newton encore, la seconde de ces forces est à la troissème comme NT à 3 TK. Cela posé, soit pris BT pour exprimer la gravité de la Lune vers la Terre, & la droite constante BV pour la sorce du Soleil de composé de NU suivant NO : Leaule de la petitesse de l'angle BTN & de celle de la droite BV, on pourra sant erreur sentible prendre a l'Est plus l'Est pur l'Est portionnelle à 3 TK, c'est-à-dire, à la force du Soleil qui agit suivant NV pour troubler les mouvemens de la Lune.

D'où il suit que les deux forces qui agissent sur N & qui viennent toutes les deux du Soleil, seront l'une NO, & l'autre une droite placée sur NW & égale à 3 VW. Or, qu'on suppose qu'on eût pris N sur une ellipse QNL dont les axes fussent l'un BQ égal à BV, l'autre BL double de BV, & mion on the interference of the land of th il est clair que NV seroit égal à 3 NW; donc la diagonale NB exprimeroit alors la force équivalente aux deux forces produites par le Soleil: mais une force qui pousse vers un centre B & qui est proportionnelle à la distance BN, seroit décrire une ellipse dont B seroit le centre, dans le même temps que le cercle seroit achevé par un corps B poussé par une force proportionnelle à BT; donc le mouvement d'épicycle dont on vient de parler, peut être regardé comme produit par les trois forces qui agissent sur la Lune, en sorte qu'on peut regarder la Lune, non comme le satellite de la Terre, mais comme celui d'une autre Planète supposée en B, vers lequel

elle

elle seroit poussée par une sorce proportionnelle à B.V, pendant que cette Planète B seroit poussée vers T par une force constante égale à B.T.

Si j'ai suivi le sens de M. Machin, il est aisé de saire voir présentement qu'il se trompe, car il saudroit pour qu'il eût raison, qu'on pût regarder la force de la Terre qui agit sur la Lune & sur la Planète B dont elle seroit un satellite, comme exprimée par deux droites parallèles & égales; mais cela ne sçauroit se supposer, car la différence de ces deux forces suivant BT seroit, par la méthode de M. Newton, proportionnelle à 3 BX: or BX est en raison sinie avec BN, & ne peut pas par conséquent être négligé; donc le corps N ne scauroit décrire une ellipse autour de la Planète supposée en B.

Quant à ce que M. Machin dit (page 9) que la différence des axes TQ, TL de l'orbite est à la somme de ces axes, comme 3LL à 2SS-LL, cela se tire très-facilement de la manière dont je viens d'exposer sa solution; il sussit pour cela de faire voir qu'il suit de cette solution, que 3BQ ou 3BV est à 2BT-BQ comme 3LL est à 2SS-LL.

Soient, dans cette vûe, nommées m la masse du Soleis, r celle de la Terre, p le rayon BT, a celui de l'orbite du Soleis, on aura $\frac{mp}{a^3}$ pour exprimer la force BV, on aura de même $\frac{r}{pp}$ pour la force NT de la Lune vers la Terre; donc $BV:BT = \frac{mp^3}{ra^3}: 1 = \frac{LL}{SS}: 1$, qui donne 3VB: 2BT - BV = 3LL: 2SS - LL.

Il est à remarquer que la courbe QINL décrite par l'épicycle de M. Machin doit être une ellipse, car en abaissant NK perpendiculaire à DK, on verra airement que BO est à NK en raison constante, aussi-bien que GT à GK. Ainst M. Machin auroit pû donner à sa courbe une description beaucoup plus facile.

. I V.

DE LA VARIATION DE LA LUNE.

Pour trouver la différence du temps vrai au temps moyen dans l'orbite de la Lune supposée sans excentricite, ou, ce qui revient au même, pour trouver la variation de la Lune, on s'y prendra de la manière suivante.

Fig. 8. Du $^{\circ}$. Il il fuit que la viteffe en un point quelconque L est

$$v = \left(1 + \frac{1}{2}\gamma + \frac{3mnp^3s^2}{2ra^3} + s^2\alpha\right)V\frac{r}{p},$$

ce qui donne pour la vîtesse angulaire en L,

$$y = \left(1 + \frac{1}{2}\gamma + \frac{3mnp^3ss}{2ra!} + 2\alpha s^2\right)V\frac{r}{p!}$$

ou en faisant $\frac{3mnp^3}{2r} = \varepsilon$,

$$r = \left[1 + \frac{1}{2}\gamma + \frac{1}{3} + 2\alpha + 3\right]V_{\frac{1}{7}}.$$

& pour la vîtesse moyenne qui arrive aux octans,

$$f = \left[1 + \frac{1}{2} \gamma + \frac{1}{2} (\beta - + \alpha) \right] V_{j}^{r},$$

qui montre que la vitesse 'angulaire quelconque 1 est exprimée à l'égard de la vîtesse moyenne par

$$v = f\left[1 - \frac{1}{2}\beta - \alpha + (\beta + 2\alpha)ss\right];$$

d'où l'on a pour le temps à parcourir L1,

$$dt = \frac{\pi ds}{V(1-ss) \times f[1-\frac{1}{2}\beta-\alpha+(\beta+2\alpha)ss]}$$

ou
$$dt = \frac{r ds}{f \sqrt{1 - s \cdot t}} \left[1 + \frac{1}{2}\beta + \alpha - (\beta + 2\alpha) s s \right],$$

dont l'intégrale est

$$t = \frac{\pi}{f} \int \frac{ds}{\sqrt{1-ss}} + \frac{\pi}{2f} (\beta + 2\alpha) s \sqrt{1-ss},$$

qui apprend que le temps total, c'est-à-dire, la révolution synodique $M = \frac{\pi}{l}$, qui donne pour l'angle répondant

au mouvement moyen,

F 7. 3.

$$\frac{ncs}{M} = n \int \frac{ds}{\sqrt{1-ss}} + \frac{\pi}{2} (\beta + 2\alpha) s \sqrt{1-ss},$$

& par conséquent pour la correction ou variation,

$$n\left(\frac{1}{2}\beta + \alpha\right) s V(1 - s s).$$

Si on veut comparer cette expression avec ce que donne M. Newton pour la variation de la Lune, il faut faire $\frac{s}{y(1-ss)} = x$, x étant alors la tangente de l'angle LTH, & l'on aura pour la variation $(\frac{1}{2}\beta - \alpha) - \frac{\pi x}{2}$, c'est-àdire, n multiplié par la différence entre l'angle LTH & l'angle dont la tangente seroit $x \rightarrow (\frac{1}{2}\beta \rightarrow \alpha) \lambda$, ce qui s'accorde avec ce que dit M. Newton; car $1 + \frac{1}{2}\beta$ répond à la moyenne proportionnelle entre 10973 & 11073.

6. V.

& I - a au rapport de 70 à 79.

DU MOUVEMENT DES NŒUDS DE LA LUNE.

PROBL. I. E'tant données les situations du Solcil, de la Lune & du Næud, trouver la vîtesse du Næud.

Soient Q le lieu de la Lune dans sa quadrature, L son Fig. 9. lieu dans un temps quelconque, S celui du Soleil dans le même moment, LH une parallèle à ST terminée par la droite TH qui fui est perpendiculaire, 1k une paraffèle à ST & proportionnelle à la force du Soleil, c'est-à-dire, égale à l'espace que cette force feroit parcourir pendant l'instant dt que la Lune met à aller de L en 1, LN le prolongement de Ll terminé par le plan de l'écliptique, Lnle prolongement de Lk terminé par le même plan. En tirant les droites TN, Tn, l'angle NTn exprimera le mouvement du Nœud pendant l'instant dt.

Gardant les mêmes dénominations que dans les s. précédens, & remarquant que la différence des plans des éclip-Dii

28 Memoires de l'Academie Royale

tiques de la l'une et da Solcil ne reauroit changer fenfiblement la valeur de la force du Soleil suivant LH, on aura toûjours pour cette force $\frac{3m \times LH}{a^3}$, ou $3gg \times LH$ en nommant et la vitesse angulaire du Solcil, ce qui donnera $lk = 3gg \times LH \times dt^2$.

Prefentement les triangles semblables N*L, LM donnent $Nn = \frac{LN \times lk}{Ll}$, & les triangles Nnh, AZT donnent $Nh = \frac{AZ}{AT} \times Nn$, c'est-à-dire, $\frac{LN \times lk \times AZ}{Ll \times AT}$;

donc $\frac{Nh}{TN \times dt}$ qui exprime la vîtesse du Nœud, aura pour valeur $\frac{LN}{TN} \times \frac{lk}{Ll} \times \frac{AZ}{AT \times dt}$, dans laquelle mettant pour lk sa valeur $3gg \times LH \times dt^2$, pour Ll sa valeur $v \times TL \times dt$ (v étant la vîtesse angulaire de la Lune en L), on aura ensin pour la vîtesse du Nœud,

$$\frac{388}{r} \left(\frac{LN}{TN} \times \frac{AZ}{AT} \times \frac{LH}{LT} \right),$$

ou $\frac{355}{\nu}$ (fin. $LTN \times \text{fin. } ATZ \times \text{fin. } LTH$),

à cause que TLN différant très-peu d'un angle droit $\frac{LN}{TN}$ est sans erreur sensible le sinus de LTN.

Si on nomme q le finus de ATZ, & h fon cofinus, cette expression sera

 $\frac{388}{r}$ [qqss + hqsV(1-ss)] tant que la Lune fera entre Q & A, & le Nœud ira contre l'ordre des fignes.

Quand la Lune sera entre $A \& \tilde{n}$, le Nœud sera encore récrograde, & sa vîtesse sera $\frac{388}{b}$ [qqss-hqsV(1-ss)],

F; 11. Et lorsque la Lane sera entre à & q, sa vitesse sera directe

& exprimée par $\frac{3EE}{\nu}$ [hqs $V(1-ss)-q^2s^2$].

Quant aux positions de la Lune dans l'autre moitié de fon orbe, elles donneront les mêmes mouvemens au nœud que celles qui sont diamétralement opposées.

Prob. II. Une position quelconque du Nœud étant donnée, trouver en regardant le Solcil & le Nœud comme fixes pendant une lunaison, la vîtesse du nœud moyenne entre toutes celles qu'il auroit à chaque lieu de la Lune; ou, pour se servir des termes de M. Newton, trouver la vîtesse médiocre des nœuds de la Lune pour cette position du nœud.

Multipliant l'expression précédente de la vîtesse du nœud Fig. 12. par dt ou $\frac{nds}{v\sqrt{(1-ss)}}$, on aura pour $d\varepsilon$ ou l'espace parcouru par le nœud tant que la Lune sera en quelque sieu L placé entre Q & A,

$$\frac{3gg}{r} \left[qqss + hqs \sqrt{(1-ss)} \right] \frac{\pi ds}{\sqrt{(1-ss)}},$$

& forsqu'elle sera en un autre lieu L' placé par-delà A à la même distance que L, cette expression sera

$$\frac{388}{vv} \left[qqss - hqsV(1-ss) \right] \frac{nds}{V(1-ss)}.$$

foit que L' foit avant \bar{n} , ou qu'il foit après.

Donc la somme de ces deux de sera

Si on met ensuite dans cette expression à la place de $\nu\nu$ sa valeur qu'on trouve être $f(1-\lambda-1-2\lambda ss)$ en faisant $2\alpha-1-\beta=\lambda$, on aura

$$\frac{6ggn}{ff} \left(1 + \lambda - 2\lambda ss\right) \frac{q^{s}s^{2}ds}{r(1-ss)},$$

dont l'intégrale, lorsque s == 1, est

30 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROTALE

$$\frac{368}{ff} \left(\frac{99}{2}\right) \left(\frac{1}{2}nc - \frac{1}{4}n\lambda c\right),$$

& exprime le quart de la rétrogradation du nœud pendant la lunaison.

Divitint donc le quadruple de cette expression par le temps $\frac{\pi c}{f}$ de la lunaison, on aura

 $\frac{388}{f} \times \frac{11}{z} \left(1 - \frac{1}{z}\lambda\right)$ pour la vîtesse médiocre du nœud, ce qui s'accorde avec M. Newton.

Prob. III. Trouver la vîtesse du nœud moyenne entre toutes ses vîtesses médiocres; ou, pour se servir des termes de M. Newton, trouver le mouvement moyen des nœuds.

Fig. 13. Que C foit le lieu où le Soleil & le nœud ont été en conjonction, A le lieu du Soleil au bout d'un temps t. & \hbar le lieu correspondant du nœud, on aura par la proposition précédente, en faisant $k = \frac{3\pi^{\frac{3}{2}}}{2\pi} \left(1 - \frac{1}{2}\lambda\right)$, la quantite $k \neq 1$ pour exprimer la vîtesse médiocre du nœud.

Donc le petit espace $\bar{n}n$ décrit par le nœud pendant un instant dt sera kj dt, pendant que celui qui est parcouru par le Soleil, c'est-à-dire, Aa = gdt. Et comme la vitesse mediocre du nœud est toujours rétrograde, la dissérence dQ ou $\frac{d}{dt}$ de l'arc $A\bar{n}$ compris entre le Soleil & le nœud, sera $gdt + kq^2 dt$, ce qui donnera pour Aa ou gdt ou dZ, la valeur $\frac{gdq}{(g+kq^2)\times V(v-qq)}$, dans l'intégrale de laquelle faisant $q\equiv v$, on aura le temps que le Soleil & le nœud emploient entre leur conjonction & leur qu'il tare, c'est à-dire, le quart d'une revolution du Soleil au nœud.

Pour intégrer cette quantité, soit sait 1 (1-99), ou

In tangente de l'angle ATN = u, & la différentielle se Fig. 13.

transformera en $\frac{gdy}{E + (E + E)xy}$, dont l'intégrale est

$$Z = V(\frac{g}{g+k}) \times AT^* \frac{y\sqrt{(g+k)}}{\sqrt{g}},$$

dans laquelle faifant $y = \infty$, c'est-à-dire, q = 1, on a pour la quantité que Z devient alors $\frac{1}{4} c \times V(\frac{s}{s+\lambda})$. dont le quadruple $c V(\frac{s}{s+\lambda})$ exprime l'arc décrit par le Soleil pendant une révolution du Soleil au nœud.

Donc si \bar{n}' exprime le lieu du nœud trouvé par le mouvement moyen, & que Q' exprime l'arc $A\bar{n}'$, on aura $Z:Q'=c\,V(\frac{g}{g+k}):c$, c'est-à-dire, $Q'=Z\,V(\frac{k+g}{g})$, quantité qui est moyenne proportionnelle entre Z & $Z(\frac{g+k}{g})$, c'est-à-dire, moyenne proportionnelle entre le mouvement moyen du Soleil & le mouvement du Soleil au nœud dans les quadratures, ce qui est le premier des deux théorèmes de M. Machin, qui sont insérez dans la troissème édition des Princip. Math. Phil. Natur.

Connoissant l'arc que le Soleil décrit pendant une révolution du Soleil au nœud, on n'aura qu'à prendre la quatrième proportionnelle à cet arc, sa dissérence à 3 60 degrés, & cette quatrième proportionnelle sera le mouvement moyen en un an.

PROB. IV. Trouver le mouvement moyen des Næuds.

Soit reprise l'équation


$$Z = V(\frac{g}{g+k}) \times AT \times \frac{3\sqrt{g+k}}{g},$$

* Une expression précédée des lettres AT des gre l'angle dont la tangente est cette quantité.

32 Memoires de l'Academie Royale Fig. 13. on en tirera

$$y = V(\frac{g}{g+k}) \times tang. \ Z \ V(\frac{g+k}{g}),$$
on $y = V(\frac{g}{g+k}) \times tang. \ Q'.$

Q étant, comme on vient de le dire, l'arc compris entre le Soleil & le nœud, trouvé par le mouvement moyen du nœud. Donc la tangente de l'angle vrai entre le Soleil & le nœud est à la tangente de cet angle trouvé par le mouvement moyen du nœud, en raison soûdoublée de la vîtesse da Soleil à la vitesse avec laquelle le Soleil s'éloigne du nœud dans les quadratures, ce qui est le second theoreme de M. Machin.



DIFFE'RENS MOYENS

. De rendre le Bleu de Prusse plus solide à l'air, & plus facile à préparer.

Par M. GEOFFROY.

PEU mon frère donna à l'Académie en 1725, deux Mémoires sur le Bleu de Penge 1 Mémoires sur le Bleu de Prusse, dans lesquels il a éclairci, autant qu'il lui étoit possible alors, tout ce qui pouvoit être regardé comme la théorie de cette opération. Il sembloit cependant qu'il lui manquoit encore quelque chofe, puisqu'il dit à la fin du second Mémoire*, qu'il auroit d'autres opé- * p. 237. rations à rapporter sur cette préparation & sur les disférentes natures des Bleus qu'elle fournit, mais qu'il les réserve pour un autre Mémoire. J'aurois été charmé de publier ce Mémoire posthume, si on l'eût trouvé dans ses papiers: comme il n'en a rien laissé par écrit, il est à présumer qu'il ne l'avoit que projeté, que des occupations d'un autre genre qui l'ont détourné de ce travail pendant quatre à cinq années, & qui ont été suivies de la longue maladie dont il est mort, nous ont privez de ce qu'on desiroit de sui sur cette matière.

Cette couleur est devenue un objet de commerce depuis que le gout des Vernis dans les appartemens, des Camayeux sur les carroffes, & plufieurs autres raisons de l'employer se sont extrêmement multipliées. Pour éviter qu'on n'en tire trop de l'Etranger, j'ai cru devoir reprendre cette matière. l'examiner de nouveau, tenter d'en perfectionner la couleur. en rendre la préparation plus facile & faire en forte d'en diminuer le prix; c'est l'objet de ce Memoire qui servira de supplément à ceux de mon frère, s'il en est juge digne par

la Compagnie.

Les principales circonstances de l'opération qui donne cette couleur, pouvant n'être pas acluellement présentes à Mem. 1743.

34 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

plusieurs de ceux qui liront ce Memoire, je me crois obligé

de les exposer de nouveau.

On fait d'abord un nitre fixé par le tartre, à ce nitre alkalife on unit par le feu la partie fulfureuse du sang de becuf en faisant calciner ce sang see & en poudre avec le nitre. aussi-tôt qu'il a cessé de sulminer; ce mélange étant sussifamment calciné & ne donnant presque plus de flamme, on le verse dans un mortier chaud, pour l'y concasser grossièrement; on fait tomber cette poudre grossière & encore trèschaude dans de l'eau bouillante pour en faire une lessive; on fait diffoudre separément du vitriol serrugineux dans de f'em de pluie, on tiltre cette diffolition: on fait diffoudre dans un autre vaitieau de l'alun net & cryflallin, puis dans cette ditiolution actuellement bouillante on verse celle du vitriol qu'en a fait chautier jusqu'a bouillir. Ces deux diffolations étant bien melces, on les survuide dans une grande terrine, & on y ajoûte peu à peu la liqueur ou lessive alkaline & fulfureuse du nitre fixé, calcine avec le sang de beens; ce melange fermente, devient moins fluide, s'eptiffit & prend une couleur de vert de montagne: la fermentation étant passée, on verse le tout sur un filtre afin d'en séparer ce qui rette en liqueur, & de retenir sur le filtre la secule qui s'est formée pendant la fermentation; on enlève cette fécule avec une spatule de bois, on la met dans une terrine, & l'on verse desius de bon esprit de sel, qui en change sur le champ la couleur verdâtre en un très-beau bleu si l'opération est bien faite: on lave a pluticur- sois ce migistère devenu bleu, pour en oter toute impression faline, & on le fait techer à l'ombre; c'est alors qu'il est preparé, & que les Peintres n'ont plus qu'à l'employer.

Il est aisé d'apercevoir en réstéchissant un peu sur cette optration, que l'alkali considere d'abord comme seul & nud, precipite la terre de l'alun & le ser du viuiol; sans le sousse animal qu'on a uni par la calcination à ce sel alkali sixe, on n'auroit qu'une espèce de crocus martis, dont la teinte jaune ordinairement assez soncce, seroit delayce ou assoible par la

blancheur de la terre de l'alun, par conséquent on n'en retireroit qu'une fécule d'un jaune pale; mais le principe sulfureux qui s'est uni à cet alkali pendant sa calcination avec se fang, l'a rendu propre à revivitier en véritable fer les parties les plus subtiles de ce métal, qui s'appliquent sur des particules blanches de la terre de l'alun, en font autant de molécules terreuses recouvertes d'une couche métallique qui paroitroit noire si elle étoit trop épaisse ou composée de trop de parties de fer, parce qu'elle absorberoit tous les rayons de la lumière: cette fécule, immédiatement après sa séparation, paroît verdâtre, parce qu'elle est encore unie à des parties de terre martiale dont le métal n'est pas, ou n'a pû être revivisié, & qui reste sous la forme & couleur de crocus: on verse dessus de l'esprit de sel, cet acide dissolvant d'abord la terre martiale & alumineuse, peut être enlevé à temps avec elle, & laisser net le mars revivifié sur la terre de l'alun dont les surfaces se trouvent alors disposées de telle sorte qu'elles réfléchissent les rayons bleus.

Je suis tenté ici d'adopter le sentiment d'un Auteur trèsconnu par la singularité de ses ouvrages, on sçait qu'il pense
que le noir le plus noir n'est que le bleu le plus soncé.
L'opération du Bleu de Prusse & celle de la teinture des
draps noirs semblent justissier ce sentiment. Pour faire un
drap d'un noir très-soncé on le passe à plusieurs reprises dans
une cuve de passel, jusqu'à ce qu'il ait pris cette nuance que
ses Teinturiers appellent bleu d'enser, qui est un bleu presque
noir; on l'engalle ensuite avec le sumach qui est un astringent
précipitant, puis on le passe à plusieurs sois dans une dissolution de vitriol. Ainsi puisque c'est le ser qui sournit le bleu
au Bleu de Prusse, il s'ensuit que dans la teinture ce sont des
parties accumulées de ce bleu métallique qu'on applique sur

le premier bleu extrait d'un végétal.

Si l'esprit de sel séjournoit long-temps sur la sécule précipitée, il dissoudroit le bleu lui-même après avoir dissous la terre jaune qui verdissoit ce bleu, c'est pour cela que j'ai dit ci-dessus qu'il falloit l'en retirer à temps. J'aurois dû sixer ce temps, ainfi que la quantité de cet acide, mais il est presque impossible de trouver sur cela le véritable terme de l'exactitude: il y a des vitriols qui rendent plus de terre jaune les uns que les autres, comme il y a des esprits de sel de dissérente acidité; ce sont ces différences, qu'on ne sçauroit toûjours prévoir, qui sont cause que quoique les circonstances paroiflent les mêmes dans plufieurs opérations, il arrive presque toûjours qu'en répétant dix sois le même procédé on a cependant dix bleus de nuances différentes. De plus, quelques lotions qu'on donne à cette fécule bleue pour en entever facide, on fent been qu'il est prefqu'impossible qu'il n'en reste quelques parties unies aux parties métalliques; cet acide restant peut continuer d'agir sur le métal, quoique d'une manière très-lente, & il arrive que cette couleur étant employée & se trouvant exposée à l'air, la petite portion d'acide prend de l'humidité, agit comme dissolvant & convertit de nouveau le fer ressuscité en crocus. Aussi voit-on que la plûpart des perspectives dont le ciel a été peint avec le Bleade Prutie, ted me fint, & que tomes les parties bleues jaunissent très-vîte, à moins qu'elles ne soient désendues pendant quelque temps par plufieurs couches de vernis.

J'ai cru qu'on pourroit éviter cette défectuosité dans le Bleu de Prusse, si l'on pouvoit trouver le moyen de l'avoir d'un beau bleu sans se servir d'aucune siqueur dissolvante ou acide. A force de faire des essais dont je supprimerai plusieurs détails, je suis parvenu à ce que je m'étois proposé, c'est-à-dire, à trouver un alkali qui, rendu sussureux par une matière animale, donne avec le vitriol & l'alun un bleu aussi beau qu'on le veut, sans être avivé par aucun acide, & j'ose espérer de l'expérience qu'en feront les Peintres, qu'il ne détruira pas ses couleurs qui en seront voisines, ou qu'ils auront mêlées avec lui, comme les autres Bleus de Prusse préparez par les méthodes ordinaires. Mon opération, pendant qu'elle se sait, donne encore d'autres phénomènes toûjours variez, toûjours nouveaux, & rarement inutiles à quiconque sera en état d'en saire usage, & n'eût-elle que cet avantage, je

n'aurois pas dû en priver les Dessinateurs employez aux Manusactures de nos étosses de soie.

J'ai dit plus haut, qu'outre la beauté du bleu je cherchois la facilité de l'opération & le moyen de diminuer le prix de cette couleur: ce fera remplir ce troisième objet que de multiplier les méthodes ordinaires, & de mettre un plus grand nombre de perfonnes en état de faire cette opération en leur en communiquant les principaux procédés déja connus dans les pays étrangers, où, à la vérité, ils ne varient guère que par les doses.

Suivant l'ancien procédé d'Angleterre, on fait fulminer 4 onces de nitre avec 4 onces de tartre rouge, on fait calciner avec ce nitre alkalisé 4 onces de sang de bœuf desséché, on en fait la lessive que l'on verse sur une dissolution de 8 onces d'alun & d'une once de vitriol calciné en blanc, puis on avive

la fécule avec 2 onces d'esprit de sel.

Le Bleu de Prusse se fait à présent à Berlin dans les mêmes proportions, toute la différence est qu'on verse l'esprit de sel au moment de la précipitation du melange des trois siqueurs, sans attendre que la sécule soit déposée, comme on le fait

en Angleterre.

Le procédé qui suit, sournit un bleu qu'on a rarement beau; on sait sulminer une livre de nitre avec autant de tartre rouge; après la détonation il reste une livre de sel fixe à laquelle on joint une livre de sang de bœuf que s'on mêle avec ce sel aussi-tôt que la détonation est finie, & pendant que ce sel est encore en susion, on remue ces matières, asin que le mélange en soit plus parsait. On laisse resroidir cette masse, on la pulvérise & on la remet au creuset pour la calciner pendant quelques heures à un seu assez vis; quand elle est en pleine susion, on la coule sur des plaques, & lorsqu'elle est sigée on la jette dans 12 livres d'eau bouillante, on en coule la lessive, on y mêle la dissolution de 2 livres d'alun saite dans 18 livres d'eau, & celle de 3 onces de vitriol calciné à blancheur dans 6 livres d'eau; du mélange de ces deux s'aqueurs il se precipite une secule bleue. Comme on no

S MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

veut pas employer d'acide dans cette opération, il faut diminuer la dose du vitriol pour avoir moins de terre jaune dans le précipité; mais ce bleu n'est pas pur, il a toûjours une nuance verdâtre.

Dans la recette suivante on substitue l'acide du nitre à celui du sel marin : la lettive alkaline fultureule preparce par calcination comme les precedentes, est composee de demilivre de nitre, demi-livre de tartre rouge, une livre de sel de potatie & une livre de lang de baut deileché; on jette ces matières toutes rouges dans 12 pintes d'eau bouillante. & l'on filtre cette lessive; on fait fondre à part 2 livres d'alun dans 12 autres pintes d'eau, puis 8 onces 3 gros de vitriol vert dans quatre autres pintes d'eau que l'on filtre quand le vitriol est ditious; après avoir fait chauffer toutes ces liqueurs juiqu'à bouillir, on les mele exaclement. & forfque la fécule est précipitée, on y verse 8 onces d'esprit de nitre, après quoi on édulcore cette fécule par plusieurs lotions: ce bleu est affez franc, mais il est pale. Il est temps de finir ces détails par le procédé qui est actuellement suivi en Angleterie; l'expérience a fait connoître que l'on ne doit point ménager le sang de bœuf ni les sels alkalis, comme on a sait dans quelques-uns de ceux qui ont été décrits ci-devant, puisque ce sont ces matières qui revivisient dans le vitriol toutes les molécules ferrugineuses qui sournissent le bleu.

On prend 2 livres de sang de bœus desseché, 2 livres de potasse brute, une livre de tartre rouge, 12 onces de salpètre de la première cuite; on réduit toutes ces matières en poudre grossière, on les mèle ensemble, on les calcine dans un creuset dont le tiers doit demeurer vuide; ce mélange sus très-peu & la calcination s'en sait lentement sans détonner, & elle dure trois heures au moins: sorsqu'on n'aperçoit plus de ssamme sur le creuset, on jette peu à peu cette matière dans de s'eau bouillante, & on s'y sait bouillir une demi-heure; pendant qu'elle est sur le seu on sait dissoudre dans de l'eau bouillante 4 livres d'alun de roche que s'on méle avec une dissolution silurée de 12 onces de vitriol

d'Angleterre; on confond toutes ces liqueurs extrêmement chaudes dans un grand vaitfeau, on agite le melange afin que la fermentation & la précipitation le fassent plus vite. Au bout d'une demi-heure ou environ, on y ajoute de l'eau de puits bien nette qui achève dans l'instant la précipitation de la fécule, ce que ne fait pas l'eau de la Seine ni toute autre eau qui diffout parfaitement le favon, ainfi que je m'en fuis affuré par des épreuves répetces : quand l'eau qui furnage cette fécule paroît claire, on la décante, on reverse de nouvelle eau nette, & l'on continue de laver cette fécule autant de fois qu'il est nécessaire pour qu'elle soit parsaitement insipide, ainsi que l'eau qui a servi à la dessaler & à lui ôter son gout stiptique & vitriolique; on la fait égouter sur un filtre, après quoi on la délaye avec 8 onces d'esprit de sel dont on augmente cependant la dose s'il est soible, comme on la diminue si son acide est trop concentré; ce que le fabriquant de cette couleur connoît à la nuance de bleu pur & franc que prend la fécule, fans employer les movens connus des Chymistes pour déterminer la force des acides.

Dans ces sortes de préparations du Bleu de Prusse, c'est l'acide du sel marin qui nettoie, pour ainsi dire, se bleu de toute la matière jaune ou terre martiale qui n'a pas été régénerée en fer, faute d'une quantite sussifiante de matière fulfureule animale, introduite dans la première lessive alkaline. On doit supposer d'après les expériences connues de l'action vive & prompte de presque tous les acides sur les terres qui peuvent être mises au rang des absorbantes, que l'esprit de sel agira d'abord avec vivacité sur cette terre jaune, espèce d'ocre précipité sans changement par la lessive, que la dissolvant il en fera évanouir la couleur qui donnoit à celle de la sécule une teinte verdatre, & que par conséquent il lui fera acquerir par cette souttraction le bleu pur qu'elle doit avoir, & qu'elle n'auroit jamais en si on n'avoit trouvé le moven de détruire le jaune par l'acide, ou qu'elle ne peut avoir sans acide, qu'en régénéran en ser la totalité de la

terre martiale du vitriol.

40 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Il y a quelques changemens de couleur pendant le mélange des liqueurs des différens procédés dont je viens de parler, auxquels l'Artifle doit être très-attentif pour bien réuffir. S'il voit, par exemple, que dans l'instant du mélange des liqueurs le coagulum devient gris, qu'en brunissant il commence à tirer sur le vert, que ce vert semble s'ouvrir pour laisser place à des veines bleues, il peut être affuré du succès de l'opération. Si le gris, d'abord affez clair, s'obscurcit sans prendre de nuance verte, c'est un mauvais signe, & l'on n'y peut remédier qu'en ajoûtant de la lessive alkaline qui soit plus sulfureuse que la première qu'on a employée; car c'est dans ce principe sulfureux que réside tout ce qui opère, & l'on verra dans la suite de ce Mémoire, que ce principe, tel qu'il le faut pour cette opération, ne se trouve abondamment que dans les matières animales. Il est nécessaire aussi que l'Artiste ait soin d'enlever à temps les parties alumineuses & vitrioliques surabondantes, en survuidant les eaux des lotions pour en mettre de nouvelles tant qu'il voit sur ces eaux une écume jaunâtre & une pellicule colorée des couleurs de la queue de paon.

Après que le bleu de la fécule a été sussissamment avivé par l'esprit de sel, l'Artisle ne doit point épargner l'eau pour l'edulcorer sussissamment, sans quoi ce bleu qui est très beau,

change fort vite lorsqu'il est employé.

On a vû dans le commencement de ce Mémoire, que je me lub propole d'oter à cette matiere la cause principale de son changement à l'air, en cherchant ses moyens de la preparer ausii belle que par les methodes precedentes, sans cependant l'aviver par un acide. Il est aisé de présumer que j'ai fait bien des expériences qui ne m'ont pas satisfait, & je puis assurer que j'ai employé près de deux ans à ces recherches, avant que de trouver le point de perfection que je souhaitois. Je me garderai bien de rapporter ici tous mes ciù : ce qui ne reutsit pas est regardé ordinairement comme inutile, je ne donnerai donc que les procedes dont on peut tirer un avantage réel.

Perfuadé

Persuadé premièrement qu'en augmentant la matière sulfureuse je sournirois à la lessive alkaline plus de parties régénérantes, puisque c'est à ce principe sulfureux qu'est toûjours dûe la revivification des particules d'un métal détrult, foit par dissolution, soit par calcination, j'ai fait détonner une livre de salpêtre bien sec avec demi-livre de tartre; dans l'instant que la détonnation a cessé, j'y ai mêlé 3 livres de fang de bœuf féché & réduit en poudre, & je l'ai fait calciner à l'ordinaire jusqu'à ce qu'il ne parût plus de flamme; j'ai fait une lessive de cette matière, & je l'ai versée très-chaude dans une diffolution aussi très-chaude de 3 livres d'alun & de 2 livres de vitriol vert : il s'est développé une odeur sulfurense fort vive pendant la sermentation, & presque dans l'instant la sécule a pris une couleur bleue si soncée, qu'après les lotions & fans employer d'acide elle s'est trouvée de la nuance d'un bel indigo: comme il y avoit peu de sel alkali dans la lessive, les lotions ont enlevé beaucoup d'alun & de vitriol dont les bases n'avoient pû être précipitées. Dans une autre expérience où j'avois augmenté la dose du sel alkali sans augmenter en proportion celle du sang de bœuf, la couleur de la fécule précipitée s'est trouvée trop foncée & presque noire.

Ces deux expériences prouvant qu'il étoit possible de faire de fort beau Bleu de Prusse sans acide, en augmentant la quantité du sang de bœuf, il restoit à découvrir si la différence des sels alkalis n'apporteroit pas encore quelque chan-

gement en mieux.

D'abord par une sorte de respect pour les premiers Inventeurs de cette couleur, je n'ai cherché qu'à changer les proportions du salpètre & du tartre, puis celles de cette lessive alkaline avec le sang de bœuf, & ensin celles du vitriol & celles de l'alun. J'ai suivi premièrement en petite dose la proportion du dernier procédé que je viens de décrire quant à la composition de la lessive, il y avoit en tout 9 onces de matière mises au creuset, j'en ai fait la lessive dans deux pintes d'eau, je ne l'ai point employée sur le champ, mais

Mem. 1743.

42 Memoires de l'Academie Royale

je l'ai gardée jusqu'au lendemain. J'avois dissous le même jour 6 onces d'alun avec 3 onces de vitriol; au bout de vingt-quatre heures ayant fait chauffer les liqueurs, je les ai mêlées dans une terrine vernissée; tout à coup le mélange a blanchi, puis il a pris une couleur cendrée qui a paffé promptement au bleu pâle, mais ce bleu ne paroitioit pas disposé à prendre plus d'intenfité fans addition, parce qu'il n'y étoit entré qu'une partie de vitriol contre six d'alun. J'avois dans une bouteille bouchée une dissolution faite depuis trente jours, de 3 onces de vitriol dans 3 chopines d'eau, elle avoit beaucoup déposé de terre martiale; je la survuidai à clair, & l'ayant fait chauffer, j'en versai peu à peu une livre sur le mélange encore chaud de la terrine, & je l'amenai au bleu foncé sans avoir la moindre nuance de vert; cette fécule bien lavée & féchée pesoit un peu plus d'une once & est restée d'un bleu très-foncé. Ainfi voilà un moyen affez fimple de faire le Bleu de Prusse, & de lui donner telle nuance que l'on veut; il indique en même temps que pour réussir avec plus de certitude, il n'y a qu'à priver le vitriol de ce qu'il a de trop de terre martiale, foit par calcination, foit par diffolution, ébullition, filtration, &c. De plus, en dissolvant le vitriol dans une même eau avec l'alun, je mèle si bien cette terre martiale avec la terre de l'alun, que quoique je fasse bouillir la dissolution, ni l'une ni l'autre des deux terres ne se précipite en refroidissant. Si dans la dissolution du vitriol seul, long-temps gardée, il se fait une précipitation affez abondante de terre jaune, on en peut conclurre qu'une portion de l'acide vitriolique ne tenant plus cette terre en dissolution, il devient libre d'agir comme dissolvant sur la terre june du vitriol diffous avec l'alun, & qu'alors fans addition d'aucun autre acide il s'en trouve assez pour dissoudre la partie de cette terre jaune non revivifice qui auroit altere la netteté ou la pureté du bleu.

Jaiethyé avec le même faccès le fel de potasse bien purise de tout sel neutre, & en ayant calciné 4 onces avec 8 onces de sang de becut desseche, j'ai eu une lessive sustineute qui. versée sur une dissolution d'alun & de vitriol, dosée comme la précédente ou dans les mêmes proportions, m'a donné une sécule d'un bleu pâle, à saquelle j'ai donné de même la nuance de bleu soncé, en y ajoûtant de la dissolution épurée & filtrée de vitriol.

La cendre gravelée, calcinée avec le fang de bœuf, donne une lettive qui fait le même effet, le détail en feroit fuperflu-

Feu mon frère en vérifiant les expériences de M. Henckel qui a tiré du bleu de la soude & du kali, s'est contenté de la certitude de ces faits, & n'a pas tenté de substituer le sel de la foude aux autres fels alkalis qu'on étoit dans l'usage d'employer pour la préparation du Bleu de Prusse. J'ai repris ce travail que je prévoyois devoir être utile à mon projet, j'ai trouvé, & j'ai déja fait voir à l'Académie que le sel de la foude contenoit une base analogue à celle du sel marin, puisqu'avec l'huile de vitriol j'en ai fait un véritable sel de Glauber. En dissolvant le sel de la soude dans l'eau elle refroidit confidérablement, je me servois d'un vaisseau élevé & d'ouverture étroite; lorsque je jetois peu à peu de l'huile de vitriol fur cette leffive, il s'élevoit pendant la fermentation une vapeur blanche sulfurcuse qui avoit cette o leur piquante si sensible aux acidules, principalement aux Eaux de Spa, & fur-tout à celles de la fontaine qu'on nomme de la Gércuftere. Pendant la fermentation de la lessive de soude avec l'acide vitriolique il fe précipitoit un peu de fécule bleue; M. Henckel l'a observé le premier, & j'ai eu de plus des crystaux de sel de Glauber bien formez, & assez colorez de bleu pour qu'on les prît pour des saphirs; je les ai fait voir à la Compagnie il y a quelques années, & ils ont conservé cette couleur dans le flacon de crystal où je les ai tenu enfermez.

Il est vrai-semblable que ce bleu ne s'est introduit dans ces crystaux salins que de la manière dont les couleurs s'in-sinuent dans les crystaux colorez qu'on trouve dans leurs mines: ce sont des dissolutions métalliques qui se mèlent avec le suc crystallin. Il n'y a point de plante qui ne contienne du ser, le kali en contient autant qu'aucune autre; lorsqu'on

MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE a brûlé cette plante pour en faire la foude, & que la cendre de cette plante calcinée jusqu'à la susson à été étoussée dans les fosses, on y a concentré un reste de principe sussure qui a pû revivisser les parties ferrugineuses, & faire dans cette calcination une partie de l'opération du Bleu de Prusse

que l'acide du vitriol achève, pendant que de fon union avec la base du sel marin il se sait un sel de Glauber.

Quant à l'existence d'un soufre dans presque toutes les cendres des plantes, & principalement dans la foude, on en a la preuve dans l'odeur qui s'élève de sa première lessive, lorsqu'on la fait bouillir, elle est semblable à celle de l'hepar fulpharis: quand on prépare le sel de Seignette, qui est un mélange de lessive de soude avec la dissolution de la crême de tartre, on fent pendant la fermentation de ces deux dissolutions une odeur d'hepar très-forte, ce qui n'arrive pas lorfque le sel est bien dépouillé de son sousre par une seconde calcination, ou lorsqu'on jette la crème de tartre sur la dissolution d'un sel de tartre vrai & pur, pour en faire le tartre soluble; il s'en élève seulement une vapeur acide qui est celle de l'acide du vin contenu dans la crème de tartre. Ceux qui ont fait le sel de Seignette, ont sans doute observé qu'à la fin de l'opération il reste une liqueur grasse très-rousse qui ne se crystallise plus; elle est composce de l'huile du tartre jointe à l'eau-mère de la soude. Si l'on jette sur cette liqueur une quantité convenable d'huile de vitriol, le mélange deviendra bleu, & il se précipitera une sécule bleue.

Cette disposition naturelle de la soude à donner le bleu lorsqu'elle est aidée par l'acide du vitriol, m'a fait juger que ce devoit être le sel alkali qui conviendroit le plus à l'opé-

ration du Bleu de Prusse.

Ainsi j'ai pris 4 onces de sel brut tiré de la soude, je l'ai mêlé avec 8 onces de sang de bœus desseché, je les ai calcinez & j'en ai sait la lessive; j'ai sait dissoudre dans un autre vaisseau 8 onces d'alun avec 3 onces de vitriol, les deux liqueurs ont été mêlées ensemble très-chaudes; ce mélange a été du temps à rendre sa sécule, elle étoit pâle, mais sur le

champ je lui ai donné la nuance de bleu-foncé en versant dessus de la dissolution de vitriol, ancienne de deux ans, que j'avois trouvée dans mon laboratoire, celle-ci a fait son esset beaucoup plus vite que la dissolution qui n'étoit saite que

depuis un mois, & dont il a été parlé ci-devant.

C'est ici qu'il est temps de parler de ces desseins que le hasard fournit, qui sont toûjours neufs, qui jamais ne se répètent, & qui conviendroient extrèmement au goût présentement à la mode, des étosses nuancées des sabriques de Lyon. Mais il faudroit un dessinateur habile pour en copier promptement le trait, car ces desseins singuliers n'exissent pas plus de dix ou douze minutes. Pour les avoir, je verse la lessive chaude & les dissolutions chaudes d'alun & de vitriol dans un vaisseau de terre vernissée plat & fort large, je les brouille avec une poignée d'ofier à fouetter la crême : en remuant lentement ce vaisseau en dissérens sens, j'arrête, le plûtôt qu'il est possible, le mouvement circulaire du mélange; fa surface devenant tranquille est d'un bleu blancheâtre ou fort pâle: je verse sur plusieurs endroits de cette surface des gouttes de diffolution de vitriol la plus vieille; ces gouttes en tombant s'épanouissent & souvent se divisent en réjaillissant, forment des fleurs presque toûjours dessinces de bon goût, des feuillages qui s'entrelacent & qui forment des bouquets, au moins auffi bien jetez que le pourroit faire le plus habile dessinateur. Si une fleur se trouve détachée & manque de queue qui la joigne au bouquet, une paille conduite legèrement suffit pour ouvrir la liqueur & former cette queue. Il m'est arrivé plusieurs sois qu'une goutte tombée d'une hauteur médiocre m'a donné la figure d'un infecte volant trèsbien dessinée. Ce ne sont pas de ces desseins qu'une imagination échauffée peut seule apercevoir; plusieurs personnes de cette Académie les ont vûs comme moi, & de dix fois qu'on fait l'expérience, il y en a au moins sept dont un bon dessinateur peut prositer; le dessein étant copié il n'y a qu'à brouiller la liqueur, la déterminer à devenir à peu-près tranquille par le mouvement du vaisseau en sens contraire, &

46 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE verser de nouveau des gouttes de dissolution de vitriol, on

aura un autre camayeu à dessiner.

Ces desseins ne deviennent si sensibles que parce que la nouvelle dissolution de vitriol que j'ajoute, sournit un ser qui se ressus de la vite substant a la terre de l'alun, qui par sa blancheur sui donne une nuance de bleu agréable à la vûe; sans elle il se seroit un précipité presque noir, parce qu'il auroit trop d'intensité. Cette manière d'opérer dans la préparation du Bleu de Prusse a, comme je l'ai dit, l'avantage de pouvoir sournir des bleus de toutes les nuances, exempts du désaut que ses Peintres reprochent aux Bleus de Prusse avivez avec les acides, après que la sécule est précipitée: d'ailleurs ils se préparent beaucoup plus vite & avec moins de dépense, puisque j'en supprime l'esprit de sel, & que je substitue la soude au nitre sixé par le tartre, qui coûte beaucoup plus.

Il peut cependant arriver, & je l'ai éprouvé quelquesois, qu'on emploie des vitriols si impurs ou si chargez de terre jaune, qu'en suivant mes procédés sans acides, on n'auroit qu'un bleu pâle & verdâtre; alors il seroit absolument nécessaire de les aviver, mais il est indissérent de quel acide on se serve, l'esprit de sel, l'esprit de nitre, l'huile de vitriol en dissolvent également la terre étrangère, sans attaquer, au mol is finfiblement, le bleu, peurvii qu'on eduleare la fécule aussi-tôt qu'elle a acquis la vivacité & l'intensité que l'on desire. Les sécules qui ont passé aux acides sont faciles à reconnotire, en ce qu'etant fechees elles font extrémement dures & difficile, a cer der; celles qui ont eté préparées fan, acides sont tendres, friables, faciles à étendre sur la palette ou à délayer avec la gomme pour les miniatures; cependant on ett dans l'ulage a Berlin d'y joindre un peu d'eau gommee pour endurcir les trochisques ou les tablettes.

Les fécules préparées avec la foude, & que j'ai fait passer à l'esprit de sel avant de les saire sécher, ont pris en diminuant de volume une couleur très-soncée; ainsi quoique j'eusse employé un esprit de sel sort concentré, il y a

apparence qu'il n'a attaqué que les terres qui délayoient ou affoiblitloient l'intenfité de ce bleu. J'ai essayé sur une semblable sécule l'esprit de nitre sumant, il m'a donné un bleu

très-éclatant, mais moins foncé que le précédent.

Comme ce sont la terre de l'alun & la partie serrugineuse du vitriol qui donnent le bleu, j'ai voulu sçavoir, au moins à peu-près quant au vitriol, ce que ces deux sels contenoient de terres. Il m'a fallu une once de sel de tartre dissous pour précipiter toute la terre de 2 onces d'alun aussi dissous, & cette terre blanche ayant été bien lavée & féchée, s'est trouvée pefer 3 gros 1. Quoique le vitriol paroisse abandonner facilement la terre jaune qui semble lui être étrangère, il en contient une autre qui ne cède pas si facilement à l'action précipitante des sels afkalis, celle-ci est fort légère & ne se sépare qu'avec beaucoup de lenteur. J'ai employé une once & demie de sel de tartre pour précipiter la terre de 2 onces de vitriol, & j'en ai eu 5 gros 36 grains lorsqu'elle a été sèche & lavée. C'est, comme je l'ai déja dit, cette terre inutile qu'il faut enlever au vitriol avant ou après l'opération du Bleu de Prusse si l'on veut avoir un bleu d'une couleur parfaite.

Dans l'alun l'acide vitriolique est si intimement uni à la terre de ce sel, qu'il ne s'en sépare point sans intermède dans quelque grande quantité qu'on le tienne en dissolution, & sa viscosité est telle que si dans la même eau on dissout l'alun & le vitriol, il ne se précipite presque rien de la terre de ce dernier, en comparaison de ce qu'il s'en précipite quand on le dissout seul. Par conséquent il est avantageux pour l'opération du Bleu de Prusse de les dissoudre ensemble dans un même vaisseau de verre, de laisser reposer pendant quelques jours cette dissolution, & de la verser par inclination dans un autre vaisseau pour la taire chausser lorsqu'on la veut meler

avec la lessive alkaline & sulfureuse.

Il falloit, ainsi que je l'ai dit plus haut, que le sulfureux de cette lessive sût tiré d'une matière animale: on a choisi le sang de bœus comme celle qui est la plus commune & le plus aisée à dessecher. On auroit pu employer l'urine avec

48 Memoires de l'Academie Royale

un même succès, puisqu'elle contient aussi beaucoup de parties huileuses, mais son exficcation seroit trop longue & d'une plus grande dépense. Feu mon frère a dit dans l'un de ses Mémoires, que de ce sang uni par calcination au nitre sixé ou à tout autre sel alkali, il se sorme un hepar sulphuris: on en pourroit conclurre que le foie de foufre ordinaire fait avec le soufre commun & un sel alkali tel qu'il soit, réussiroit comme le précédent dans l'opération du Bleu de Prutle; mais l'expérience prouve le contraire, puisque le foie de soulre ordinaire, quelque varié qu'il soit dans ses proportions, étant verse sur les dissolutions de vitriol & d'alun, ne sait jamais que de l'encre, & si même on laisse précipiter la sécule noire de cette encre, ce noir se détruit entièrement lorsqu'on vient à laver cette fécule. Les matières huileuses ou grasses extraites des végétaux & unies par calcination à un sel alkali n'ont pas un meilleur succès, elles ne sont aussi que de l'encre lorsqu'on en verse la lessive sur la dissolution de l'alun & du vitriol.

Il faut pour avoir la couleur bleue, un soufre beaucoup plus ténu & plus subtil; on ne peut guère mieux le comparer qu'il celui du Phosphore. Si on le taint à propos dans le temps qu'il cherche à se dégager des sels, chassé par la violence du feu, on observe en tirant la matière du creuset, une sumée blanche, ségère & sumineuse, semblable à celle qui s'élève du phosphore sorsqu'on le frotte contre un corps dur dans un lieu obscur. J'ai remarqué aussi qu'en jetant ce sel calciné tout rouge & sortant du creuset dans de l'eau bouillante, il s'en élève assez souvent un tourbillon de slamme. Ensin sorsqu'on unit la sessive de ce sel alkali avec les dissolutions d'alun & de vitriol, on sent une odeur volatile sussume. Peu différente de celle de la sseur de Pècher, & par conséquent semblable à celle de la distillation du phosphore.

La préparation du Bleu de Prusse n'a été utile jusqu'à présent qu'à la Peinture, mais ne pourroit-elle pas être employée avec succès dans la Médecine? Un principe sussureux extrait des matières animales, subtilisé par le seu, réuni à des

parties

parties ferrugineules extrêmement divifées, & joint à une terre absorbante, pourroit être introduit dans le sang avec espérance de réuffite. Mais comme le sang de bœuf qu'on ramasse ordinairement dans des lieux mal propres, pourroit devenir une raison de dégoût, quoique très-mal fondée, pour plusieurs malades délicats qui se préviennent aisément, je lui substitue le bois de cerf dont je double la dose: par exemple, je prends 1 o onces de cette matière bien rapée & pulvérisée. de la foie crue tirée des cocons & coupée fort menu une once, du sel tiré de la soude 4 onces; je mêle ces matières & je les calcine à grand feu comme les précédentes, je jette cette matière toute rouge dans 2 pintes & chopine d'eau bouillante que je mets dans une marmite de fer ou dans une terrine de terre vernissée, afin qu'on n'y puisse rien soupconner de cuivreux. Je joins à cette lessive toute chaude une diffolution de 8 onces d'alun de glace & d'une once & demie de vitriol d'Angleterre, tous deux bien choisis & sondus dans 2 pintes d'eau bouillante. La fermentation & la précipitation fe font à l'ordinaire, il s'en élève une odeur sussure volatile & piquante. Enfin j'augmente le bleu de la fécule en faisant tomber dans la liqueur une suffisante quantite de solution de vitriol éclaircie, je noie cette fécule dans de l'eau chaude pour en enlever les sels inutiles, je la décante, puis je purifie ce bleu par quatorze ou quinze lotions d'eau froide. Cette opération me donne une once fix gros & demi d'un blen trèsvif & très-léger. Je m'en fers à préparer des pastilles sucrées qui m'ont paru agir comme diaphorétiques, & affez fouvent comme apéritives.

Quant à l'analy se chymique du Bleu de Prusse, par la puelle je finirai ce Mémoire, voici ce que j'ai observé: Si je sais calciner cette sécule sous une mousse, le bleu se dissipe & il reste une terre rouge comme le colcothar, plus ou moins soncée, à proportion de l'intensité du bleu; ainsi la présence du ser est démontrée par cette expérience, puisque celui qui existoit dans le bleu se convertit en crocus par la calcination. Cette épreuve sous la mousse sert encore à saire connoître

Memoires de l'Academie Royale It la fecule à ete furillamment purgee de set sels par les lotions, car s'il y en reste, on les voit se boursousser sur les petites

masses du crocus.

J'ai mis une once de Bleu de Prusse dans une cornue de verre, & par un feu augmenté par degrés j'en ai retiré du the gime, un espritaile di legen ment unineux & un peu huileux. Au dernier teu il a patte dans le recipient un sel qui s'est crystallif cumme le sel ammoniae secret de Glauber, & enfin il s'est sublimé dans le col de la cornue un vrai sel ammoniac: ce dernier sel se trouve, comme l'on sçait, dans Italine, & par confequent doit fe trouver dans le sang. Quant au sel ammoniac secret, il est formé de l'union du principe fulfureux volatil animal avec la petite portion d'acide du vitriol qui s'y est jointe dans la préparation de la fécule.

A l'es rd de l'utilité de ce Mémoire, elle dépend en partie de l'expérience. Je me suis propoté de diminuer la depente de l'operation du Bleu de Pruffe, & j'ai rempli cette première partie de mon deficin. Je me fuis auffi propote de rendre cette couleur plus folide & moins nuitible aux couleur voismes; c'est aux Peintres & au temps à en décider.



1743

M E M O I R E

Sur la manière dent se forment les Glazons qui slettent sur les grandes rivières, & sur les différences qu'on y remarque lorsqu'on les compare aux glaces des eaux en repos.

Par M. l'Abbé Nollet.

UAND on sçait en général pourquoi l'eau perd sa 6 Février fluidité & se convertit en glace, quand on connoît les propriétés qui lui conviennent en cet état, on est porté à croire que le cas dont il s'agit ici n'a pas besoin d'une explication particulière: l'attouchement de l'air suffisamment refroidi fait geler un bassin, un étang, &c. Quelle dissérence doit-il y avoir pour une eau courante, si ce n'est que le mouvement doit retarder la congélation, & que la glace n'aura

lieu que quand le froid sera devenu plus grand?

Cette pensée se présente si naturellement que les Physiciens ont regardé avec raison comme un préjugé populaire l'opinion de ceux qui prétendent que la glace des rivières commence par le fond, & qu'elle s'en détache ensuite pour s'élever à la superficie de l'eau; & en effet, quelle apparence y a-t-il que la terre soit capable de refroidir & de glacer l'eau qui la couvre, si le froid ne vient à l'une & à l'autre que par l'atmosphère? Rien ne paroît moins d'accord avec les principes de la bonne Physique, & peut-être trouvera-t-on que j'ai eu tort de combattre sérieusement cette erreur; mais j'écris moins pour la combattre que pour en faire connoître les caufes; & quoique parmi les perfonnes qui la foutiennent, il s'en trouve qui méritent bien qu'on travaille à les détromper, je me serois sans doute abstenu de saire connoître la fauflete d'un fait qui paroit même impossible, si les preuves Gij

MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

que j'en ai ne m'avoient semblé mériter par elles-mêmes

quelqu'attention.

En expliquant dans mes leçons de Physique, de quelle manière la glace se forme & se soûtient sur l'eau, j'ai souvent été arrêté par des personnes qui n'étoient point de mon avis, & qui pretendeient etre bien certaines que la glace qui furnage, vient du fond de la rivière. Chacun me citoit ses propresoblervations & le tem ignage unanime des gens à qui ces fortes de remarques ne peuvent échapper, les meûniers, bateliers, pêcheurs, &c. De semblables citations & le récit de M. Plot déterminèrent en 1730 M. Hales à examiner la vérité de ce fait: on lit dans l'appendice qui est à la fin de sa Statique des Végétaux, que deux années de suite il se transporta sur la Tamise lorsqu'elle étoit gelée, qu'il en sit rompre la glace, & qu'il observa la rivière tant au sond qu'à la surface. Voici ses propres paroles: « La superficie de l'eau » étoit gelée d'un tiers de pouce d'épaisseur, à travers cette • glace j'en aperçus un autre lit au dessous; je rompis la glace » du dessus avec une rame, & ayant pêché de la glace du " deffous, je vis qu'elle avoit près d'un demi pouce d'epaiffeur, » muis elle avoit plus de cavités, & elle ctoit plus spongieuse » & moins solide que la première. M. Hales ajoûte: cette » glace du deffous se joignoit à celle de dessus au bord de l'eau. « & ces deax lits de glace s'cloignoient l'un de l'autre à meture » que l'eau étoit plus profonde; & réellement le second lit » suivoit la prosondeur de la rivière, car il étoit adhérent au » fond, & même mêle de fable & de pierres que les glacons emmenoient quelquefois avec eux.»

On ne peut rien dire de plus positif en saveur de l'opinion vulgaire, c'est le temoignage d'un habile Physicien, & qui prononce d'après des signes qui n'ont pas l'air equivoque. Cependant tout decisis qu'ils paroissent, s'il etoit vrai que M. Hales n'eut juge la glace adhérente au sond, que parce qu'elle étoit sale en revenant à la supersicie de la rivière, on verra par la suite de ce Memoire que son jugement ne servit pac aussi bien appuyé qu'on le pourroit croire. Pour dissiper

ce foupçon, ou plûtôt pour le prévenir, je voudrois que M. Hales cut dit positivement qu'il avoit sait sonder devant lui le fond de la riviere, à quelque diffance du rivage, & qu'il y avoit trouvé de la glace attachée en plufieurs endroits. En faudroit-il moins pour donner du poids à une opinion qui paroit aussi peu recevable? Mais en lisant l'endroit que l'ai cité ci-deslus, on voit que les observations qui y sont rapportées ont été faites dans un endroit de la rivière qui sert d'abreuvoir, & qui a par consequent sort peu de prosondeur fur les bords; que la glace n'avoit qu'un tiers de pouce d'épaisseur, ce qui n'a pas dû permettre à l'observateur de s'en servir pour s'avancer plus avant; & le témoignage des pêcheurs y est si souvent employé, qu'on pourroit craindre que M. Hales n'y ait mis un peu trop facilement la confiance. Quoi qu'il en soit, je vais rapporter ce que j'ai fait & ce que j'ai vû, afin que l'on sçache ce qui peut en avoir imposé à ceux qui croyent avoir des preuves de la congélation de l'eau au

fond des rivières. Cet hiver pendant que la Seine étoit prise par la gelée, le thermomètre de M. de Reaumur étant 10 degrés au dessous du terme de la congélation, je ils couper la glace à 3 ou 4 pieds du bord, & j'en fis détacher un morceau qui avoit environ un pied en quarré, & qui se trouva épais de 8 pouces : quand il fut enlevé, je remarquai que le deflous n'étoit point uni comme il l'est ordinairement à la glace qui se forme d'une eau dormante; il n'étoit pas non plus confiftant comme le reste, mais fort inégal & comme spongieux, avant toutes les apparences d'une couche de glace broyée & réduite en grumeleaux, qui se seroit attachée sous une glace plus solide; j'aperçus toûjours la même chose à tous les endroits de la rivière où je fis détacher des morceaux de glace: je remarquai aussi qu'au fond des trous que j'avois faits à la glace pour avoir les morceaux dont je viens de parler, au lieu de voir l'eau claire, comme il arrive d'ordinaire lorsqu'on fait un trou à la glace d'un bassin ou de quelque vaisseau, on n'apercevoit qu'une glace mal prite, pelotonnée par petites

G iii

54 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE parties, & tout-à-sait semblable à celle que j'avois vûe sous le glaçon détaché; j'en fis tirer une certaine quantité, & quelque soin que je prisse pour mettre l'eau à clair, je ne pus jamais y parvenir, cette espèce de glace se renouvella continuellement à la surface; & les ouvriers que j'employois, pénétrant mon dessein, m'assurèrent sur l'expérience qu'ils en avoient, que je faisois de vains efforts. Je sus obligé de les en croire pour le fait, mais je ne me rendis pas de même aux raisons qu'ils m'en donnèrent. « Cette glace que nous " tirons par ce trou, me dirent-ils, est le bouzin qui s'est formé pendant la nuit au fond de la rivière, & que le soleil attire pendant le jour à la superficie : vous pouvez remarquer, , ajoutèrent-ils, que presque tous les morceaux que nous en-" levons, sont sales, pleins de terre, & contiennent quelquesois des brins d'herbe. »

De tout ce que je venois d'entendre, il n'y eut qu'une chose qui me parut digne d'attention, c'est la saleté du bouzin que je trouvai réelle & que j'attribuai d'abord à la proximité du rivage & au peu de prosondeur de la rivière dans les endroits où j'avois sait ouvrir la glace; cette raison avoit de la vrai-semblance, mais elle la perdit bien-tôt par une épreuve qui me paroissoit devoir la consirmer. Je sis ouvrir la glace dans des endroits où la rivière avoit 9 ou 10 pieds de prosondeur, & quand le glaçon sut enlevé, je vis, contre mon attente, que le bouzin ressembloit très-souvent à celui que j'avois observé plus près du rivage, qu'il contenoit aussi des saletés, & que la surface de l'eau en étoit toûjours couverte, quelque soin qu'on prît pour l'en ôter.

Je ne pouvois donc plus regarder ce bouzin comme une glace qui se forme près d'un sond sablonneux & remué par l'agitation de l'eau. Mais devois-je croire contre tout principe, que la glace qui paroît à la surface d'une rivière ne s'épaissit que par addition de parties gelées au sond de l'eau? Si la congélation des rivières ne se fait pas comme celle des étangs & des bassins, ses différences qu'on y peut remarquer, peuvent-elles avoir d'autres causes que le mouvement de l'eau,

& ce mouvement pourroit-il faire que le froid attaquat le fond avant la superficie? M. Hales* pour expliquer ce phé- * Statigue des nomène qu'il regarde comme certain, prétend que le fond Végétaix, dans peut acquerir assez de froid pour glacer l'eau qui y coule 30 toûjours plus lentement qu'ailleurs; mais j'ai d'autant plus du Voullateur, de peine à me rendre à cette supposition, qu'ayant plusieur. 1982 104. fois & en différentes années plongé des thermomètres à toutes fortes de profondeur dans la rivière lorsque la glace de la surface avoit acquis 2, 3, 6, & jusqu'à 8 pouces d'épaisseur, je n'ai jamais trouvé l'eau au degré de froid qu'il lui faut pour se convertir en glace. A la vérité elle en approche quelquesois de fort près, mais ce n'est qu'après plufieurs jours d'une forte gelée, & non pas lorsque la glace de la superficie n'a encore que trois quarts de pouce d'épaisfeur: en un mot il m'a toujours paru que l'eau actuellement fluide n'avoit jamais le froid de la glace; comment donc pourroit-elle le transmettre au fond sur lequel elle coule?

Mais quoique ces raisons m'empêchent de croire avec M. Hales que les rivières se gèlent au fond, il n'en est pas moins vrai qu'on trouve ordinairement sous la glace solide de leur furface cette autre forte de glace spongicuse dont j'ai fait mention, qu'elle est souvent terreuse & pleine de sable, & que ces marques s'y rencontrent non seulement lorsqu'on la tire fort près du rivage, mais aussi dans les endroits où la rivière a 9 ou 10 pieds de profondeur. Tâchons-donc de faire voir que ces faits, quoique bien observez, n'ont pas été interprétez comme ils devoient l'être, & qu'on peut les concilier avec les effets ordinaires de la gelée & avec les idées qu'on en a en Phyfique.

La dissiculté d'épuiser le bouzin par les trous qu'on avoit faits à la glace, me porta à croire qu'il suivoit le courant de l'eau jusqu'à ce que quelque circonstance le déterminat à fe fixer sous les glaçons solides; si cela étoit, il ne devoit s'en trouver qu'à la superficie de l'eau, & si l'on interposoit quelqu'obstacle qui l'empêchât de suivre le sil du courant, il n'en devoit plus paraître a l'endroit cui kircit imme listement

au dessous; une large pelle de bois que je sis plonger perpendiculairement m'en sit voir assez pour me donner bonne opinion de ma conjecture; mais comme ce qui passoit par les côtés ne me permettoit pas de mettre la superficie de l'eau entièrement à clair, je sis venir un tonneau dont on ôta les deux sonds, je sis faire dans la glace un trou de grandeur convenable, & je le sis descendre dans l'eau jusqu'aux trois quarts de sa longueur, je formai de cette manière une espèce de puits dont j'épuisai le bouzin en très-peu de temps, & je demeurai convaincu que cette sorte de glace obéit au courant & ne se sixe point pour l'ordinaire à l'endroit où la gelée l'a fait naître.

A cette expérience on peut joindre l'observation dont je vais rendre compte, & qui suffiroit seule, à mon avis, pour dissuader ceux qui pensent que la glace vient du sond de l'eau. S'il étoit vrai qu'elle en vînt, les saletés qu'on y remarque ne devroient-elles pas tenir du fond sur lequel on pretend qu'elle a été formée, & au dessus duquel elle répond quand elle s'est élevée? J'ai observé cependant tout le contraire, le plus souvent le bouzin m'a paru jaune ou rempli de sable, tandis que le fond de la rivière, que je faisois sonder, n'étoit que de la vafe a des diffances affez confiderables. Cette glice dont il s'agit, est donc venue de plus haut, & cela posé, il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi elle est file, terre de, quelquelois remplie d'herbes & de puille, quoquielle n'int point été formée sur la terre; il sussit (& c'est une supposition qu'on n'aura pas de peine à admettre) qu'elle ait traîné contre le fond aux endroits où la rivière est basse, & que les petits grundeaux qui la compofent, event ete falis avant que de s'unir.

On voit donc par ce que je viens de rapporter, que l'opinion vulgaire sur la prétendue formation de la glace au fond des rivières a quelqu'apparence de raison, mais on voit aussi que ces apparences n'ont rien de réel quand on les examine avec soin. Il reste maintenant à sçavoir pourquoi ces apparences trompeutes, ces assemblages de petits grams leaux glacez,

glacez, que nous avons nomme harin, & qui enduisent le dessous des glaçons solides, ne se trouvent que dans les eaux qui ont un courant; car c'est un fait constant que cette espèce de glace ne se trouve point dans les eaux dormantes. Comment donc se forme-t-elle, & qu'est-ce qui la détermine à occuper les places qu'este a coûtume d'affecter?

La glace, comme l'on sçait, est de l'eau qui a perdu sa fluidité, c'est-à-dire, que ses parties ou molécules sont sixées dans de certaines positions relativement les unes aux autres, & qu'elles s'y tiennent à la façon des corps solides; la cause de cette sixation, c'est le froid; mais le froid opère cet esset avec plus ou moins de promptitude, selon qu'il agit sur des parties qui ont plus ou moins de mouvement, c'est pourquoi les marcs, les bassins, les étangs sont ordinairement puis avant les rivières, & celles-ci commencent toújours à prendre par

les bords, parce que l'eau y est moins agitée.

Le mouvement qui retarde ou qui empêche les effets de la gelée, n'est pas celui que les parties de l'eau ont en commun, mais plûtôt celui qu'elles ont chacune en particulier. Si le milieu de la rivière, ce que l'on nomme communément le courant, ne se glace pas comme les bords, ce n'est pas précisément parce que l'eau coule en cet endroit, ce n'est pas même parce qu'elle y coule plus vite qu'ailleurs, mais parce qu'elle coule par ondes, & que toutes ses parties n'ont point une vîtesse égale; car s'il étoit possible que dans leur mouvement commun elles gardassent entr'elles les mêmes possitions respectives, je ne vois pas ce qui empêcheroit alors que le froid ne les sigeât & ne les convertît en glace.

Non seulement cela devroit être, mais il y a toute apparence que cela est en esset, & je crois être en état de prouver que les glaçons que l'on voit slotter quand la rivière charie, ont été formez pour la plûpart, d'une eau qui n'a point cessé de se mouvoir; car je ne crois pas qu'on doive les regarder, au moins pour la plus grande partie, comme des fragmens détachez des bords, ou qui viennent des petites rivières où 'on a pris soin de rompre les glaces, comme l'ont pensé

Mem. 1743.

S MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE quelque Phythein . Cette penlee ne peut le foutenir quand on the attention pacifican mentation du froid qui rend la glice des bords plus solide, & par conséquent moins propre à se briler, multiplie toujours celle qui fuit le fit de le ju, a moins qu'il ne parvienne à un certain degré d'apreté qui a un effet tout contraire, comme je le dirai dans la suite de ce Mémoire. Les glaçons flottans sont autant & plus nombreux le matin que le soir; est-il vrai-semblable qu'on ait travaillé à les détacher pendant la nuit? ou s'ils viennent d'affez loin pour être partis du jour precedent, comment le plus quand nombre n'a-t-il pas été arrêté en chemin par la glace des bords & par mille autres obstacles qui se rencontrent sur une rivière à moitié prise? D'ailleurs, s'ils ont été détachez à force de bras, quel travail ne faut-il pas supposer pour en produire une auffi grande quantité, & d'où feait-on que les gen. de la campagne aghient ainfi de concert pour degager les rivieres? Enfin, pour peu que l'on compare ces glicons avec ceux qui tiennent au rivage, quelles differences n'y trouve t oa pas? Ces derniers sont presque toûjours plus unis, plus épais, plus durs & plus transparens; les premiers ne sont donc pas de la même étoffe, & voici comme on peut concevoir qu'ils ont été formez.

Quand on jette les yeux sur une grande rivière, sur-tout dans la campagne & par un temps edime, on remarque quantité d'endroits où la superficie de l'eau coule d'une manière sentiblement unitorme, où les parties par confiquent n'ont qu'une vîtesse commune & sont comme en repos respectivement les unes aux autres : qu'un tel mouvement se soûtienne quelques initans pendant un froid apre, il se torme un adonqui a plus ou moins d'étendue selon celle où se borne l'uniformite du mouvement que nous supposons, cette e dite de vîtesse qui sûrement n'est jamais exacte à la rigueur, mais qui le plus souvent sussit pour donner prise à la gelée. Si ce premier glaçon tendre & mince ssotte quelque temps sur une cau qui continue de couler de cette manière, bien loin de le manière, il se durcit dayantage & augmente en épaliteur,

parce que le degré de froid qu'il a, croitfant de plus en plus, tes parties se condensent, & il devient lui-même capable de geler l'eau qui le touche immédiatement; & quand bien même il passeroit ensuite par des endroits où le courant est ondé, ou qu'il iroit heurter contre d'autres glaces, sa dureté & ses dimensions peuvent être telles qu'il résiste au choc & aux secoutles; ou bien s'il se rompt, les morceaux demeurent encore allez grands pour en composer un autre par leur union avec de semblables fragmens.

Mais au contraire, si cette première glace, au moment qu'elle commence, passe sur un endroit de la rivière trop agité (& c'est sans doute le cas le plus ordinaire) ou qu'il vienne à être ferré entre deux glaçons plus solides, il est écrafe & réduit en très-petites parties qui flottent au gré des vagues, & qui le plus souvent ou ne se rejoignent pas, ou ne font que se pelotonner; car ces petits fragmens étant presqu'auffi épais que larges, suivent le fil de l'eau en roulant sur un centre, ce qui empêche la réunion, ou fait prendre une forme arrondie aux parties qui se réunissent : ce mouvement de rotation vient de ce que le petit glaçon flotte entre deux milieux (l'eau & l'air) dont l'un se meut pendant que l'autre est tranquille, ou qui se meuvent tous deux avec des directions & des vitesses différentes. La partie émergente du corps flottant étant retardée par le frottement ou par l'impultion de l'air, tandis que la partie plongée conserve toate la vitesse qu'elle reçoit du courant, il est évident qu'il n'y a qu'un point qui se meut constamment en ligne droite, & qu'autour de celui-ci tous les autres par une succession fortuite sont obligez de décrire des cercles; de-là viennent sans doute ces grosses pelotes de bouzin qui se présentent souvent à la furface de l'eau quand on a enlevé la glace solide qui la couvroit. Comme il arrive très-ordinairement qu'on les reposifie vers le fond de l'eau en remuant le glaçon qu'on veut enlever, ces masses qu'on voit surnager un instant après, sont dire aux gens prévenus qu'elles viennent du fond de la rivière & qu'elles y ont été formées.

En supposant donc que la glace se forme sur les rivières de la munière que je viens de l'exposer, on peut facilement tendre raison des différences qu'on y remarque quand on la compare à celle des eaux dormantes.

1.° Les glaces des rivières, tant celles qui flottent que celles qui font adherentes, ont les bords plus epais que le reste, & la face qui touche l'eau est presque toujours enduite

d'une couche de bouzin.

Les grands glaçons conservent mieux que les petits le mouvement qu'ils ont acquis, lorsqu'ils viennent a patier d'un endroit plus rapide dans un autre qui l'est moins, ils gagnent de vitetle cette espèce de glace broyce, dont une partie s'arrête à leurs bords & car augmente l'épaisseur, ils glissent sur le reste dont ils entraînent toujours avec eux quelque portion que la gelle attache à leur surface inscrieure. On conçoit bien que la même chose doit arriver à la glace sixe lorsque le bouzin sera porté dessous par le mouvement de l'eau, & qu'il doit même s'y amasser en plus grande quantité, parce que tous les corps qui stottent sur un courant dont la vitesse est plus grande au milieu qu'aisseurs, comme celui d'une rivière, tendent toûjours à s'approcher des bords.

2.° Les glaçons que la rivière charie, sont pour l'ordinaire moins unis & moins droits que ceux du rivage ou des caux

dormantes.

C'ett que la glace nouvellement formée, étant encore trèsmince, thotte a fleur d'eau, & qu'elle est fouvent couverte de petites vagues que la gelee faifit avant qu'elles aient eu tout le temps de s'etendre; d'ailleurs il arrive ausii que ces glacons minces sont rencontrez par d'autres qui les croisent & les doublent en partie, ce qui augmente inégalement leur épaisseur: en un mot, par la seule raison que ces glaces se meuvent & changent continuellement de lieu, elles sont exposes à des accidens qui n'arrivent point à celles des eaux tranquilles, aussi ces dernières sont-elles beaucoup plus droites & sans rugosités considérables.

3.° Les glaçons flottans sont moins transparens que les

autres, & le plus souvent d'une couleur laiteuse.

La transparence des corps dépend beaucoup, comme l'on sçait, de l'homogénéité de leurs parties & de l'ordre qu'elles ont entr'elles: on doit concevoir les glaçons, eu égard au progrès de la gelée qui les forme, comme un assemblage de plusieurs couches d'eau qui se sont sixées successivement les unes sur les autres; quand cela se fait au même endroit, toutes les couches se ressemblent à peu-près, mais sur un courant combien n'arrive-t-il pas d'accidens qui changent l'état de l'eau pendant que le froid sixe ses parties?

Les vagues & les lames d'eau qui passent sur la glace & qui s'y gelent en un instant, comme nous l'avons dit ci-dessus, couvrent souvent & renserment au dessous d'elles le frimas, la gelée blanche ou la neige qui s'y est attachce, & c'en est assez pour occasionner cette couleur blancheatre que l'on

remarque presque toûjours aux glaçons slottans.

N'est-il pas naturel de penser que l'eau perd sa sluidité par degrés comme toutes les autres matières, que ses parties avant que de prendre une consistance totale, se pelotonnent, pour ainsi dire, en molécules plus grossières, & que seur assemblage n'est uniforme & solide qu'autant qu'elles ont eu le soitir de se joindre de la manière la plus convenable, ou que seur liaison n'a point été interrompue par des secousses & par des mouvemens étrangers. Toutes les matières qu'on agite, sorsqu'elles passent de l'etat de siqueur à celui de solide, ne prennent jamais ni la transparence, ni la dureté qu'elles acquéreroient sans cette circonstance, & les siqueurs qu'on sait glacer en les remuant, ne se convertissent jamais qu'en neige.

Quand j'ai supposé ci-dessus que les parties d'eau dont se sorme le glaçon slottant, n'ont qu'un mouvement commun, a qu'elles sont comme en repos relativement les unes aux autres, je n'ai pas prétendu que ce repos sut aussi parsait qu'il peut l'être dans une eau dormante, je n'ai exclu par ma supposition que des vîtesses respectives, telles qu'elles ne laissaffent aucun lieu à la fixation de l'eau; mais tant qu'il y a de ces mouvemens irréguliers qui changent continuellement la position des parties (& il y en a toujours dans l'eau

MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE 62

qui coule) l'union ne peut jamais se saire d'une manière aussi intime ni avec autant d'ordre qu'elle se seroit dans des cir-

conflances plus favorables.

Indépendamment de ces vitetles inégales qui tendent à déplacer les parties, & qui retardent leur cohérence, il est encore une autre espèce de mouvement qu'on ne peut guère se dispenser d'admettre, & qui s'oppose aussi à la congélation & au parfait arrangement des parties de l'eau. Tont fluide qui suit une pente non seulement glisse selon cette inclinaison, mais il semble que les petites masses qui le compofent, au moins celles qui sont aux surfaces, doivent tourner sur elles-mêmes, à peu-près comme les petits glaçons dont j'ai parlé ci-deflus. Quand le mouvement de toute la masse seroit tellement régulier que les molécules de l'eau tournassent sans se déplacer les unes à l'égard des autres, seroit-il patilble galaam anent de leur congelation elles fe trouvailent unies aussi étroitement & avec autant de régularité que si le repos avoit précédé cette union, à moins qu'on ne suppose toutes e spetites maffes parlaitement uniformes & de figure ¿ dement propre à s'arranger dans toutes fortes de circonftince? Supposition peu vrai-semblable si l'on considere les molecules qui commencent la glace comme autant de petits glaçons infensibles que la gelée a déja pelotonnez.

Enfin, quand l'eau se gèle étant en repos, une grande partie de l'air qui s'en dégage, s'échappe du côté opposé au froid qui condense les parties, & se rassemble en volumes trèsfaithles & quesquetois fort grands. If n'en est pas de même quand le froid convertit en glace des parties d'eau qui se meavent adaellement, l'air qu'elles renferment entrelles s'échappe en toute sorte de sens & demeure divisé dans la mute en une infinite de petits globules qui interrompent les passages de la lumière, & qui en détournent les rayons par de 1 h dians & par des rellexions différentes de celles que l'eau seule occasionneroit. C'est une observation qui n'a point * ? The Chappera M. & Mairan *, & qu'il a fait valoir pour expliquer la glace, refere de pourquoi la glace en général est toûjours moins transparente

des filees que mon que l'eau dont elle a été sormée.

. 4.º Les glaçons qui flottent dès l'instant de leur forma-remponté les Prix tion, font toujours moins folides & moins épais que ceux d'une eau tranquille, qui ont commencé en meme temps & 1,700000 avec le même degré de froid.

Les causes qui rendent ces sortes de glaces moins transparentes que les autres, empêchent aussi qu'elles ne prennent autant de solidité; car en général les corps solides ont d'autant plus de consistance que leurs parties sont plus homogenes & que leur liaiton est plus parfaite. Ces deux conditions manquent dans les glaçons flottans, les petites parties d'air dont ils font remplis & qu'on y aperçoit au premier aspect, interrompent frequemment celles de l'eau qui se sont glacées, & ce mélange forme un tout qui n'est solide qu'en partie, encore ce qu'il y a de solide n'a-t-il pas toute la cohérence qu'il pourroit avoir, parce que, comme je l'ai déja remarqué, les pièces qui composent cette folidité interrompue, n'ont pas eu la facilité de s'arranger de la manière la plus convenable, à cause du mouvement qu'elles ont eu jusqu'à l'instant de la congélation.

Quant à l'épaisseur, on concoit facilement qu'un morceau de glace qui soit le sil de l'eau & qui n'a jamais exaclement la même vîtesse qu'elle, a moins de prise sur les parties qui doivent recevoir de lui le degré de froid nécessaire pour s'y

attacher & concourir à fon accroissement.

En admettant l'opinion que j'ai exposce dans ce Mémoire touchant la formation des glaces que les grandes rivières charient, on expliquera facilement un fait qui a merite l'attention des Scavans, & dont je vois qu'on a cherche la raison. On a vû pluticurs fois la Seine tout à-fait prife par un froid qui n'excédoit pas 8 ou 10 degrés, & l'on se rappelle encore avec une espèce de surprise, que pendant le rigoureux hiver de 1709, le milieu de son courant demeura libre, à cela près qu'il charioit des glaçons comme il a coutume de faire pendant une gelée beaucoup moins âpre.

M. Homberg * pour expliquer cette espece de bizarrerie de * V. // la Nature, supposa que « les grosses rivieres, au moins dan. "page y. ?

64 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

" notre climat, ne devoient pas geler d'elles-mêmes si ce n'est » vers les bords, parce que leur courant est toûjours trop fort " vers le milieu; qu'ainsi si l'on ne cassoit pas la glace des bords " (ce que l'on ne manque jamais de faire, dit-il, pour diffé-" rentes raisons) le milieu couleroit toûjours à l'ordinaire, sup-" posé d'ailleurs qu'il ne tombat point de petites rivières dans " la grotle; mais comme il y en tombe, les glaçons qu'elle or charie dans son milieu, viennent pour la plus grande partie " des petites rivières dont on a cassé la glace; que ces glaçons » arrêtez par un pont ou par un coude de la rivière, ou par si quelça intre obilacle que ce foit, se costent les uns aux autres » par le froid, & forment ensuite une espèce de croûte qui » couvre toute la surface de la rivière; & qu'enfin comme le " froid de 1709 fut très-subit & très-âpre dans son premier " commencement, les petites rivières qui tombent dans la » Seine au deffus de Paris gelerent tout-à coup & entièrement, " de forte que leurs glaçons qui se seroient pris sur la superficie » de la Seine, ne pûrent y être apportez, du moins en assez

Je suis d'accord avec M. Homberg sur la manière dont se fait l'engorgement, je conviens que la glace qui couvre une grande rivière n'est jamais toute d'une pièce, qu'elle n'est qu'un assemblage de plusieurs morceaux arrêtez par quelque obstacle, & soudez, pour ainsi dire, les uns aux autres; je crois encore, comme lui, qu'un froid subit & sort âpre rend les glaçons slottans moins nombreux qu'ils n'ont coûtume d'être lorsque l'hiver est plus modéré; mais quelle en est sorigine, & pourquoi leur quantité dépend elle de la sorce & des progrès plus ou moins précipitez de la gelec! voilà

le point qui nous sépare.

grande quantité. »

Que quelques meuniers, quelques paysans rompent les glaces qui leur nuisent aetuellement, ou pour prevenir quelques accidens qu'ils ont à craindre, & qu'ils en mettent à flot les fragmens; que ces morceaux même emportez par le courant en détachent d'autres de temps en temps par leur choe, c'est ce qu'on ne peut nier raisonnablement; mais que

cela suffise pour produire tout ce qu'on voit flotter nuit & jour tant que le courant est libre, c'est ce qui ne me paroît pas vrai-semblable. Mes doutes sont sondez sur les raisons que j'ai alléguées ci-dessus, & je les trouve d'autant plus fortes, qu'elles sont parfaitement d'accord avec une expérience dont la Police de la Ville sit les frais ces jours derniers forsque la Seine sut totalement prise. Cinquante ou soixante ouvriers furent employez à rompre les glaces pour prévenir les défordres d'un dégel précipité; quiconque a voulu le voir, aura remarqué comme moi, que pendant ce travail les glacons qui ont flotté n'étoient ni aussi grands, ni aussi nombreux qu'ils l'avoient été précédemment par le seul effet de la gelée. Peut-on croire après cela qu'une grosse rivière comme la Seine, ne charie que par l'effet du hasard, ou par les foins de quelques particuliers qui de loin en loin mettent l'eau à découvert?

Disons plûtôt que les glaçons qui sont chariez, au moins quant au plus grand nombre, sont sormez comme je l'ai expliqué ci-dessus, qu'ils slottent dès l'instant de leur naisfance, & que venant à s'amasser & à se joindre les uns aux autres dans les endroits où il se rencontre des obstacles, seur atsemblage sorme une espèce de croute qui cache entierement l'eau; & le milieu du courant sur qui la gelée n'a point de prise immédiatement, se trouve couvert par une glace qui vient d'ailleurs: voilà ce qui se passe le plus ordinairement.

Mais il peut y avoir tel cas où les glaçons flottant dès leur origine ne parviennent pas jusqu'au milieu du courant, ou n'y arrivent point en assez grand nombre pour le couvrir par-tout, & ce cas est celui d'une gelée plus subite & plus âpre que d'ordinaire, & voici comment on doit l'entendre.

Une certaine étendue d'eau qui coule assez unisormement pour donner prise à la gelce, devient sur la rivière un glacon isolé qui continue de flotter tant qu'il se trouve entre le sort du courant & quelque veine d'eau qui demeure stuide, parce que le degré de mouvement qu'elle a, ne cède point au froid actuel. Mille circonstances occasionnent ces differens

MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE depres de vinctie dans les différentes parties d'une grande rivière, & c'est une supposition que je ne crois pas qu'on veuille me contester. Mais si le froid vient à s'augmenter pa implement, cette portion de la rivière qui avoit confervé La fluidité, pourra la perdre avant que le glacon flottant qu'elle fepue du rivage ou des glaces qui y tiennent, soit celuppe, & cette derni se congelation, je veux dire, celle que l'aug mentalian fubite de la gelec ama fait nattre, Lera aux elaces du boid le morceau qui auroit continué de flotter par un moindre degre de froid; de-la il fuit que la rivière charie heaucoup moins par deux railons, 1 parce que le glacon qui auroit flotté ne flotte point, 2° parce que ne flottant point & demeurant dans le lieu même où il a été formé, il couvre une étendue d'eau qui en auroit produit un autre immédiatement après lui.

En voilà assez, je pense, pour faire entendre comment les rivieres charient independ amment des soins qu'on paroit se donner pour rompre la glace, & pour justifier eette proposition qui paroît d'abord un paradoxe, que nous avons quelquesoi, en France des hivers trop froids pour glace:

entièrement nos grandes rivières.



ME' MOIRE

Où l'on prouve qu'il y a une inégalité très-sensible dans les plus grandes hauteurs du Soleil au solstice d'été, & que l'obliquité Apparente de l'Écliptique* a augmenté depuis 1738, d'environ un quart de minute ou quinze sécondes.

Par M. LE MONNIER Fils.

Al comparé en 1-38 la plus grande hauteur soldiciale J du bord supérieur du Soleil avec celles qui ont été obfervées en 1715 & 1721 par M. le Chevalier de Louville, dans le dessein de vérisser son hypothèse sur la diminution de l'obliquité de l'Ecliptique, & dans le Mémoire que j'ai Iû pour lors à l'Académie, j'ai fait voir qu'il ne paroissoit guere vrai-temblable que cette diminution fut autli confiderable qu'on l'avoit supposée jusqu'ici, puisqu'au lieu de 12". dont le Soleil auroit dû paroître moins élevé, je trouvois à peine de quoi me convaincre qu'il y cut cu quelque diminution fentible dans l'espace d'environ vingt ans. Il est vrai que dans un intervalle trois fois plus grand qui s'est écoulé entre les observations faites à l'Itle Cayenne & celles qu'on a faites au Pérou, on trouve une différence d'environ 20 secondes dont l'obliquité de l'Ecliptique auroit diminué; mais après avoir examiné toutes les circonstances de ces observations, on a sait voir qu'elles ne savorisoient pas entièrement l'hypothèse etablic par M. de Louville, puisqu'il est certain qu'en adoptant les mêmes observations il saudroit près de 200 ans avant qu'on s'aperçut d'une minute de diminution dans l'obliquité de l'Écliptique.

* Il faut prendre garde que cette obliquité n'est point conclue des observations saites au solssice d'hiver, à cause de la réfraction qui est inconnue & qui varie à 18 degrés de hauteur; on en donnera dans la fuite le résultat, car il n'est point encore prouvé que la distance des Tropiques ait augmenté sensiblement dans l'espace de cinq à six ans.

22 Juin 17+3.

Peu de temp après jai en communication de deux differentes lettres cerltes à M. de Maupertuis par M. Bradley. où il est parlé d'un mouvement particulier aux Etoiles fixes. & qui devoit influer sur l'obliquite de l'Ecliptique: comme M. Bradley paroissoit desirer que l'on observat ici avec le sedeur de 9 piede de ravon le mouvement qui, dans les ctoiles du colure des solstices, avoit paru en 1728, contraire à celui que l'on observe aux étoiles situées près du colure des équinoxes, je commençai dès-lors à déterminer les vraies distances au zénit de Paris de l'étoile n de la queue de la grande Ourse. de quelques autres étoiles du Bouvier & d'Hercule, & de Leanle o de la tete du Dr. on. Je publisi les mêmes obtervations dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1738, & ensuite dans le livre qui a pour titre Degré du Méridien; mais à prine deux annes s ctoient coult es que j'apercus ces mêmes variation annonces par M. Bradley, let etailes du colure du folflice, telle que y de la tete du Dragon, s'et int doisnées du zénit de Paris vers le Midi, ce qui doit s'entendre après avoir fait quelques legeres réductions qui dépendent de la Précession des Equinoxes.

Je comparal auffi en 1738 l'étoile d'Arclurus avec le bord superieur du Soleil, & avant determiné leurs différences de hauteurs méridiennes au solssice d'été, de 3d 10' 15", je me proposa d'abord de verifier par cette voie si l'obliquité Apparente de l'Ecliptique augmenteroit, comme M. Bradley le foupconnoit; d'ailleurs j'ignorois entièrement fi M. Bradley avoit fait usage dans cette occasion des hauteurs solsliciales du Soleil. Quoi qu'il en soit, il est à propos de remarquer ici que l'étoile d'Arcturus étoit fort convenable pour cette recherche, n'étant pas fort éloignée du Soleil à la fin du my i de Juin, & fon putiage au Muridien le fuitant en plein jour & à une heure très-commode. De plus le micromètre de mon quart-de-cercle étant excellent, je crus pouvoir déterminer cette différence de hauteur plus exactement qu'à s secondes près, sur-tout en prenant un milieu entre diverses opérations réitérées plusieurs jours de suite ayant ou après le

solstice; ensin le til à plomb tomboit chaque sois sur les mêmes points de la division de mon quart-de-cercle.

J'avois déja annoncé à l'Académie en 1740 le résultat de ces premières tentatives *, mais j'ai toujours diffère de les publier, jusqu'à ce que des différences plus confiderables m'aient (1999) enticrement convained qu'on ne pouvoit plus soupçonner le ... a. e d'erreurs dans des observations auffi delicates. Arcturus doit i / i) descendre chaque année de 18', à cause de la Précession des 15 de 2000 Equinoxes; mais parce que cette étoile a un mouvement : , : ; , ... propre en latitude d'environ 2 minutes en 50 ans, j'ai trouvé (1997) : 1 en comparant d'autres observations faites avec l'instrument de l'acceptant Mr Picard & de la Hire, qu'Arcturus avoit change sa decli-naison de 17' 27" ½ en 55 ans, & qu'ainsi cette étoile devoit lis h changer chaque année sa declinaison de 19', 05. Ayant donc égard à cette correction, & ajoutant le double 38, 17, --au résultat des observations saites en 1738, on voit d'abord qu'elle auroit dû paroître plus basse en 1740, de 3d 10'53" que le bord supérieur du Soleil, au lieu que je l'observai de 3ª 11' 5", c'est-à-dire, de 12" plus grande.

Enfin ayant égard aux mêmes réductions que ci-desfus, La hauteur meridienne du bord supérieur du Soleil au solstice d'été de 1742, devoit surpasser celle d'Arcturus de 3d 11'. 31"; au lieu que j'ai trouvé 17" 1 de plus qu'en 1738, & actuellement au solstice de 1743, la dissérence est un peu plus grande. Il est donc constant par une suite continuelle d'observations saites avec le même micromètre depuis 1738, que la plus grande hauteur folfliciale du Soleil à augmenté; en un mot, independamment des hauteurs de l'étoile, & après avoir bien vérifié mon quart-de-cercle au zénit par les étoiles de la grande Omie, ainfi que je l'ai pratiqué au mois de Juin 1738, je trouve la hauteur meridienne du bord superieur du Soleil de 15" plus grande, c'est à-dire, qu'elle est aujourd'hui, réduite au parallèle de l'Observatoire, de 6.4d 5.4' 35", au lieu

de 64d 54' 20" qu'on a trouvé il y a cinq ans.

126 5754

Liij

SUR LEZINC.

Second Mémoire.

Par M. MALOUIN.

15 Juin DLUSIEURS expériences que j'ai faites sur le Zinc avec 1743. Il le soufre minéral, avec l'antimoine crud, avec le régule d'antimoine & avec le foie de soufre, m'ont fait connoître que le Zinc a quelques propriétés qui n'avoient encore été attribuées qu'à l'or; j'ai trouvé qu'il a aussi quelque chose de commun avec le mercure; enfin j'ai remarqué dans ce demi-métal des singularités qui le distinguent de toutes les matières métalliques, dans les choses mêmes qui leur sont communes à toutes.

> Je me propose de rapporter dans ce Mémoire ce qui m'a conduit à ces connoissances, j'y rendrai compte aussi de la dissolution du zinc par les alkalis fixes & par les volatils; enfin je le terminerai par le détail d'une expérience que j'ai faite sur le phosphore & sur le zinc mêlez ensemble.

> Dans le Mémoire que j'ai eu l'honneur de lire l'année dernière à l'Académie sur l'analogie du Zinc & de l'Étain, j'ai rapporté une expérience par laquelle j'ai trouvé que le zinc réfiste au soufre minéral, comme fait l'or, & qu'il ne s'y mêle point lorsqu'on les sond ensemble, quoique tous les autres métaux s'y joignent plus ou moins: le mercure même a une telle liaison avec le soufre, que c'est un des plus sorts moyens qu'on ait pour le retenir & pour lui donner une forme solide. L'argent s'unit encore plus intimement au sousre commun que ne le fait le mercure, & on peut imiter par cette union du sousre & de l'argent, une production naturelle qui se trouve près de Goslar dans la Forêt noire: c'est cette mine d'argent & de soufre de laquelle George Agricola & plusieurs autres Auteurs ont parlé sous le nom de Minera argenti vitrea.

J'ai aussi rapporté dans mon premier Mémoire sur le Zinc, une opération par laquelle ayant suit fondre de l'étain avec du soufre minéral, j'ai sait une espèce de mine artissielle d'étain; le soufre & l'étain y étoient si bien mêlez, qu'ils représentoient ensemble une pierre d'étain dont l'interieur étoit disposé en aiguilles, comme est l'antimoine.

On trouve à Hetie une mine de fer sousrée qu'on nomme Minera Martes solaris, laquelle contient une quantité extraordinaire de soutre. Le fer est de tous les metaux celui qui se joint au sousre plus aisément & en plus grande quantité.

On sçait en Chymie que le régule d'antimoine fondu avec du soufre commun, forme un antimoine crud qui est toutfait semblable à l'antimoine naturel qu'on a tiré de sa gangue.

Entin le soufre s'attache plus ou moins à toutes les matières métalliques, à l'exception de l'or & du zinc, ce qui est surprenant par rapport au zinc, en ce qu'il paroît qu'il contient beaucoup de soufre, puisqu'il brule en s'entlammant, ce qui n'arrive à aucune autre matière métallique; mais il y a lieu de penser que ce soufre est particulier au zinc, & qu'il n'est point de la nature du soufre ordinaire. J'ai sondu ensemble parties égales de zinc & de soufre commun, & lorsque le tout a été retiré du seu & respoidi, j'ai retrouvé le zinc que j'avois employé, le soufre ne l'avoit point dissous, & ils ne s'étoient point mèlez ensemble. Je dois encore saire observer que pendant l'opération il ne s'étoit point sublime de sleurs, quoique le seu suit attez sort pour cela, ce qui apprend que le soufre sixe le zinc.

Cette experience m'a depuis conduit à en tenter une autre, qui a cté de faire passer le zinc par l'antimoine crud, parce que l'antimoine, comme on le sçait, el compose d'une grande quantité de soufre de la nature du soufre commun.

C'est un fait constant que l'antimoine dissout tous les métaux, à l'exception de l'or. Si l'on sait sondre un métal avec l'antimoine crud, le métal se dissout, & s'élève en scories avec la partie sultureuse de l'antimoine, pend int que la partie réguline de ce minéral tombe au fond.

Personne, que je sçache, n'a travaillé se zinc avec l'antimoine. J'ai sait sur ces deux minéraux plusieurs opérations, desquelles je ne rapperteral ici que celles qui fant au sujet que je traite dans ce Memoire. J'ai pense que puisque l'antimoine ditsout les metsux par sa partie salsureuse, & qu'il ne dissout point l'or, il pourroit se saire que l'antimoine ne dissout-oit pas le sine, qui, comme l'or, ne se dissout point par le soutre.

Pour m'affurer de ce fait j'ai mis 4 onces de zinc dans un creuset rougi entre les charbons ardens, & lorsque le zinc a cte presque sonda, j'y ai ajouté 4 onces d'antimoine end en poudre; j'ai recouvert le creuset, & j'ai entoure le tout de charbons jusque par desius le couvercle. Quelque temps apres ayant juge que le melange pourroit être sondu, j'ai ecarte ces charbons & j'ai de couvert mon creuset; j'ai plongé dedans une verge de ter rouillee, j'ai remue, & ayant trouve la matière bien sondue, je l'ai retirée du seu, & je l'ai renversée.

Pendant que le tout refroidissoit, j'ai examiné le couvercle du creuset, & j'ai trouve qu'il y avoit plus est petits globules de zinc, lesquels y étoient attachez par une espèce de crasse d'un gris jaune, qui formoit sur ce couvercle une couche mince & inégale. Il est à remarquer que le zinc avoit été mis au fond du creuset, & que le creuset n'avoit point été

tout-à-sait rempli par l'antimoine & par le zinc.

Cette observation jointe à d'autres dont je vais rendre compte, m'a donné lieu d'attribuer au zinc une propriété de

laquelle je parlerai dans la suite.

La matière étant refroidie, j'y ai retrouvé le zinc séparé de l'antimoine, & j'ai observe que l'antimoine n'étoit point en régule, qu'il étoit simplement comme est l'antimoine crud qu'on a resondu.

Quoique cette expérience prouvait affez que l'antimoine ne ditfout pas plus le zine que ne fait le foutre, j'ai reiteré plus ficurs fois l'opération en y talfant quelques chan; emens, & je n'ai jamais pû unir ensemble le zine & l'antimoine crud.

Il m'est souvent resté après l'opération une espèce de crasse d'un gris brun, qui étoit plus considérable sorsque j'avois

bien

bien fait fondre le zinc avant que d'y mettre l'antimoine, ou forsqu'ayant mis l'antimoine dans le même temps que le zinc, j'avois plus poussé le seu qu'il ne salloit pour sondre

seulement le mélange.

Cette crasse ne doit point être prise pour des scories composces du zinc dissous avec le soufre excédent de l'antimoine. puisque dans toutes ces opérations, de quelque façon que je les aie faites, il n'est jamais resté de régule d'antimoine. Il se forme une semblable croûte sur le zinc sondu avec le soufre, quoiqu'il ne se dissolve point de zinc par le sousre, comme je l'ai rapporté dans mon premier Mémoire. Cette croûte feroit aussi considérable, si le zinc étoit tenu sans soufre ou fans antimoine, au même feu & pendant le même temps; il y a feulement cette différence, qu'elle est d'un brun verd par le soufre, & d'un brun gris par l'antimoine, au lieu que sur

le zinc seul elle paroît grise.

Pour mieux voir ce qui se passoit lorsque je fondois enfemble le zinc & l'antimoine, j'ai mis l'un & l'autre dans une cornue de verre qui avoit environ 4 pouces de diamètre. J'ai placé cette cornue sur un culot au milieu d'un fourneau, & j'y ai ajusté un récipient, sans luter les jointures de ces deux vaisseaux, ensuite j'ai donné un seu doux d'abord. J'ai aperçu que dès que le mélange a commencé à se fondre, il pussoit une petite vapeur blanche de la cornue dans le récipient, & une partie de cette vapeur s'échappoit dehors par les jointures des vaisseaux. Ayant examiné de bien près cette vapeur, j'ai trouvé qu'elle avoit une odeur à peu-près semblable à celle du pholphore. Cela me rappella dans l'efficit ce qu'avance M. Henckel dans sa Pyritologie*, où il dit que le * Pyritologie zinc & le phosphore ont une grande liaison entr'eux, & qu'ils Henckel, c. l'o, p 628. Liff. viennent, selon toute apparence, d'un même principe.

Ensuite j'observai qu'ayant un peu augmenté le seu, le col de la cornue étoit devenu brun intérieurement, & en même temps le haut de la cornue, c'est-à-dire, la partie vuide de la cornue s'étoit obscurcie de même par une couleur brune. Je jugeai alors que mon opération étoit, pour ainsi dire,

Mem. 1743. . K

manque, en ce que cette couleur m'en déroboit la vûe, qui etoit tout ce que je cherchois en la faifant dans des vaitieaux de verre; c'ett pourquoi ayant renonce à voir ce qui fe feroit pail pendant la fusion du zinc & de l'antimoine melez enfemble, j'ai augmente le seu insentiblement jus pa'à un degré suititant pour saire elever le zinc en sleurs : je voulois par ce moyen sçavoir s'il s'éleveroit des sleurs de zinc dans des vaiticaux sermez, & si l'antimoine apporteroit à ces sleurs quel que variete. En poutsant ainsi le seu, la cornue s'est obleurcie de plus en plus, & elle n'a pas tandé à se feler dans son son fond vers la partie posterieure; alors la vapeur blanche qui auparavant passoit par le col de la cornue dans le recipient, a discontinué aussi tot, & elle s'est échappee par cette schure, ce qu'elle a continué de faire pendant tout le reste de l'opération.

Après avoir augmenté le seu par degrés pendant une demiheure, j'ai cessé d'y mettre du charbon, & j'ai laisse le tout

dans l'état où il étoit, pendant que le feu s'éteignoit.

J'ai observé que la connue en se retroidifiant taisoit sans cesse un bruit semblable à celui que sait le verre sorsqu'il catie au seu, & j'ai vu qu'elle se seloit de toutes parts, si ce n'est à

sa partie supérieure qui étoit vuide.

Entin j'ai retiré ma cornue hois du fourneau lorsqu'elle n'a plus fait de bruit & qu'elle a éte tout-à fait retroidie, je l'ai examinée, & j'ai trouvé qu'elle étoit toute cafice en petits morceaux dans la partie qui contenoit la matière, ce qui venoit, je crois, de ce que cette cornue en s'échaussant avoit augmenté la capacité, & la matière en le fandant en même temps dans la cornue, s'étoit conformée à cette capacité. Le feu étant éteint, la cornue s'est refroidie plus promptement que n'a fait la matière qu'elle contenuit : cependant lorsque cette matière en se resroidissant a été assez endurcie pour résister à la compression du verre qui se resservoit, la cornue s'est cassée en petits morceaux, qui se sont écartez les uns des autres à proportion de la dissérence du resservement de la cornue, & de celui de la matière qu'elle contenoit.

J'ai encore obtervé ce ei de particulier, e est que le milieu du

corps de la cornue étoit comme une large bande toute ganie extérieurement de petites éminences qui étoient comme des têtes d'épingles de différentes groffeurs. Quelques-unes de ces éminences étoient percées, & les bords de ces petits trous étoient inégaux & comme déchirez en dehors. Cette bande étoit large irrégulièrement de trois doigts dans la partie de la cornue qui étoit opposée à son col, & elle aboutissoit en diminuant insensiblement de largeur, à deux travers de doigt loin du col. Le tiers de la fargeur de cette bande répondoit au haut de la matière, & les deux autres tiers s'etendoient au dessus.

Après avoir ainsi considéré les dehors de ma cornue, je l'ouvris, & ayant examiné la matière qu'elle contenoit, je n'y trouvai pas le moindre vestige de régule d'antimoine : le zinc étoit en gros globules répandus dans l'antimoine crudces globules de zinc étoient en plus grande quantite vers la partie supérieure & vers le col de la cornue, que dans le reste de la masse.

Ces éminences hémisphériques que j'ai dit avoir observées au dehors de la cornue, faisoient en dedans autant de concavités, & j'ai aperçu dans ces petites concavités des globules métalliques.

Pour sçavoir si ces globules étoient des globules de zinc, je les examinai par la propriété que j'ai trouvé qu'a le zinc, qui est de donner un cri particulier, comme est celui de l'étain, & un peu plus sort. Je mis quelques-uns de ces petits globules entre mes dents, & je trouvai qu'ils avoient bien sensiblement le cri du zinc.

J'examinai les morceaux de verre qui formoient le fond de la cornue, au dessous de cette espèce de bande distinguée par ces éminences & par ces petits trous, & je n'y remarquai ien de particulier. Pour ce qui est du haut de la cornue qui étoit au dessus de cette bande, il étoit tout garni en dedans d'une couche brune, comme une espèce de chagrin, dont les grains étoient plus gros dans la partie qui ctoit plus près de cette bande, & ces grains devenoient d'autant plus petits,

76 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE qu'ils s'en éloignoient plus; de forte que dans la partie de la cornue la plus éloignée de la matière, ces grains n'étoient pes fent le le ru toucher, ils étoient teulement la transpuence du verre. J'examinai les grains qui faisoient cette espèce de chagrin, & je reconnus que c'étoient des globules de zinc noircis par l'antimoine.

Ayant trouvé que l'antimoine ne dissout point le zinc, je voulus voir si on pourroit mèler ensemble le régule & le zinc; per cet este je tandis du regule d'antimoine. À 19 je tai du zinc en petits morceaux, il s'y fondit aussi-tôt: je retirai le tout du seu, & lorsque la matière sut refroidie, je trouvai que le zinc étoit allié au régule, & qu'il le rendoit plus dur

& plus cassant.

Pour réussir dans cette opération, il ne saut pas donner un seu trop sort, qui seroit dissiper le zinc en espèces de susées; il ne saut pas non plus saire un seu trop soible, parce qui l'audioit le contina r plus lun, temps pour sure l'atti-e, & on verroit alors la matière se couvrir d'une sorte de crasse grise produite par le zinc calciné.

Cette expérience qui montre que le zinc se mêle bien avec le régule, prouve en même temps que c'est la partie sulfureuse de l'antimoine crud qui empêche que le zinc ne s'y allie.

Voyant que le zinc résisse au sousre minéral & à l'antimoine, comme sait l'or, j'ai en lieu de croire qu'il se dissoudroit ensin par le sousre joint à un alkali, je veux dire, par le soie de sousre, puisque l'or s'y dissous.

On sçait, ou du moins les Chymistes sçavent, que l'or se dissout si paraitement par le soit de s'ustre, que le melange de l'or & du soie de sousre étant dissous dans de l'eau, l'or y

reste suspendu, & passe avec elle au travers du siltre.

Je jugeai que le zinc pourroit se dissoudre de même dans un teu de suston par le soie de sousire, quoiqu'il ne se dissolve point par le sousire seul, ni par le sousire joint au régule, comme il l'est dans l'antimoine crud, puisque l'or qui ne peut se dissoudre ni par le sousire ni par l'antimoine, se dissous par le soie de sousire aussire qu'aucun autre métal.

Mais je prevoyois qu'il feroit difficile de s'affurer de ce qui résulteroit de cette opération, parce que le zinc se calcine aisément par le seu, & parce que tous les acides le dissolvent promptement. Il ne suffisoit donc pas de voir que le zinc se dissout dans le soie de soufre, il falloit s'assurer que c'étoit par le foie de soufre que le zinc seroit dissous sans être décomposé, comme l'or en est dissous; c'est pourquoi il salloit trouver le moyen d'en retirer le zinc sans qu'il eût perdu aucun de ses principes, ce qui est aussi difficile à faire qu'il est facile d'en retirer l'or, parce que ce métal ne se calcine point,

& parce que les acides le précipitent sans le dissoudre.

Ces difficultés prévûes & les moyens trouvez de retirer le zinc du foie de soufre en cas qu'il y sût dissous, comme je m'y attendois, j'ai fait un foie de foufre avec une once & demie de sel de tartre & une once de soufre mêlez ensemble; j'ai mis ce mélange par cuillerées dans un creuset d'Allemagne rougi au feu, recouvrant chaque fois le creuset; lorsque la matière a été sondue, j'y ai jeté une demi-once de zinck, & j'ai recouvert le creufet : quelque temps après je l'ai découvert pour voir si le zinc étoit fondu, alors j'ai aperçu que les petites lames qui s'élevoient en se croisant en grand nombre & avec beaucoup de viteffe dessus la matière, avoient chacune trois couleurs différentes, elles étoient blanches dans leur milieu, rouges au dessus, & bleues dans leurs bords. J'ai fait cette remarque, parce qu'avant que j'eusse mis le zinc dans le foie de foufre, les étincelles qui en partoient, étoient rouges feulement, elles n'étoient pas en si grande quantité, & leur mouvement n'étoit pas si vif que lorsque le zinc y a été. J'ai rapporte dans mon premier Mémoire, que lorsque le zine ett bien fondu, il s'en élève de petites susées qui sulminent.

Ayant reconnu que le zinc étoit fondu avec le foie de soufre, j'ai retiré le creuset du seu, & je me suis aperçu qu'il y avoit extérieurement à la partie inférieure du creuset de petits points lumineux qui deviment de petites flammes plus sensibles; ces slammes s'étendirent peu à peu, de sorte qu'infunfiblement elles se joignirent ensemble, & ne firent plus das la l'ite gainne feule flamme qui entouroit tout le bas du creuset; cette flamme répondoit à la hauteur de la matière contenue dans le creuset, mais peu de temps après elle s'é-

teignit en s'affoibliffant par degrés.

Lorsque le creuset a commencé à se refroidir, je l'ai découvert, & j'ai trouvé que le dessus de la matière qu'il contenoit, étoit comme une pâte fine & bien liée, elle avoit une couleur grise, & ce qui étoit dessous étoit verdatre & bien dur; j'ai pris entre mes doigts un peu de cette matière molle du dessus, elle y a durci extraordinairement en se reficidiffant tout-à fait. Je penfe que cette matière gifte étoit composée de la partie du zinc calcinée par le seu, & jointe à un peu de soie de soufre; lorsque cette partie calcinée du zinc est jointe à un peu d'antimoine ou à un peu de sousre, elle forme cette espece de croute dont j'ai parlé plus haut.

Après avoir catie le creuset, je reconnus qu'une partie de la mutière avoit penetré les côtés du creuset jusqu'en dehors, & j'apercus que celle qui ctoit restée dans le creuset, étoit remplie de globules de zinc, sur-tout vers sa partie supérieure.

Je sus sort surpris de voir que le soie de soutie n'avoit pas ditions le zino qui v étoit en globules, dont quelques-uns ctolent de la uro. Eur d'une noisette, comme je les avois trouvez dans l'antimoine crud après l'avoir fondu avec ce minéral.

Je soupçonnai que cela pouvoit venir de ce que je n'avois pas faisse affez long-temps la matière au feu, cette reflexion m'engagea à la remettre dans un creulet que je couvris, &

que j'entourai de charbons ardens.

Je remarquai que lorique la matiere commença de chauffer, il en fortit une famée de deffous le couverele par les trois pointes du creulet, & à cette fumée succèda aufli-tôt une flamme bleuatre; pendant ce temps il se sit une décrépitation dont le bruit augmenta tout d'un coup confidér iblement, & il cessa de même presqu'aussi-tôt. Je laissai le tout au seu pendant trois quarts d'heure, le premier quart d'heure le patla à allumer le fea, & il y a cu pendant une demi-heure un bon seu de susion.

Le tout étant refroidi j'ai cassé le creuset, & j'ai trouvé, comme dans la premiere opération, le zinc répandu en globules dans la masse du soie de soufre.

Le zinc n'étoit point tombé en culot au fond du creuset ni dans la première ni dans la seconde opération, parce que le zinc se sublime aisement au seu; il s'élève en sumée & en sleurs lorsqu'etant à un seu plus fort qu'il ne saut pour le sondre seulement, il est expose à l'air libre: au contraire, lorsqu'il est environné de quelqu'autre matière, comme dans les opérations dont il s'agit ici, il l'a été ou du sousre, ou de l'antimoine, ou du soie de sousre, alors il s'élève en globules, & en se resroidissant il ne tombe point au sond ni du soie de sousre ni de l'antimoine, quoiqu'il soit spécifiquement plus pesant qu'eux, parce que vrai-semblablement il se restroidit plus tard, & s'antimoine ou le soie de sousre étant plûtôt congelez que le zinc, il ne peut les traverser pour tomber en culot au sond du creuset.

J'ai observé dans les opérations par lesquelles j'ai sait sondre le zinc & avec l'antimoine & avec le soie de sousire, que le zinc, l'opération sinie, étoit en globules d'autant plus petits, & que ces globules se trouvoient placez d'autant plus haut dans la masse, que le seu avoit été plus fort.

Les petits globules de zinc que j'ai trouvez au couvercle du creuset dans la première opération dont j'ai parlé plus haut, & ceux qui se sont élevez dans la cornue, dont quelques-uns ont formé cette espèce de chagrin, & quelques autres en ont sorée, & même percé le verre, sont connoître que de toutes les matières métalliques le zinc est, après le mercure, ce qu'il y a de plus volatil; le zinc a encore ceci de commun avec le mercure, c'est qu'il paroit avoir une disposition naturelle à se mettre en globules ou en aiguilles. J'ai rapporté dans mon premier Mémoire sur le Zinc, que j'avois sondu jusqu'à six sois le même zinc, & parce que j'avois alors en vue de le calciner par ces sontes, je le laissois au seu quinze heures chaque sois; je sis dans ce temps une observation que je n'ai point rapportée dans ce premier Mémoire, c'est qu'après ces

MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE futions je trouvois beaucoup de cellules dans la matte du zinc lorsqu'elle étoit refroidie, & je remarquai que ces cellules devenoient plus grandes à chaque fusion, & qu'elles approchoient plus du centre de la maffe en s'éloignant plus de la surface; de sorte qu'en la grattant avec un couteau pour en faire tomber la chaux, je les ouvris, & il en sortit de petits globules rouds, blanes & quoique tolides, extremement mobiles, comme sont les globules de vif-argent; après les autres susions ces cellules étoient remplies d'aiguilles très-fines.

Je crois devoir rapporter ici à l'occation de la volatilité du zinc, ce que M. Stahl dit dans sa Dissertation sur les Sels des métaux*, sçavoir, que le zinc mêlé avec l'or élève avec lui des parties d'or lorsqu'on le sublime en sleurs. Je crois que le zinc sublimeroit de même les autres métaux, si après l'avoir allié avec eux on le sublimoit en fleurs; & dans ce cas on pourroit dire que le sinc ell entre les matteres métalliques ce que le sel ammoniac est entre les matières salines.

On doit regarder comme une chose bien singulière en Chymie, que le zinc ne se dissolve point par le soie de soufre, qui diffout parlaitement le regule d'antimoine, le bi.muth, le fer, le plomb, l'étain, le cuivre, l'argent, l'or, en un mot

toutes les matières métalliques.

Je n'en excepte pas même le mercure, quoique M. Stahl dife pointivement dans fon Specimen Bedamin in que le mercure ne se dissout point dans le soie de sousre, parce qu'il se dissipe pendant l'opération; mais on peut prévenir cet inconvénient en mélant le mercure dans le foie de soufre, comme on le mele dans le soutre pour faire l'athiops par le feu. Il faut d'abord faire le foie de soufre, & lorsqu'il est bien fondu e. qu'il est d'un rouge brun, il faut le retirer du feu, & des qu'il ne bouillonne & n'étincelle plus, il faut y saire tomber le mercure comme la pluie en le passant par le chamois, & remuant continuellement avec une spatule. On part aufit fire cette operation par la voie hamide, en mettant le mercure dans le soie de soufre dissous dans de l'eau, ou résous par l'humidité de l'air.

M. Groffe

* p. 19.

M. Grosse à qui je communiquai l'expérience par l'aquelle j'avois trouvé que le zinc ne se dissout point par le soie de sourre, sut extrêmement surpris de cette singularité, & il me conseilla de réitérer cette opération; ce que je sis en prenant alors pour composer le soie de soutre, parties égales de sousre & d'alkali, qui est la proportion dont parle M. Stahl dans sa Dissertation intitulée Vitulus aureus igne combusus, arcanum simplex, sed arcanum. Ayant sait ainsi mon soie de sousre, j'y jetai une demi partie de zine; mon opération étant sinie, je trouvai le zine en gros globules dans le soie de sousre, sur-tout vers sa partie supérieure.

Pendant que je réitérois ainfi cette expérience, M. Grosse y travailla aussi. Il prit, m'a-t-il dit, trois parties d'alkali & deux parties de soufre qu'il mèla ensemble, & qu'il mit dans un creuset rougi entre les charbons ardens; & lorsque le mélange sut bien sondu, & que la matière sut d'un rouge brun, comme doit être le soie de soufre sondu, il y jeta par intervalles une sixième partie de zinc en petits morceaux: il observa que de temps en temps il s'échappoit du zinc hors du creuset en s'élevant comme des susées enslammées.

Après avoir retiré le creuset du seu, & laissé refroidir, il trouva le zinc en globules qui n'etoient point alliez au foie de soufre.

Ce scavant Chymiste voulut encore réitérer cette opération en la faisant d'une autre saçon, & cependant en gardant la mème proportion de l'alkali, du sous en la du zinc, laquelle il avoit observée dans le premier essai, & qui est la memo que j'avois employée la première sois que je sis cette experience.

M. Grosse ne sit point le soie de sousre avant que d'y mettre le zinc, il sit le mélange des matières, & il en remplit les deux tiers d'une petite siole qu'il choisit à sond plat, & après s'avoir bouchce d'un bouchon de liege, il la mit dans un sourneau, & il lui donna d'abord un seu doux qu'il augmenta par degrés: dès que la matière commença à se sondre dans la siole, il vit le bouchon sauter en l'air, & dans le même temps la bouteille se cassa en morceaux, ce qui

Mem. 1743.

lui cta la fatisfaction qu'il s'etoit promife, de voir ce qui se passeroit pendant la sussen du zinc dans le soie de sousie en la faisant dans un vaisseau de verre.

Cette expérience sur le soie de soufre & sur le zinc m'a canduit à eprouver si le zinc se dissout par les alkalis. J'ai cte engage à en saire l'estai par la restexion que j'ai saite, que le soie de sourre ne dissolvant point le zinc, il salloit ou que les alk dis ne putient dissoudre le zinc, ou que le sousie eut n'n seulem nt la propriete de ne point dissoudre le zinc, mais encore celle d'empécher que ce qui peut le dissoudre etant seul, ne le dissolve pas etant joint au sousie; de même que los qu'il est joint au regule, il l'empèche de s'allier avec le zinc qui s'y unit si bien sorsqu'il est separe du sousire, comme je m'en sui assistant par l'experience que j'ai rapportée plus haut.

J'ai effavé de diffoudre le zinc avec les sels alkalis fixes, par la voie humide & par la voie sèche. Il m'a paru, en me fervant de la voie humide, que les alkalis diffolvoient plus lentement & en moindre quantité le zinc, lorsqu'ils ctoient rctous en liqueur par l'humidité de l'air, que lorfqu'on les avoit fait fondre en y versant de l'eau; & quand j'ai employe la voie siche en faifant fondre au feu le zinc avec les alkalis, ils fe font bien mèlez ensemble; de cette façon il s'est diffous plus de zine, & la diffolution s'en est faite plus promptement; enfin j'ai cru avoir trouvé que le sel alkali du tartre diffout micux le zinc que ne le diffout la potatie, & la potatie micux que ne fait la foude. Je ne me fuis cependant pas affure de ces differences, & je n'ai point cherche leurs degres, purce que mon unique objet dans les operations que j'ai faites avec les sels alkalis & avec le zinc, étoit de voir si les alkalis sixes diffolvolent furement le zinc, ce que j'ai trouvé conflint.

Le zine ne se dissout pas seulement par les alkalis sixes, il se dissout aussi par les alkalis volatils. M. Grotse qui m'a dit en avoir sait la première expérience, a mis du zine dans de l'esprit volatil de sel ammoniac, le zine s'y est dissous en jetant des bulles d'air sensibles. J'ai réitéré cette expérience, j'ai dissous du zine dans de l'esprit volatil de sel

ammoniac, mais la diffolution s'en est faite sans sermentation; vrai-semblablement cette difference vient de ce que l'esprit de sel ammoniac dont s'est servi M. Grosse, étoit plus

fort que celui que j'ai employé.

Voyant que les alkalis dissolvent le zinc, j'ai fait entrer une plus grande quantité d'alkali dans la composition du soie de soutre, pour le rendre plus propre à dissoudre ce demi-métal; j'ai pris six gros d'alkali du tartre, que j'ai mêlez avec un gros de sousre, j'ai mis le mélange dans un creuset rougi au seu; lorsque le soie de sousre a été bien sondu, j'y ai jeté un gros de zinc, j'ai couvert mon creuset; peu de temps après je l'ai découvert pour remuer la matière, & le zinc étant sondu j'ai cessé de remuer, j'ai recouvert aussi-tôt le creuset & je l'ai retiré du seu; lorsqu'il a été resroidi, je s'ai cassé, j'ai trouvé le zinc en globules répandus dans le soie de sousre, sans y être dissous.

Il réfulte de ces dernières expériences, que non seulement le soufre minéral ne se mèle pas avec le zinc & ne le dissout point, comme il se mêle avec toutes les autres matières métalliques, mais mème que lorsqu'il est joint aux alkalis, comme il l'est dans le soic de soufre, il les empêche de se mêler avec le zinc & de le dissoudre, quoiqu'ils s'y mèlent bien & qu'ils le dissolvent lorsqu'ils sont seuls; de même qu'il empèche le régule de s'allier au zinc, quoiqu'il s'y allie bien

lorsqu'il est seul.

Ayant vû que le soufre ne dissolvoit nullement le zinc, soit qu'il sût employé seul, soit qu'il sût retenu ou par le régule d'antimoine, ou par les sels alkalis, je conçus le dessein d'essayer si on pourroit dissoudre le zinc par le phosphore dont l'acide, qui est l'acide marin, dissout si bien le zinc; je me proposai de mettre du zinc en limaille avec du phosphore dans un matras bien bouché, de donner un seu de digestion jusqu'à ce que le phosphore suit dissous, & de voir si dans cet état le phosphore dissoudroit le zinc.

J'ai choisi un petit matras dont le corps avoit environ 2 pouces ½ de diamètre, & dont le col avoit 4 pouces de

84 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE longueur fur un demi-pouce de diamètre; j'ai mis dans ce matras 2 gros de zinc en poudre & 2 gros de phosphore

matras 2 gros de zinc en poudre & 2 gros de phosphore coupé menu, j'ai bouché le matras avec un bouchon de liége, j'... tondu de la circ a cada ter far les jointure. & j'ai appli paé par destus le tout un morceau de vessie mouillée, ensure j'ai mis mon matras dans un creutet que j'ai acheve de remplir de sable, & j'ai posé ce creuset dans un fourneau.

Le matras a paru d'abord rempli d'une vapeur blanche, mais elle a disparu peu de temps après, le matras s'est celairei. & il ne s'est rien passe entre le phosphore & le zine pendant quatre jours & quatre muits que je les ai laisiez ensemble sans seu.

Dès que j'eus fait un peu de seu, & que le matras commença à s'echautier, il se remplit d'une vapeur blanche, & j'apercus dans le milieu une flamme claire qui disprut presqu'aussi tôt; à cette flamme succèdérent d'autres flammes bien moins claires qui montoient du sond du matras à travers la vapeur blanche qui le remplissoit; ces flammes s'elevoient comme de ondes jusqu'a l'entrée du col du matras, je les voyois à l'obseurité, mais lorsque j'en approchois la lumière, j'apercevois seulement la vapeur blanche qui remplissoit le matras.

Cette vapeur & ces flammes se sont associates insensiblement, de sorte qu'au bout d'un quart d'heure je ne voyoi, plus sien dans le matras à l'obsenité, & sorsque j'en approchois la lumière il me parcitsoit éclairei, & les vapeurs qui circuloient dans le matra, n'etc ient plus blanches, elses étoient d'un jaune pâle, & je commençai alors à voir dans le sond du matras la matière qui y paroissoit être comme un sable jaune.

Dans ce încme temps j'aperçus au haut du matras comme des gouttes d'huile blanche, ensuite le tiers du matras vers son sond s'est trouve intérieurement tout garni de petits points qui et ient des gouttelette, transparentes comme de l'eau bien clane; le apercevant que ces gouttelettes étoient continuellement en mouvement, ce qui me paroissoit produit par des goutte d'ant singeur très claire qui dissibilité le leng des côtes du matras en dedans, j'observai attentivement une partie du vaite en d'où parcie vu tomber une larmé de cette siquem.

& je remarquai qu'à cette place qui ctoit vuide aprè la chiste de la larme, il s'y reforma de ces petites gouttelettes sphériques qui devinrent en si grand nombre qu'elles se toucherent, & dans l'instant d'attouchement elles se réunirent promptement en une goutte qui dissilla comme la première, & laissa une place où il s'en reprodussit d'autres; cette siqueur avoit la transparence de l'eau, mais else paroissoit avoir la consistance de l'huile. La quantité de ces gouttes a augmenté insensiblement, & il s'en est sormé peu à peu plus haut jusqu'au cos du matras, ensuite elles ont pris une couleur d'un jaune rouge, celles qui étoient vers le sond du matras ont été les premières à se colorer ainsi, & cette couleur s'est communiquée peu à peu jusqu'aux gouttes qui étoient dans le col du matras; on n'apercevoit plus de ces gouttes se former dans les parties du matras qui étoient ainsi colorées.

Dans la suite cette couleur jaune a pâli insensiblement, ce changement de couleur a commencé dans le sond du matras, & il s'est communiqué en montant jusqu'au col; alors j'ai aperçu au travers du verre ainsi coloré de petites plaques blanches qui paroissoient être métalliques, & avoir la grandeur des plus petites parcelles de zinc que j'avois enfermées dans le matras. Pendant tout ce temps j'ai augmenté doucement le seu par degrés, & il a toujours circulé des vapeurs dans le matras.

Il y avoit deux heures & demie que j'observois ainsi ce qui se passoit dans mon opération, lorsque tout à coup le matras se cassa en plusieurs morceaux; ces morceaux, par la sulguration, surent jetez de tous côtés, excepté les trois morceaux qui tormoient le sond du matras, lesquels resterent à leur place.

Il a paru d'uns le même inflant sur tous ces morceaux une flamme qui s'est éteinte peu de temps après; les morceaux du sond du matras contenoient du zinc en poudre qui étoit dans son entier, & qui étoit comme un sable jaune; ces morceaux avoient intérieurement une couleur de jaune pourpre.

Les morceaux qui avoient formé le milieu du corps du matras, étoient d'un jaune de safran, & on y voyoit de petite parcelles de zinc qui y étoient collées.

Pour les fragmens du haut du matras, & le col même, ils

étoient intérieurement colorez d'un rouge clair.

Les phaphore n'a diffous le zinc que loriqu'il a été refous on Le Lur par l'humidite de l'air, lorsqu'il n'a pas eté ainsi rotor il ne s'est mele dans cette operation ga'avec ce qui s'est calciné du zinc par la force du seu. Je crois que c'est cette partie du alne, combinee avec le phosphore, qui a donné dans le matras ces couleurs jaunes, pourprées & rouges, defqueiles je viens de parler; ce sentiment que j'avance se trouve · Miscellane confirmé par une experience rapportée par M. Marggraff*, qui ayant cleve des fleurs du zinc qu'il avoit mèle avec du phosphore, dit que ces fleurs ctoient d'un jaune orangé, & qu'ayant continué son operation, il en vint des sleurs d'un jaune rouge.

tinuatio V., fac tom. VI, awa 1740, p. 56.

> Les morceaux de mon matras étant restez exposez à l'air, s'y sont humeclez, & j'ai observé que le zinc s'y est alors ditious en chaux blanche. Le phosphore en s'allumint à l'air, la partie inflummable s'est consumée presque toute entière, & l'acide du phosphore, qui, comme nous l'avons dit, est de la nature de l'acide du sel commun, étant à découvert, s'est diffous par l'humidité de l'air, & dans cet état il a diffous le zinc; il n'en a diffous qu'une partie, parce qu'il n'y avoit pas affez d'acide du phosphore pour diffoudre tout ce qu'il y avoit de zinc.

> Il semble qu'on peut conclurre de ces dissérentes expériences de Chymie, que les acides & les alkalis qui separément dissolvent bien le zinc, n'ont plus aucune prise sur Li des qu'ils sont joints à un principe inflammable; c'est ce que je tacherai de vérifier par d'autres expériences que je me propose de faire pour cela, & desquelles je rendrai compte

l'Acidémie dans un troissème Memoire sur le Zinc.



QUATRIEME MEMOIRE SURLES OS,

Dans lequel on se propose de rapporter de nouvelles preuves qui établissent que les Os croissent en grosseur par l'addition de couches offeuses qui tirent leur origine du périosse, comme le corps ligneux des Arbres augmente en grosseur par l'addition de couches ligneuses qui se forment dans l'écorce.

Par M. DU HAMEL

E dessein que j'ai eu de saire apercevoir dans un Mémoire 26 Février assez court tous les points d'analogie que je crois avoir découverts entre la crûe du bois des Arbres & celle des os des Animaux, m'a mis dans l'impossibilité de rapporter dans mon troisième Mémoire sur les Os toutes les preuves du sentiment que j'essayois d'établir, j'ai même été obligé d'abréger considérablement le détail de mes principales expériences.

Ces omissions que je ne pouvois éviter sans grossir beaucoup mon Mémoire, auront peut-être occasionné des doutes qui prévaudroient bien-tôt sur les preuves que j'ai rapportées,

si je négligeois de les dissiper.

Raifonne-t-on d'après des idées généralement reçues? on éprouve peu de contradiction, & cela doit être, car puisqu'on est d'accord sur les principes, il ne s'agit plus que de faire apercevoir l'exactitude des conséquences, ce qui n'est pas dissicile; mais si l'on entreprend d'établir un sentiment nouveau, il est bien dissicile de parvenir à une conviction entière, c'est là où l'on auroit besoin de l'évidence des démonstrations géométriques; à leur désaut il saut rassembler tous les secours que le raisonnement & l'expérience peuvent nous sournir.

C'est dans ce dessein que je me prepose de reprendre la

unes apres les autres toutes les propulitions que j'ai avance... dans mon troissème Mémoire sur les Os.

Les Os augmentent-ils en grotfeur par l'addition de lames très-minces qui faitoient partie du periotte avant que d'être adhérentes aux os, avant que d'en avoir acquis la dureté? mon unique but dans ce Memoire est de rapporter les raisons

qui me déterminent à le penser.

Ce seroit aller contre un sentiment unanimement reçu par les plus celèbres Anatomistes, & prétendre detruire les observations des Physiciens qui ont particulièrement étudié cette matière, que de nier que les os ont commence par etre mols avant que d'avoir acquis la durete qui les distingue si sentiblement des autres parties de l'animal; je suis donc dispense de rapporter les preuves que j'ai de cette verité, il me suifira de renvoyer à Clopton-Havers, à Malpighi, à Kerchrughas dans son Ostéogénie, à M. Winslow dans son Exposition anatomique, à M. Petit dans son Traité des maladies des Os, & ensin au Mémoire que M. Hunauld lut l'année dernière à l'Académie sur les Os surnuméraires.

Il faut donc convenir qu'il y a dans la jambe d'un petit embryon un cartilage qui occupe la place du tibia, & qui acquerant dans la fuite de la dureté, ceffera d'être un cartilage, & deviendra véritablement l'os tibia de cet embryon plus grand; de même que le flernum, l'extremite des cotes & des épiphyses qui sont cartilagineux dans l'enfant, deviennent des os fort durs dans les vieillards: mais comment

se fait ce changement de cartilages en os?

Comme la finovie des articles, le suc médullaire & la graisse se trouvent aux environs des os, quelques-uns ont soupconne que ces substances servoient à la formation des os; c'est comme si l'on disoit que la falive sert à former les parties qui en sont abreuvées, car j'espère prouver dans la suite que les substances que je viens de nommer, bien soin de contribuer à l'ossistication, servent au contraire a retarder l'endureissement des cartilages.

Mais on fait qu'une lymphe épaiffic peut faire un corps

fort dur; on ne refusera pas d'accorder que les cartilages sont remplis de lymphe, cette lymphe peut s'épaissir & ensuite s'endurcir dans les vaisseaux des cartilages, qui par-là s'offitie-roient peu a peu proportionnellement aux differens degrés de l'endurcitiement de cette lymphe; explication que je ne propose que comme une conjecture, mais qui me paroît convenir affèz à l'endurcissement des vaisseaux longitudinaux des cartilages.

On peut outre cela imaginer qu'il se dépose dans le tissu cellulaire ou vésiculaire des os, des molécules analogues au tartre du vin, ou, si l'on veut, aux pierres de fiel ou de la vessile, à quelque chose de semblable à ce qui fait les pierres des fruits; ce dépôt tartareux s'accumulera peu à peu, il se durcira, & alors ce ne sera plus un corps mos, un cartilage, ce sera un corps fort dur, en un mot un vrai os; comme un morceau de bois qui a été pénétré par un suc pierreux n'est plus du bois, c'est une vraie pierre qui conserve la disposition des parties que lui a donné la substance qui l'a, pour ainsi dire, moulée.

Je n'assure pas cependant que les sibres ligneuses soient absolument détruites dans un morceau de bois qui est pétrissé, puisque j'ai vû le volatil urineux se développer de pierres fort dures qui étoient formées d'un grand amas de coquillages, mais les coquillages, les bois & les autres corps pétrissez ont été si intimement pénétrez par le suc pierreux, que la sub-

stance première est presque méconnoissable.

Il en est, je crois, à peu-près de même de l'endurcissement des cartilages en os; le tartre osseux, qu'il me soit permis d'employer ce terme, s'arrête d'abord dans quelques parties du tissu cellulaire d'un cartilage; à ce premier amas il s'en accumule d'autres, & il en résulte bien-tôt un corps qui est plus cartilagineux qu'osseux; à mesure que les molécules osfeuses se multiplient, le caractère de cartilage se dissipe, la lymphe qui est dans les principaux vaisseaux s'endurcit, & ensin on n'aperçoit plus rien de cartilagineux, c'est un vrai os qui en a pris la place.

Mem. 1743.

Les corps qui se pétrissent, n'acquièrent pas tout d'un coup toute leur dureté, il en est de même d'un cartilage, d'un vainteau, d'une membrane qui s'ossitie, la Nature n'e git point par sauts; ces changemens se sont peu à peu & par des nuances que nous ne pouvons distinguer les unes des autres.

Néanmoins une simple ébullition réduit en gelée les os d'un embryon fort jeune, parce qu'ils sont presque tout car-

tilagineux.

Les os des fectus, quoique plus cloignez de l'etat de cartilage, s'attendritient presqu'entierement par le secous de l'esprit de vin. Il saut employer pour attaquer les os des animaux plus âgez, l'eau de chaux ou les fortes lessives, & ensin il n'y a que la machine de Papin qui puisse amollir les gros os des vieux animaux; d'ailleurs la dureté des os des vieillards se fait connottre par leur couleur, ils sont blanes, au lieu que les os des jeunes animaux qui tiennent encore des cartilages, sont rougeâtres.

Cette espèce de décomposition des os nous sait apercevoir les dissérens états par où ils passent avant que d'être des os partaits, états qu'on observe aussi dans la formation du bois; ce n'est d'abord que de l'herbe, c'est ensuite une écorce plus solide qu'on connoit sous le nom de leter, & dont on peut

faire différens ouvrages.

La folidité de cette écorce augmente, & c'est de l'aubier, puis du boi de plu, en plus solide jusqu'à ce qu'il commence à s'altérer.

La décomposition naturelle du bois lorsqu'il se pourrit, suit la même loi, mais dans un ordre renversé; l'écorce herbacée est bien tot détruite, le liber a dans peu de temps le même sort, l'aubier dure peu, & ensin c'est le bois le plus dur, le mieux sorme qui se detruit le dernier. L'anal gie avec les os se soûtient donc encore dans cette partie.

Ce que je viens de dire sur l'endurcissement ou l'ossissement à l'objet tion des cartilages, n'appartient pas essentiellement à l'objet de ce Memoire, j'aurois meme évité d'en parler, si je n'avoit pas eru que ces idées, quoique genérales, & , je l'avoue, assert superficielles, me serviroient beaucoup pour l'intelligence de ce que j'ai à dire dans la suite sur le développement & la crûe des os.

Clopton-Havers, & beaucoup d'Anatomistes avec lui, ont pensé que le petit tibia d'un embryon, par exemple, croissoit par l'interposition du suc nourricier, du suc osseux qui forçoit les parties déja ossisées de s'écarter les unes des autres, & que cet écartement produisoit l'extension de l'os dans toutes ses dimensions. Comme ce sentiment de Havers a fait une espèce de fortune parmi les Anatomistes, il me convient d'insister un peu sur cet article, & de rapporter plus en détail le sentiment de ce célèbre Anatomiste.

Havers fait d'abord remarquer que les artères s'infinuent dans les os, d'où il conclut, suivant son système général sur la nutrition qu'il sait dépendre du suc nourricier siltré dans les glandes, que le suc nourricier des os se siltrera dans les glandes qu'il dit être à côté des artères, & comme l'auteur croit avoir besoin d'esprits animaux, il dit que c'est le périoste qui les sournit.

Pour faire ensuite mieux concevoir par quel méchanisme les particules ofleuses se vont placer à la circonférence des os & vers leurs extrémités, il fait observer que les os des sœtus sont tendres, & qu'alors leurs parties sont aisées à diviser; que quand l'ensant est né ses os tiennent encore beaucoup du cartilage, & qu'il faut du temps pour que les os acquièrent peu à peu leur dureté.

Cela étant posé, tant que les os sont cartilagineux, dit Havers, ou qu'ils approchent de l'état de cartilage, tant que leurs parties peuvent s'écarter ou vers les extrémités ou vers les cotés, ils acquièrent de l'étendue; car la pression du suc nourricier en agissant vers les côtés augmentera la grosseur de l'os, & en agissant suivant la longueur de l'os elle dilatera les interslices qui sont entre les parties offissées, & en se fixant en ces endroits elle augmentera la longueur de l'os.

Mais quand les particules offeuses seront unies les unes aux autres, l'essort du sue nourricier ne pourra plus les écarter, & c'est alors que les os ne croîtront plus.

Il n'est question dans tout ceci que du gontlement de l'os primitif, ou, si l'on veut, d'une intus-susception qui ne rend point raison de la formation des lames offente. Sur unt cette idee les os ne devroient être qu'une mate, néanmoins il est certain qu'ils sont composez d'un grand nombre de couchet, on les aperçoit dans les caries, on les voit sur les os qui ont dong-temps resté à l'air. Havers dit en avoir compté quarante dans l'épaisseur de l'os tibia d'un bœus; il avoue cependant qu'il n'a pas pû les distinguer toutes, & il estime qu'il y en avoit au moins cinquante cinq: quoique ce nombre paroiffe considérable, je puis assurer que ce célèbre Anatomiste n'avoit pas encore une juste idée de la finesse & du nombre de ces lames. Si l'on veut s'en convaincre, on n'a qu'a prendre l'os de la jambe d'un veau nouveau-ne, le faire bouillir dans une forte letlive, l'expoler ensuite à l'air dans un endroit où il foit à l'abri du dommage que differens animaux lui pourroient causer, & au bout de quelque temps on verra des lames d'une fineffe extrême qui se detacheront d'elles mêmes de deslus la surface de cet os.

Cette expérience que j'ai exécutée avec beaucoup de satisfaction, m'a sait de plus apercevoir que dans les os des jeunes animaux il y a quantité de sames oficuses qui sont plus courtes que la longueur totale de l'os, ce que j'ai particulièrement observé sur l'os tibia du côté de la partie la plus évasée, ou qui répond à la cuisse. Je prie qu'on sasse attention à cette

observation, car j'en serai usage dans la suite.

Je ne dissimulerai pas que Havers est d'un autre sentiment, car il dit positivement que les sibres qui composent la lame osseuse la plus extérieure, s'étendent de toute la longueur de l'os, & j'en conviens s'il est question de l'os d'un vieil animal, mais assurément il n'en est pas ainsi dans les jeunes animaux. Havers même, après avoir répété dans un autre endroit que les lames extérieures des os s'étendent de toute leur longueur, remarque comme une chose singulière, qu'il a vû sur des os frais des lames fort minces, immédiatement sous le périoste, qui étoient beaucoup plus courtes que l'os; c'est-là, suivant

Havers, une singularité qui n'arrive que très-rarement.

Si cet excellent Observateur s'étoit avisé d'examiner des os de jeunes animaux, comme je viens de l'indiquer, il seroit convenu qu'il arrive toûjours aux jeunes animaux que les lames les plus extérieures sont beaucoup plus courtes que l'os entier; c'est un sait dont je me suis assuré, & que je prouverai dans la suite de bien des saçons différentes, ce que je viens de dire sussit pour le présent.

Les os font donc composez de lames très-minces qui s'enveloppent les unes les autres, c'est une chose incontestable; donc les os ne croissent pas uniquement par l'interposition du suc osseux qui écarte les parties de l'os précédemment formé, une telle méchanique produiroit une masse, & non

pas les lames dont je viens de parler.

& blanches que j'ai fait voir à l'Académie?

Suivant le sentiment de Havers les molécules rouges étant chariées par le suc nourricier, s'interposeroient entre les molécules blanches, & elles formeroient une mosaïque très-sine qui donneroit une teinte rougeatre à toute la substance de l'os; ce qui n'arrive point, comme je l'ai dit dans mon troi-sième Mémoire sur les Os.

On fera fans doute surpris que Havers qui connoissoit si bien les sames osseules, ne se soit pas sait l'objection que je viens de rapporter. Pour moi je crois qu'il s'étoit très-bien aperçu de l'insussifiance de son système principal, car dans le chapitre où il traite du périosse, il dit expressement que l'os n'acquiert son accroissement que par une matière gelatineuse semblable à celle qui l'a formé dans le sœtus, ce qu'on peut observer, ajoûte-t-il, dans l'os d'un veau mort-né, où l'on observe une semblable matière entre l'os endurci & le périosse: ce sentiment a été adopté par beaucoup d'Anatomisses, les uns seulement ont sait suinter cette lymphe, ce suc osseulement out sait suinter cette lymphe, ce suc osseulement est celebre Lister, ont cru que le périosse ctoit l'organe destine

94 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE pour la filtration de cette liqueur. Havers le dit (& je ne crois pas qu'on refuse de me l'accorder, ne sut-ce que comme une chose probable) que les lames osseuses dans l'animal qui croît, se forment de la même manière que la première lame s'est formée dans le sœtus.

D'ailleurs tout le monde convient que les os du fœtus

étoient des cartilages avant que d'être endurcis.

Si-tôt qu'on m'aura accordé ces deux propositions, je puis conclurre qu'il est probable que les lames osseuses ont

aussi été cartilagineuses avant leur endurcissement.

Maintenant si l'on ne veut pas s'assurer par un examen & une dissection expresse, que les cartilages sont des corps très-organisez, on n'a qu'à consulter le chapitre où Havers traite des cartilages, & on en sera pleinement convaincu.

Le petit os d'un sœtus qu'on avoue avoir été un cartilage, est donc sormé d'un corps très-organisé; n'est-il pas naturel de penter que les lames oticuses le sont de même d'une lame qui étoit organisce? & sur quel sondement oferoit on leur donner une autre origine en les saisant produire par une

lymphe épaissie par l'épanchement du suc osseux?

Imaginons pour un moment ce que pourroit produire ce sac offeux épanché entre l'os & le perioste, semblable à une coucle de mastic qui d'abord est mol & qui s'endurcit peu à peu, il en retulteroit une lame semblable à celle des pierres feuilletées; après cela qu'on examine le progrès de l'offification, & affurcment on n'apercevra tien de semblable, on découvrira des points d'offification d'où partent des filets offeux tres-diffincts & fingulièrement disposez. Pour abréger, je renvoie encore à Havers & à tous les Embryologifles qui démontrent admirablement bien que les os ne sont point des corp. morts comme les pierres, mais qu'ils sont très vivans & admirablement bien organifez; ils ne peuvent done pas être produits par une lymphe simplement epaissie; ils le sont de ne n ceffairement par une substance organisce. Quelle est cette substance? c'est dans l'embryon un cartilage, tout le monde en convient; qu'on examine ce cartilage, on trouvera qu'il

ressemble sort au p'rioste, qu'il n'est autre chose que plusieurs lames épaisses du périoste. Kerchreches dit positivement que les cartilages sont sormez de lames qui d'abord étoient membraneuses & qui deviennent ensuite cartilagineuses.

Enfin je ne crois pas qu'on refuse d'avouer que les lames ofseuses sont organisées; on convient d'ailleurs qu'elles étoient molles avant que d'être ofseuses, il saut donc que cette substance molle qui est convertie en os, ait été organisée, & je ne vois que les lames du périoste qui aient pû être cette substance, ce qui est bien moins singulier que de voir un vaisseau sanguin, une portion de la dure-mère, de la pleure, d'un tendon devenir osseus.

Si l'on veut avoir recours à l'observation de Havers sur ses veaux mort-nez, pour soutenir que les lames ofscuses sont formées pur un mucilage qui suinte de l'os ou du périoste, on sera obligé de convenir qu'un mucilage pareil se doit trouver entre se périoste & l'os d'un veau de six mois, puisque les os de ce veau ne sont pas encore parvenus à la grosseur qu'ils doivent avoir; je l'ai cherché inutilement ce mucilage, & on avouera qu'il n'existe pas dans les animaux de cet âge, quand on sera seulement attention à la sorte adhérence du périoste avec l'os, adhérence qu'il est impossible de concilier avec l'interposition d'une humeur mucilagineuse.

Havers lui-même infifte beaucoup sur l'union intime du périoste aux os, qu'il dit être partim per contiguitatem, partim per continuitatem, sive per insertionem filamentorum periossei in infam:

offium substantiam.

J'entends par contiguité, continue Havers, un contact immédiat fans qu'il y ait aucune substance intermédiaire, & par continuité une insertion des sibres du perioste dans la substance même de l'os; ceci ne s'accorde guère avec un mucilage interpose entre l'os & le périoste, néanmoins Havers y revient, & dit que l'insertion des sibres du périoste dans l'os s'observe même dans les veaux mort-nez, où l'on voit les sibres du périoste qui traversent la mucosité pour s'insérer dans l'os. Il paroit donc que Havers n'admet point de viscotié

interposec entre le périosse & l'os dans les animaux d'un certain age, & assurément on ne trouve rien qui y ressemble.

Mais, dira-t-on, à quoi fert la viscosité que Havers a obfervée dans les veaux mort-nez? cette question m'oblige d'avouer que je n'ai pas bien vû la viscosité dont parle cet auteur; je conviens que le périoste est moins adhérent aux os dans les animaux mort-nez que dans ceux qui ont vécu quelques mois, j'avoue que leur perioste est generalement plus tendre, & que les sibres qui le joignent à l'os se rompent plus aisément.

Dans ces fœtus tout est plus abreuvé que dans les animaux plus âgez, mais toutes ces choses n'etablitsent point l'existence d'une humeur mucilagineuse qui soit interposce entre l'os & le periotte; je dis plus, quand on supposeroit l'interposition d'une couche qui paroitroit mucilagineuse, on n'en pourroit encore rien inscrer contre mon sentiment, je le prouve par

ce qui arrive aux arbres.

Dans le fort du printemps, quand la sève est dans son plus grand mouvement, l'écorce qui pendant l'hiver avoit cté si adhérente au bois, paroît en être détachee, elle le quitte presque sans aucune resistance, & il semble qu'il n'y ait entre le bois & l'écorce qu'un mucilage qui les unit soiblement; ce seroit néanmoins se laisser tromper par des apparences bien légères que de le penser, car pour peu qu'on examine ce pretendu mucilage, on apercevra presque toujours sur le bois des mamelons ou des houppes en relies qui s'insèrent dans de petites cavités qui sont dans l'écorce.

On reconnoîtra que ce prétendu mucilage est un tissue cellulaire ou vésiculaire très-abreuvé & très-delie, qui, quand il sera converti en bois, unira l'une à l'autre deux couches très-minces de sibres longitudinales; je suis quelquesois parvenu à détruire ces couches de tissu cellulaire, & j'ai par ce moyen séparé des lames ligneuses d'une sinesse extrême; je crois aussi que c'est le tissu cellulaire des os qu'on détruit, quand on parvient à séparer les couches osseuses. L'analogie entre le bois & les os se montre par-tout. Je ne suivrai pas

plus

plus loin cette réflexion, j'aurai occasion dans un autre Mémoire de prouver l'existence du tissu cellulaire des os, & après ce que je viens de dire des arbres, on sent de reste que le mucilage dont parle l'avers doit être organise, & que probablement il ressemble au prétendu mucilage qu'on obferve au printemps entre l'écorce & le bois des arbres; ainsi je pense qu'il n'y auroit pas plus de vrai-semblance à soûtenir que les os augmentent en grosseur par l'endurcissement d'une matière en apparence mucilagineuse qui se trouve entre le périoste & s'os, qu'à prétendre que le bois n'augmente en grosseur que par l'endurcissement du prétendu mucilage qu'on aperçoit entre le bois & les plans de sibres longitudinales de s'écorce.

Je ne crois donc pas qu'on puisse encore soûtenir que les couches offeuses soient formées par un simple épanchement d'un suc gelatineux; mais peu accoutumé qu'on est à penser que le périoste se puisse convertir en couches osseuses, on aimera peut-être mieux soûtenir que ces couches sont formées par le tissu cellulaire dont je viens de parler, qui s'épanouiroit sur l'os & sous le périoste, pour y sormer les lames osseuses.

Quoique cette idée s'écartat de l'analogie qui se maniscste par-tout entre la crûe des os & celle du bois, elle m'avoit néanmoins se duit au point que je l'aurois peut-être adoptée, si de nouvelles observations n'étoient pas venues m'assermir dans mon premier sentiment; moyennant ce tissu tout me paroissoit prendre un ordre naturel, c'étoit une membrane organiste qui formoit des seuillets ofseux aussi organisez, mais les expériences sont décisives sur l'offssication du périosse; néanmoins avant que d'en rapporter le détail, il faut dire un mot d'un autre sentiment qui est presque généralement reçu par les Anatomisses modernes.

On suppose que toutes les couches ofseuses existent distinguées les unes des autres dans le cartilage du plus petit embryon qui doit sormer l'os tibia, par exemple, d'un animal; que toutes ces couches s'etendent en longueur, en largeur MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE & en épaisseur, & que l'extension de ce cartilage produit l'accordinement de l'es tibia de l'animal dans toutes ses dimensions.

Suivant ce sentiment les os croilsent par la distribution du suc nourricier dans toutes les parties de l'os; les parties colorantes de la garence devroient donc se distribuer egulement dans toutes les parties des os, & leur donner une teinte uniforme, ce qui est détruit par les expériences que j'ai fait voir à l'Académie.

Néanmoins pour éviter toute équivoque, je dois avertir que je ne décide point si dans le périoste d'un ensant, de même que dans l'écorce d'un jeune arbre, toutes les couches qui doivent se développer successivement, y sont contenues en raccourci, ou s'il s'en forme de nouvelles à mesure que d'autres se convertissent en os ou en bois. Ces questions ne peuvent être éclaircies par des expériences, & elles ne seront jamais bien décidées par le raisonnement, c'est pourquoi je passe au détail de mes experiences qui acheveront de detruire tous les sentimens que je viens de combattre.

Je dépouillai de ses muscles l'os de la jambe d'un veau mort-né âgé d'environ six mois, & j'eus soin de ne point

endommager le périoste.

Alors ay ant commencé à difféquer le périosse vers la partie moyenne, j'entrepris de le detacher de l'os en remontant vers le genou; je le detachois essectivement avec assez de facilité, mais quand je sus parvenu auprès de l'epiphyse, je m'apereus que je ne sevois pas tout le périosse, qu'il y en avoit une lame qui ressoit adhérente à l'os, quoique le periosse que je dissequois, parût conserver assez exactement sa même ep isfeur. Il me vint dans la pense de sever cette lame insérieure du périosse, en commencant à la dissequer en sens contraire, c'est-à-dire, de l'extrémité de l'os vers sa partie moyenne; je le sis essectivement, mais avec assez de peine, car l'adhérence du périosse à l'os, de même que la sermeté du périosse, augmentoit à mesure que j'approchois de la partie moyenne; ce periosse perdit ensin sa transparence, il commençoit à

tenir de la nature de l'os, & bien-tôt je me trouvai avoir à

détacher une lame d'os, ce qui étoit impossible.

Cette observation me surprit d'abord, mais m'étant rappellé, comme je l'ai dit au commencement de ce Mémoire, qu'il y a sur les os des jeunes animaux des lames minces qui ne s'étendent pas de toute la longueur de l'os, je commençai à penser qu'une même lame pouvoit être osseuse dans une partie, & encore périoste dans une autre.

J'avois grand intérêt à m'assurer de ce fait, puisque rien ne peut mieux prouver que les os augmentent en grosseur par des couches de périoste qui s'ossifient, que de trouver une même lame qui est osseuse à la partie moyenne de l'os,

& périofte vers les extrémités.

Le besoin que j'avois de mettre ce sait dans une évidence parsaite, me sit imaginer plusieurs moyens pour y parvenir; mais comme j'apprchendois de me saire illusion dans une circonstance aussi désicate & aussi importante à mon sujet, j'écrivis à M. de la Haye Chirurgien-major de la Murine à Rochesort, que je le priois d'examiner avec toute l'attention possible se périoste qui recouvre le tibia & le sémur des sœtus. M. de la Haye avoit bien connoissance de mes trois premiers Memoires sur les Os, mais il ignoroit absolument l'observation que je viens de rapporter.

Quelques mois après le hasard l'ayant mis à portée de disséquer un soctus humain de quatre à cinq mois, & un veau mort-né de six mois, voici ce qu'il m'écrivit à ce sujet,

c'est du sœtus humain dont il s'agit.

« Après, dit M. de la Haye, avoir fait une incifion circulaire au périoste, je l'ai suivi de la partie moyenne de l'os « vers les extrémités, remarquant qu'il augmentoit d'épaisseur « à mesure qu'il en approchoit; néanmoins par-dessous cette « première couche de périoste il y en avoit une seconde trèsfacile à lever vers les extrémités, mais qui étoit offisice dans « toute la partie moyenne; par-dessous cette seconde couche « l'os paroissoit composé de fibres, &c. «

Ce que j'ai trouvé de plus dans le veau mort-né, ajoûte «

» M. de la Haye, c'est que dans toute la surface de l'os cette » seconde couche se pouvoit détacher, de sorte qu'à la partie » moyenne on enlevoit des esquilles très-considérables qui tenoient encore un peu de la nature membraneuse. »

Les obtervations de M. de la Haye continment les miennes, qui deviendront presque incontestables, quand on se aura que M. Ferrein a aussi observé la même chose. Essayons néan-

moins de rendre la chose encore plus claire.

J'ai dit dans mon troisième Mémoire sur les Os, que j'avois mis pendant un mois à la nourriture de garence un cochon âgé de six semaines, qu'au bout de ce mois on avoit supprimé la garence à cet animal, & que l'ayant nourri à

l'ordinaire pendant un mois, on l'avoit tué.

Dans l'impatience que j'avois de sçavoir en quel état étoient les os de cet animal, j'en sis bouillir plusieurs dans de l'eau pour enlever plus aisément les chairs qui les recouvroient, & je sus surpris de voir la partie moyenne des os longs tout-à-fait blanche, pendant qu'un peu au dessous des épiphyses ils étoient d'un rouge éclatant; j'examinai les os avec une loupe, & je reconnus que les endroits qui étoient blanes, le terminnient par des equelles blanches moins epaiffes qui couvroient les couches rouges; les couches blanches devenoient bien-tôt affez minces pour qu'on pût apercevoir au travers un peu des couches rouges, ces couches blanches continuoient peu à peu à devenir de plus en plus minces, puis elles l'étoient au point qu'elles ne diminuoient presque plus de la vivacité de la couleur des couches rouges; & enfin les couches blanches manquoient entierement, & les conches rouges restoient à découvert.

Je ne m'en tins pas à ces observations, j'examinai des os recouverts de leur périoste, & à l'aide de la dissérence de couleur, non seulement je m'assurai qu'il y avoit plusieurs lames qui étoient partie périoste & partie osseuses, je vins de plus à bout de détacher des lames osseuses blanches qui étoient continues à celles du périoste, & de découvrir ses

lames rouges qui étoient dessous.

Le fait n'est donc plus douteux, surement les lames du périoste s'ossistient, & contribuent à l'augmentation de groffeur des os.

Cette observation me fournit de plus l'explication d'une remarque qui a été faite par Havers & par tous les Anato-

mistes qui l'ont suivi.

Havers en parlant des inégalités qui se trouvent à la superficie des os, dit qu'il a observé des cavités superficielles qui s'étendoient au delà de la lame où elles étoient formées, & que le périoste les remplissoit par une espèce de rugossité.

Si par quelque cause que ce puisse être, & que nous essayerons d'éclaireir dans la suite, plusieur. Lames de périoste ne s'ossistient pas dans un endroit, il en résultera une cavité superficielle qui s'étendra au delà de la same où elle aura été sormée, & qui sera remplie par le périoste, comme l'a observé Havers, & comme je l'ai aussi aperçu sur des os colorez par la garence.

Indépendamment de cette remarque, je crois, après les observations que j'ai rapportées, pouvoir maintenant donner une idée claire & distincte de la crûe des os en grosseur.

Pour cela il faut examiner quels sont les dissers états du même os de disserens animaux d'une même espèce, sui-

vant les différens âges.

J'ai l'os de la jambe d'un veau mort-né âgé d'environ fix femaines, cet os est gros comme le tuyau d'une plume d'oie, il a à peu-près 3 lignes de grosseur à sa partie moyenne.

L'épaisseur des lames osseuses qui forment le canal médul-

laire, est au plus d'un quart de ligne.

Enfin le canal médullaire a environ 2 lignes ½ de diamètre. Le même os pris dans une vache a plus d'un pouce & demi de diamètre.

L'épaisseur des lames ofseuses de cet os est d'environ 5

ou 6 lignes.

Et le canal médullaire a à peu-près un demi-pouce de diamètre.

Yoll) done deux choses à considerer dans l'augmentation N iii

de gretieur des os, scavoir, l'elargitiement du canal médullaire

& l'épaitlitlement des parois qui forment ce canal.

Affurément l'interpolition du fue nourricier ne fournira jamais une explication latisfaitante de l'affemblage des lames offcules qui torment les parois du canal medullarie, je l'ai prouvé au commencement de ce Mémoire.

D'un autre côté il est certain que la super-addition des lames osseules ne peut pas servir à rendre raison de l'aug-

mentation du diamètre du canal médullaire.

Il faut donc que ces deux causes concourent pour expliquer l'augmentation de grotseur des os; etsay ons de distinguer ce qui appartient à l'une & à l'autre de ces causes, c'est par où je terminerai ce Mémoire.

Si-tot qu'on scait que le canal médullaire augmente de diamètre, on peut en conclurre que les lames offeuses s'étendent; nommoins pour rendre encore la chose plus cer-

taine, je fis l'expérience suivante.

J'entourai l'os d'un pigeonneau vivant avec un anneau de fil d'argent qui étoit place fous les tendons & fur le périofle; je laitlai-là cet anneau pour reconnoître ce qui arriveroit aux couches offeuses déja formées, supposé qu'elles vinssent à s'etendre, car je pensois que mon anneau etoit plus fort qu'il ne falloit pour retister à l'effort que ces lames offeuses feroient pour s'étendre; il résista en esset, & les couches ofseuses qui n'étoient pas encore fort dures ne pouvant s'étendre vis-à-vis l'anneau, se coupèrent. Ce qui prouve bien s'extension des couches ofseuses, c'est qu'ayant disséqué la partie, je trouvai que le diametre de l'anneau n'etoit pas plus grand que celui du canal médullaire.

Il me feroit inutile de détailler les autres preuves que j'ai de l'extension des couches ofleuses, puisque celles que je viens de rapporter ne laissent aucun lieu d'en douter, mais il est à propos de saire remarquer que cette extension a un terme différent de la crûe de l'os, je veux dire que les lames s'étendent d'autant plus qu'elles sont moins endurcies, & qu'elles cessent de s'etendre quand elles ne tiennent plus du cartilage,

quand elles sont endurcies à un certain point, & qu'elles arrivent à ce point d'endurcissement beaucoup avant que s'os

soit parvenu à sa plus grande grosseur.

Pour concevoir comment se fait l'extension des couches ofseuses, je prie qu'on se rappelle ce que j'ai dit au commencement de ce Mémoire sur le changement des cartilages en os; qu'on se ressouvienne que ce changement se fait peu à peu, & qu'à mesure que les vaisseaux & le tissu cellulaire se remplissent de molécules ofseuses, le caractère de membrane ou de cartilage disparoît.

J'adopte de plus ce que Havers dit de l'interposition du suc osseux qui écarte les molécules déja ossissées, tant qu'il se trouve des intervalles cartilagineux ou membraneux qui

séparent les molécules endurcies.

On se souviendra d'un autre côté que le suc colorant de la garence n'agit point sur les parties molles, non plus que sur celles qui sont converties en os, mais uniquement sur celles qui s'endurcissent acluellement pendant l'usage de la garence.

Etant convenu de ces préliminaires, je suppose que quand on met un animal à l'usage de la garence, une des sames qui composent le canal médulfaire, soit à moitié ou aux deux tiers endurcie ou ossissée, assurément toutes les molécules déja offifices refleront blanches malgré l'usage de la garence, puisque le suc colorant n'agit point sur les parties qui sont endurcies précédemment à l'usage de la garence; néanmoins cette lame acquerra dans la fuite une teinte rouge, car puisque j'ai supposé que cette lame n'étoit pas entièrement offitice, il faut pour qu'elle acquière toute sa dureté, que des molécules qui n'etoient pas endurcies, parviennent à l'être, ou que par le mouvement des liqueurs il y soit apporté de nouvelles particules qui s'endurcitient & se joignent à celles qui l'étoient déja. Ces nouvelles particules seront dans le cas de recevoir le suc colorant de la garence, puisqu'elles s'endurcissent pendant que l'animal en usera dans sa nourriture.

Voilà donc des particules rouges qui s'interposeront entre les particules blanches, & qui seront une mosaïque, si sine à

la vérité, que l'œil ne pourra pas distinguer les molécules blanches des molécules rouges, mais qui donnera à cette Jame une teinte rouge plus ou moins forte, suivant qu'il y aura plus ou moins de parties rouges interposées entre les

particules blanches.

Je prie que l'on observe qu'une same telle que nous venons de la supposer, mais qui appartiendroit à un os déja intérieurement endurci, & qui ne s'étendroit par conséquent plus, que cette lame, dis-je, ne deviendroit jamais aussi rouge que si elle appartenoit à un os moins parsait & qui sût encore susceptible d'extension, parce que dans ce cas, outre les molécules rouges que j'ai dit qui devoient s'interposer entre les molécules blanches pour former un os parfait, il en faudra d'autres pour remplir les intervalles que l'extension ne peut manquer de produire.

Ce ne sont point là de simples imaginations, ce sont des

conséquences que j'ai tirées des observations suivantes.

Observation.

Quand on nourrit alternativement avec de la garence un jeune animal dont les os font encore extensibles, si les temps où l'on fait usage de la garence & où on la supprime, ne sont pas d'une certaine durée, on n'obtient pas des couches aussi rouges que quand on ne change la nourriture qu'au bout de six semaines ou de deux mois, à cause de l'interposition des molécules de différentes couleurs.

Observation.

C'est pour cette même raison qu'on remarque que les couches blanches & rouges sont toûjours plus confuses & moins pures dans les os des animaux fort jeunes, que dans ceux qui sont plus âgez.

Ol fervation.

C'est encore pour cette même raison que les couches passent tres sie juemment du rouge au blane par une nu nee, & non pas subitement.

Indépendamment de ce que je viens de dire des os des Observation. jeunes animaux, on remarque qu'il y a plus d'intensité dans la couleur rouge & plus de pureté dans la couleur blanche, aux endroits où l'ossissation a fait plus de progrès pendant l'usage

de la garence, ou lorsqu'on supprimoit cette nourriture. On On aperçoit à certains endroits, même aux os des jeunes animaux, quelques filets ou quelques feuillets parfaitement Olizza blancs ou parfaitement rouges, apparemment parce que l'offification s'ett faite dans ces endroits plus promptement qu'ailleurs.

Cette observation me suit apercevoir un point d'anale, ie avec les arbres, que je ne crois pas devoir passer sous silence.

Dans le Mémoire où nous avons recherché M. de Buffon & moi la cause de l'excentricité des couches ligneuses, nous avons prouvé,

1° Qu'il y avoit des couches ligneuses qui étoient consi-

dérablement plus épaisses d'un côté que de l'autre.

Avec le fecours de la garence j'ai reconnu qu'il en étoit de même dans les os.

2° Nous nous fommes assurez qu'il y avoit des arbres où l'aubier se convertissoit plûtôt en bois, qu'à d'autres de

même espèce.

Il est de même certain que le changement de cartilage en os se fait plus promptement dans des sujets que dans d'autres. Il y a des sujets qui ont tant de disposition à l'ossissication, que les membranes, les vaisseaux, les cartilages s'ossissient, pendant qu'il y en a d'autres où ses os sont un temps considérable à parvenir au degré de dureté qu'ils doivent avoir. Il y a des poissons qui au lieu d'os n'ont que des cartilages qui ne se convertissent januais en os, comme il y a des végétaux qui sont toûjours herbacez.

3° Nous avons observé qu'il y avoit souvent d'un côté d'un arbre plus de couches d'aubier que de l'autre, parce que l'aubier se convertit plûtôt en bois d'un côté de cet arbre

que de l'autre.

De même j'ai fait observer qu'il y avoit des endroits où

l'ossissation se saisoit plus promptement qu'à d'autres.

Enfin, quand nous avons recherché la cause de la plus grande épaisseur des couches ligneuses d'un côté que d'un autre, il nous a paru qu'elle ne dépendoit point de l'exposition, mais de la position des branches ou des racines.

Mem. 1743.

De même j'ai reconnu que les endroits où les couches offeuses étoient les plus épaisses, étoient ceux où les tendons s'inséroient dans les os.

Ln voila affez de dit pour faire apercevoir l'analogie que

j'avois annoncée, je reviens à mes observations.

Olfervation.

Les couches offeuses les plus extérieures dans les jeunes animaux comme dans ceux qui sont plus âgez, quoiqu'elles ne soient pas encore dans l'état d'un os parsait, sont ordinairement très-rouges si elles ont été sormées pendant l'usage de la garence, ou exemptes de toute rougeur si elles l'ont été pendant l'usage des alimens ordinaires, pourvu qu'etes soient affer épustés pour n'être point transparentes, parce que dans ces couches il n'y a point de molecules offeuses de différente couleur qui soient interposées entre celles qui ont été les premières endurcies.

Observation.

Dans un même animal tous les os ne s'endurcissent pas aussi promptement les uns que les autres, on peut sur cela consulter Kerckringius. Plusieurs des os qui forment le pied des cochons, & qui répondent à ceux du métatarse & du métacarpe, ces os, dis-je, s'endurcissent lentement, ce qui fait qu'on ne peut presque distinguer les couches qui ont été formées pendant l'usage de la garence, de celles qui avoient eté formées sorqu'ils usoient des alimens ordinaires, à moine que les animaux ne soient parvenus à un âge un peu avancé.

Observation.

A la table intérieure du crâne, dans les orbites, à l'extremité des os longs, à l'intérieur des os qui renferment la moëlle, for tout dans les jumes animaux, j'ai prefique toujour remarqué qu'il y avoit de la confusion entre les couches blanches & rouges, & il m'a aussi toûjours paru que dans ces endroits qui sont abreuvez par le suc médullaire, par la graisse, par la sinovie ou par d'autres liqueurs, l'ossissation se faisoit plus lentement qu'ailleurs; c'est donc toûjours la name cause qui occasionne la consusson de couche, de disterente couleur.

Observation.

Les cartilages qui ne sont point encore endurcis, & il y en a qui ne s'endurcissent qu'à un âge sort avancé, n'ont

aucune teinte rouge; ainsi la même partie d'un os peut être rouge dans un animal, & blanche dans un autre animal, quand même ces deux animaux auroient été mis à l'usage de la garence au même âge & pendant le même temps, parce que l'endurcissement des os se fait à des âges dissérens dans dissérens individus d'une même espèce.

J'ai prouvé qu'une lame de périoste est souvent ossissée à la partie moyenne d'un os, pendant qu'elle est membraneuse vers les extrémités: il suit de cette remarque que suivant le temps où l'on changera la nourriture, relativement à l'ossissement cation de cette lame, elle pourra, sorsqu'elle sera entièrement ossissée, être blanche à la partie moyenne, & rouge vers les extrémités, ou le contraire; c'est ce qu'on aperçoit à merveille sur quantité d'os que j'ai sciez suivant leur longueur.

L'indécission des couleurs dans certaines circonstances. pendant que dans d'autres elles sont très distincles, l'épaisseur plus ou moins grande des couches blanches ou rouges dans certains endroits des os, le défaut d'une couche rouge ou d'une couche blanche qui manque quelquefois entièrement dans certains endroits, le changement de couleur d'une même lame qui à la partie moyenne est d'une couleur différente de ce qu'elle est vers les extrémités, sembloient former des objections très-fortes contre le sentiment que je viens d'établir; néanmoins pour peu qu'on se donne la peine de résléchir sur les observations que je viens de rapporter, je crois qu'on conviendra qu'elles sont plus favorables que contraires à mon sentiment. On sentira que les différens degrés d'offisication par où passe une lame de périoste avant que d'être entièrement endurcie, doivent dans certaines circonstances produire de la confusion dans les couches ofseuses.

Quand on fera bien convaincu qu'une lame de périoste est souvent ossificé à la partie moyenne d'un os, pendant qu'elle est encore membraneuse vers les extrémités, on ne sera point surpris de trouver des sames qui sont d'une couleur dissérente à la partie moyenne d'un os & vers les extrémités.

On connoîtra de même la cause de la disserte epaisseur

10^{me} Observation. des couches offeuses, de seur différent terme d'endurcisse-

ment, &c.

Mais j'ai cru pouvoir tirer encore un autre avantage des observations que je viens de rapporter; car puisque les couleurs sont moins décidées, puisqu'elles sont confuses & plus mèlées dans les os des animaux qui sont encore assez jeunes pour que les couches ofseuses prennent de l'étendue, que dans les os des animaux plus âgez, qui étant plus endurcis ne peuvent plus acquerir d'extension, j'ai pensé que c'étoit un moyen de distinguer à peu-près quel étoit l'âge où les couches osseuses sont les plus extensibles.

J'ai donc examiné dans cette vûe les os de plusieurs animaux qui avoient été nourris alternativement avec de la garence & sans garence, & à en juger par la circonstance que je viens de rapporter, il m'a paru que les couches osseuses des os tibia du cochon de la première expérience, qui a été tué à l'âge de quatre mois, se sont proportionnellement beaucoup plus étendues que celles des os du cochon de la seconde

expérience, qui a vécu fix mois.

Néanmoins étant peu satisfait de l'exactitude des connoifsances que pouvoient me sournir mes os colorez, je crus que je reconnoîtrois avec un peu plus de précision le temps de la plus grande extension des couches osseuses, en comparant le diamètre du canal médullaire de l'os tibia d'animaux de la même espèce, mais de dissérens âges; car voici comme je raisonnois.

Le diamètre du canal médullaire augmente, & il augmente fürement par l'extension des lames offèuses qui forment ce canal; donc l'extension des couches doit être proportionnelle à l'augmentation du diamètre du canal médullaire. On peut connoître à quel âge ce canal augmente le plus de diamètre, en comparant la largeur du canal médullaire de l'os tibia, par exemple, des cochons de dissérens âges, d'où on pourra conclurre à quel âge les couches osseuses s'étendent le plus, & à quel âge elles cessent d'avoir cette propriété.

Il est vrai que par ce moyen on ne peut encore reconnoître

qu'à peu près le temps où cette l'extension des lames osseules, puisqu'on ne peut comparer les os d'un animal qu'à ceux d'un autre animal, &, comme on sçait, dans la même espèce d'animaux, il y en a qui deviennent bien plus grands que d'autres, il y a des individus qui croissent bien plus rapidement que d'autres, il y en a où l'endurcissement se sait bien plus

promptement, &c.

Néanmoins sans me flatter de parvenir à un degré parsait de précision, je me proposai de comparer le diamètre du canal médullaire de quantité de tibia de cochons de différens âges que j'avois rassemblez à dessein, & que j'avois sciez suivant leur longueur; je crus d'abord à la simple inspection de ces os, que le canal médullaire augmentoit de diamètre jusqu'à l'âge où ces animaux sont parvenus à leur grandeur; mais y ayant prêté plus d'attention il me parut qu'il n'en étoit pas de même à la partie moyenne où ces os commencent à s'endurcir, ce qui me sit prendre le parti de ne comparer ces différens diamètres qu'à la partie la plus étroite, qui est celle où cet os commence à s'endurcir. Avec cette précaution & sans m'arrêter à des mesures trop exactes, il m'a paru (à l'égard de l'os de la jambe des cochons) que le canal médulfaire s'élargit beaucoup dans les fœtus, qu'il continue à s'élargir assez considérablement jusqu'à l'âge de trois mois, qu'il s'élargit encore sensiblement depuis cet âge jusqu'à six mois; passé cet âge l'élargissement ne m'a presque plus été sensible, les os continuent néanmoins à augmenter en grosseur, les parois du canal médullaire deviennent confidérablement plus épaisses, sorte d'accroissement qui ne peut être produit par l'extension des lames osseules, mais qui dépend nécessairement & uniquement de la super-adduion des sames du périofte qui s'ossissent. Ainsi je pense que l'augmentation de grosseur des os qui dépend de l'élargissement du canal médullaire, est uniquement produite par l'extension des lames ofleuses, mais que l'épaississifillement des parois qui forment le canal médulfaire, dépend uniquement de la super-addition des lames du périoste qui s'ossissent successivement.

RÉCAPITULATION.

Les os sont formez de lames qui s'enveloppent les unes les autres; donc ils ne croitlent pas en grosseur uniquement par l'interposition de ne uvelle parties qui soccent celles qui sont précédemment formées de s'écarter.

Les os font des corps organifez & vivans; donc ils ne font point formez par le fimple épanchement d'une lymphe vif-

queuse qui s'arrête entre le périoste & l'os.

Les os sont organisez & ont été mols avant que d'être endurcis; donc cette substance molle qui est devenue osseuse

étoit organisée.

On obtient par le moyen de la garence des couches rouges & des couches blanches fort distinctes les unes des autres; donc les os ne sont point sormez par un nombre de couches cartilagineures qui auroient existe dans le plus petit embryon, & qui n'auroient sait qu'augmenter avec l'age d'épaisleur & d'étendue.

On obterve des lames du périofle qui font partie offitiées, partie membraneuses; donc le périofle ett la substance molle & organisce qui est destince à produire l'augmentation de grosseur des os.

Le canal medullaire augmente de diametre jusqu'à ce que l'animal ait un certain âge; donc les lames ofleuses qui ne sont point encore parfaitement endureies, sont capables de

s'étendre & de croître par une intus-susception.

L'épaisseur de la substance ofleuse augmente lorsqu'elle cesse de s'étendre, & on voit clairement que cette augmentation vient de l'addition des lames du périoste, & qu'elle ne peut dépendre de l'intus-susception.

Ensin on conviendra que j'ai eu raison de comparer l'augmentation de grosseur des os à celle du bois, si on se rappelle,

1° Qu'un jeune bourgeon, si l'on en excepte la moëlle,

n'est que de l'écorce tendre & herbacée.

2° Que tant que l'intérieur de ce bourgeon n'a pas acquis la dureté du bois, il augmente en grosseur par la dilatation

de ses parties & par l'addition de couches ligneuses qui se forment à la circonférence.

3° Que quand l'intérieur est une sois bien converti en bois, ce bourgeon n'augmente plus en grosseur que par l'addition des couches qui se sont formées dans l'écorce.

J'ai donc satisfait à ce que j'ai annoncé au titre de mon Mémoire; il reste à prouver que les os augmentent en longueur par une méchanique toute pareille à l'alongement du corps signeux des arbres, ce sera le sujet du Mémoire suivant.

CINQUIEME MEMOIRE SUR LES OS,

Dans lequel on se propose d'éclaireir par de nouvelles expériences comment se sait la crûe des Os suivant leur longueur, & de prouver que cet accroissement s'opère par un méchanisme très approchant de celui qu'observe la Nature pour l'alongement du corps ligneux dans les bourgeons des Arbres.

Par M. DU HAMEL.

J'AI tàché d'établir dans le Mémoire précédent, que les Os 10 Juillet croissent en grosseur par l'extension des couches osseuses 1743: non endurcies, qui produit l'étargissement du canal médullaire, & par la sur-addition des couches du périosse, qui en s'ossissant

forment l'épaississement des parois de ce canal.

Si les preuves que j'ai rapportées paroifient suffisantes, j'ai satissait à ce que je m'etois proposé touchant l'augmentation de grosseur des Os; mais il me reste à développer par quel mechanisme ils s'étendent en longueur, c'est ce que je vais essayer de saire dans ce cinquième Mémoire.

Pour faciliter l'intelligence de ce que j'ai à dire dans la fuite, je me trouve obligé de donner une idée du perioste

plus exacte que celle qu'on en a ordinairement, c'est un préliminaire dont je ne puis me passer, j'essayerai seulement de l'abréger le plus qu'il me sera possible.

Du Périoste.

Le périoste est un assemblage de plusieurs membranes fermes, de la nature des tendons, extrèmement minces, intimement unies les unes aux autres, de même qu'aux os qui en sont tous recouverts.

Par le fecours de la macération on peut féparer plufieurs de ces lames qui forment le périofte. Havers dit qu'il a divisé par ce moyen le périofte de la jambe d'un bœuf en quatre ou cinq lames; lorsque le périofte est tumésié par une contufion ou à l'occasion d'une fracture, ces lames deviennent plus apparentes: il ne saut cependant pas espérer de pouvoir séparer les lames extérieures du périoste, elles n'ont pas assez de solidité, c'est comme si on vouloit diviser les couches herbacées des écorces; mais on n'aperçoit jamais mieux combien elles sont minces, que quand on observe avec soin leur ossissiem.

L'écorce des arbres est aussi composée d'un nombre prodigieux de couches qu'on peut distinguer les unes des autres dans le temps de la sève & dans les autres saisons, par des macérations & des dissections bien entendues, ou lorsqu'on observe leur endurcissement en bois.

J'ai indiqué dans mon quatrième Mémoire comment on pouvoit, à l'aide de la garence, apercevoir l'extrême finesse des couches osseuses dans le temps de leur formation; il ne sera pas, je crois, hors de propos de rapporter les moyens que j'ai employez pour découvrir dans la même circonstance la finesse des couches ligneuses.

Le printemps, lorsque la sève est abondante dans les arbres, j'appliquai un écussion sur un bourgeon gourmand de poirier; on sçait que ces écussons qu'on appelle à ail poussant, pro-

duisent presque sur le champ un bourgeon.

Quand ces bourgeons carent ac juls quatre ou cin j travers de doigt

de doigt de longueur, je coupai les branches gourmandes qui les portoient, pour examiner en quel état étoient les écussons que j'avois appliquez & l'écorce que j'avois levée pour placer les écussons.

Je trouvai une partie de l'écusson (qui étoit sout écorce quand je l'avois appliqué) déja convertie en bois, & une partie de l'écorce que j'avois levce pour placer l'écasson, aussi

endurcie en hois.

J'examinai de même de ces écussons dans bien des états dissérens, ce qui me mit à portée de dissinguer des lames

ligneuses d'une grande finesse.

Si cette expérience suffit pour qu'on puisse s'assurer qu'il se forme des lames ligneuses extrêmement minces, je suis dispensé d'en rapporter quantité d'autres que j'ai faites sur le même sujet, qui alongeroient cette digression, & qui trouveront mieux seur place dans une autre occasion, je reviens

donc au périoste.

Les lames dont je viens de parler, tant à l'égard du périosle qu'à l'égard des écorces, sont composées d'un assemblage prodigieux de sibres, ou plûtôt de saisceaux de sibres; car si l'on examine en particulier quelques sibres du périosle cu des écorces, on reconnoîtra avec le secours du microscope, qu'elles sont composées d'un nombre de sibrilles d'une deli-

catesse presqu'inexprimable.

Quoique j'aie suivi fort soin l'examen de ces sibrilles, tant du périoste que des écorces, en disséquant au soyer d'un bon microscope des morceaux de périoste de sœtus ou d'écorces qui étoient depuis long temps en macération, mon intention n'étant point pour le présent d'étendre mes recherches sur des parties si déliées, je considérerai les faisceaux de sibres dont je viens de parler, comme s'ils étoient une sibre simple; & toutes les tois que je parlerai des sibres du perioste ou de l'écorce, il ne sera question que des saisceaux.

Les fibres qui composent les lames du périoste, suivent différentes directions, il y en a que je nomme longueur des os, parce qu'elles se prolongent selon la longueur des os, pendant

Mem. 1743.

que d'autres que je nomme obliques, s'écartent un peu de cette direction, & coupent les autres fous différens angles

qui neanmoins font toujours aigus.

Havers a fort bien obtervé que ces fibres obliques se trouvent aux at aches des tendons & des ligamens, & qu'ils ne sont pour la plüpart qu'un prolongement de leurs tibres; imitation affez exacte de ce qui s'observe dans les arbres à l'infertion de leurs branches dans leur tronc, car le prolongement des sibres des branches suit une route oblique relativement à celles du tronc : l'entrelacement des sibres de la branche avec celles du tronc seroit-il la cause de la dureté du bois qu'on observe à la naissance des branches, & de cette irrégularité de direction que les ouvriers appellent du bois rebours! ou ces phénomènes dépendent-ils du tissu cellulaire qui est plus serré en ces endroits qu'ailleurs? c'est ce que je n'ose encore décider.

Quoique j'aie Havers pour garant de ce que je viens d'avancer sur les sibres obliques du périoste & sur leur origine qui vient des tendons & des ligamens, j'ai néanmoins lieu d'appréhender qu'on ne me fasse l'objection suivante.

Si les tendons s'épanouissent dans le périosse, il s'ensuit que leur attache est dans cette membrane, & non pas dans les os, ce qui est contraire à la raison & à l'observation; à la raison, puisque par les moindres esforts le périosse seroit détaché des os, & à l'observation, puisqu'on voit les sibres des tendons & des ligamens s'insérer dans les os, dans lesquels même on peut les suivre.

On ne trouve point dans Havers de réponse à cette objection, mais elle m'est fournie par une observation que j'ai faite, que M. de la Haye Chirurgien-major de la Marine a faite aussi, & qui n'aura peut-être pas échappé à plusieurs

Anatomistes, la voici.

En disséquant des sœtus nous avons observé qu'il y avoit certains tendons qui s'inséroient dans le périoste, & qui netenoient presque point à leurs os, de sorte qu'en disséquant le périoste dans ces endroits on enlevoit les tendons sansépreuver beaucoup de résistance.

Assurément on ne remarque pas la même chose dans les adultes, pas même dans les jeunes animaux; si cela étoit, le périoste pourroit-il résister aux essorts des muscles? ne seroit-il pas exposé à être détaché des os? mais la Nature y a pourvû; ce qui étoit périoste dans le sœtus, est converti en os avant que l'ensant soit exposé à faire usage de ses membres, & l'extrémité des tendons faisant partie du périoste, l'os & ses tendons ne sont plus dans l'adulte qu'un corps continu qui

deviendra d'autant plus folide, que l'os devenant plus épais embrassera une plus grande quantité de sibres tendineuses. Il en est donc des tendons & des ligamens à peu-près comme des racines du guy, qui se trouvent engagées bien avant dans le bois des arbres sans néanmoins avoir pénétré cette substance dure; ou même comme des branches des arbres

dont l'origine est toûjours de plus en plus engagée dans le corps des arbres à proportion que leur tronc prend plus de grosseur; par-là les branches des arbres sont plus en état de résister aux efforts du vent, du poids du givre, &c. & les tendons sont plus disposez à soûtenir l'effort des muscles.

J'ai essayé de rendre ce méchanisme sensible par des figures, & quand on en aura une juste idée, on concevra aisément comment les tendons & les ligamens s'insèrent dans les os, ou plûtôt comment ils sont une vraie continuation des sibres ofseuses.

Les fibres du périoste ne suivent donc pas toûjours une direction parallèle les unes à l'égard des autres (je dois avertir une sois pour toutes que je ne parle que des os longs) il y a des sibres qui s'éloignent de ce parallélisme; mais il m'a paru que ce changement de direction n'étoit jamais considérable, car une lanière de périoste se divise asse aisément quand on la déchire suivant sa longueur, pendant qu'elle résiste beaucoup davantage quand on veut la déchirer de travers; ce qui n'établit pas seulement un point d'analogie entre le périoste & l'écorce des arbres, mais cette observation prouve de plus que la sorce qui est nécessaire pour séparer les sibres ligneuses des écorces & les sibres tendincules du periotte, est beaucoup

moindre que celle qu'il faut pour rompre ces mêmes fibres.

Le périoste est plus épais dans des endroits que dans d'autres, tout le monde en convient; si l'on desire en sçavoir la raison, il saut se souvenir qu'il m'a paru que le périoste est plus épais là où il est plus humecté par la graisse, par la sinovie, par le suc médullaire ou par d'autres liqueurs : car d'abord il est naturel de penser que les lames du périoste seront plus épaisses dans les endroits où elles seront plus abreuvées de quelques sucs; outre cela, il faut se rappeller que j'ai dit dans mon quatrième Mémoire, que se périoste se convertissoit moins promptement en os dans les endroits où il est plus abreuvé des siqueurs que je viens de nommer.

Assurément il y aura plus de couches de périoste dans les endroits où l'ossistication se sera plus lentement, & il est naturel que le periotte soit plus épais dans les endroits où il

est formé d'un plus grand nombre de lames.

Je ne répéterai point ce que j'ai dit dans mon quatrième Mémoire sur les Os, en parlant de certaines cavités superficielles des os; mais si l'on veut consulter ce que j'ai dit à ce sujet, on conviendra qu'elles dépendent souvent de la même cause, je veux dire, de la non-ossissation de plusieurs lames du périosse.

On a remarqué que le périoste est plus transparent dans des endroits que dans d'autres, & il n'est pas douteux que, toutes choses étant égales, le périoste doit être moins trans-

parent dans les endroits où il ett le plus épais.

Mais il n'en est pas toûjours de même, car à mesure que le périoste s'endurcit, il perd de sa transparence; or quelquefois il est plus dur, il est plus près d'être ossissé dans les endroits où il est plus mince: ceci regarde principalement les
jeunes animaux, & il me sera inutile d'en rapporter les raisons
ser le r. pp lle ce que j'ai dit au sajet ou periotte dans mon
quatrième Mémoire.

Je me contenterai donc de faire remarquer que les fibres longitudinales étant celles qui s'ossifient les premières, le periode doit être moins transparent dans les endroits on le.

somme à la partie moyenne, que dans ceux où il y a beaucoup de tissu vésiculaire, comme vers les extrémités des os.

On a encore remarqué que la surface du périoste qui ne touche point aux os, est assez unie, excepté aux endroits où s'attachent ses tendons; mais celle qui touche à la surface des os a des inégalités de bien des formes différentes dont

la contre-épreuve est marquée sur les os.

J'ai déja parlé de plufieurs de ces inégalités qui dépendent de la non-offitication de plufieurs des lames du périotte, mais il y en a d'autres fort petites qu'on aperçoit principalement à l'extrémité des os des jeunes animaux, qui ne dépendent que du tissu vésiculaire qui remplit les intervalles qui sont entre les tibres longitudinales, & celles-ci ressemblent beaucoup à celles qu'on observe à l'intérieur de l'écorce de certains arbres.

L'injection démontre qu'il y a des vaisseaux qui se distribuent dans le periosse comme dans toutes les autres membranes, j'ai même vû la liqueur colorée se distribuer dans quelques vaisseaux des lames nouvellement offisièle; l'injection démontre de plus que le vaisseaux du périosse & ceux des muscles sont continus, & que ceux qui se distribuent dans les os des sœtus, sont continus avec ceux du périosse.

Ces vaisseaux se divisent dans le périoste en une infinité de ramifications qui, par leurs fréquentes communications, forment une cipèce de réseau : entre les vaisseaux qui forment ce réseau il y en a quelques-uns de plus gros que les autres, qui traversent toutes les lames ofseuses & qui vont se distribuer à la moëlle, à la membrane médullaire ou au périoste interne, & enfin aux lames nouvellement ofsissées des os des sectus.

Ces vaisseaux sont-ils tous artériels ou veineux? on le pense ainti, néanmoins comme je conçois que la liqueur des injections pourroit sorcer les passages & s'introduire dans les vaisseaux symphatiques, comme le trit la partie rouge du tang dans les inflammations, je suis dispose à penser qu'enter

ce grand nombre de vaisseaux il y en a de sanguins & de

lymphatiques.

Affurément, comme le dit Havers, le périoste n'est pas seulement uni aux os par un contact immédiat, il y a de plus des sibres du périoste qui s'insèrent dans les os, &, continue le mème auteur, cette union est d'autant plus intime qu'il y a dans l'un & l'autre des éminences & des cavités qui se remplissent mutuellement. Havers croit que ce sont les sibres qui viennent de la dure-mère qui forment cette union, & moi je pense que dans les os, comme dans les arbres, cette union depend principalement d'un tinia vencalaire est parte d'une couche de sibres longitudinales à une autre, & que cette union est augmentée par les sibres des tendons & des ligamens, & peut-être encore par le réseau vésiculaire que l'injection sait apercevoir.

Que les fibres tendineuses & ligamenteuses pénétrent dans les os, tout le monde en convient, & si l'on prépare des os de suitus comme je l'ai dit dans mon quatrieme Memoire, on apercevra que les sibres lon_itudinales des os forment un reseau dent les mailles sont remplies pur une subtlance plus tendre, que je crois être la vésiculaire, & que je regarde, lussqu'elle sera endurcie, comme espable d'unir les unes aux

autres les couches de fibres longitudinales.

Après avoir examiné la texture du périoste, l'arrangement & la disposition des parties qui le composent, la connexion de ces parties, en quoi consiste l'union du périoste avec les os, je me proposai d'examiner l'étendue du périoste sur les os, & je disséquai dans cette intention tantôt des sœtus, tantôt de jeunes, quelquesois aussi de vieux animaux; & ce travail m'ayant fourni des idées assez neuves sur la disposition de cette membrane à l'égard des os, pour vérisser les observations que j'avois saites, je disséquai avec M. de la Haye l'articulation du tibia avec le sémur & quelques autres articulations d'un petit agneau, voici ce que nous aperçumes.

1. La commençant à difféquer le periode au milieu du

tibia, & en remontant vers les extrémités, nous remarquames qu'il augmentoit d'épaisseur à mesure que nous approchions de l'articulation.

Suivant les observations que j'ai rapportées dans mon quatrième Mémoire, vers les extrémités des os le périoste est compose d'un plus grand nombre de couches qu'il ne l'est

à la partie moyenne ou principale.

Le réseau de sibres longitudinales est plus dilaté vers les extrémités des os que vers le milieu, & le tissu vésiculaire y est plus abondant; d'ailleurs vers les extrémités des os le suc médullaire y est en plus grande quantité qu'à la partie moyenne, voilà bien des raisons pour que le périoste y soit plus épais.

2° Quand nous fumes parvenus par la dissection au cartilage intermédiaire, nous aperçumes qu'il se détachoit des lames du périoste qui se prolongeoient entre l'épiphyse & l'extrémité de l'os, pour sormer en cet endroit se cartilage

intermédiaire.

Je prie qu'on prête attention à cette observation, car j'en

ferai ulage dans la suite.

3" Ayant coupé ces lames qui formoient le cartilage intermédiaire pour continuer notre diffection, nous vimes le périofle augmenter confidérablement d'épaisseur, & il étoit très-adhérent au corps de l'épiphyse, dans laquelle il jetoit quantité de faisceaux ou de plans de fibres.

4° Notre dissection nous conduisit au cartilage qui revêt la tête de l'os qui forme l'articulation, & nous sumes surpris d'apercevoir que ce cartilage est encore une continuation du

périoste.

Nous fimes une pareille dissection, mais en sen scontraire; commençant à détacher le cartilage qui revêt les éminences & les cavités articulaires, & tendant vers la partie moyenne de l'os, ce qui ne servit qu'à vérisser les observations que je viens de rapporter.

5° En fendant l'os & l'épiphyse selon seur songueur, il mous parut que le cartilage de l'articulation, celui qu'en

nomme intermédiaire, l'extrémité des tendons & des ligamens, & enfin le périoste devenu en cet endroit fort épais, il nous parut, dis-je, que ces dissérentes parties formoient toutes ensemble ce qu'on appelle l'épipluse.

6° Nous ouvrimes le ligament capsulaire, & nous découvrimes que ce ligament est couvert d'une membrane qui est continue avec le cartilage qui revêt l'articulation, ou avec le périoste, tant du côté du tibia que de celui du fémur.

7° Ce n'est pas tout, cette lame du périoste est aussi continue avec le cartilage qui revêt la rotule & avec les cartilages semi-lunaires, où il se forme des duplicatures qui me paroissent mériter l'attention des meilleurs Anatomisses.

Depuis la dissection dont je viens de parler, j'ai mis macérer des os de sœtus encore petits (cependant garnis de leurs épiphyses) j'en ai aussi disséqué de frais, & il m'a paru que le périoste tel que je viens de le décrire, s'épanouissoit conjointement avec les extrémités des ligamens & des tendons dans les épiphyses qui étoient encore toutes cartilagineuses, que ces parties suivoient dans le corps de l'épiphyse c'informes directions, & que cet atsemblage sormoit le corps de ces épiphyses.

M. de la Have suivoit de son côté cette même recherche,

& voici ce qu'il m'écrivit le 11 Avril 1742.

"Je mis tremper dans l'eau, l'hiver dernier, pendant quinze jours l'articulation du fémur avec le tibia, j'essayai ensuite de lever le périoste à la partie supérieure du tibia; mais l'adhérerence étant trop grande, je me tournai vers la partie insérieure & antérieure du fémur, où je ne trouvai nulle dissiculté pour le séparer de l'os jusqu'à l'endroit où sinit l'os & où commence l'épiphyse; je trouvai sà une same qui paroissoit se détacher de l'intérieur du périoste pour s'engager entre l'épiphyse & l'os, tandis qu'il paroissoit se détacher à l'extérieur d'autres sames pour sorm relesignment capsuline. Je coup à le le mes du périoste qui se prolongeoient entre l'os & l'epiphyse, és je remarquai que le perioste sépaisitioit en

cet endroit, & qu'il alloit former le cartilage qui recouvre « l'extrémité de l'os. »

Outre ce que je viens de rapporter, M. de la Haye m'écrivit le 15 Octobre 1742, « qu'ayant eu à disséquer un fœtus de cinq à six mois, il avoit remarqué que le périoste augmente d'épaisseur vers les extrémités des os:

Qu'en approchant des bords de l'épiphyse, cette mem-

brane paroissoit se séparer en deux lames:

Que la plus externe formoit le ligament capsulaire, & « l'interne le cartilage uni & glissant qui garnit les eminences « & les cavités articulaires:

Que par-dessous la portion de périoste présentement décrite, il y en avoit une autre qui se prolongeoit entre l'épiphyse & l'os pour y former le cartilage intermédiaire, & « que quand cette lame cût été dissequée jusqu'au bord de l'os, « l'épiphyse se détacha très-aisément de l'os, cette seconde « couche restant attachée a l'epiphyse qui étoit de la consistance « d'une gelée un peu soside & rougeatre; ensin qu'en levant le « périoste autour du tibia il avoit en même temps enlevé le « ligament inter-osse»

Je crois que les observations que je viens de rapporter, donneront lieu à plusieurs questions; j'ai essayé de les prévoir pour y répondre, & je le fais d'autant plus volontiers, qu'en établissant la vérité de ces observations, je pourrai expliquer avec beaucoup de facilité plusieurs phénomènes qui appartiennent à la formation des os, ce qui seroit extrêmement

difficile sans le secours de ces observations.

J'ai prouvé dans mon quatrième Mémoire, que le périoste est aux os ce que l'écorce est aux arbres, j'ai fait voir que les lames intérieures de cette membrane s'ossissient, & qu'elles augmentent la grosseur des os, comme les lames intérieures de l'écorce augmentent la grosseur du corps ligneux à mesure qu'elles s'endurcissent.

Après les preuves que j'ai rapportées dans le Mémoire que je viens de citer, on imaginera volontiers, je crois, que les os font recouverts d'un fourreau membraneux, qui venant

Mem. 1743.

122 Memoires de l'Academie Royale

à s'ossifier, ajoutera de nouvelles lames osseuses à l'os précédemment formé. Mais on aura peut-être de la peine à faire quadrer cette addition de couches avec les divisions du périe de qui vont former le ligament intermediaire, celui qui revet les articulations & une partie du ligament captulaire,

comme je viens de l'expliquer.

Néanmoins je crois que cette difficulté s'évanouira si l'on sait attention que le périoste (& par conséquent les os) est en partie formé par l'épanouissement de l'extrémité des tendons & des ligamens, & que les tendons & les ligamens sont euxmèmes recouverts d'un périoste; car alors un os garni de ses tendons & de ses ligamens doit être regardé comme un arbre dont les branches seroient herbacées & seulement le tronc ligneux; & essectivement je ne vois pas qu'il soit singulier d'avancer que le ligament intermédiaire & le capsulaire forment une partie du périoste par leur épanouissement, puisqu'on convient que les autres ligamens, de même que les tendons, s'épanouissent dans cette membrane & en forment une partie.

Mais je crois apercevoir un moyen de rendre la chose encore plus claire en employant une comparaison tirée du règne végétal; pour apercevoir la justesse de cette comparaison il faut sçavoir que le tissu du périoste est plus serré & plus épais dans les endroits où il se divise pour former le cartilage intermédiaire, le ligament capsulaire, le cartilage qui revêt les articulations, &c. car je crois, avec le secours de cette considération, pouvoir donner une idée de la disposition de ces sibres en ces endroits, en rappellant l'idée des nœuds des arrondinacées où le tissu est bien plus serré & plus consus qu'ailleurs, & d'où partent des sibres longitudinales qui forment, les unes la continuation de la tige, les autres des bourgeons latéraux, & d'autres des seuilles.

Mais, dira-t-on, le périoste est donc continu depuis le calcaneum jusqu'au sommet de la tête? Havers l'a pensé à peu-près de même, de sorte que si l'on pouvoit sans endommager le périoste, détruire tous les os, on auroit un sourreau

qui représenteroit un squelette entier.

Cette idée ne souffre point de disficulté dans le sentiment de Havers qui ne penfoit pas que le periotle put s'offilier; mais puilque j'ai prouvé dans mon quatrieme Memoire que le périofte s'offifie, on pourroit être en peine de sçavoir pourquoi la membrane captulaire qui est une continuation du périoste, ne s'offisie pas, & reste ligamenteuse.

Avant que de répondre à cette question, je prie qu'on remarque que le ligament capsulaire est dans le même cas que tous les autres ligamens, & que tant de tendons qui, de l'aveu de tous les Anatomistes, sont osseux à leur extrémité qui s'insère dans les os, & restent ordinairement slexibles dans leurs autres parties; je dis ordinairement, pour qu'on ne m'objecte pas que les tendons des jambes des oiseaux sont presque toûjours offifiez, & qu'on trouve dans les vieillards & dans les rachitiques, des portions de tendons & de liga-

Après avoir fait sentir que la mollesse que conserve le ligament capfulaire n'offre rien de plus fingulier que celle de tous les autres ligamens, je hasarderai seulement, ne sut-ce que comme une raison probable, que c'est le mouvement qu'eprouvent ces parties, joint aux liqueurs qui les humeclent, qui empêche qu'elles ne s'offifient; les observations suivantes

semblent le prouver.

mens qui se sont endurcis.

On convient affez généralement que les os du crâne des enfans qui sont attaquez d'hydrocéphale, s'endurcissent plus lentement que les mêmes os des enfans qui n'ont point cette maladie. On peut consulter sur cela un Mémoire de M. Hunauld, imprimé dans le Volume de 1740*; le séjour d'une lymphe épanchée est donc un obstacle à l'endurcisse-

ment des os qui en peuvent être abreuvez.

Plusieurs Auteurs prétendent qu'il y a des anchyloses qui viennent du manque de la finovie, & qui font précédées de l'amaigrissement de la partie, souvent avec un cliquetis; si cela est, voilà des ligamens qui s'offissent faute d'être humeclez. Tout le monde sçait que quand un membre est longtemps sans action, comme il arrive aux Esclaves déserteurs

du Mexique & aux malades qui ont eu long-temps un membre dans une même fituation; on sçait, dis-je, qu'il y survient une anchylose: voilà les ligamens qui s'ossissent

faute de mouvement.

Enfin j'ai entendu dire à feu M. Duverney, qu'il se formoit quelquefois aux endroits des fractures des espèces d'articulations au lieu d'un cal solide, & que cette singularité dépendoit du mouvement que la partie rompue avoit éprouvé pendant sa guérison. Si cette observation que je n'ai pù vérifier, est exacte, ce seroit une preuve décisive que le mou-

vement empêche l'offification des cartilages.

Autre dissiculté que je dois essayer de dissiper: j'ai avancé que le cartilage qui revêt les éminences & les cavités articulaires, étoit une continuation du périofle; on aura peut-être peine à convenir de cette continuité, si l'on compare la texture du périofte avec celle de ce cartilage qui est épais, serme, d'un blanc de lait, uni & glissant à sa superficie, &c. Voici une observation qui prouve que cette différence ne vient que du frottement continuel qu'éprouvent les cartilages des articulations.

On voit assez souvent dans les squelettes des rachitiques, que deux os qui dans l'état naturel devoient être écartez l'un de l'autre à leur partie moyenne, tels que le cubitus du radius, se touchent en cette partie, à cause du contour irrégulier que prennent les os de ces rachitiques: or dans ces endroits où deux os ont frotté l'un contre l'autre, au lieu du périoste qu'on y observe ordinairement, on y trouve un cartilage épais, ferme, blancheatre, entièrement semblable à celui des articulations; c'est donc le frottement qui change la texture du périoste à l'extrémité des os articulez, je ne crois pas qu'on refuse maintenant d'en convenir.

Des fibrilles extrêmement fines, ramassées par saisceaux,

forment les fibres apparentes du périoste.

Ces faisceaux de sibres sorment des lames fort minces. Le périoste est composé d'un nombre plus ou moins grandde ces fames.

Enfin les fibres des ligamens & des tendons font continues avec les fibres ofleuses ou avec les fibres du périosle, sans qu'on en doive excepter le ligament inter-osseux, non plus que le capsulaire & le cartilage qui revêt les articulations.

Voilà un précis de ce que j'ai dit sur le périoste, je passe

à ce qui regarde l'accroissement des os.

Havers, pour prendre la chose dans son principe, dit que les os commencent par être mols & gelatineux, & qu'ensuite

ils deviennent cartilagineux.

On peut accorder à Havers que les os commencent par être gelatineux, si par-là il ne prétend indiquer que leur molletle; mais quelque mols qu'ils soient, je crois qu'ils sont organisez, car jusqu'à présent on n'a point de preuve qu'un amas d'une matière purement mucilagineuse puisse jamais faire un corps organisé; ainst quoique le cartilage primitis des os soit trop mol pour qu'on puisse le diviser par lames, je pense néanmoins, comme Kerckringius, que les os commencent par être membraneux, qu'ils deviennent ensuite cartilagineux, & ensin osseus.

Je n'ai point examiné au microscope ce cartilage primitif des os, mais j'ai examiné les extremites cartilagineuses des os des sœtus, & je crois y avoir aperçu une organisation assez semblable à celle du périosse; l'injection prouve d'ailleurs que la distribution des vaisseaux est la même dans les cartilages dont je parle & dans le périosse, & cette conformité concourt avec les preuves que j'ai rapportées dans mon quatrième Memoire pour l'établissement du sentiment qui fait

l'objet de tout ce travail.

Je sçais que les os ne commencent pas toûjours à s'endurcir par leur partie principale, les os innominés en fournissent un exemple; je sçais aussi que dans les vertèbres ce n'est pas la partie principale qui est la plus dure, mais comme je ne parle que des os longs, & particulièrement du tibia, je puis dire que l'ossissication commence par la partie moyenne de ces os, & que c'est en cet endroit que la paroi du canal médullaire est la plus épaisse & la plus dure.

Je dois faire observer que quand je parlerai de la partie moyenne du tibia, je ne prétends pas que ce sera le milieu de l'os d'un animal formé, mais à peu près le milieu du cartilage d'un embryon qui doit être, dans l'animal formé, l'os tibia; car comme je vais prouver que cet os s'étend beaucoup plus du côté du genou que du côté du pied, il s'ensuit que la partie moyenne de l'os d'un petit sœtus est dans l'adulte beaucoup plus près de la partie inférieure de cet os que de la supérieure. Il est bon d'être prévenu de cette circonstance, je reviens à mon sujet.

J'ai examiné au microscope la jambe & la cuisse d'un embryon qui avoit du sommet de la tête aux pieds, environ 28 lignes de longueur; cette pièce avoit été préparée avec

beaucoup d'adresse par seu M. Hunauld.

Le pied, la jambe, la cuisse avec l'os des iles n'avoient que 9 lignes de longueur.

Le fémur, le tibia & le péroné étoient offisiez par leur

milieu, le reste de ces os étoit cartilagineux.

Il sembloit au microscope que les endroits offisiez formoient un canal qui étoit enfilé par le cartilage, ce qui vient 1° de ce qu'en se desséchant le cartilage s'étoit plus retiré que l'os, 2 de ce que probablement une partie du cartilage avoit été détruite par la dissection.

Enfin la partie ossissiée ne paroissoit pas unie, mais rabo-

teuse, & comme composée de flocons ofseux.

J'ai patlé ensuite à l'examen des lames osseuses dont l'orginitation est sur-tout sensible au crane des petits fictus, à des os longs & malades, aussi de fœtus, & à l'extrémité supérieure du tibia des veaux mort-nez, principalement quand ils ont reste quelque temps exposez à l'air, pour qu'une partie du tissu vésiculaire soit détruite; on voit que les os sant formez d'un tissu de sobres solides differemment disposees suivant la conformation de chaque os.

En examinant ces fibres au microscope, j'ai vû qu'elles se prolongeoient suivant une certaine direction, quelquesois deux sibres s'inclinent l'une vers l'autre, & elles s'anastomosent;

d'autresois une sibre se divise en deux, & chaque bisarcation va se joindre à une sibre voitine; ensin il part de temps en temps des sibres dont je viens de parler, des sibres latérales qui sont presque perpendiculaires sur les sibres principales, & qui s'étendent d'une sibre à une autre.

Cette disposition des sibres osseules ressemble assez à un reseau, c'est aussi l'idée qu'en donnent M. Malpighi & le célèbre Albinus dans son excellent Traité de l'Ostéologie

des fœtus.

J'ai quelquesois vû les mailles de ce réseau remplies par une substance cartilagineuse, qui étant un peu dessechce & examinée à un bon microscope, paroissoit entrecoupée par un nombre de petites lignes que je ne puis mieux repréfenter qu'en indiquant les figures que Malpighi a sait graver pour représenter le tissu vésiculaire des arbres.

Quand on examine de ces os un peu mieux formez, les filets offeux paroiffent comme chargez de concretions offeuses qui remplissent une partie des mailles du réseau que je viens de décrire, & alors on ne voit plus que comme une table

osseuse qui seroit percée de plusieurs trous.

Je crois que les concrétions dont je viens de parler, ne font autre chose que le tissu vésiculaire qui s'est offsisé en

partie.

Ensin les mailles du réseau ou les trous dont je viens de parler, se ferment entièrement & si exactement que dans beaucoup d'os on n'aperçoit plus rien de tout ce que je viens de décrire, on ne voit qu'un seuillet ofseux sort plein & sort uni; je n'ai point estaye de développer les silets qui sorment le réseau dont je viens de parler, mais Leewenoek qui a suivi cette recherche avec grand soin, a reconnu que ces sibres étoient des saitceaux de sibrilles, & que ces sibres premières (pour me servir de ses termes) étoient roulées en spirales comme celles des plantes. C'est Leewenoek qui me sournit cette comparaison, & il insiste beaucoup dans plusieurs endroits de ses ouvrages sur la ressemblance qu'il a observée entre les sibres osseuses & les sibres ligneuses.

Ces fibres premières sont donc ramassées par faisceaux, ces faisceaux sont disposez les uns à l'égard des autres en forme de réseau dont les mailles sont remplies par un tissu vésiculaire, & tout cet assemblage forme des seuillets ou lames ofleuses dont j'ai amplement parlé dans mon quatrième Mémoire.

Je soupçonne de plus que les cless ou les clouds dont parle Gagliardy sont formez par le tissu vésiculaire qui se pre lange entre les mailles du réseau de sibres longitudinales qui les remplit, & qui sert à unir les uns aux autres ces plans

de fibres longitudinales.

Je l'ai déja dit, mais je crois devoir le répéter, il y a des animaix qui ont un temp rament si dispote à l'ossistication, que des pirtles qui doivent naturellement rester molles sendurcissent en os, pendant qu'il y a d'autres animaux de la même espèce qui ont si peu de disposition à l'ossissication, que des parties qui ont coutume d'etre essistices dans tous les sujets de la même espèce, restent dans ceux-la cartilagineuses.

J'ai dit de plus que je conjecturois que l'offitication etoit fouvent ralentie par l'abondance du fue medullaire ou du fue

graisseux, ou de quelqu'autre liqueur.

La même chose se remarque aussi dans le règne végétal, car on sçait que parmi les noyers il y en a qui ont une telle disposition à s'endurcir en bois, que les membranes de l'intérieur de leur truit deviennent aussi dures que la boite signeuse e si enveloppe l'anunde; au contraire il y a des noyers qui ont si peu de disposition à l'endurcitiement, que leur truit n'est couvert que d'une coquille sort mince, ou même le bois manque absolument en quelques endroits.

De même on voit des prunes qui ont le noyau fort dur, j'en ai une espece d'ont le noyau est presque membraneux, & feu M. Marchant en sit voir une à l'Académie il y a quelques années dont l'amande n'étoit point du tout recouverte de bois.

Des poires qui sont pierreuses, tandis que d'autres ne le sont pas, des racines qui sont les unes fort tendres & les autres cordées, la dissérente dureté des bois; toutes ces choses sournissent

fournissent des exemples de la disposition plus ou moins

grande que certaines plantes ont à s'endurcir.

Pendant que j'étois occupé à rassembler ainsi les connoisfances qui me sembloient devoir être utiles à mes recherches, je sentis combien il me seroit avantageux de sçavoir, ne sut-ce qu'à peu-près, de quelle quantité les os d'un jeune animal croissent dans les dissers âges.

Pour cela je sis choisir dans les basse-cours de nos fermiers

une suite de poulets de disférens âges.

Je m'informai avec tout le soin possible de l'age des poulets que j'avois choisis.

J'essayai que ce sussent tous coqs, mais cela ne se distingue

pas sûrement quand les poulets sont petits.

Comme dans une même couvée il y en a de plus forts les uns que les autres, je choisis ceux qui me paroissoient

les plus vigoureux.

Je pesai tous ces poulets en vie, & je mesurai la longueur de l'os de seur jambe; la table suivante indique dans la première colonne les numéros qui servent à distinguer ces poulets, la seconde colonne contient seur âge en jours, la troisième marque seur poids en gros, & la quatrième la longueur de l'os de seur jambe en signes.

NUMERO.		AGE DES POULETS.		LEUR POIDS.	LONGUEUR DU TIBIA.
1 . 2 . 3 ·			42	gros 14	2
5 · 6 · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,		. 120	
8.		1		206	

Je dois avertir que malgré toutes les précautions que j'ai Mem. 1743.

130 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE prifes pour bien exécuter cette expérience, on ne doit pas beaucoup compter sur la table qui en marque le résultat; car i je n'ai sou l'age des poulets que par le rapport des sermières; 2 on fent bien que le poids dépend beaucoup du tempérament de ces animaux, qui sont ou plus gras ou plus charnus les uns que les autres; 3° la mesure du tibia n'est pas plus certaine, non seulement parce qu'il y a de ces animaux qui viennent beaucoup plus grands les uns que les autres, mais encore parce que je ne suis pas bien certain d'avoir eu tous cogs, ce qui fait une différence confidérable, puisque dans une même basse-cour j'ai trouvé de vieux coqs dont le tibia avoit plus de 56 lignes de longueur, pendant que le même os d'une vieille & grosse poule n'avoit que 40 lignes de longueur; néanmoins on voit que passé 4 mois le tibia de ces poulets n'alonge que très-lentement, quoique le poids total de ces animaux continue de beaucoup augmenter: c'est presque tout ce que je puis conclurre de cette expérience, qui néanmoins m'a coûté affez de peine.

Le mauvais succès de cette recherche m'engagea à essayer de connoître simplement à quel âge les os de ces animaux

cessent de s'étendre.

Je choisis pour cela de jeunes poules de 8 mois & de vieilles poules, les unes & les autres fortes & vigoureuses; les jeunes poules pesoient à peu près & poids moyen 248 gros, & l'os de leur jambe avoit environ 40 lignes de longueur; les vieilles poules pesoient à peu près 264 gros, & l'os de leur jambe avoit aussi à peu près 40 lignes de longueur: d'où on peut conclurre que les os de ces volailles ont acquis toute leur longueur avant que ces animaux soient âgez de 8 mois.

Cependant les os des jeunes poules étoient beaucoup moins gros que ceux des vieilles, leurs apophyses étoient moins longues & moins dures, & le ligament qui est entre le tibia & le péroné étoit moins endurci dans les jeunes poules que dans les vieilles, où il étoit tout ossissé.

Enfin ayant entamé ces os pour examiner l'épaisseur des

parois du canal medullaire, je remarquai que la partie co a pacte des os des vieilles poules étoit beaucoup plus épaire

que celle des os des jeunes poules.

Comme je me trouvai avoir une suite d'os de poulets de différens âges, je les limai de la moitié de leur épaisseur, pour comparer la largeur du canal médullaire & l'épaisseur des parois offeuses de ce canal, comme j'ai dit dans mon dernier Mémoire que je l'avois fait sur des os de bœuf; je vais rapporter ce que j'ai observé.

1° Le canal médullaire est proportionnellement plus large dans les jeunes animaux que dans les vieux, parce que les parois du canal médullaire font plus minees a proportion dan

les jeunes que dans les vieux.

2° La largeur du canal médullaire augmente beaucoup depuis que le poulet est éclos jusqu'à l'âge de 15 jours.

3° Il continue à augmenter considérablement depuis cet

âge jusqu'à celui de 3 mois 1.

4° Il augmente encore, mais moins sensiblement, depuis

cet âge jusqu'à ce que le poulet ait 5 mois 1.

5° Passé cet âge le canal médullaire n'augmente presque plus de diamètre, quoique l'epaitseur des parois de ce can d

augmente très-fensiblement & pendant long temps.

- 6° Quand les animaux sont jeunes, les lames extérieures de leurs os vers les extrémités sont d'un tissu moins serré que la partie moyenne, il semble que dans l'endroit où le tiffu du periofle s'est plus étendu, le réseau de fibres longitudinales soit moins serré qu'ailleurs; mais dans les vieux animaux la surface des os est d'un tissu sort serré dans toute l'étendue de l'os.
- 7° Dans les animaux fort jeunes l'épiphyse ne paroit tenir au corps de l'os que par le périoste, dans les animaux plus lige: l'épiphyle est plus adherente au corps des os ; ne mm lins elle s'en sépare quand on fait bouillir les os dans de l'eau, mais elle ne fait plus qu'un corps continu quand les animaux font vieux.
 - 8°. Il se forme avec l'âge des éminences considérables Rij

aux endroits où les ligamens & les tendons s'attachent aux os, ce qui produit les éminences articulaires, & quand elles font

confiderables on les appelle les apophyses.

J'ai donc eu raison d'avancer dans mon quatrième Mémoire, que le canal médullaire s'élargitsoit de plus en plus tant que les sames qui le forment n'avoient pas acquis une certaine dureté, qu'ensuite elles cessoient de s'étendre, & que les os augmentoient alors de grosseur par la sur-addition des sames du périoste.

Il est facile de faire la même observation dans les arbres, puisqu'on voit dans le noyer, dans le sureau & dans les autres arbres qui ont beaucoup de moëlle, que le canal qui la renferme s'élargit tant que les bourgeons sont herbacez.

J'ai dit de plus dans mon troitième Mémoire, 1° que les cartilages, de même que les bourgeons herbacez, s'étendoient dans toutes leurs parties comme un bâton de cire molle qu'on

tireroit par les deux bouts.

2° Que quand un cartilage commence à se convertir en os, ou quand un bourgeon commence à se convertir en bois, l'alongement diminue dans la partie qui s'endurcit, & qu'il e stri insque l'endurcitément est parsaite; de sorte que si le tibia d'un jeune animal est parsaitement endurci à sa partie principale, qu'il soit tout-à-fait cartilagineux aux extrémités, & que l'espace contenu entre l'os parsait & l'extrémité cartilagineuse soit dans un état moyen entre l'os & le cartilage, ce tibia s'étendra beaucoup à ses extrémités, point du tout à sa partie principale, & dans le reste l'extension sera proportionnelle, mais en raison contraire de l'endurcissement.

La même chose s'observe dans les arbres, l'alongement cesse d'abord à l'endroit où le bourgeon tient à l'arbre, parce que c'est la partie qui se convertit la première en bois; il est considérable à l'extrémité du bourgeon, parce qu'il y est entièrement herbacé, & dans l'espace intermédiaire il est plus ou moins considérable, suivant qu'il est plus ou moins endurei; je vais rapporter les preuves que j'ai des saits que je

viens d'avancer.

Il est inutile de répéter le détail des expériences que j'ai déja rapportées dans mon troisième Mémoire, elles prouvent, il est vrai, ce que je viens d'avancer, mais il me sussit de les indiquer; ainsi je passe au détail de quelques autres que j'ai exécutées depuis avec tout le soin possible.

Je commence par ce qui regarde les bourgeons, ce que je dirai ensuite sur les os en sera plus aisé à comprendre.

Les premiers jours de Juin de l'année dernière 1742, je mesurai le bourgeon nouveau, ou de l'année, d'un jeune marronier d'Inde qui étoit assez vigoureux; ce bourgeon avoit alors un pied de longueur, je le divisai en douze parties égales qui avoient par conséquent chacune un pouce.

Pour reconnoître les divisions que je venois de faire, je piquai à chaque division une épingle très-sine qui traversoit

le bourgeon de part en part.

J'eux l'attention de mettre d'un même côté toutes les têtes

de mes douze épingles, on en va sentir la raison.

A mesure que l'extrémité du bourgeon qui excédoit la douzième épingle s'étoit alongée d'un pouce au dessus de cette dernière épingle, je le piquois d'une autre épingle, ayant l'attention de mettre la tête de cette nouvelle épingle en sens contraire des précédentes, & je continuai d'ajoûter ainsi de nouvelles épingles toutes les sois que le bourgeon s'étoit alongé d'un pouce.

Le 29 Octobre de la même année ce jeune arbre ayant perdu ses seuilles, je mesurai de nouveau toute la longueur du bourgeon de l'année, elle se trouva être de 15 pouces; ce bourgeon s'étoit donc alongé de 3 pouces depuis le commencement de mon expérience, ce qui fait un cinquième de

l'alongement total de ce bourgeon.

Le but principal de mon expérience étoit de connoître à quelle partie s'étoit fait cet alongement, & moyennant mes

épingles il m'étoit aifé d'en être certain.

Les dix premières épingles en commençant par en bas fe trouvèrent éloignées les unes des autres d'un pouce juste, il ne s'étoit donc fait aucun alongement en cet endroit, parce

que l'intérieur de ce bourgeon dans la longueur de 1 o pouces étoit trop endurci pour être encore capable d'alongement.

De la dixième épingle à la onzième il y avoit i 5 lignes d'intervalle, il y avoit donc eu 3 lignes d'alongement à cette partie; donc le degré d'endurciffement qu'avoit cette partie du bourgeon quand j'ai fait mon expérience, permettoit un petit alongement.

De la onzième à la douzième épingle il y avoit 2 1 lignes de distance, cette partie du bourgeon qui étoit la plus herbacée quand j'ai commencé mon expérience, s'étoit donc

alongée de 9 lignes.

Mais l'alongement de ce bourgeon depuis le mois de Juin étoit de 3 pouces, & ne voilà qu'un pouce d'alongement de compris entre les limites des douze épingles que j'avois

placées au commencement de l'expérience.

Aussi y avoit-il 2 pouces d'alongement au dessus de la douzième épingle; mais ce qui est fort singulier, c'est que cet alongement qui avoit été produit au déclin de la sève s'étoit fait uniquement par l'extrémité du bourgeon, car à la sin de l'expérience la treizième épingle qui avoit été mise en place si-tôt que j'avois aperçu un pouce de distance entre la douzième épingle & l'extrémité du bourgeon, cette treizième épingle, dis-je, étoit toûjours restée à cette même distance de la douzieme, quoique le bourgeon cut continué à s'alonger de plus d'un pouce; & ce que je viens de faire remarquer au sujet de la treizieme epingle, ctoit entierement semblable à le card de la quatornieme epingle, relativement à la treizième.

J'ai de même examiné des sarmens de vigne qui n'ont point du tout alongé du côté de leur naissance sur le sep, qui ont beaucoup alonge en d'autres endroits, prisque j'ai treuve jusqu'a 13 lignes d'alongement seulement dans l'intervalle d'un pouce, & qui après que la grande sève a été pusse, se sont alongez seulement par leur extremité, & de la saçon que je viens de l'expliquer en parlant du marronier, de plus d'un pied; de sorte qu'à la sin de l'expérience j'ai

trouvé à l'extrémité de ces farmens douze, & quelquefoiquatorze épingles qui étoient toutes à un pouce les unes des autres.

J'ai choisi ces expériences entre plusieurs autres que j'ai faites sur le même sujet, mais dont je supprime le détail pour ne point trop alonger ce Mémoire, & principalement parce qu'elles m'ont fait apercevoir plusieurs choses qui n'appartiennent pas au sujet que je traite, assez intéressantes néanmoins sur le progrès de la végétation, pour mériter dans un

autre temps l'attention de l'Académie.

Il me suffira d'assurer que toutes mes expériences établissent que l'alongement est considérable à la partie des bourgeons qui est entierement herbacce, qu'il diminue proportionnellement au progrès de l'endurcissement, & qu'il cesse aux endroits où l'endurcissement est parfait; enfin que quand sa grande force de la sève est passée les bourgeons ne croissent plus que par leurs extrémités. Apparemment qu'alors la conversion en bois est trop prompte pour que les bourgeons soient extensibles dans une plus grande longueur.

Maintenant qu'on a une idée assez exacte de ce qui se passe à l'égard des végétaux, je vais rapporter les expériences que j'ai faites pour m'assurer si la Nature suit les mêmes

règles pour l'augmentation de longueur des os.

Le 12 Mars 1741 je sis percer en deux endroits avec un poinçon affez gros la jambe de devant d'un petit agneau. on le tua le 28 Mars, les piquûres de l'os ne paroissoient alors que par de petites éminences qui étoient à la surface de l'os, mais elles étoient fuffifantes pour qu'on apercut que l'intervalle d'un pouce vers la partie moyenne de l'os, espace qui et it rensermé par les deux piquûres, s'etoit alonge de 2 lignes dans l'espace de 16 jours.

Il y a donc un temps où l'os de la jambe est capable d'alongement, même vers la partie moyenne, c'est tout ce

qu'on peut conclurre de cette expérience.

A peu près dans le même temps on fit au gros os de la jambe de derrière d'un petit chien age de 15 jours eing trous,

& l'on eut soin qu'une des piquûres sût le plus précisément qu'il étoit possible, à la partie principale de l'os, les quatre autres s'étendoient vers les extrémités supérieure & insérieure. Quinze jours après cette opération on tua cet animal, & on remarqua que la piquûre n.º 3 (car pour reconnoître ces piquûres je les distingue par des numéros en commençant à compter par la piquûre qui est la plus proche du pied) on remarqua, dis-je, que la piquûre n.º 3 étoit plus écartée de celles n.º 2 & n.º 4, tout au plus d'une ligne au delà de ce qu'elle étoit au commencement de l'expérience, mais la piquûre n.º 5 s'étoit éloignée de celle n.º 4 de 5 lignes.

Je ne trouve point sur mon journal quel étoit l'alongement de la partie insérieure, mais cette expérience prouve que l'alongement avoit été fort petit à la partie moyenne

en comparaison de la partie supérieure.

Quelque temps après on piqua de quatre trous l'os de la jambe d'un pigeonneau, n.º 1 étoit le plus près du pied, & peu éloigné de l'articulation, la partie principale de cet os étoit renfermée entre n.º 2 & n.º 3, & la piquûre n.º 4 étoit du côté du genou, mais un peu éloignée de cette articulation. On tua cet animal huit jours après qu'on lui eut fait ces piquûres, & on vit que celles n.º 2 & 3, qui renfermoient la partie moyenne, n'avoient pas changé de position l'une à l'égard de l'autre; mais la piquûre n.º 1 s'étoit éloignée de celle n.º 2 de près d'un quart de ligne, & la piquûre n.º 4 s'étoit éloignée de celle n.º 3 de près d'une demi-ligne.

Il est évident par cette expérience que l'os de la jambe de ce pigeonneau avoit acquis assez de dureté à sa partie principale pour ne plus s'étendre à cet endroit, mais qu'il n'étoit pas assez dur vers les extrémités pour avoir perdu la propriété de s'étendre; de plus il est à propos de remarquer que l'extension a été plus considérable du côté de l'extrémité

supérieure que du côté du pied.

Ce que je pouvois desirer après ces expériences, c'étoit d'avoir des dissérences plus sensibles; j'espérai y parvenir en laissant

laissant vivre plus long-temps les animaux dont j'avois piqué les os, mais alors les plaies étoient si parfaitement guéries que je ne pouvois plus reconnoître les impressions des piquures. Cet inconvénient coûta la vie à plus d'une trentaine d'animaux, sans que j'en pusse tirer aucun éclaircissement; je ne me rebutai pas néanmoins, je pris le parti de recommencer les mêmes expériences, avec la précaution d'introduire dans les trous que je serois un fil d'argent qui empêcheroit les trous de se fermer, & me mettroit en état de reconnoître les piquures long-temps après qu'elles auroient été faites.

Affurément par ce moyen je remédiois aux inconvéniens qui réfultoient de la trop prompte guérison des piquûres; mais ces fils d'argent causoient bien de la douleur à mes poulets, leurs jambes devinrent violettes, & malgré tous mes soins la plus grande partie périt trop tôt pour mon instruction; j'en sauvai deux en les débarrassant des fils d'argent qui causoient leur douleur, mais quelques-uns des trous se cicatrisèrent trop bien pour qu'on pût les distinguer à la sin de l'expérience, il n'y eut qu'un seul poulet qui vécut sept semaines avec les anneaux de sil d'argent dont je viens de parler; c'est beaucoup que d'en avoir réchappé un, puisqu'il me sournit seul toutes les connoissances que je desnois, voici l'histoire de ce poulet.

Le 16 du mois de Septembre 1742 on choisit un poulet âgé d'environ six semaines, l'os de sa jambe avoit 2 pouces de longueur; on le perça avec un foret à un demi-pouce de l'articulation du pied, on sit un autre trou un demi-pouce plus haut, ensin on sit un troisième trou encore un demi-pouce plus haut, & ce dernier trou étoit éloigné de l'articulation du genou d'un demi-pouce, de sorte que toute sa

longueur de l'os étoit divisée par demi-pouces.

Je sis passer un fil d'argent dans chacun de ces trous, & on en sit des anneaux qui embrassoient la moitié des chairs ou des muscles de la jambe.

Ce poulet âgé de fix femaines au commencement de l'expérience, fut tué le 7 Novembre, ainfi cet animal étoit âgé Mem. 1743. 138 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE de treize semaines quand on le tua, & il avoit vécu sept

semaines depuis qu'on lui avoit piqué l'os de la jambe.

A la fin de l'expérience l'os tibia de cet animal avoit 3 pouces de longueur au lieu de 2 pouces qu'il avoit au commencement de l'expérience; ainfi cet os s'étoit alongé d'un pouce pendant les sept semaines que l'expérience avoit duré.

Il est question de sçavoir à quelle partie de cet os s'est fait ect. Jon; ement, c'est et qu'il est aire de connoître par le moyen des trous qui divisoient l'os de sa jambe en quatre parties égales. Le premier, qui au commencement de l'expérience étoit à 6 lignes de l'extrémité insérieure, étoit à la sin de l'expérience à 9 lignes; ainsi il s'étoit alongé de 3 lignes en cet endroit. Le deuxième trou étoit à la sin de l'expérience comme au commencement, à 6 lignes du premier & du troissème trou; il n'y avoit donc eu aucun alongement entre le premier & le troissème trou. Mais ce troissème trou qui au commencement de l'expérience étoit éloigné de 6 lignes de l'extrémité supérieure du tibia, en étoit éloigné à la sin de 15 lignes; ainsi il y avoit 9 lignes d'alongement à cette partie, ce qui prouve incontestablement que le plus grand alongement s'étoit sait à cette partie qui est celle qui s'endurcit la dernière.

J'ai dit que j'avois été obligé pour conserver la vie à deux des poulets que j'avois mis en expérience, d'ôter les sils d'argent qui devoient empêcher les trous de se fermer; cette précaution soulagea beaucoup mes poulets, mais aussi plusieurs des trous se fermèrent trop exactement pour qu'on pût les reconnoître surement à la sin de l'expérience. Néanmoins ces deux poulets qui étoient âgez de neus semaines au commencement de l'expérience, prouvent assez bien, quoique moins clairement, la même chose que le poulet dont je viens

de parler, ainsi on peut regarder comme certain,

1° Que quand les os ne sont pas bien endurcis, ils s'alongent dans toutes leurs parties, cela est prouvé par la

premiere experience.

2° Que l'alongement diminue dans ses endroits où l'endurcissement sait plus de progrès, ceci est prouvé par la seconde expérience.

139

3° Que l'alongement cesse aux endroits où l'endurcissement est parsait, la troissème & la quatrième expérience le prouvent.

4 Que l'alongement est plus considérable à la partie supérieure du tibia qu'à l'inférieure, ce qui est établi par toutes

les expériences.

5° Enfin il m'a paru que quand les animaux approchent de la grandeur qu'ils doivent avoir, l'accroiffement de leurs os

ne se fait plus que par leurs extrémités.

Maintenant si l'on se donne la peine de rapprocher ce que j'ai dit de l'alongement des bourgeons, de ce que je viens de dire à l'égard des os, je crois qu'on apercevra comme moi une analogie surprenante, & qu'on sera étonné de voir la Nature suivre à peu de chose près les mêmes règles pour des productions qui au premier coup d'œil paroissoient extrêmement différentes.

Pour moi je suis persuadé que plus on étudiera la Nature, plus cette analogie entre les corps organisez s'établira.

On a regardé pendant long temps comme un avantage propre aux végétaux, de reproduire une partie semblable à celle qu'on leur a retranchée; mais depuis qu'on a vû la reproduction de la queue des lézards & des pattes des écreviffes, on est convenu qu'il y avoit des animaux qui jouitsoient des

mêmes avantages.

On a été furpris, & assurément on devoit l'être, d'apercevoir deux sexes bien dissincts dans les végétaux comme dans les animaux. J'ai trouvé cette ressemblance plus grande que je ne la croyois quand j'ai suivi l'anatomie de la poire; il paroissoit néanmoins qu'il n'y avoit que les plantes qui dans le même individu rassembloient les deux sexes capables d'agir l'un sur l'autre, mais les recherches qu'on a faites sur les pucerons nous assurent qu'il y a des animaux qui jouissent de ce même avantage.

Depuis cette découverte on convient que les végétaux comme les animaux se multiplient par des œufs, mais il sembloit qu'il n'y avoit que les vegetaux qui en outre pussent

se multiplier de traînasse & de bouture; il saut revenir de cette erreur, maintenant qu'on voit des tronçons d'animaux reproduire des animaux parsaits, & d'autres animaux preduire des especes de branches qui etant separces de l'animal eni les a produites, deviennent des animaux aussi parsaits.

De plus, la réunion des os rompus s'opère précisément

comme la réunion des greffes.

L'organisation des os est très-semblable à celle du bois. Les os croissent à très-peu de chose près comme le corps ligneux des arbres.

On entrevoit dans les articulations de la sensitive & dans

ses mouvemens quelque chose qui tient de l'animal.

Enfin, en étudiant bien le règne animal, il semble qu'on voit qu'il s'approche par quelques uns de ses sujets du règne végétal, & que celui-ci s'élève aussi par degrés vers le règne animal; de sorte qu'il y a un milieu où ces deux règnes semblent se consondre au point qu'un Observateur très-éclairé & très-attentif n'a osé décider si ce qu'il avoit examiné avec tout le soin possible, étoit un animal ou une plante. Mais ces réslexions m'écartent de mon sujet, j'y reviens, & je vais essayer de donner une idée générale de l'accroissement des os, esse ser sonde sur les observations que s'ai rapportées dans tous mes Mémoires.

Il faut s'imaginer dans la jambe d'un embryon un cartilage qui doit former le tibia de cet animal, ce cartilage est également mol dans toutes ses parties, il doit donc s'étendre également dans toute sa longueur, du moins on n'aperçoit point de raison pour qu'il s'étende plus dans une partie que dans une autre : julque la il n'est question que de l'extension d'une partie molle, ainsi point de dissiculté.

Ce cartilage est composé de plusieurs lames ou membranes qui s'enveloppent les unes les autres; vers la partie moyenne & dans l'intérieur de ce cartilage une ou plusieurs lames commencent à s'ofsisier, alors le lames membraneuses qui recouvrent cette portion offsisée, sorment le périosse de cet os.

Atturément l'alongement ne sera plus si considérable à

cette partie déja offissée, mais il ne sera point diminué dans le reste du cartilage qui n'a pas encore commencé à s'endurcir; voilà donc ce tibia partie cartilagineux & partie osseux, qui continue à s'étendre dans toute sa longueur, avec cette seule dissérence qu'il s'étend plus dans les endroits où il est cartilagineux, & moins dans ceux où il commence d'être osseux.

L'offification fait du progrès, la portion déja endurcie augmente en longueur & par la propre extension & parce qu'une portion plus considérable du cartilage s'endurcit à l'égard de la portion qui est encore cartilagineuse, elle continue à s'étendre beaucoup; ainsi ce tibia acquiert de la longueur.

Il grossit en même temps & par l'extension des lames déja offitiées & par la sur-addition des lames du périoste; ainsi l'extension continue d'être générale, elle est seulement plus considérable où il y a plus de mollesse, & moindre dans les

endroits où il y a plus d'endurcissement.

La portion de ce tibia déja offissée continue de faire du progrès & aux dépens de la portion cartilagineuse qui s'ossissie, & par l'addition des lames du périosse, & par l'extension des lames offeuses tant en largeur qu'en grosseur, & de cette saçon le tibia acquiert de l'étendue; mais en même temps il faut saire attention que cette portion ossissée augmente de densité, qu'elle durcit, & que peu à peu elle arrive à un point d'endurcissement qui ne sui permet plus de s'étendre.

Il est naturel de penser que les couches osseuses qui se sont endurcies les premières, soient aussi celles qui acquièrent les premières l'endurcissement parsait, & qui perdent en même

temps la propriété de s'étendre.

C'est par la partie principale des os que l'ossissation a commencé; c'est donc à cette partie que le parsait endurcissement commencera, c'est donc cette partie qui commencera à perdre la propriété de s'étendre en tous sens, pendant que les autres portions du même os continueront à s'étendre proportionnellement à leur mollesse.

Une circonstance à laquelle il faut prêter attention puifqu'elle peut nous fournir quelque lumière sur la formation

de la substance spongieuse des os, c'est que les lames ofseuses intérieures ne s'étendent pas de toute la longueur des os, elles sont plus courtes que les extérieures, & elles se recourbent vers s'axe des os où elles se rident, elles se plissent, il en part des plaques & des filets ofseux, ce qui contribue à la formation du tissu spongieux des os, qui, comme s'on sçait, est en grande quantité à l'extrémité des os longs.

Si cette lame la plus intérieure est assez endurcie pour ne plus s'étendre que par ses bords qui s'inclinent vers l'axe de l'os, les lames qui la recouvrent, qui ont été formées depuis, continuent de s'étendre, & l'os acquiert de la longueur; bien-tôt la seconde lame cessera de s'étendre, elle formera à son extrémité une autre portion du tissu spongieux, & par cette méchanique qui continue tant que les os acquièrent de l'étendue, on conçoit qu'il se peut former une quantité de substance spongieuse aux dépens de la substance compacte

qui en devient toûjours de plus en plus mince.

Mais, dira-t-on, on aperçoit souvent dans la substance spangieuse des os des especes d'arcades où la couche osseuse d'un côté semble se réunir avec celle qui lui est diamétralement opposée, comment se peut faire la réunion de ces couches? J'essayerai d'autant plus volontiers de répondre à cette queltion, qu'elle me sournira l'occasion de dire quelque chose des épiphyses, partie essentielle des os qui mérite bien d'être examinée; je dois néanmoins avertir que ce que je vais dire sur la substance spongieuse des os & sur les epiphyses, ne doit point être regardé comme des choses incontestablement pronvees, mais teulement comme des conjectures tres-vrai-semblables, sur ce pied je prie qu'on sasse attention,

1° Que les os des embryons n'ont point d'épiphyses, on n'aper oit d'abord entre le tibia & le semur de ces embryons qu'un cartilige auquel vrai-semblablement vont aboutir tous les ligamens & tous les tendons qui dans la suite s'insèrent

dans les épiphyses.

2' Peu à peu le cartilage se gonsse aux endroits des épiphyses, & la rotule commence à se distinguer. 3° Quelque temps après les épiphyses & la rotule se distinguent plus précisement, les épiphyses grossissent beaucoup, & on découvre mieux les ligamens & les tendons qui s'y insèrent, quoique tout soit encore cartilagineux.

4° Si afors, ou quelque temps après, on dissèque attentivement les épiphyses, elles paroissent entierement formées par l'épaississement du périosse & l'épanouissement de l'ex-

trémité des tendons & des cartilages.

5° Entre l'extrémité de l'os & l'épiphyse on aperçoit le cartilage intermédiaire qui est fort épais dans les jeunes animaux, qui devient mince avec l'âge, & qui ensin s'essace entièrement.

6° Ce cartilage intermédiaire est formé par des plans qui

sont continus avec le périoste.

7° Quand on enlève de dessus un os tout le périoste, l'épiphyse se détache très-aisément, sans qu'il paroisse qu'il

y ait presque d'adhérence entre l'os & l'épiphyse.

8° Quand on dissèque le périoste sur les épiphyses, on remarque qu'il y est sort adhérent, & on aperçoit quantité de plans de sibres du périoste qui se jettent dans le corps de l'épiphyse.

9° Le cartilage qui revêt les cavités & les éminences arti-

culaires est encore une continuation du périoste.

10° L'épiphyse grossit beaucoup, sur-tout aux endroits qui recouvrent les extrémités des ligamens & des tendons; il se forme à ces endroits des éminences qui, quand elles sont

confidérables, s'appellent des apophyses.

Ensin avec l'âge le cartilage intermédiaire disparoît, & l'épiphyse s'attache si intimement au corps de l'os, que l'un & l'autre ne sont plus qu'une pièce, tant intérieurement qu'extérieurement, car la substance spongieuse est continue dans l'intérieur, comme la substance compacte l'est à l'extérieur.

Maintenant voici comme je conçois que se forment les

arcades du tissu spongieux, & l'union des épiphyses.

Quand une des lames du périoste qui répond au cartilage intermédiaire a acquis attez d'endureissement pour ne plus

s'étendre, elle reste à ce point d'alongement, & il est naturel que la lame du cartilage intermédiaire qui répond à la lame du périoste endurcie, reste adhérente aux bords de cette lame offense, & qu'elle se sépare des autres lames qui forment le cartilage intermédiaire; cette lame horizontale se plissera, elle produira quelques seuillets ou quelques sistes ofseux, & voilà une arcade du tissu spongieux des os bien formée.

Ce que je viens de dire d'une des lames du cartilage intermédiaire, je le puis dire des autres; ce qui explique à merveille comment ce ligament devient de plus en plus mince, comment il disparoît, & comment le tissu spongieux

des os devient continu avec celui des épiphyses.

De cette façon les lames ofleuses sont d'autant plus longues qu'elles sont plus à l'extérieur des os, & quand les lames du périoste qui s'ossifitent, s'insèrent dans le corps de l'épiphyse au dessus du cartilage intermédiaire, on conçoit qu'elles doivent unir d'autant plus intimement les épiphyses aux os qu'il s'ajoûtera un plus grand nombre de couches ofseuses; & comme l'endurcissement de ces lames qui s'insèrent dans les épiphyses, se fait fort tard, sur-tout vers les extrémités des os, il s'ensuit que les épiphyses seront long-temps sans être fort adhérentes aux os.

Peu à peu les lames ossificées s'étendent jusqu'au bord du cartilage qui revêt les éminences & les cavités articulaires, & même sous ce ligament; & alors les couches osseus sont continues sur le corps de l'os & sur l'épiphyse, & ces deux parties précédemment séparées ne sont plus qu'une pièce, ce

qu'on observe sur les os des vieillards.

Il est presque inutile que je sasse remarquer que comme les épiphyses ne s'endurcissent que tard, elles s'étendent de même que les os, & qu'elles contribuent à l'accroissement de l'animal; mais je dois saire observer qu'avec l'âge les extrémités des ligamens, & sur-tout des tendons, s'ossissent dans leurs parties qui s'insèrent dans les os ou dans les épiphyses, ce qui sorme dans les vieillards des éminences qu'on nomme emplysses quand elles sont considérables.

Enfin

Ensur on doit encore saire attention que l'accroissement total d'un animal résulte du produit de l'accroissement particulier de chaque os; & comme la hauteur d'un squelette humain, par exemple, est formée par l'assemblage de 27 ou 28 os posez les uns sur les autres, qui s'étendent tous par leurs deux extrémités, il s'ensuit que l'accroissement total d'un homme est le produit de 54 ou 56 alongemens particuliers, sans compter l'augmentation des épiphyses, qui néanmoins est assez considérable.

Il feroit curieux de sçavoir si tous les os croissent dans une même proportion, c'est-à-dire, supposé que le tibia s'alonge de cinq sixièmes, si les vertèbres augmentent de la même

quantité relativement à leur étendue.

Maintenant si l'on se donne la peine de rapprocher de ce que je viens de dire sur l'accroissement des os en longueur, ce que j'ai établi dans mon quatrième Mémoire sur leur augmentation de grosseur, je crois qu'on aura une idée assez juste de la formation & de l'accroissement des os; néanmoins pour qu'on ait plus de constance au sentiment que j'essaie d'établir, je rapporterai dans un autre Mémoire quelques observations des plus célèbres Anatomistes & des plus habiles Praticiens, tant sur les Os sains que sur les Os malades, pour faire voir qu'elles s'expliquent simplement & naturellement suivant mes principes, dont même elles semblent être autant de preuves.

EXPLICATION DES FIGURES.

LA première Figure représente un morceau du crâne d'un setus, où Fon aperçoit distinctement à l'aide d'une loupe, trois couches

offeutes A, B, C.

La couche A qui étoit la plus proche du cerveau, étoit formée de filets offcux, longs, très-lej arez les uns des autres, liez neanmoins de temps en temps par des branches de communication; quelque-fois les fibres longitudinale. S'inclinoient l'une vers l'autre attez pour fe toucher, & même quelquefois pour ne faire plus qu'un falet plus gros, on apercevoit auffi de ces filets qui le feparoient de nouveau.

Les files qui formoient la couche B. étoient plus courts, & joints les uns aux autres par un plus grand nombre de famifications.

Enfin la couche C fembloit une plaque percée de quantité de trous, car les filets étoient larges, plats, & formoient un réseau dont les mailles étoient fort petites.

La Figure II représente un des filets offeux de la couche A de la figure précédente, grossi au microscope; on y voit très-distinctement les inflexions, les ramifications, les bifurcations & les anastomoses des filets ofseux qui ne sont point simples, mais composez de faisceaux de fibrilles très-déliées. On aperçoit vers aa des portions de membranes déchirées, ou de tissu vésiculaire, ou de périoste, qui n'étoient point encore converties en os.

La Figure III représente les os de la cuisse & de la jambe d'un embryon, la longueur totale étoit de 9 lignes; les portions aa étoient cartilagineuses, & on voyoit en b les points d'offisseations qui sont plus renssez que le cartilage qui s'est plus retiré en se desséchant.

La Figure IV représente la façon dont les couches ligneuses s'enveloppent dans le tronc & dans les branches des arbres. A est une branche qui s'est formée la quatrième année, B est une branche qui s'est formée la fixième.

La Figure V représente un os aa dans lequel s'insère un tendon B; elle est destinée à faire apercevoir qu'il y a quelque ressemblance entre l'insertion des branches dans le tronc des arbres, & l'insertion des tendons dans le corps des os.

La Figure VI est destinée à faire voir comme s'enveloppent les lames offeuses.



DISSERTATION

SUR

LES COULEURS ACCIDENTELLES.

Par M. DE BUFFON.

uoiqu'on se soit beaucoup occupé dans ces derniers 15 Nors temps de la physique des Couleurs, il ne paroit pas qu'on ait sait de grands progrès depuis Newton: ce n'est pas qu'il ait epuise la matière, mais la plupart des Physiciens ont plus travaillé à le combattre qu'à l'entendre, & quoique ses principes soient clairs, & ses expériences incontestables, il y a si peu de gens qui se soient donné la peine d'examiner à sond ses rapports & l'ensemble de ses decouvertes, que je ne crois pas devoir parler d'un nouveau genre de couleurs, sans avoir auparavant donné des idées nettes sur la production des Couleurs en général.

Il y a plusieurs moyens de produire des couleurs, le premier est la réfraction; un trait de lumière qui passe à travers un prisme se rompt & se divise de saçon qu'il produit une image colorée composée d'un nombre infini de couleurs, & les recherches qu'on a faites sur cette image colorée du Sofeil, ont appris que la fumière de cet astre est l'affemblage d'une infinite de rayons de lumière différemment colorez, que ces rayons ont autant de differens degrés de refrangibilite que de couleurs differentes, & que la mone couleur a constamment le même degré de réfrangibilité. Tous les corps diaphanes dont les surfaces ne sont pas parallèles, produisent des couleurs par la réfraction, l'ordre de ces couleurs est invariable, & leur nombre quoiqu'infini, a été réduit à fept dénominations principales, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge; chacune de ces dénominations répond à un intervalle déterminé dans l'image colorée qui

contient toutes les nuances de la couleur dénommée, de sorte que dans l'intervalle rouge on trouve toutes les nuances de rouge, dans l'intervalle jaune toutes les nuances de jaune, &c. & dans les confins de ces intervalles les couleurs intermédiaires qui ne font ni jaunes ni rouges, &c. C'est par de bonnes raisons que Newton a fixé à sept le nombre des dénominations des couleurs; l'image colorée du Soleil qu'il appelle le spectre solaire, n'offre à la première vue que cinq couleurs, violet, bleu, vert, jaune & rouge, ce n'est encore qu'une décomposition imparsaite de la lumière & une représentation confuse des couleurs. Comme cette image est composce d'une infinité de cercles différemment colorez qui répondent à autant de disques du Soleil, & que ces cercles anticipent beaucoup les uns sur les autres, le milieu de tous ces cercles est l'endroit où le mélange des couleurs est le plus grand, & il n'y a que les côtés rectilignes de l'image où les couleurs soient pures; mais comme elles sont en même temps très-foibles, on a peine à les distinguer, & on se sert d'un autre moyen pour épurer les couleurs, c'est en rétrécissant l'image du disque du Soleil, ce qui diminue l'anticipation des cercles colorez les uns sur les autres, & par conséquent le mélange des couleurs; dans ce spectre de lumière épurée & homogène, on voit très-bien les sept couleurs; on en voit même beaucoup plus de sept avec un peu d'art, car en recevant successivement sur un sil blanc les différentes parties de ce spectre de lumière épurée, l'ai compté souvent jusqu'à dix-huit ou vingt couleurs dont la différence étoit fentible à mes yeux. Avec de meilleurs organes ou plus d'attention on pourroit encore en compter davantage; cela n'empêche pas qu'on ne doive fixer le nombre de leurs dénominations à fept ni plus ni moins, & cela par une raison bien fondée, c'est qu'en divisant le spectre de lumière épurée en sept intervalles & suivant la proportion donnée par Newton, chacun de ces intervalles contient des couleurs qui, quoique prises toutes ensemble, sont indécomposables par le prilme & par quelqu'art que ce soit, ce qui leur a sait donner

le nom de couleurs primitives: si au lieu de diviser le spectre en sept, on ne le divise qu'en six ou cinq, ou quatre, ou trois intervalles, alors les couleurs contenues dans chacun de ces intervalles se décomposent par le prisme, & par conséquent ces couleurs ne sont pas pures, & ne doivent pas être regardées comme couleurs primitives. On ne peut donc pas réduire les couleurs primitives à moins de sept dénominations, & on ne doit pas en admettre un plus grand nombre, parce qu'alors on diviseroit inutilement les intervalles en deux ou plusieurs parties dont les couleurs feroient de la même nature, & ce seroit partager mal-à-propos une même espèce de couleur, & donner des noms dissérens à des choses semblables.

Il se trouve par un hasard singulier que l'étendue proportionnelle de ces sept intervalles de couleurs répond assez juste à l'étendue proportionnelle des sept tons de la Mussique, mais ce n'est qu'un hasard dont on ne doit tirer aucune conséquence, ces deux phénomènes sont indépendans l'un de l'autre, & il saut se livrer bien aveuglément à l'esprit de système pour prétendre, en vertu d'un rapport sortuit, soûmettre l'œil & l'oreille à des loix communes, & traiter l'un de ces organes par les règles de l'autre, en imaginant qu'il est possible de faire un concert aux yeux ou un paysage aux oreilles.

Ces sept couleurs produites par la réstraction sont inaltérables, & contiennent toutes les couleurs & toutes les nuances de couleurs qui sont au monde; les couleurs du prisme, celles des diamans, celles de l'arc-en-ciel, des nuages, des halos, dépendent toutes de la réstraction, & en suivent exactement les lois.

La réfraction n'est cependant pas le seul moyen pour produire des couleurs, la lumière a de plus que sa qualité réfrangible d'autres propriétés qui, quoique dépendantes de sa même cause générale, produisent des essets dissérens; de la même saçon que la lumière se rompt & se divise en couleurs en passant d'un milieu dans un autre milieu transparent, elle

T iij

s'appelle inflexion, & les couleurs qu'elle produit, sont les mêmes que celles de la réfraction ordinaire, les rayons violets qui tout les plus refrancibles, sont autit les plus flexibles, & la frange colorée produite par l'inflexion de la fumière ne dissère du spectre coloré produit par la réfraction, que dans la forme; & si l'intensité des couleurs est dissérente, l'ordre en est le même, les propriétés toutes semblables, le nombre est, la quantité primitive & inalterable commune à toutes, soit dans la réfraction, soit dans l'inflexion, qui

n'est en esset qu'une espèce de réfraction.

Mais le plus puissant moyen que la Nature emploie pour produire des couleurs, c'est la réflexion; toutes les couleurs miterielles en dependent, le vermillon n'est rouge que parce qu'il refléchit abond imment les rayons rouges de la fumière, & qu'il absorbe les autres; l'outre-mer ne paroît bleu que parce qu'il reflechit fortement les rayons bleus, & qu'il re-oit dans ses pores tous les autres rayons qui s'y perdent. Il en est de même des autres couleurs des corps opaques & transparens; la transparence depend de l'uniformité de densité; lorique les parties composantes d'un corps sont d'égale densité, de quelque signre que soient ces mêmes parties, le corps fera toujours transparent. Si l'on reduit un corps transparent à une fort petite épaiffeur, cette plaque mince produira des co deurs dont l'ordre & les principales apparences sont sort différentes des phenomènes du spectre ou de la trange colorée; aussi ce n'est pas par la réfraction que ces couleurs sont produites, c'ell par la reflexion: les plaques minces des corps transparens, les bulles de savon, les plumes des oiseaux, &c. parollent colorecs, parce qu'elles reflechiffent certains rayons & laissent passer les autres; ces couleurs ont leurs loix & dépendent de l'épaisseur de la plaque mince, une certaine épaisseur produit constamment une certaine couleur, toute autre épaisseur ne peut la produire, mais en produit une autre; & lorsque cette épaisseur est diminuée à l'infini, en sorte

qu'au lieu d'une plaque mince & transparente on n'a plus qu'une surface polie sur un corps opaque, ce poli qu'on peut regarder comme le premier degré de la transparence, produit aussi des couleurs par la reslexion, qui ont encore d'autres loix; car lorsqu'on laisse tomber un trait de lumière sur un miroir de métal, ce trait de lumière ne se résléchit pas tout entier sous le même angle, il s'en disperse une partie qui produit des couleurs dont les phénomenes, aussi-bien que ceux des plaques minces, n'ont pas encore été assez observez.

Toutes les couleurs dont je viens de parler sont naturelles & dépendent uniquement des propriétés de la lumière; mais il en est d'autres qui me paroissent accidentelles & qui dépendent peut-être plus de notre organe que de la lumière. Lorsque l'œil est frappé ou pressé, on voit des couleurs dans l'obscurité, lorsque cet organe est mal disposé ou fatigué on voit encore des couleurs; c'est ce genre de couleurs que j'ai cru devoir appeller couleurs accidentelles, pour les distinguer des couleurs naturelles, & parce qu'en este elles ne paroissent jamais que lorsque l'organe est forcé, ou qu'il a été trop fortement ébranlé.

Personne n'a fait, avant M. Jurin, d'observations sur ce genre de couleurs, cependant elles tiennent aux couleurs naturelles par plusieurs rapports, & j'ai découvert une suite de faits singuliers sur cette matière, que je vais rapporter le

plus succinclement qu'il me sera possible.

Lorsqu'on regarde fixement & long-temps une tache ou une figure rouge sur un fond blanc, comme un petit quarré de papier rouge sur un papier blanc, on voit naître autour du petit quarré rouge une espèce de couronne d'un verd foible; en ceilant de regarder le quarré rouge si on porte l'œil sur le pupier blanc, on voit très-distinélement un quarré d'un verd tendre tirant un peu sur le bleu, cette apparence sub-title plus ou moins long-temps selon que l'impression de la couleur rouge a été plus ou moins sorte. La grandeur du quarre verd imaginaire est la même que celle du quarré réel rouge, & ce verd ne s'evanouit qu'après que l'œil s'est rassuré

152 Memoires de l'Academie Rotale

& s'est porté successivement sur plusieurs autres objets dont les images détruisent l'impression trop sorte causée par le

rouge.

En regardant fixement & long-temps une tache jaune sur un fond blanc, on voit naître autour de la tache une couronne d'un bleu pâle, & en cessant de regarder la tache jaune & portant son ceil sur un autre endroit du sond blanc, on voit distinctement une tache bleue de la même figure & de la même grandeur que la tache jaune, & cette apparence dure au moins aussi long-temps que l'apparence du verd produit par le rouge. Il m'a même paru, après avoir fait moi-même. & après avoir fait répéter cette expérience à d'autres dont les yeux étoient meilleurs & plus forts que les miens, que cette impression du jaune étoit plus sorte que celle du rouge. & que la couleur bleue qu'elle produit, s'effaçoit plus difficilement & fubfiftoit plus long-temps que la couleur verte produite par le rouge; ce qui semble prouver ce qu'a soupçonné Newton, que le jaune est de toutes les couleurs celle qui fatigue le plus nos yeux.

Si l'on regarde fixement & long-temps une tache verte fur un fond blanc, on voit naître autour de la tache verte une couleur blancheâtre qui est à peine colorée d'une petite teinte de pourpre; mais en cessant de regarder la tache verte & en portant l'œil sur un autre endroit du sond blanc, on voit distinctement une tache d'un pourpre pâle semblable à la couleur d'une améthiste pâle; cette apparence est plus soible & ne dure pas, à beaucoup près, aussi long-temps que les couleurs bleues & vertes produites par le jaune & par le rouge.

De même en regardant fixement & long-temps une tache bleue sur un sond blanc, on voit naître autour de la tache bleue une couronne blancheâtre un peu teinte de rouge, & en cessant de regarder la tache bleue & portant l'œil sur le sond blanc, on voit une tache d'un rouge pâle, toûjours de la même figure & de la même grandeur que la tache bleue, & cette apparence ne dure pas plus long-temps que l'apparence pourpre produite par la tache verte.

En

153 En regardant de même avec attention une tache noire fur un fond blanc, on voit naître autour de la tache noire une couronne d'un blanc vif, & cessant de regarder la tache noire & portant l'œil sur un autre endroit du fond blanc, on voit la figure de la tache exactement dessinée & d'un blanc beaucoup plus vif que celui du fond; ce blanc n'est pas mat, c'est un blanc brillant semblable au blanc du premier ordre des anneaux colorez décrits par Newton; & au contraire si on regarde long-temps une tache blanche sur un fond noir, on voit la tache blanche se décolorer, & en portant l'œil fur un autre endroit du fond noir, on y voit une tache d'un noir plus vif que celui du fond.

Voilà donc une suite de couleurs accidentelles qui a des rapports avec la fuite des couleurs naturelles; le rou-e naturel produit le verd accidentel, le jaune produit le bleu, le verd produit le pourpre, le bleu produit le rouge, le noir produit le blanc, & le blanc produit le noir. Ces couleurs accidentelles n'existent que dans l'organe s'atigué, puisqu'un autre oil ne les aperçoit pas; elles ont même une apparence qui les distingue des couleurs naturelles, c'est qu'elles sont tendres, brillantes, & qu'elles paroifient être à différentes diffances, selon qu'on les rapporte à des objets voisins ou éloignez.

Toutes ces expériences ont été faites sur des couleurs mattes avec des morceaux de papier ou d'étoffes colorées, mais elles réussissent encore mieux sorsqu'on les fait sur des couleurs brillantes, comme avec de l'or brillant & poli au lieu de papier ou d'étoffe jaune, avec de l'argent brillant au lieu de papier blanc, avec du lapis au lieu de papier bleu, &c. l'impression de ces couleurs brillantes est plus vive & dure beau-

coup plus long-temps.

Tout le monde sçait qu'après avoir regardé le Soleil on porte quelquefois pendant très-long temps l'image colorée de cet astre sur tous les objets, la lumière trop vive du Soleil produit en un instant ce que la sumière ordinaire des corps ne produit qu'au bout d'une minute ou deux d'attention fixe de l'œil sur leurs couleurs; ces images colorées du Soleil que

Mem. 1743.

l'œil ébloui & trop fortement ébranlé porte par-tout, sont des couleurs du même genre que celles que nous venons de decrire, & l'explication de leurs apparences depend de la même théorie.

Je n'entreprendrai pas de donner ici les idées qui me font venues sur ce sujet; quelqu'assuré que je sois de mes expériences, je ne suis pas assez certain des conséquences qu'on en doit tirer, pour ofer rien hasarder encore sur la théorie de ces couleurs, & je me contenterai de rapporter d'autres observations qui consirment les expériences précédentes, &

qui serviront sans doute à éclaireir cette matière.

En regardant fixement & fort long-temps un quarré d'un rouge vif fur un fond blanc, on voit d'abord naître la petite couronne de verd tendre dont j'ai parlé; ensuite en continuant à regarder fixement le quarré rouge, on voit le milieu du quarré se décolorer, & les côtés se charger de couleur & former comme un quadre d'un rouge beaucoup plus fort & beaucoup plus foncé que le milieu; ensuite en s'éloignant un peu & continuant toûjours à regarder fixement, on voit le quadre de rouge foncé se partager en deux dans les quatre côtés, & former une croix d'un rouge aussi soncé; le quarré rouge paroit alors comme une senêtre traversée dans son milieu par une grosse croisée & quatre panneaux blancs, car le quadre de cette espèce de senêtre est d'un rouge aussi sort que la croifée; continuant toûjours à regarder avec opiniàtreté, cette apparence change encore, & tout se réduit à un rectangle d'un rouge si foncé, si fort & si vif qu'il ofsusque entièrement les yeux; ce rectangle est de la même hauteur que le quarré, mais il n'a pas la sixième partie de sa largeur: ce point est le dernier degré de fatigue que l'œil peut supporter; & forsqu'ensin on détourne l'œil de cet objet, & qu'on le porte sur un autre endroit du fond blanc, on voit au lieu du quarré rouge réel l'image du rectangle rouge imaginaire exactement dessince & d'une couleur verte brillante: cette impression subsiste sort long-temps, ne se décolore que pen à pen, & rette dans l'œil, meme apres l'avoir fermé. Ce que je viens de dire du quarré rouge arrive aussir lorsqu'on regarde très-long-temps un quarré jaune, ou noir, ou de toute autre couleur, on voit de même le quadre jaune ou noir, la croix & le rectangle, & l'impression qui reste, est un rectangle bleu si on a regardé du jaune, un rectangle blanc brillant si on a regardé un quarré noir, &c.

J'ai fait faire les expériences que je viens de rapporter à plusieurs personnes, elles ont vû comme moi les mêmes couleurs & les mêmes apparences. Un de mes amis m'a assuré à cette occasion, qu'ayant un jour regardé une éclipse de Soleil par un petit trou, il avoit porté pendant plus de trois semaines l'image colorce de cet astre sur tous les objets, que quand il fixoit ses yeux sur du jaune brillant, comme sur une bordure dorée, il voyoit une tache pourpre, & sur du bleu, comme sur un toit d'ardoise, une tache verte. J'ai moi-même souvent regardé le Soleil, & j'ai vû les mêmes couleurs, mais comme je craignois de me faire mal aux yeux en regardant cet astre, j'ai mieux aimé continuer mes expériences sur des étosses colorées, & j'ai trouvé qu'en esset ces couleurs accidentelles changent en se mêlant avec les couleurs naturelles, & qu'elles fuivent les mêmes règles pour les apparences; car lorique la couleur verte accidentelle produite par le rouge naturel tombe sur un fond rouge brillant, cette couleur verte devient jaune, si la couleur accidentelle bleue produite par le jaune vif tombe sur un fond jaune, elle devient verte; en forte que les couleurs qui réfultent du me lange de ces couleurs accidentelles avec les couleurs naturelles, fuivent les mêmes règles & ont les mêmes apparences que les couleurs naturelles dans leur composition & dans leur mélange avec d'autres couleurs naturelles.

Ces observations pourront être de quelque utilité pour la connoissance des incommodités des yeux, qui viennent probablement d'un grand ébranlement causé par l'impression trop vive de la lumière; une de ces incommodités est de voir toûjours devant ses yeux des taches colorées, des cercles blancs ou des points noirs, comme des mouches qui voltigent.

156 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE J'ai oui bien des personnes se plaindre de cette espèce d'incommodité, & j'ai lû dans quelques Auteurs de Médecine, que la goutte serène est toujours précédée de ces points noirs; je ne sçais pas si leur sentiment est sondé sur l'expérience, car j'ai éprouvé moi-même cette incommodité, j'ai vû des points noirs pendant plus de trois mois, en si grande quantité que j'en étois fort inquiet; j'avois apparemment fatigué mes yeux en faisant & en répétant trop souvent les expériences précédentes, & en regardant quelquesois le Soleil, car les points noirs ont paru dans ce même temps, & je n'en avois jamais vu de ma vie; mais enfin ils m'incommodoient tellement, sur-tout lorsque je regardois au grand jour des objets fortement éclairez, que j'étois contraint de détourner les yeux; le jaune sur-tout m'étoit insupportable, & j'ai été obligé de changer des rideaux jaunes dans la chambre que l'habitois, & d'en mettre de verds; j'ai évité de regarder toutes les couleurs trop fortes & tous les objets brillans, peu à peu le nombre des points noirs a diminué, & actuellement je n'en suis plus incommodé. Ce qui m'a convaincu que ces points noirs viennent de la trop forte impression de la lumière, c'est qu'après avoir regardé le Soleil, j'ai toûjours vû une image colorée que je portois plus ou moins long temps sur tous les objets, & suivant avec attention les différentes nu nees de cette image colorée, j'ai reconnu qu'elle se decoloreit peu à peu, & qu'à la fin je ne portois plus sur les objets qu'une tache noire, d'abord affez grande, qui diminuoit enfaite peu à peu, & se réduisoit enfin à un point noir.

Je vais rapporter à cette occasion un sait qui est assez remarquable, c'est que je n'étois jamais plus incommodé de ces points noirs que quand le ciel étoit couvert de nuées blanches, ce jour me satiguoit beaucoup plus que la lumière d'un ciel serein, & cela parce qu'en este la quantité de lumière résléchie par un ciel couvert de nuées blanches, est beaucoup plus grande que la quantité de lumière restechie par l'air pur, & qu'à l'exception des objets éclairez immédiatement par les rayons du Soleil, tous les autres objets qui sont dans

l'ombre, font beaucoup moins éclairez que ceux qui le font par la lumière réfléchie d'un ciel couvert de nuées blanches.

Avant que de terminer ce Mémoire, je crois devoir encore annoncer un fait qui paroîtra peut-être extraordinaire, mais qui n'en est pas moins certain, & que je suis fort étonné qu'on n'ait pas observé, c'est que les ombres des corps qui par leur essence doivent être noires, puisqu'elles ne sont que la privation de la lumière, que les ombres, dis-je, sont toûjours colorées au lever & au coucher du Soleil; j'ai observé cet été plus de trente aurores & autant de soleils couchans, toutes les ombres qui tomboient sur du blanc, comme sur une muraille blanche, étoient quelquefois vertes & fouvent bleues, & d'un bleu aussi vis que le plus bel azur. J'ai fait voir ce phénomène à plusieurs personnes qui en ont été aussi surprises que moi; la faison n'y fait rien, car il n'y a pas huit jours que j'ai encore vû des ombres bleues, & quiconque voudra fe donner la peine de regarder l'ombre de l'un de ses doigts au lever ou au coucher du Soleil fur un morceau de papier blanc, verra comme moi cette ombre bleue. Je ne sçache pas qu'aucun Astronome, qu'aucun Physicien, que personne, en un mot, ait parlé de ce phénomène, & j'ai cru qu'en faveur de la nouveauté on me permettroit de donner le précis de cette observation.

Au mois de Juillet dernier, comme j'étois occupé de mes couleurs accidentelles, & que je cherchois à voir le Soleil, dont l'œil foûtient mieux la lumière à fon coucher qu'à toute autre heure du jour, pour reconnoître enfuite les couleurs & les changemens de couleurs causez par cette impression, je remarquai que les ombres des arbres qui tomboient sur une muraille blanche, étoient vertes; j'étois dans un lieu clevé, & le Soleil se couchoit dans une gorge de montagne, en sorte qu'il me paroitsoit fort abaitse au dessous de mon horizon; le ciel étoit serein, à l'exception du couchant qui, quoiqu'exempt de nuages, étoit chargé d'un rideau transparent de vapeurs d'un jaune rougeâtre, le Soleil lui-même étoit sort rouge, & la grandeur apparente au moins quadruple de ce

IS MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE qu'elle est à midi; je vis donc très-distinclement les ombres des arbres qui étoient à 20 & 30 pieds de la muraille blanche. colorées d'un verd tendre tirant un peu sur le bleu; l'ombre d'un treillage qui étoit à 3 pieds de la muraille, étoit parfaitement dessinée sur cette muraille, comme si on l'avoit nouvellement peinte en verd de gris: cette apparence dura près de 5 minutes, après quoi la couleur s'affoiblit avec la lumière du Soleil, & ne disparut entièrement qu'avec les ombres. Le lendemain au lever du Soleil j'allai regarder d'autres ombres fur une autre muraille blanche, mais au lieu de les trouver vertes comme je m'y attendois, je les trouvai Lleues, ou plutét de la couleur de l'indigo le plus vif; le ciel étoit serein, & il n'y avoit qu'un petit rideau de vapeurs jaunaires au levant, le Soleil se levoit sur une colline, en sorte qu'il me paroiffeit eleve au deffus de mon horizon, les ombres bleues ne durèrent que 3 minutes, après quoi elles me parurent noires; le même jour je revis au coucher du Soleil les ombres vertes, comme je les avois vues la veille. Six jours fe pafferent enfuite sans pouvoir observer les ombres au coucher du Soleil, parce qu'il etoit toujours couvert de nuages; le septième jour je vis le Soleil à son coucher, les ombres n'étoient plus vertes, mais d'un beau bleu d'azur, je remarquai que les vapeurs n'étoient pas fort abondantes, & que le Soleil ayant ayancé pendant sept jours, se couchoit derrière un rocher qui le faisoit disparontre avant qu'il put s'abaitser au deficus de mon horizon. Depuis ce temps jui très fouvent observé les ombres, soit au lever, soit au coucher du Soleil. & je ne les ai vues que bleues, quelquefois d'un bleu fort vit, d'autres fois d'un bleu pale, d'un bleu foncé, mais conflamment bleues, & tous les jours bleues. Cette observation m'a engagé à faire quelques recherches fur la lumière du S deil levant & du Soleil couchant, & sur la lumière qui passe à travers différens milieux colorez, dont je rendrai compte à l'Académie dans un autre Mémoire.

E X T R A I T

DE QUEIQUES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES, Faites au Collège Mazarin pendant l'année 1743.

Par M. l'Abbé DE LA CAILLE.

Trs Observations suivantes ont été faites dans une petite tour bâtie exprès sur des voûtes très-folides à côté du dome de la Chapelle du Collége Mazarin. Suivant quelques opérations géométriques que j'ai faites, le milieu de cette tour est éloigné de 17 toises à l'orient de la Méridienne de l'Observatoire, & elle est à 1189 toises ½ plus au Nord,

qui valent 1' 15".

Les instrumens dont je me suis servi, sont une excellente Pendule faite par M. Julien le Roi, & un Quart-de-cercle construit par M. Langlois, il a 3 pieds de rayon, & une lunette longue de 5 pieds, garnie d'un micromètre, les divisions sont des points très-sins marquez de 10 en 10 minutes; on n'a rien oublié dans sa construction de tout ce qui pouvoit le rendre solide & commode, on y a mis un clou d'or au centre, un garde-filet, une verge de fer, &c. pareils à ceux dont on trouve la description & les usages dans le l'ivre de la Méridienne de Paris, vérifiée par de nouvelles observations. Treisime part,

Pour suspendre le plomb du centre, je ne me sers pas de 1 . 21. fil d'argent, à cause de la petitesse du rayon de cet instrument, ni de cheveu, parce qu'il ne seroit pas possible de se servir de la cuvette pleine d'eau, qui sert à arrêter les oscillations du plomb, car l'eau pénétrant le long du cheveu l'alonge en très-peu de temps & fait descendre le plomb jusqu'au fond de la cuvette, où il s'arrête; mais j'ai noué une boucle de cheveux engagée dans l'aiguille du centre, à un fil de pite très-délié & un peu ciré, afin que ses poils ne frottent pas contre les parois du garde-filet, ce fil est noué à un

autre bout de cheveu noir un peu au dessus du limbe, ainst les deux extrémités de mon sil sont de cheveux, mais ils sont trop courts pour s'alonger considérablement par l'humidité.

J'ai éprouvé souvent que cet instrument étant dans le plan du Méridien, & le filet battant sur un des points de la division, l'intervalle des retours des Fixes au sil vertical de la lunette étoit toûjours le même, & que le sil répondoit toûjours exactement sur le même point; ce qui est une preuve de la solidité de la construction de l'instrument & de celle

du lieu où j'ai fait mes Observations.

Je ne rapporterai ici que quelques-unes des Observations les plus intéressantes, & auxquelles les Astronomes s'attachent plus particulièrement à prefent. Je me propose meme de rendre compte tous les ans à l'Académie de celles de cette espèce que j'aurai faites pendant le cours de chaque année, afin qu'on les puisse comparer, & en faire l'usage qu'on jugera à propos. L'Astronomie auroit fait encore de plus grands progrès qu'elle n'en a faits, si les Observateurs avoient communiqué plus souvent & plus en détail leurs Observations, & si la plûpart ne s'étoient pas contentez d'en publier seulement les résultats. Il est cependant bien certain qu'un Astronome exact n'employera jamais une observation pour determiner un élément important, à moins qu'il ne la voie accompagnée de toutes les circonstances nécessaires pour la rendre décifive, & qu'un simple résultat ne lui servira tout au plus que pour vérifier ce qu'il aura déterminé.

Le Quart-de-cercle dont je me suis servi n'ayant été achevé que dans le mois de Mai 1743, je n'ai pû saire d'observations exactes avant ce temps, c'est ce qui sait que je n'en

puis rapporter ici qu'un affez petit nombre.

ARTICLE I.

Sur la Comète du mois de Février de cette année.

Des deux Comètes qui ont paru cette année au mois de Février & au mois d'Août, je n'ai vû que la première.

M. Maraddi

M. Maraldi l'avoit découverte le 12, je m'apprêtai à l'obferver le 13, mais comme sa lumière étoit fort soible il ne me sut pas possible de déterminer exactement sa situation dans le ciel. L'incommodité de la saison & un gros rhume que j'eus alors m'empêchèrent de la suivre. Pour y suppléer je vais rapporter un extrait d'une lettre de M. Zanotti Prosesseur d'Astronomie à Boulogne, où il l'a observée plusieurs sois.

« Je vous envoie les longitudes & latitudes de la dernière Comète que nous avons observée cette année, en vous avertissant qu'elles ne peuvent pas être des plus exacles, à cause de la grande dissiculté de l'observer. La foiblesse de sa lumière da faisoit paroître comme un petit nuage, ou comme une sumée; on ne la reconnoissoit que par une petite queue à l'opposite du Soleil.

	Longitude.	Latitude fepterer.
Le 12 Février 1743 à 11h 6'	od 46'm	434 3
Lc 14 à 8 14	6 0	32 46
Lc 20 à 8 15	11 26	18 57
Le 21 à 7 46	11 49	17 39
Le 23 à 7 31	12 21	15 44
Le 26 à 8 30	12 57	13 25
Lc 28 à 8 43	13 8	12 31

Outre ces observations nous en avions sait encore quel- « ques autres, mais qui ne s'accordent pas avec celles-ci, soit « par quelqu'erreur commise dans l'observation, soit parce que nous n'avons pû reconnoître avec évidence l'étoile à laquelle nous avions comparé la Comète avec le micromètre.»

ARTICLE II.

Observation de la Conjonction de Mars & de Saturne.

Mars s'est trouvé cette année en Conjonction avec Saturne & Jupiter dans la Constellation du Lion, & même proche de la plus belle étoile de cette Constellation, ce qui a sait un spectacle assez curieux, pour être remarqué par les personnes les moins attentives aux phénomènes célestes.

Mem. 1743.

Le 14 Mai ayant trouvé par plufieurs hauteurs correfpondantes le midi vrai à ma pendule à 11h 50' 57", j'arrêtai mon quart-de-cercle à peu près dans le plan du méridien, « j'obtervai le pallage de Mars au fil vertical de la luncite de la lu

& celui de Saturne à 6 42 43 ½:

Donc différence d'ascension o 4 35½, droite en temps }

qui valent 1 d 9' 3" dont Mars étoit plus occidental.

Avec le micromètre je trouvai la différence de declinaison de 18' 53", dont Mars étoit plus septentrional.

J'observai encore ce même jour plusieurs passages de Mars & de Saturae par les tils d'un reticule ordinaire place au toyer d'une lunette de 3 pieds, & je déterminai qu'à 8h 30' temps vrai, la dissérence d'ascension droite de ces deux planètes étoit de 1^d 7' 11", & la dissérence de déclinaison 17' 51".

Le 15 Mai je trouvai le midi vrai à ma pendule, par fept hauteurs correspondantes, à 11h 50' 58" \(\frac{3}{4}\), & le soir je sis avec le réticule les observations suivantes.

Temps vrai & corrigé.

2 8h 42' 59"
 3 43 14!
 8 44 49^{2/4}

Passige de Mars par les treit sil de la partie inserieure.

à 8h 46' 42" = 8 47 o 8 47 18 Passage de Saturne par les trois mêmes sils du même côté.

8) 43 14 1 4 22 Passage de Saturne par les trois fils de la partie supérieure.

Par ces observations & en prenant un milieu, je conclus

qu'à 8h 48' de temps vrai, Mars étoit plus occidental que Saturne, de od 46' 26", & plus septentrional de 9' 11".

Le 16 Mai, le midi vrai à la pendule par neuf hauteurs correspondantes, à 11h 51' 0" 1. Le soir ayant remis mon quart-de-cercle à peu près dans le plan du méridien, j'obtervai

Temps vrai. à 6h 22' 23" Régulus au fil vertical 54d 22' 6 33 o Mars au même fil. 54 38 6 34 49 Saturne au même fil 54 37

Les hauteurs ont été prises avec le micromètre, le fil à plomb battant conjours sur le point 54d 20' de la division.

Il suit de là qu'à 6h 3 3' temps vrai, Mars étoit plus oriental que Régulus, de 2d 39' 42" en ascension droite, & plus septentrional de 16' 25"; & qu'en même temps il étoit plus occidental que Saturne de 27' 20", & plus septentrional de 54".

Le 17 Mai, midi à la pendule par sept hauteurs correspondantes, à 11h 51' 0" 1 comme la veille. Le soir je ne pus voir Régulus au méridien, mais fobservai le passage de Mars par le fil vertical de la lunette du quart-de-cercle dirigé à peu près au méridien, à 6h 30' 36" temps vrai, & celui de Saturne à 6h 3 1' 1"; de sorte que ces deux planètes ne différoient en ascension droite que de 6' 16". Je ne pus alors prendre leur différence de déclinaiton, mais la nuit étant venue j'observai avec le réticule

Passage de Régulus par les trois fils de la partie supérieure. 10 11 31

à 10h 22' Passage de Mars par les mêmes fils de la partie supérieure. 10 23

à 10h 23' Passage de Saturne par les trois fils de la partie inférieure.

De là je conclus qu'à 10h 23' temps vrai, Mus étoit plu

164 Memoires de l'Academie Royale oriental que Régulus, de 3^d 6' o" en ascension droite, & plus septentrional de 5' 7"; & qu'en même temps il étoit plus occidental que Saturne de 2' 31", & plus austral de 9' 52".

Le 18 Mai, jour de la Conjonction, je trouvai par cinq hauteurs correspondantes, que le midi vrai étoit à 11 h 51 1 " ½; le temps resta couvert pendant le passage des deux planètes au méridien, mais le soir j'observai avec le réticule

Temps trai.

2 8h 8' 0'
8 8 53 \frac{1}{4}
8 9 46 \frac{1}{2}
9 46 \frac{1}{2}

Passage de Saturne par les trois fils inférieurs.
8 9 57 \frac{1}{2}
8 10 20

Passage de Mars par les trois fils supérieurs.
2 8' 14' 51'
8 15 36 \frac{2}{3}

Passage de Saturne par les trois fils inférieurs.
1 1 2 2

Passage de Mars par les trois fils inférieurs.
2 8h 16' 15' \frac{2}{3}
8 16 44 \frac{1}{3}
8 17 13

Passage de Mars par les trois fils supérieurs.
8 17 13

Donc par un milieu, à 8h 14' temps vrai, Mars étoit plus oriental que Saturne, de 0d 16' 32" en afcention droite, & plus auftral de 18' 13" en déclinaison.

Le 19 Mai le mauvais temps m'empêcha d'observer des hauteurs du Soleil, mais ma pendule étant réglée plus exaclement qu'il n'étoit nécessaire, par les observations saites les jours precédens, j'arrêtai le soir mon quart-de-cercse près du plan du méridien, & j'observai

Torps trai.

A 61 10' 25" Régulus au fil vertical. . . . 54 22' 11' 5

6 23 12 5 Saturne au meme fil. 54 35 34 5

6 25 36 Mars au même fil. 54

8 47

Les hauteurs ont été prifes comme celles du 16.

Il réfulte de ces observations, que le 19 Mai à 6h 25'30"

du foir, Mars étoit plus oriental en ascension droite que Régulus, de 3 ^d 48′ 22″, & plus austral de 13′ 24″½; & qu'en même temps il étoit plus oriental que Saturne de 35′, 58″, & plus austral de 26′ 57″½.
Voici maintenant le calcul des circonstances de cette Conjonction;
1° En comparant l'observation du 17 à 10 ^h 23' avec celle du 18 à 8 ^h 14', je trouve la Conjonction en ascension droite, le 17 à 13 ^h 12'. Par la comparaison des observations du 16 à 6 ^h 33', A du 1- à 16 ^h 23'
Et par un milieu, la Conjonction s'est saite à 13h 16' temps vrai.
2° En comparant de même les dissérences de déclinaisons observées aux mêmes instans, on trouve que Mars étoit plus austral que Saturne,
dc
Done par un milieu 10' 54".
3° Pour sçavoir dans quel point du ciel la Conjonction s'est saite, j'ai comparé les observations de Régulus avec celles de Mars, & j'ai trouvé,
Par la comparaison des observations du 16 à 6 à 3 3', & du 17 à 10 à 2 3' Mars étoit au temps de sa Conjonction en ascension droite avec Saturne, plus oriental que Régulus, de 3 d 8' 41", & plus boréal de 3' 54". Par celle da 17 e de 15 3 \$ 4' 3 5'.

Par celles du 16 & du 19 ... 3 9 2 3 41.

Donc par un milieu, Mars étoit plus oriental que Régulus, de 31 8' 50", & plus boréal de 3' 50" à l'instant de sa Conjonction en ascension droite avec Saturne.

Si donc on suppose l'ascension droite de Régulus de 148d 39'43", & sa déclinaison de 13d 12'52", telles qu'on les déduit de sa position marquée dans la Connoissance des Temps, & qui est établie sur plusieurs observations nouvelles & exactes, le point de l'Equateur où la Conjonction s'est faite, est celui de 151448' 33", la déclinaison de Mars étant 13d 16' 42" boréale, & celle de Saturne 13d 27' 36" ausli boréale.

Je n'ai pas corrigé le lieu vrai de cette étoile par l'aberration,

parce qu'alors Régulus n'en avoit pas en afcention droite, & n'en pouvoit avoir que 6" ½ en déclinaison, quantité trop petite, cu égard à la précision avec laquelle la déclinaison de cette étoile a été déterminée.

Voilà tout ce qu'on peut déduire immédiatement de ces observations, qui tont audi completes qu'on le puitie defirer; car pour ce qui est de la Conjonction en longitude, on ne peut la conclurre qu'en supposant la position de Régulus & l'obliquite de l'Leliptique tres-exactement connucs, ainsi en supposant que cette obliquité est de 23^d 28' 35", on trouvera par le calcul qu'a l'instant de la Conjonction en ascension droite, Mars étoit dans 29^d 6' 31" Q, avec une latitude boréale de 1^d 34' 45"; & que Saturne étoit dans 29^d 2', 41" Q, avec une latitude boréale de 1^d 44' 55"; que par consequent la Conjonction en longitude avoit precedé celle qui s'est faite en ascension droite.

Pour en déterminer la différence, nous prendrons les obfervations du 1 6 Mai, par lesquelles on trouve à 6h 3 3' 0",

		Déclin, l'oréale.		
Régulus. : 148	39 43"	134 12 52")	Done $\begin{cases} 26^{\frac{1}{3}} 15' 20'' \% \\ 28 35 32 \end{cases}$	0 27 24"
M 151	19 2;	13 29 17	Done { 28 35 32	1 36 25
Saturne 151	46 45	13 28 23)	(29 0 55	1 44 53

Donc la Conjonction en longitude s'est faite 4h 2' avant la Conjonction en ascension droite, c'est-à-dire, à 9h 14' dans 29d 2' 27" \(\rangle \), & la distance des deux planètes étoit alors de 9' 57"; de sorte que la latitude de Mars étoit de 1d 34' 58" boréale, & celle de Saturne de 1d 44' 55". Suivant les observations de M. Cassini la Conjonction en longitude s'est faite le 17 à 9h 23' 25" dans 29d 2' 37" \(\rangle \), la latitude de Saturne ctant 1d 44' 46", & celle de Mars de 1d 34' 42".

ARTICLE III.

Observation du passage du Soleil par le parallèle d'Arcturus.

Le 22 Mai j'arrêtai mon quart-de-cercle à peu près dans le plan du méridien, & ayant fait battre le fil à plomb fur le point de 61^d 40' de la division, j'observai le passage du centre du Soleil par le fil vertical de la lunette à 11^h 50' 37"³/₄, la hauteur du bord supérieur 61^d 46' 8"¹/₂.

Ensuite à 9h 58' 10" ½ du soir, Ardurus passa par le

même fil.

Le 23 Mai les nuages m'empèchèrent d'observer le passage des deux bords du Soleil, je pris néanmoins avec le micromètre la hauteur du bord inférieur, de 61d 26' 18".

A 9^h 54' 16" ½ ou 17, Arcturus passa au sil vertical, sa hauteur étant de 61^d 41' 8".

Le 24 Mai à 11^h 50' 50" ½, le centre du Soleil au même fil, & la hauteur du bord inférieur 61^d 37' 49".

A 9h 50' 22" Arcturus au même fil, sa hauteur 61d

Pendant ces trois jours l'instrument n'a pas été remué, & le sil à plomb est toûjours resté exactement sur le même point de 61^d 40'. Les hauteurs rapportées dans cette observation sont telles qu'elles ont été observées sans avoir égard à la réfraction, ni à l'erreur de la position de l'axe de sa lunette à l'égard du premier point de la division.

Depuis le 24 Mai je ne pus avoir l'heure par des hauteurs correspondantes, jusqu'au 1 et Juin, auquel jour je déterminai le midi à ma pendule à 1 1 h 5 2 ' 3 2 " ½; mais comme cette horloge va très-uniformément, ces observations sont plus que suffisantes pour determiner le passage du Soleil par le parallèle d'Arcturus.

La révolution des Fixes étant entre le 22 & le 23 Mai,

de 23h 56' 6", & entre le 23 & le 24 de 23h 56' 5" ½, il est aise d'en conclurre que le 22 Mai à midi, le centre du Soleil étoit plus oriental qu'Arclurus, de 152³ 17' 54" en ascension droite, & que son bord supérieur étoit plus boréal de 5' 0'; & que le 24 Mai à midi le centre du Soleil étoit plus occidental de 150^d 17' 18", & son bord inférieur plus austral de 3' 19".

Le mauvais temps qu'il a fait au mois de Juillet, n'a pas permis d'observer le retour du Soleil par ce même parallèle.

ARTICLE IV.

Observation de la Conjonction de Mars & de Jupiter.

Je n'ai pû faire une observation aussi compléte de cette Conjonction que de celle de Mars & de Saturne, tant à cause du mauvais temps, que parce que quelques assaires m'ont appellé à la campagne; cependant comme j'ai déterminé la position respective de ces deux planètes par des observations très-exactes, saites dans le temps qu'elles étoient fort proches de la Conjonction, je vais les rapporter ici.

Le 1^{er} Juin je trouvai par quatre hauteurs correspondantes, le midi vrai à ma pendule à 11^h 52′ 32″ ½, & le soir ayant vérisié la position des sils horizontaux & verticaux de la lunette de mon quart-de-cercle, j'observai

Temps vrai & corrigt. Le fil a plomb battant fur 22d 10'de la division. à 10h 27' 29" Mars au vertical	dre.	te, di plas c	co d'atc. ont Misrs occilional gutor.	ded t Mars	nail, dont
10 28 0 Mars à l'horizontal 10 28 25 Jupiter au vertical 10 28 19 Jupiter à l'horizontal	Oq	6'	49"	1'	46"
Le fil à plemb battant fur 20 ^d 20'. 2 10 th 39' 11" Mars au vertical 10 39 15 Mars à l'horizontal 10 39 34 L' Jupiter à l'horizontal 10 39 44 Jupiter au vertical	01	6'	39"	1 "	35"

DES OCIENCES,	109
TEMPS VRAI & CORRIGÉ. Le fil à plomb battant fur 194 40' de la division. à 10h 42' 23"t Mars au vertical	Differences d'alc. Differences du droite, dont Mars, die ir uit de cell plus occidental, que Jupiter, aufenque Jupit.
10 43 20 Mars à l'horizontal	04 6' 50" 1' 35"
Le fil à plomb battant fur 184 30'. à 10h 49' 42" Mars au vertical 10 50 29 Mars à l'horizontal 10 50 14½ Jupiter au vertical 10 50 48 Jupiter à l'horizontal	od 6' 39" 1' 37"±
Le fil battant fur 5 ^d 40'. à 12 ^h 8' 46" Mars au vertical 12 9 11 Mars à l'horizontal 12 9 10 Jupiter au vertical 12 9 28 Jupiter à l'horizontal	04 5' 16" 0' 57"
Le fil battant fur 5 ^d 9' 50". à 12 ^h 12' 22"½ Mars à l'horizontal 12 12 37½ Mars au vertical 12 12 38½ Jupiter à l'horizontal 12 13 0½ Jupiter au vertical	od 5' 1" o' 52"

Le lendemain 2 Juin je trouvai par cinq hauteurs correspondantes le midi vrai à ma pendule à 11h 52' 44"; le temps s'est entièrement couvert sur les 2 heures ½, & ne se découvrit que sur les 9 heures du soir, contre toutes les apparences qui m'aveient sait désépèrer de pouvoir observer ce jour-là ces deux planètes.

Pour suppléer au désant des observations que je ne sis pas, on pourra se servir de celles de M. Cassini, qui détermina ce jour-là à Thury, que M as étoit plus oriental que Jupiter, à 9^h 47' 10", de 53" ½ de temps, ou de 13' 34" de degré,

& plus méridional de 6' 13".

ARTICLE V.

Observation du Soleil dans son Apogée.

Les Astronomes ont reconnu que les observations du Soleil les plus importantes, sont celles qui sont faite lonqu'il se trouve dans la ligne de ses apsides & dans ses longitudes moyennes, parce qu'elles servent à établir tous les élémens de sa théorie avec toute la précision possible. Nous n'avons encore guère d'observations qui aient été faites dans ces circonstances avec toute la subtilité de l'Astronomie moderne: en voici une qu'il m'a réussi de faire le 1^{er} Juillet de cette annce, & dont j'ai en la corresp, ndante au mois de decembre.

J'ai observé avec mon quart-de-cercle des hauteurs correspondantes du Solcil & d'Archurus. On ne sera pas simplide l'accord qu'on y trouvera, si on fait attention à la longueur de la lunette dont je me suis servi, & à la facilité avec laquelle on tait battre le silet sur les points de la divis on de mon instrument.

Hauteurs correspondantes du bord supérieur du Soleil.

Le rer Juillet. Fil fupéricur 8th Industria 5 Fil intérieur 8	Matin. $14' 51''\frac{1}{2}$ $15 37 \frac{1}{2}$ $16 25\frac{1}{2}$	Soir. $\begin{cases} 3^{h} 42' 24''^{\frac{1}{2}} \\ 3 4^{1} 3 \dots \\ 3 4^{0} 51^{\frac{1}{2}} \\ \end{cases}$	Done Midi moyen 1 1 5 8 3 8" 1 1 5 8 3 8 ½
I II f. :	18 44	{3 \ 3\\ 3 \ 3\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	11 58 384
Fil supérieur 8 ^h 21' Fil du milieu. 8 21	3" = cu 4 } 40d 50'	$\begin{cases} 3^{h} 36' 14'' \\ 3 35 28 \frac{1}{2} \end{cases}$	11 58 39 ½
Donc en prer	nant un milieu, mid	i moyen à	11h 58' 38"1.
i uma adi	(th)		2 .
Done midi	vrai à la pendule à		11h 58' 40" 40".

Hauteurs correspondantes d'Arclurus.

Soir.	Soir.	Done Passage au Méridien.
Soir. Fil du milieu 4^{h} 3 $4'$ 5 $9''\frac{1}{2}$ 46^{d} 20' Fil du micromètre. 4 35 19 $\frac{1}{2}$	\\ \text{10\text{\text{\text{1}}} & 8' \text{50"} \\ \text{10} & 8 \text{30} \end{array}	
Fil du milieu 4 ^h 38' 21" Fil du micromètre. 4 38 41	$\begin{cases} 10^{f_1} & 5' & 28''\frac{\tau}{2} \\ 10 & 5 & 8\frac{3}{4} \end{cases}$	$7^{h} 21' 54''^{\frac{1}{4}}$ $7 21 54''^{\frac{7}{8}}$
Fil du milicu $4^{h} 41' 44''$ Fil du micromètre. $4 42' 4\frac{1}{2}$	\\ 10 1 45 \\	$7^{h} 21' 54''\frac{5}{8}$ $7 21 54\frac{3}{7}$
Fil du milieu $4^{h} 45' 10''\frac{1}{2}$ $47^{d} 50'$ Fil du micromètre. $4 45 30\frac{1}{2}$	9 58 19 to 1	7 ^h 21' 55"

Donc par un milieu, Passage d'Arcturus au Méridien à . . 7h 21' 54" 48".

Le lendemain 2 Juillet le temps ne me permit d'observer des hauteurs du Soleil que le matin, mais comme elles sont correspondantes à celles que j'avois prises la veille, elles sont plus que suffisantes: les voici.

Hauteurs du bord supérieur du Soleil.

Matin. $8^{h} \cdot 16' 5'' \frac{1}{2} \\ 8 16 53 \frac{1}{2} \\ 39^{d} \cdot 50' \\ \vdots$	Donc Minuit moyen 11h 58' 52"
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	

Ayant comparé ces observations à celles qui ont été faites le 1^{cr} Juillet au soir, on en conclut le minuit moyen, par un milieu, à 11^h 58′ 52″ ½ à la pendule : retranchant 6″ 16″ pour l'équation qui convient au changement en déclinaison dans l'intervalle de 8^h 19′ 30″, on a le vrai minuit

172 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE à 11h 58' 46", & par consequent la moitié de l'intervalle

du retour du Soleil au Méridien, de 12h 0'5".

Retranchant 11^h 58' 40" 40" midi vrai le 1st Juillet, de 7^h 21' 54" 48" passage d'Arcturus au méridien, on a 7^h 23' 14" 8"' de la pendule pour la disférence d'ascension droite entre le Soleil & Arcturus le 1st Juillet à midi; laquelle à raison de 12^h 0' 5" 20' pour 180 degrés, répond à 110^d 47' 43", dont le Soleil étoit plus occidental qu'Arcturus au temps du passage de cette étoile par le méridien, qui est arrivé à 7^h 23' 11" temps vrai.

ARTICLE VI.

Observation du passage du Soleil par le parallèle de Procyon.

Le 7 Septembre je plaçai mon quart-de-cercle à peu près dans le plan du méridien, & ayant fait répondre le fil à plomb fur le point de 47^d o' de la division, je le laissai dans cet état pendant deux jours, & j'observai

àt 1 5 1' 3 1" les deux bords du Soleil au même sil, la hauteur 11 53 40 (apparente du bord inscrieur... 47 3' 26"!.

Le 8 Septembre

à 8h 12' 47" Procyon au fil vertical. Haut. appar. 47d 1' 24"5.

La révolution des Fixes étant, suivant ces observations, de 23^h 56′ 4″½, & Procyon ayant passé le 7 Septembre 3^h 35′ 53″ avant le Soleil, il est facile d'en conclurre que la dissérence d'ascension droite entre Procyon & le centre du Soleil, étoit ce jour-là à midi de 54^d 7′ 6″, & que le bord inférieur étoit alors plus septentrional que cette étoile, de z′ 5″.

Si donc on suppose que le Soleil ait fait 22' 35" \frac{1}{2} en déclinaison dans l'intervalle du 7 au 8 Septembre, ce que

l'on déduit plus exactement de la théorie du Soleil, qu'on ne le feroit des observations immédiates, on trouve que le bord inférieur du Soleil a passé par le parallèle de Procyon le 7 Septembre à 2h 12' 3.

ARTICIL VII.

Observations de la hauteur du bord supérieur du Soleil dans le Tropique du Capricorne.

	Hau fupéri	teur d eur di	u berd a Soleit.	Dift, d	lu parell, au Trop.		Dor	10	Hautei	ır 10lıli	clale.
Le 16 Décembre 1743.	184	7	1.1''	7'	38"			٠	17d	59'	33"
Lc 17											
Lc 18											38
Lc 19											39
Lc 20	18	0	14	0	39				17	59	35
Par un milieu, hauter Erreur de l'instrumen											-
Donc hauteur co	orrigé	c							173	59'	17"
Dans toutes ces observ	ations	s Ic	quart-	de-ce	rcle e	lt 1	i) O	joi	urs r	efté a	rrêté,

Ie filet battant sur le même point de la division.

J'ai déterminé l'erreur de l'instrument par plusieurs obfervations des distances de la Claire de Persée au zénith, tant du côté du midi que du côté du nord. Je n'ai pû encore le vérifier à l'horizon, mais indépendamment de cette vérification, il suit des observations que je viens de rapporter, que l'arc de mon quart-de-cercle compris entre le point de god de sa division & la hauteur solsticiale apparente du bord Supérieur du Soleil, a été cette année 1743, de 72d 0'43".

ARTICLI VIII.

Observation de Mercure dans le Soleil.

Les pluies & les brouillards continuels qu'il avoit fait derui la mi Octobre, tritoient preligna desequier de voir cette Yiii

174 MEMOTRES DE L'ACADEMIE ROYALE année Mercure deux le Soleil. L'éclipse totale de l'une dont nous ne pumes absolument rien voir pendant la nuit du 1^{cr} au 2 Novembre, en étoit encore un mauvais présage. Je ne l'instit pus cepen lant d'observer des hauteurs correspondantes du Soleil le 1^{cr}, le 3 & le 5; j'apprêtai une bonne lunette de 14 pieds, & j'ajustai à celle de mon quart-de-cercle un réticule ordinaire fait avec des sils de soie.

Le temps fut assez inconstant pendant la nuit du 4 au 5, mais il se nettoya parsaitement vers le lever du Soleil, & il resta aussi beau qu'on ait pû le souhaiter pendant tout le

reste de la journée.

A 8h 39' 44" de temps vrai, je commençai à voir Mercure sur le bord intérieur du Soleil, ce bord qui n'étoit élevé que de 11 degrés ¼ sur l'horizon après une nuit assez humide, étoit sort ondoyant, & l'on n'a guère pû y voir Mercure avec évidence, que lorsqu'il y a été à moitié entré.

A 8h 40' 38" il me parut totalement entré, j'héfitai cependant encore pendant 4 à 5"; je m'attachai ensuite à la lunette de mon quart-de-cercle, & pendant tout le temps que Mercure resta sur le Solcil, j'en determinai vingt-quatre positions. D'abord peur éviter l'esset des rétractions, j'observai les pass'iges des bords du Solcil & de Mercure par les tils horizontaux & verticaux de la lunette; mais depuis 1 ob ½ jusque vers la sortie de Mercure, je ne me servis plus que du sil vertical & des autres sils inclinez de 45 degrés.

A midi Mercure passa au méridien 39" \(\frac{1}{4}\) avant le centre du Soleil, il étoit éloigné du bord insérieur de 10' 42", ce

que je déterminai avec le micromètre.

A 1h 10' 3" Mercure me parut toucher le bord du Soleil pour en fortir, & à 1h 11' 58" il me parut totalement forti; à 1h 12' je fus assuré de ne plus le voir sur le bord du Soleil

avec la lunette de 14 pieds.

Pendant toute la durse du patinge de Mercure sur le Soleil, je ne remarquai point autour de lui de nébulosité, il me parut rond & bien terminé, & même plus gros que je ne m'y attendi la car il n'etoit alors cloi (ne de son perihelic que de 2001).

DES SCIENCES. 175
Le temps se trouvant donc très-bien disposé, je m'appliquai à faire mes observations à mon aise, & le plus scrupuleusement qu'il me sut possible: en voici le détail.

T T	
Temps vrai. A 9 th 2'58" le bord précédent du ⊙ au fil vertical 9 4 10 Mercure au fil vertical	Différence en en decimatoria decimatoria.
9 4 36 Mercure au fil horizontal 9 4 52 le bord infér. du ① au fil horizontal	1'36" 6' 12" 13' 4"
9h 15' 56" le bord précéd, du Soleil au vertical	
9 16 49 Mercure à l'horizontal 9 17 6 Mercure au vertical 9 17 17 le bord infér. du Soleil à l'horizontal	5' 49" 5' 4" 12'15'
III.	
9 ^h 20' 36" te bord précédent au fil vertical 9 21 45 Mercure au vertical 9 22 27 Mercure à l'horizontal 9 22 59 le bord inférieur à l'horizontal 9 23 6 le bord fuivant au vertical 1 V.	2' 27" 4' 31" 12' 13
9 ^h 26' 31" le bord précéd. du Soleil au vertical 2 27 38 Mercure au vertical 2 27 58 ½ Mercure à l'horizontal 2 28 36 ½ le bord infér. du Soleil à l'horizontal 2 28 59 ½ le bord fuivant au vertical	758 1 3758 11748
9 ^h 32' 10" le bord précédent au fil vertical 9 33 16 Mercure au vertical 9 33 33 Mercure à l'horizontal 9 34 15 le bord inférieur à l'horizontal 9 34 37 ½ le bord fuivant au vertical VI.	33" 3' 22 11';
9 ^h 48' 49" le bord précéd. du Soleil au vertical 9 49 28 [†] Mercure à l'horizontal	28% 1' 56" 10'57 5

176 Memoires de l'Academie Rotale


1/0 MLMOIRES D	L LILONDENIE	LOTALI	
Temps strai. VII.		Datierence	D firence
A 9h53' 43" le bord précéd, du Soleil au vertica		afcenf, droite	déclinail ».
9 54 44 Mercure au vertical	/		
9 55 2 Mercure à l'horizontal	Donc à 9h55' 2"	1'31	11/3/
9 56 8 le bord infér, du Soleil à l'horizonta			
9 56 8 le bord suivant au vertical)	Ì	
V. III			
	,		
10" 12' 39' ½ le bord précédent au sil vertical			
10 13 8 Mercure à l'horizontal	Done 1 13' 8		, .,
: .3 33 11000	Doin " 1 13' 8	(' 1 -	10 1
10 14 37 1 le bord insérieur à l'horizontal			
10 15 1 ½ le bord suivant au vertical	,		
1 X.			
10/22' 5" le bord précédent au vertical)		
10 22 8 Mercure à l'horizontal	(D)	1	1 0
10 22 59 Mercure au vertical	Donc à 10 h 22' 8'5	0' 57"	9' 27"
10 23 54 le bord inférieur à l'horizontal)		
X.			
10126'57" Mercure à l'horizontal			1
10 27 16 le bord précédent au vertical	Donc à 10h 26' 57"	1	
10 28 9! Mercure au vertical	(Doug a 10, 70, 24	1 24	9 17
10 28 31 le bord inférieur à l'horizontal)		
.10 29 37 le bord suivant au vertical			
\ I.			
16h33'49" le bord précédent du Soleil au pre mier oblique.			
, 34 19 le même bord au vertical	A		
34 53 Mercure au premier oblique	Y.		1
1 35 10 Mercure au vertical	Donc à 10 h 35' 13"	2' 8"	0' 24
: 35 20 'Mercure au second oblique.	()))))		7 3
. 36 25 le bord suivant du Soleil au premie	r		
oblique.			
10 36 38 1 le même bord au vertical)		
		1	1

Temps vrai, XII. A 10 ¹¹ 40' 7'' ¹ 2 le bord précedent au premier obliqu		Dafference en	Difference
10 40 28 au vertical 10 40 43 Mercure au premier oblique 10 41 17½ Mercure au vertical 10 41 37½ Mercure au fecond oblique 10 42 46¼ le bord fuivant au premier oblique 10 42 47 au vertical	Donc à 10"41'24	2 37]	6 41
XIII 10h 47' 28" le bord précéd, au premier oblique 10 47 54 ½ au vertical 10 48 17 Mercure au premier oblique 10 48 42 Mercure au vertical 10 48 57 Mercure au fecond oblique 10 50 8½ le bord fuivant au premier oblique 10 50 12 au vertical	Donc à 10 h 48' $46''\frac{1}{2}$	3' 12"	S 26
XIV 11h13' 38" le bord précéd, au premier oblique 11 14 12 au vertical 11 14 38 Mercure au premier oblique 11 14 52 Mercure au vertical 11 15 2 la Mercure au fecond oblique 11 16 28 le bord fuivant au premier oblique 11 16 28 au vertical	Doncarrhing 53 :	5 53 1	7. 19"
11 ^b 29' 25" le bord précédent au premier oblique 11 29 45 au fecond oblique 11 30 3 au vertical 11 30 38 ¹ / ₂ Mercure au premier oblique 11 30 38 ¹ / ₂ Mercure au vertical 11 30 47 ¹ / ₂ Mercure au fecond oblique 11 32 18 ¹ / ₂ le bord fuivant au vertical 11 32 22 au premier oblique 11 33 15 ¹ / ₂ au fecond oblique		ブ 38″	6' <u>4</u> 1"
Mem. 1743.	. 7.		

178 Memoires de l'Academie Royale

1/0 MEMOIRES DE EA	CADEMIE MOIALE
Temps wai. X V I.	1 . 1
A11640' 48" le bord précédent du Soleil au pre-	alemb droite
mier oblique.	1
11 41 20 au second oblique.	
11 41 27 Mercure au premier oblique	
11 41 33 le bord précédent au vertical	1
	carib42'8" 8 23 6' 5"
11 42 40 Mercure au second oblique	
11 43 48 ½ le bord suivant au vertical	
11 44 11 au premier oblique	
11 44 21 fau second oblique	
XVII.	
11/5" 21" le bord précédent au vertical	
11 58 50 - Mercure an vertical à 10' 42" du	
bord inférieur Donc	211558'50" 9'50" 5' 27"
12 0 37½ le bord suivant au vertical	
XVIII.	
on 34' 2" le bord précédent au premier oblique	
o 34 23 Mercure au premier oblique	
0 34 44 le bord précédent au vertical	
	à 0h 34' 56" 13' 6" 3' 38"
0 35 49 Mercure au fecond oblique	
0 36 54 te bord suivant au premier oblique	
o 37 o au vertical	
XIX.	
oh38" 11" le bord précédent du Soleil au pre- mier oblique	
o 38 16 au second oblique	
o 38 30 1 Mercure au premier oblique	1
o 38 41 1 le bord précédent au vertical	
	à 01 38'54" 13'32" 3' 36"
o 39 32 Mercure au second oblique)-)+ ->)- 3 30
o 40 58 le bord suivant au vertical	
0 41 2 au premier oblique	
o 41 58 2 au second oblique	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

Temps vrai.	XX.			
A 045' 12" le bord précéden			Dafference en	Différence
micr oblique	it da soien au pre-		afcenf. droite	déclination.
o 45 28 ½ Mercure au prer o 45 44 le bord précéden o 45 58 Mercure au verti o 46 36½ Mercure au feco o 47 59½ le bord fuivant a o 48 1 au premier obliq	t au vertical cal nd oblique u vertical	Donc à oli 45' 53" =	13'55."	3' 26"
	XXI.			
0 ⁶ 49' 39" ¹ / ₂ le bord précéd. 3 0 49 55 Mercure au prem 0 50 6 ¹ / ₂ le bord précéden 0 50 18 ³ / ₄ Mercure au verti 0 50 51 Mercure au fecon 1 52 23 ¹ / ₂ le bord fuivant a 0 52 26 ¹ / ₂ au premier obliq	nu premier oblique valer oblique valer oblique valer oblique valer oblique vertical oblique vertical	Donc à oh 50'14" ½	14′32)' ea'
oh53' 24" 1 le bord précéder)		
micr oblique				
o 53 39 \(\frac{1}{2}\) Mercure au prem			Ì	
o 53 44 le bord précéden o 53 55 de Mercure au vert		Donc à 0 ^h 53'50" ½		2, 02
o 54 19½ Mercure au secon		7 7 7 7 7 7	1) 2	2 582
o 56 1½ le bord suivant a				
o 56 10 ½ au premier obliqu			1	
	XXIII.	'		
oh57'21" le bord précédent			ł	
mier oblique	du Soteir au pre-			
o 57 33 1 Mercure au prem	icr oblique			
o 57 50 } le bord précéden	au vertical			
o 58 o 1/4 Mercure au verti		Don. à 65 57 54'	15'25'	3, 12
o 58 39 1 Mercure au secor				
1 0 $4\frac{1}{2}$ le bord suivant a	u premier oblique			
I o 8 ½ au vertical)	}	
		Z ij	1	



Queique je n'aie pas marque ici la fituation des traces de Mercure & du centre du Soleil par rapport à celui de la lunette, cependant il ne peut y avoir d'équivoque, parce que j'ai mis à côté de chaque observation la dissérence en ascention droite & en déclinaison qui en résulte, & que j'ai

calculée plusieurs fois & en plusieurs manières.

Pour déterminer les dissérences d'ascension droite & de déclination dans les dix premières observations, j'ai tulvi la méthode que M. Delisse a employée dans ses calculs du paffage de Mercure fur le Soleil en 1723, & qui est rapportec * p. 316. dans les Mémoires de cette année*, c'est-à-dire, j'ai calculé très-scrupuleusement les azimuts du Soleil à chaque inflant des passages de Mercure & du bord précedent ou du centre du Soleil par le fil vertical de ma lunette, & les hauteurs du Soleil a chaque inflant des pafa, e. de Mercure & da l'ard interieur du Soleil par le fil horizontal; d'ou j'ai conclu les différences d'azimuts & de hauteurs entre le centre du Soleil & Mercure. J'ai supposé dans ces calculs le lieu du Soleil tel qu'on le trouve par les Tables de M. Caffini, l'obli ulité de l'Écliptique de 23^d 28' 35", le demi-diamètre du Soleil de 16' 14", la différence des parallaxes horizontales de Mercure & du Soleil, de 4" 1/2, & la hauteur du Pole au Collége Mazarin, de 48d 51' 25".

> Dans toutes les autres observations où l'esset de la réfraction & des parallaxes n'étoit pas tant à craindre, j'ai réduit les passages du Soleil & de Mercure par les sils horizontaux

& verticaux de la lunette, à ceux qu'on eût observez, si le sil vertical eut été perpendiculaire au plan du parallèle que le Soleil décrivoit ce jour-là. Tous les passages de Mercure & ceux du Soleil dans la 15me, 16me & 19me observation ont été calculez suivant la méthode que j'ai rapportee dans mon Mémoire sur la Comète de 1742. Dans les autres observations du Soleil je n'ai pu determiner que le passage de son centre par un des fils obliques & par le vertical; c'ett pourquoi pour scavoir à quel instant & a quelle distance du centre de la lunette le Soleil a passe par le cercle horaire qui v répond, il a fallu résoudre un triangle rectiligne, dont un des angles est égal au complément de l'angle du cercle vertical & du cercle de déclinaison. Un autre angle est de 45 degrés, & son côté opposé est la trace que le centre du Soleil a décrite dans l'intervalle de son passage du sil oblique au sil vertical.

Pour ne rien négliger, j'ai eu égard dans les réfultats de ces calculs à la différence des parallaxes en ascension droite & en déclinaison, & j'ai réduit en degrés le temps des passages de Mercure dans la lunette, dans le rapport de 3 604

à 23h 51' 20".

Après avoir trouvé de cette forte les vingt-quatre différences en ascension droite & en déclinaison, rapportées dans la Table précédente, j'ai calculé les circonstances de cette Conjonction & les élémens de la théorie de Mercure qui en résultent. J'ai d'abord cherché la grandeur de la corde formée sur le disque du Soleil par la route apparente de Mercure; pour cet esset j'ai comparé successivement une des trois premières observations avec une des trois dernières, & en ayant déduit la longueur des arcs de grand cercle qui mesurent la quantité du mouvement apparent de Mercure, tant en ascension droite qu'en déclinaison, j'ai calculé l'hypothénuse dont ces arcs sont les côtés, ce qui m'a donné les arcs apparens parcourus dans l'intervalle des deux observations comparées. Je les ai augmentez dans le rapport de ces intervalles à 4^h 3 1' 1 5", temps de la demeure du centre

182 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE de Mercure sur le disque du Solcil; ainti en comparant la 110 & la 240 observation, j'ai trouvé 23' 46" \(\frac{1}{3} \) pour l'arc apparent parcouru par Mercure sur le Solcil en 3h 58' 37" de temps, & à proportion l'arc total est de 27' 1"\(\frac{1}{2} \).

de tempe, or a proportio	
Donc en prenant un milicu, Mercure a parcouru fur le Soleil un arc de 26' 58".	Par la 116 & la 236 j'ai trouvé 27 36 Par la 116 & la 226 27 0 Par la 26 & la 246 26 53 Par la 26 & la 236 26 55 Par la 26 & la 226 26 51 Par la 36 & la 246 26 59 Par la 36 & la 236 27 1 Par la 36 & la 226 26 57
R C E MG	D N

J'ai tracé sur une figure cette route AB, le disque du Soleil est representé par le cercle QAB, la droite FN représente l'Écliptique, QT le parallèle à l'Équateur que le Soleil parcouroit au moment de sa Conjonction avec Mercure, & dont le plan est incliné à celui de l'Écliptique, de 17st 43'

15", c'est l'angle DCT.

Connoissant donc AB de 26' 58", j'ai tiré les rayons CA. CB. & dans le triangle isoscèle ABC où tous les côtés sont connus, j'ai trouvé facilement que les angles CAB, CBA étoient chacun de 33d 50' 25", & l'angle ACB de 112d 19' 10", ainsi la corde AB étoit celle d'un arc de 112d 19' 10". J'ai trouvé aussi la perpendiculaire CG, de 9' 2"½ d'un 11 and cercle, & cest la la plus courte distance de Mercure

au centre du Soleil, à laquelle il s'est trouvé au milieu de son

passage, c'est-à-dire, à 10h 55' 27".

J'ai cherché ensuite l'instant de la Conjonction en ascenfion droite, c'est celui où Mercure est arrivé au point E. à l'endroit où CE perpendiculaire à QT élevée du centre C. rencontre la trace AB. Pour cela j'ai comparé deux à deux les différences en ascension droite que j'avois déduites des observations saites aux environs de 10 heures, temps auquel Mercure & le centre du Soleil étoient à peu près dans le mème cercle de déclinaison; j'ai donc trouvé cette conjonction en comparant ensemble

	Tomparante Cincinon												
		(4°			٠	۰			à	Ioh	10'	7"
		3	50					9	۰	ä	10	10	12
			60		٠	٠		٠	٠	à	10	10	6
la	Se observation avec 1	1	70							à	10	10	24
5.00	8° observation avec I		90	۰		۰	0	٠		à	10	9	18
			100			٠		0		à	10	9	37
		1	10°		٠	۰				à	10	9 9	44
		1	120	٠		0			0	à	10	9	40
	9° observation avec I												52"
Ia	9° observation avec 1:	a {	60		0-				,0	à	10	II	22
		(. 7°		0	٠	۰		9	à	10	12	2
13	10° observation avec la	, {	7°	۰	•	•	۰	•		à	10	12	2
7	. 10	(60							à	IOh	11'	13"
13	r 1° observation avec la	13	7°							à	10	12	15
		(,

Donc par un milieu entre ces quinze déterminations, la Conjonction en afcention droite est arrivée à 10h 10' 47" temps vrai ; ainfi l'entrée du centre de Mercure for le Soleil étant arrivée à 8h 39' 50", cette conjonction s'est faite 1h 30' 57" après.

Failant donc cette proportion, comme 4h 31'15" tempque Mercure a employé à parcourir AB, est à 1h 30' 57 temps employé à parcourir AE; ainti AB qui ett de zC_A :

184 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE est à A E de 9' 2"\frac{1}{2}, & par conséquent EB est de 17' 55"\frac{1}{2}.

Maintenant pour avoir l'inclination de la route de Mercure par rapport au cercle de déclination & au cercle de latitude, dans le triangle CEB, on connoît CB de 16' 14", BE de 17' $55"\frac{1}{2}$, & l'angle compris CBE de 33d 50' 25"; donc l'angle CEB est de 63d 50' 0", c'est l'inclination par rapport au cercle de déclination. Y ajoûtant 17^d 43' 15", on a 81^d 33' 15", inclination par rapport au cercle de latitude; ainsi l'inclination apparente de l'orbite AN de Mercure

sur le plan de l'écliptique, étoit de 8d 26' 45".

Avec ces élémens il est facile de conclurre l'instant de la Conjonction de Mercure avec le Soleil, qui s'est faite au point M, & la latitude que Mercure avoit alors; car dans le triangle rectangle CMG, où on connoît CG de 9' 4", & l'angle CMG de 8 1 d 33' 15", on trouve CM de 9' 10", & MG de 1' 20" 3 2"' qui répondent à 1 3' 30" de temps, lesquelles étant ôtées de 10h 55' 27", milieu du temps du passage de Mercure, donnent l'heure de la conjonction à 10h 41' 57" du matin. Or suivant les Tables de M. Cassini le Soleil étoit alors dans 12d 37' 36" du Scorpion; donc la conjonction s'est faite dans 12d 37' 36" m, Mercure


ayant 9' 10" de latitude australe.

Il reste maintenant à déduire des mêmes observations le vrai lieu du nœud de Mercure & la vraie inclinaison du plan de son orbite sur celui de l'écliptique. J'ai calculé pour cela les latitudes AF, BD que Mercure a dû avoir aux instans de son entrée & de sa sortie, ce qui étoit facile, car ayant trouvé ci-dessus l'angle CEB de 63^d 50' 0", son complément CHE est de 26^d 10' 0", & sa dissérence avec l'angle CBE de 33^d 50' 25", est l'angle HCB, qui se trouve de 7^d 40' 25". Y ajoûtant 17^d 43' 15", on a 25^d 23' 40" valeur de l'angle C du triangle rectangle DCB, & par conséquent BD est de 6' 57" $\frac{2}{3}$, & CD de 14' 40". Ajoûtant 25^d 23' 40" à 112^d 19' 10", le supplément 42^d 17 10 de la 15 mme est l'angle C du triangle reclangle EAC; donc aussi AF est de 10' 55" $\frac{1}{2}$, & CF de 12' 0" $\frac{1}{2}$.

DES SCIENCES.

185

Ces valeurs étant de petits arcs vús de la Terre, il faut les réduire à ceux qu'on eut vus du Soleil, & qui font à ceux-là en raison réciproque des distances de la Terre à




Mercure & au Soleil. Or la diffance du Soleil à Mercure étant, suivant les Tables de M. Cassini, à celle de la Terre à Mercure, comme 3 144 à 6736, il est clair que les petits arcs BD, CD, AF, CF étant vus du Soleil, paroitient être respectivement de 14'54", 31'25", 23'23", 25'44".

D'où il suit que pendant le temps du pusse de Mercure sur le Soleil, il a fait 8' 29" \(\frac{1}{4}\) en latitude, & qu'il a parcouru sur le plan de l'écliptique 5" 9" par son mouvement composé, squvoir, 25' 44' depuis son entre jusqu'à sa conjonction, & 31' 25" depuis sa conjonction jusqu'à sa fortie. Y ajoûtant 5' 4" & 6' 15", qui sont le mouvement de la Terre pendant ces deux intervalles, on a 1\frac{d}{2} 8' 29" pour le mouvement réel de Mercure en longitude, réduit à l'Écliptique, & tel qu'il seroit vú du Soleil pendant 4\frac{d}{2} 31' 15'.

Taikint donc, comme 8' 29" \(\frac{1}{2} \) font à 4\(\frac{1}{2} \) font à 7\(\frac{1}{2} \) font à 1\(\frac{1}{2} \) font à 2\(\frac{1}{2} \)

Mem. 1743.

186 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE qu'il 21 degres de distance de son puihelie, Mercure qui en approche, doit accélérer sa vîtesse de 32" \frac{1}{2} en 8 heures, cet are vu du Solcil est recliement de 21 0 49. Or la



conjonction étant arrivée dans 12^d 37' 36" du Scorpion, & par conféquent la longitude héliocentrique de Mercure étant dans 12^d 37' 36" du Taureau, & cette planète ayant parcouru 37' 40" depuis fa conjonction jusqu'à fa fortie, & 2^d 0' 49" depuis fa fortie jusqu'à la rencontre de fon nœud, il est facile de conclurre que le vrai lieu du nœud est dans 15^d 16' 5" du Taureau.

Enfin dans le triangle rectangle BDN, où BD vû du Soleil est de 14' 54" $\frac{1}{2}$, & DN de 2^d o' 49", on trouve Iangle $B \cap D$ de Enclinairen de l'orbite de Mercure sur le

plan de l'Ecliptique, de 7d 2'.

Après deux observations aussi complétes & aussi voisines que l'ont été celle du 11 Novembre 1736 & celle du 5 Novembre 1743, on peut dire que les mouvemens de Mercure dans la partie de son orbite qui est proche de son nœud ascendant, sont aussi parfaitement connus qu'il est possible, & que si quelques obtervations astronomique, pouvoient etre indisférentes, ce seroient celles des passages de Mercure sur le disque du Soleil dans le mois de Novembre. Or par une capace de hasard il sera impossible d'en talte de completes ici à l'uni pendant le reste de ce siccle ci, qualque ce phenomene doive encore arriver cinq sois proche de ce nœud.

187

Il feroit beaucoup plus important d'observer Mercure sur le disque du Soleil vers le nœud descendant, il n'y a été vû qu'une seule sois en 1661 par Hevelius, & quoique cet Astronome sût sans contredit le plus habile observateur de ce temps-là, il n'a pû saire cette observation avec toute la subtilité des Astronomes modernes; mais malheureusement l'occasion d'en saire une compléte à Paris, ne se présentera pas avant le 7 Mai 1799.

ARTICLE IX.

Observation du Seleil dans son Perizee, & Recherche du lieu de l'Apogée du Soleil.

Le temps s'étant enfin éclairei après les grands brouillards qui ont été continuels pendant presque tout le mois de Décembre, j'ai observé le 3 0 de ce mois les hauteurs suivantes d'Arcturus.

A l'Orient.	Hauteurs. A	l'Occident.	Donc Passage a	u Méridien.
A l'Orient. A 5 ^h 50′ 53″½ 5 51 18	53d 40' \$9	h 38′ 30″±	· · · · 7 4	4' 42"
5 51 18 5	(9	38 6	7 4	4 42
$5^{h} 53' 36''$ $5 54 0\frac{7}{3}$	54ª o' § 9	h 35′ 49″··	\cdots 7^h 4	42"1
$5 54 0\frac{7}{2}$	19	35 25	7 4	1 42 4
5 56 20" }	543 20' \$ 9	h 33′ 5″ · ·	· · · · 7 ^h 4·	4 42 1
5 56 45 5	1 29	32 40	7 4	4 42 1
5 59 6" }	544 40' 59	h 30′ 18″	· · · · 7 h 4 ·	4 42
5 59 32 5	()	29 53	7 4-	4 42 1
61 7 44	55 40 9	21 41		1 42 !
6h 13' 47" · · · ·	. 56d 20' 9	h 15' 37" · ·	· · · · 7 ^h 4·	42"
6 17 24 }	561 40 50	12 29 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 12 1
6 17 24 5	19	12 1	7 4	4 42 5
6 2 3 8	. 571 0 9	h 1/	· · · · 7 ^h 4·	4' 42 1

Et par un milieu, Arcturus a passé au Méridien Iorsque la pendule marquoit 7^h 44' 42" 1/3.

Le même jour j'ai trouvé le midi par les hauteurs correlpondantes qui foivent, je me fuis servi de trois tils ho.: zontaux qui sont dans la lunette.

		Hauteurs.		Done Mi	di moyon.
19	÷9′ ∶≀	34"1/2 \ 11d 10'	$ \begin{cases} 2^{h} 44' 30'\frac{1}{2} \cdots \\ 2 44 21 \cdots \end{cases} $	oh	$17' \ 2''\frac{1}{3}$ $17 \ 2\frac{1}{3}$
		25' 3 ± ½ 3 11d 20'			
9 h	53	16" 26 58½11 ^d 30'	$ \begin{cases} 2^{h} & 40' & 47'' \\ 2 & 40 & 38\frac{1}{2} \\ 2 & 40 & 5 \end{cases} $	o	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
		$\binom{7^{\frac{6}{2}}}{18}$ \\ \dots \tau^4 \dots \cdot\ \dots \\ \dots			
		1" 2 11d 50'.			
e 1	<u>, .</u>	56" }12d o'	$\begin{cases} 2^{h} & 35' & 9'' & \cdots \\ 2 & 34 & 59^{\frac{\pi}{4}} & \cdots \end{cases}$	oh	$17' 2'' \frac{1}{2}$ $17 2^{\frac{1}{2}}$
9	51	40)	(2 34 25 1	0	17 3

En prenant un milieu, le midi moyen à la pendule est arrivé à 0^h 17' 2" 8", dont il faut retrancher 3" 48" à cause du changement du Soleil en déclinaison; le midi vrai est donc arrivé à 0^h 16' 58" \frac{1}{3}.

Le mauvais temps qui recommença le 3 1, ne me permit que de prendre quelques hauteurs orientales d'Arclurus, qui m'ont donné le temps de la révolution des Fixes à la pendule, de 23^h 56' 18": en voici les observations.

	Le 3	1 Décembre.				Doi	c Révol	urion de	s Fixes.
A 6h	4	$2^{''\frac{1}{2}}$ ou $3^{''}$	55ª	40'.			. 23h	56'	17"3
6	10	5½ ou 6	56	20 .			23	56	18 3
6	13	13 }	, ,	40 .	• •	• • •	23	56	17
		25 1							

Et par un milicu. 231 56' 18"

Pour trouver le lieu de l'Apogée du Soleil par ces observations, nous supposerons que l'ascension droite d'Arcturus étoit le 1^{ct} Janvier 1743, de 210^d 59'20", comme elle est marquée dans la Connoissance des Temps, d'après plusieurs observations très-exactes qui en ont été faites les années dernières. Y ajoûtant 20"½ pour la précession des Equinoxes, & 8"½ pour l'aberration, l'ascension droite apparente de cette étoile en résulte de 210^d 59'49" le 1^{ct} Juillet 1743, & parce que ce jour à 7^h 23' 11" temps vrai, ou à 7^h 26' 18" temps moyen, la dissérence ascensionnelle entre le Soleil & Arcturus a été déterminée de 110^d 47' 43", l'ascension droite du Soleil étoit donc de 100^d 12'6" à ce même instant, & par conséquent sa longitude dans 9^d 22' 23" , en suppositut l'obliquité de l'Ecliptique de 23 l'28'), telle qu'elle est à peu près cette année.

Par un femblable calcul il faut ajoûter à l'époque de l'afcension droite d'Arcturus 41" pour la précession des Equinoxes, & en retrancher 9" pour l'aberration; de sorte que le 30 Décembre 1743 l'ascension droite apparente d'Arcturus étoit de 210^d 59' 52". Y ajoûtant 68^d 14' 31", qui est la dissérence d'ascension droite entre le Soleil & Arcturus, déduite des observations précédentes, on a l'ascension droite du Soleil de 279^d 14' 23", & par conséquent sa longitude le 30 Décembre à 0h 3' 7" de temps moyen, dans 8^d

29' 12" = %.

Il paroit donc que dans l'intervalle des deux observations le Soleil a parcouru en longitude 5 s 29 d 6 49 " ½, & qu'il

190 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE s'en faut de od 53' 42" qu'il n'ait parcouru 61 od o' 31" 1: cette différence étant évaluée en temps, à raison de 57'12' pour 24h o' 11" de temps moyen, sait voir que le 30 Juin à 8h 54' 14" de temps moyen, le Soleil étoit éloigné de 61 od o' 31" - du lieu où il étoit le 30 Décembre à oh 3' 7". L'intervalle des temps est de 182 jours 15h 8' 53", plus grand de 1' 37" 1 que la demi-révolution anomalistique du Soleil; donc le 30 Juin à 8h 54' 14", le Soleil n'étoit pas encore arrivé dans son Apogée. Faisant donc cette analogie, comme 4' 0", dissérence des mouvemens diurnes du Soleil apogée & périgée, font à 57' 12" mouvement diurne du Soleil apogée; ainsi 1' 37" ½ sont à 23' 14". Les ayant ajoûtées à 8h 54' 14", on trouve que l'instant du passage du Soleil par son apogée est arrivé le 30 Juin à 9h 17' 28", temps moyen, auquel temps sa longitude étoit de 8d 29' 36 . C'est-la le lieu de l'April e qui resulte des observations que je viens de rapporter.



OBSERVATION ANATOMIQUE.

Par M. DU HAMEL.

Intre plusieurs morceaux d'Histoire Naturelle que M. d'Après de Mannevillette premier Lieutenant des Vaisseaux de la Compagnie des Indes & Correspondant de l'Académie, m'a rapportez de son dernier voyage, il y avoit de squelette de la tête d'un animal que les Indiens du Maduré, pays naturel de cet animal, appellent le Renard armé.

Les os de la mâchoire indiquent qu'il est de la nature des animaux qui ont quatre grandes dents incisives, tels que les lievres, les lapins, &c. son cervelet est rensermé dans une boite ofscuse, ce qui s'observe de même dans la tête des soups & de la plûpart des animaux carnassiers.

Mais ce qu'il y a de plus fingulier dans cet animal, c'est une apophy se pointue, ou une espece de corne longue d'environ 5 lignes, recouverte d'une substance dure, blanche & polie comme l'émail des dents, qui est située à la réunion des deux temporaux avec l'occipital. Ceux qui ont vû de ces animaux vivans ont assuré M. d'Après qu'ils se servent de cette corne pour leur désense; néanmoins elle est bien courte pour seur être d'un grand secours, & elle est située de saçon que l'animal seroit obligé de mettre sa tête entre ses jambes, pour se servir de cette désense.

On a promis à M. d'Après qu'on lui procureroit un de ces animaux tout entier, en attendant j'ai joint à la courte description que je viens de donner, une sigure de la tête dont il s'agit, & j'ai remis le crâne original au Cabinet de l'Académie.

192 Memoires de l'Academie Royale

EXPLICATION DES FIGURES.

LA première Figure représente le squelette de la tête du Renard armé, a l'apophyse.

La deuxième Figure sert à faire voir l'apophyse sciée en deux, il y a au centre une espèce de diploé.

La troissème Figure est une coupe de cette même tête pour faire voir la boîte offeuse qui rensermoit le cervelet, & la mâchoire supérieure taillée pour recevoir deux grandes dents incitives.



OBSERVATIONS

OBSERVATIONS DE LA COMETE

Qui a paru au commencement du mois de Février de cette aunée 1743, & de l'orbite de la Comète de 1729.

Par M. MARALDI.

E 12 Février de cette année 1743, j'aperçus une Comète fans queue, en forme d'une étoile nébuleuse, dans la Constellation de la grande Ourse, elle étoit à 8h 30' du soir entre les étoiles x & y, deux fois & un peu plus éloignée de l'étoile y que de l'étoile x; les lignes tirées de ces étoiles à la Comète faisoient un angle de 140 degrés ou environ. Nous remaiquames audi qu'oyant tiré del'étoile s'deux lignes, une à la Comète & l'autre à l'étoile y, elles faisoient avec la ligne tirée de l'étoile y à la Comète un triangle dont l'angle en y étoit obtus & d'environ 140 degrés; la distance de l'étoile y à la Comète étoit tant soit peu plus grande que celle qui est de l'étoile D à l'étoile y. Après avoir fait cette configuration, nous nous disposames à faire quesques objervations avec la machine parallactique; mais la Lune qui s'etc it levée pendant que nous nous y préparions, nous fit perdre la Comète de vûe, & nous sumes obligez de nous contenter de la configuration que nous avions faite.

Pour déterminer le lieu de la Comète par cette configuration, nous avons fait une figure où ayant placé ces étoiles suivant leur longitude & latitude, & la Comète suivant les distances à ces étoiles, nous avons trouvé qu'elle étoit en od 40' de la Vierge, avec une latitude boréale de 43^d 40'.

Le 13 Février nous comparames la Comète avec une étoile de la grande Ourse, qui est la 1 é 5° du catalogue de Flamíteed.

Mem. 1743.

B b

20 Juillet 1743.

A 7^h 5 1' 3" la Comète passa par un cercle horaire. A 8^h 5' 9" l'Étoile passa par le même cercle, avec une dissérence en déclination, de 27 secondes de temps, ou de 4' 50" en degrés de grand cercle.

Nous avons déterminé l'ascension droite de cette étoile par une observation du 13 Mai, de 177^d 13' 41", & sa déclinaison boréale de 44^d 29' 26", d'où nous avons conclu l'ascension droite de la Comète de 173^d 41' 37", sa déclinaison boréale de 44^d 34' 17", sa longitude de 5^f 3^d

36' 40", & sa latitude boréale de 37d 46' 15".

Depuis le 13 Février le ciel a été presque toûjours couvert pendant le reste du mois; mais la nuit du 17 au 18 les nuages étant chaffez par un grand vent d'ouest, qui laitsoient de temps en temps quelqu'espace du ciel serein, M. Cassini apercut la Comète proche du meridien; elle etoit dans le parallèle d'une petite étoile, dont il determina l'afcenfion droite par l'observation de son passage au méridien, de 1704 40' 50, & sa déclinaison septentrionale de 29d 13' 4"; mais il n'y put pas voir la Comète, & il eut recours à une autre lunette qu'il dirigea à l'étoile, & l'avant tenu fixe, il marqua le temps auquel l'étoile & la Comète fortirent du champ de la funette, & il trouva que la Comète en sortit 48 secondes de temps après l'étoile. Cette observation sut faite aussi tot après le passage de l'étoile par le méridien, qui arriva le 18 Février à 1h 46' du matin; ainsi nous avons conclu l'ascension droite de la Comète pour cette heure, de 170d 58' -', sa déclinaison septentrionale de 29d 13' 4', sa longitude de 5 9 37 30", & sa latitude septentrionale de 23d 9' 20".

Voila les observations que le temps nous a permis de saire, qui ne sont pas suffisantes pour déterminer les particularités du mouvement de la Comète. Nous avons appris qu'on avoit va cette Comète à Berlin deux jours plutot qu'à Paris, je souhaite qu'on y ait sait aussi un plus grand nombre d'observations, pour pouvoir determiner avec quelque précision

la route de cette Comète, qui a été, comme on voit, du nord au midi, ayant parcouru dans l'espace de 4 jours & 6 heures 6^d 1' en longitude suivant la suite des signes, & 14^d 37' en latitude. Si nous pouvons avoir les observations saites à Berlin, nous tacherons d'en calculer l'orbite, en attendant nous donnerons les élémens de la théorie de la Comète de l'année 1729, & une Table de la longitude & de la latitude de cette Comète, calculée suivant ces élémens, & comparée à la longitude & à la latitude conclue des observations.

La Comète de 1729 est la plus remarquable de toutes celles qui ont paru jusqu'à présent, par la durée de son apparition, c'est la première que j'ai observée; ces deux raisons m'ont engagé à voir si je pouvois représenter son mouvement en supposant qu'elle ait décrit une parabole & en me fervant des Tables de M. Halley. Ce qu'en a dit M. Bouguer dans un Mémoire de 1733 n'a pu me rebuter; en effet, que deviendroit un corps célefte qui parcoureroit une hyperbole? ce seroit à mon avis un corps perdu: or il n'est pas vraisemblable que les Comètes soient des corps jetez au hasard: je ne crois pas même que ce soit le sentiment de M. Bouguer, il a rapporté ce que son calcul lui a donné, ce que, suivant les règles de Képler, le rapport de la vîtesse de la Comète fur son orbite trouvée par le moyen de trois observations à la vîtesse de la Terre sur l'orbe annuel, l'a obligé de conclurre. Nous en aurions fait de même si nous nous étions arrêtez au premier de nos calculs, mais comme nous pensons que les Comètes sont des corps célestes qui, comme les planètes, décrivent des ellipses autour du Soleil, nous avons cherché une parabole (car on peut prendre la parabole comme une ellipse infiniment alongée) par le moyen de laquelle on pût représenter toutes les observations de cette Comète, & nous avons trouvé qu'il faut supposer le paramètre de cette parabole, de 166770,8 parties, dont la distance moyenne de la Terre au Soleil est de 10000, & par consequent la distance périhélie de cette Comète, de 41692,7. Le lieu du périhelie répond à 27d 21' 38" du Verseau, elle y a 196 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE pailé le 22 Juillet à 23h 54' 20" temps moyen, neuf jours avant la première découverte. Le lieu de son nœud ascendant est à 10^d 16' 46" du Verseau, & son inclinaison est de 76^d 42' 45". Ayant calculé suivant ces élémens les lieux observez de cette Comète, & rapportez par M. Cassini dans un Mémoire de 1730, nous avons dressé la Table suivante, où s'on voit que les plus grandes dissérences dans la longitude sont le 10 & le 14 Octobre de 5' 8", & le 19 de 6' 38"; & dans la latitude le 3 1 Août de 3' 37", & le 26 Septembre de 3' 5". Les autres observations s'accordent insimiment mieux au calcul, y en ayant plusieurs qui s'accordent dans la minute, qui est une précision aussi grande que celle qu'on trouve dans les autres planètes.

Cette Comète a été directe, elle a parcouru sur son orbite 21^d 44′ 33″ dans l'espace de 139ⁱ 20^h 23′, sçavoir, depuis le 31 Août 1729 à 9^h 34′ du soir qu'on a sait la première observation à Paris, jusqu'au 18 Janvier 1730 à 5^h 57′ du soir qu'on l'a vûe pour la dernière sois. Sa distance à la Terre étoit le 31 Août de 33464,5 parties, dont la distance moyenne de la Terre au Soleil est de 10000, & le 18 Janvier elle étoit de 51311 de ces mêmes parties; ainsi elle s'en et sit cloignée de 1704 parties, un peu plut de la moitié de la distance où elle étoit le 31 Août, au lieu que pendant tout ce temps elle ne s'étoit cloignée du Soleil que de 3491 des mêmes parties, sa distance au Soleil étant le 31 Août

de 41826 parties, & le 18 Janvier de 44317.

DES SCIENCES. 197

TABLE L. Le itales & Lautales de la Comète de l'amie 1729.

Journal Control	TEMPS	Longitude observée.	Longitude çalculée.	Diffé- rence.	L'ATITUDE observée.	Latitude calculée.	Diffé- rence.
172). A & 31 - 1.m' 2 - 10 - 11 - 12 - 10	2 34' 2 25 9 23 8 6 - 53 - 55 - 7 8 - 0	S; 'o' S; 13 7; 1, 42 6; 1; 1 6; 1; 1 4; 50; 1 4; 12; 3; 1 4; 2; 5; 4; 6; 6; 3; 1; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2;	6 21 5 6 7 22 5 3 1, 5 2, 13 5 14 3' 4 55 22	- 2';;" 0 1(1-2 ; 1 2 ; 3; 3 ; 4 ; -1; 3 ; 5; -1; 4; 4; 1 -1-2; 5; -1; 5; 7; -1; 6; 7; 7; -1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1	28448' 9" 1, 6 30 2 14 4 2 55 7 3 9 32 3 27 23 3 27 23 3 10 10 21 11 11 11	281,1/2/ 2) 6;2 2) 1; 3, 20 7; 3, 40 2; 40 2;	
Cell lee 1 12 14 15 14 15 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	7 43	2 38 1 2 36 5 2 34 12 2 30 2 2 26 13 2 33 42 2 34 17 2 34 46 2 3 43	2 43 9 2 49 50 2 3 14 2 33 54 2 32 56 2 11 52 2 37 27 2 41 23 2 41 16	+ + 1° + 5 + 6 7 5 1 10 3 7 -1 4 7 + 4 13	71 (1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2 2 3	3 12 - 20 - 3 7 3 .8 - 12 - 2 1 5 5 1	4 2 5 5 4 2 2 5 4 2 2 5 5 4 2 2 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		- 2 5 1 -1-1 5 7 -1 1 5 6 - 1 1 5 6 - 2 - 1 5 - 1 5	1) 7 17 13 7 2 13 7 1 13 1 1 1	1 1 1 1	

Jours des mois.	TEMPS vrai.	Longitude observée.	Longitude calculée.	Dale- rence.	LATITUM obfervée.	l at itt pr calculée.	D 'c-
1729 • Decemb. 2 3 9 14 19 20 24 27	6 19 6 17 6 0 5 32 5 29 6 34	= 6 50' 20" 6 59 13 8 6 41 9 7 11 10 6 46 10 19 16 11 14 52 11 57 32	6 5 49 8 5 39 9 6 1e 10 9 25 10 22 50	+0 24 +1 2 -+1 1 +2 39 +3 34 +2 14	33 45 45 34 1 5 14 13 10 34 32 38 14 17 21 34 45 32	33 46 8	-0'17" +0 28 +0 46 +0 55 +0 44 +1 33 +-0 2
1730. Janvier 7 8 16	\$ 3\$ 6 10 5 48 5 51 5 57	14 41 31 14 57 23 17 1 29 17 16 12 17 34 16	14 55 51 17 1 52		35 48 50		-1 2 6 -1-2 17 -1-1 28 -1-1 33 -1-0 13



M E M O I R ESUR L'OUIE DES POISSONS.

ET SUR

LA TRANSMISSION DES SONS DANS L'EAU.

Par M. l'Abbé Nollet.

A question que j'entreprends de traiter, seroit décidée, 24 Avril s'il étoit vrai que ces ouvertures qu'on voit à la tête des Poissons, & que le vulgaire a nommées les ouics, fussent en effet des organes propres à leur faire sentir les sons. Pourroit-on raisonnablement supposer que la Nature leur cût accordé un sens dont ils ne feroient point d'usage? Mais les Sçavans qui se sont appliquez à l'Histoire Naturelle en ont jugé autrement, ces parties leur ont paru desfinées à des sonctions tout-à-fait différentes de celles qu'on leur attribue communément, & qu'elles semblent annoncer, soit par la place qu'elles occupent, soit par le nom qu'elles portent. Plusieurs même ont mieux aimé croire que les Poissons étoient parfaitement fourds, que de regarder les ouïes comme le passage des sons. Artedus dans la deuxième partie de son Ichtyologie, s'exprime ainfi à la page 19: Pifes ectacci onves meatus auditorios externé habent, reliqui verò omnes iifdem earent. & consequenter sonos seu voces non videntur percipere, pracipae cum vocales non fint.

Cette opinion à la vérité n'est point celle du plus grand nombre; quelqu'incertain qu'on ait été jusqu'à présent des moyens par lesquels ces animaux perçoivent les sons, on eut toujours peine à croire qu'ils sussent privez de la faculté d'entendre; on est naturellement persuadé qu'ils sont senfibles & attentifs au bruit, Artedus même que je viens de citer, semble en convenir quelques pages après, & se restreint

à la perception des sons articulez qu'il leur refuse.

C'est assez l'usage de faire la pêche en silence, & les gens du métier l'exigent comme une précaution nécessaire, ils peut par le bruit déterminer leurs mouvemens, qu'ils ont in izine pour les prendre, des precédés qui riuffiffer, & qui sont entièrement sondez sur cette opinion. Sur les côtes de Bretagne on fait communément une sorte de pêche dont tout l'art consiste à chasser d'abord le poisson dans une anse dont on ferme ensuite l'embouchure avec des filets vers lesquels on le ramène; pour le saire aller & revenir ainsi, deux hommes avec chacun une chaloupe & un tambour le suivent en faisant du bruit & en observant d'ailleurs tout ce que thabitude & l'experience leur ont falt re, arder comme nécessaire. Les Chinois, dit-on, en usent à peu près de même, au lieu de tambour ils emploient un instrument qui est fort en usage chez eux, & qu'ils appellent tam-tam*, de pour fordinaire une plaque de misal suspendae, sur Eigrelle en happe avec une bagiette dant le bout est rentie avec des cordes sortement serrées les unes sur les autres.

Pline, Rondelet, Boyle & quelques autres Naturalisses font mention de deux ou trois étangs où l'on avoit sait prendre au polition l'habitude de s'affembler au fen d'une petite cloche, ou de venir à la voix d'un homme qui avoit coutume de lui porter à manger. Le petit pullons d'res de la Chine que l'on nourrit par cariofite d'un le mail m, ne manquent pas, dit-on, de venir à la surface de l'eau dès que l'on heurte un peu la jarre où ils sont; on prétend même que l'habitude & l'agitation n'y entrent pour rien. que cette expérience réuffit à toute heure en heurtant, & que le n.eme effet n'a par lieu quand en se contente de 10-

muer le vaisseau.

^{*} Une personne fort intelligente qui a fait plusieurs voyages à la Chine, & qui s'est appliquée à connoître les mœurs de la nation, m'a fait observer ce cérémonies religieuses; que le tam-tam est toûjours employé dans leurs 2' as de de la la la la la grafiche de control de la figura de la serie de la control ter Line have it hen as combined avec tricement as prepare at 1 ...

Au premier coup d'œil toutes ces apparences décident la question, mais quelque séduisantes qu'elles soient, quand on y réfléchit sans préjugé il reste encore bien des incertitudes sur l'opinion qu'elles favorisent; le bruit ne va guère sans quelque mouvement sensible à la vûe, le poisson a le coup d'œil très-subtil, il n'est pas facile de bien juger si la crainte qui le met en suite ou l'empressement avec lequel il s'assemble en certaines occasions, sui vient de ce qu'il entend, ou bien de ce qu'il voit. Les Auteurs que j'ai citez ne se donnent point pour témoins oculaires des faits dont ils font mention, & ces sortes de récits n'ont du poids qu'autant qu'ils sont appuyez sur le témoignage d'un observateur habile & reconnu pour tel. J'ai fait, pour dissiper mes doutes, bien des expériences qui ne m'ont pas réussi; les carpes que l'on tient auprès des maisons & que l'on visite fréquemment, ne m'ont pû donner aucun éclaircissement, le bruit pour l'ordinaire ne les fait pas fuir, mais elles ne marquent pas plus de crainte quand elles voient qu'on s'approche d'elles; cette sécurité ne prouve pas qu'elles soient aveugles, on n'en peut donc pas conclurre non plus qu'elles soient sourdes.

J'ai cherché des ruisseaux écartez pour y trouver du poisson plus farouche, & j'ai toûjours observé que le moindre mouvement, le plus petit geste qu'il pouvoit apercevoir, le faisoit fuir; je me tenois tranquillement appuyé contre un arbre ou sur le parapet d'un pont, & je saisois tout d'un coup quelque bruit, ou avec la voix sans remuer ni les lèvres ni les yeux, ou avec un sisset que je tenois à la bouche; plusieurs fois j'ai vû le poisson rester en place & ne donner aucun signe de crainte, d'autres sois aussi je l'ai vû partir & me laisser fort incertain sur la cause de sa suite, car souvent il fuyoit de la même manière avant que j'eusse sait du bruit, & J'avois toujours à craindre qu'une plante, une feuille sèche, agitée sur le rivage sans que je l'eusse aperçue, ou quelqu'autre cause qui m'auroit échappé, n'eut produit l'esset que j'étois tenté d'attribuer au bruit. On aura peine à croire qu'après bien des soins & des tentatives je n'aie pu conclurre rien de

Mem. 1743.

certain, mais ceux qui font dans l'habitude d'observer & qui aiment la vérité, sçavent très-bien qu'on est tous les jours arrête dans les choses qui paroissent les plus simples, & qu'en

ne doit pas se rendre aux premières apparences.

Ce qui prouve bien que ces fortes d'observations ne sont pas audit Leiles qu'en le pourroit croire, c'est le peu d'accord qui se trouve entre les Sçavans qui ont travaillé sur cette matière, l'incertitude avec laquelle ils ont prononcé, & le parti qu'ils ont pris pour terminer la question. Des Auteurs également célèbres ont accordé & resusé aux poissons la faculté d'entendre, la plûpart ne se sont exprimez qu'en héstitant, & tel qui adopte un des deux sentimens, revient quelques lignes après à l'opinion contraire, comme l'a sort bien remarqué M. Klein dans la présace d'un ouvrage imprimé en 1740, & qui a pour titre: De Lapillis corumque numero in craniis Piscium.

On en peut juger par quelques passages de Ray au 1 et livre de ses Additions à l'histoire des Poissons de Willugby, p. 3: Tous les Poissons, dit-il, excepté ceux qu'on nomme cétacez, & peut-être aussi les cartilagineux, n'ont ni oreilles externes ni conduits pour les sons, d'où il paroît qu'ils sont sour les cartilagineux, n'ont ni oreilles externes ni conduits pour les sons, d'où il paroît qu'ils sont sour se comme ils sont mucts; & à la page 6, il prononce avec plus de retenue, voici ses paroles: les Poissons n'ayant point de ners auditifs, il est vraisemblable qu'ils sont privez de l'ouïe; ensin à la page 7 il s'exprime ainsi, on ne sçait pas bien encore par quel endroit les Poissons entendent (si tant est qu'ils entendent) si tamen omnino audiant. Ces expressions dans l'ouvrage d'un sçavant & laborieux Naturaliste, prouvent bien que la question qu'il traite, n'est pas décidée, & qu'il n'est pas facile qu'elle le soit.

La difficulté d'apprendre par des observations directes ce que l'on se proposoit de sçavoir touchant l'ouïe des poissons, a fait prendre un chemin un peu plus détourné, mais qui conduit au même but; au lieu d'examiner immédiatement s'ils entendent, on cherche à sçavoir s'ils peuvent entendre, & pour résoudre cette dernière question, il y a deux choses à faire, 1" il faut s'assurer si les poissons ont des organes

propres à percevoir les sons, 2° il faut voir si le milieu qu'ils habitent, est capable de les leur transmettre; l'une ou l'autre de ces deux conditions venant à manquer, on peut en toute sûreté conclurre que les poissons n'entendent point sous l'eau: il est aussi plus que vrai-semblable qu'ils ne sont point sourds s'ils ont des oreilles ou quelque chose d'équi-

valent, & que l'eau soit perméable au son.

De ces deux objets on n'en a encore suivi qu'un, on a employé l'anatomie la plus exacle pour tâcher de découvrir quelle partie pourroit être l'organe de l'ouïe, on a trouvé dans la tête des poissons certains petits corps solides que les uns ont appellé offelets à cause de leur dureté, & que d'autres ont nommé petites pierres (lapilli) peut-être parce qu'ils ressemblent un peu à l'agathe ou au caillou par leur poli. Les Sçavans qui ont fait cette découverte sont portez à croire que ce sont là principalement les organes internes de l'ouje dans les poissons, mais ils sont d'ailleurs si partagez sur la nature de ces offelets, sur leur nombre & sur la correspondance qu'ils ont avec les autres parties qui doivent nécessairement concourir avec eux aux fonctions qu'on veut leur attribuer, qu'il n'est guère possible de rien établir de certain sur ce qu'on en sçait; l'observation n'a produit jusqu'ici que des soupçons, c'est à l'observation même à les convertir en connoissances. En attendant de nouvelles preuves qui nous fassent connoître évidemment que les poissons ne sont point sourds par privation d'organes, je me suis proposé de sçavoir s'ils le sont par la nature du fluide qui leur sert de milieu, la fuite de ce Mémoire fera connoître ce que l'expérience a décidé; mon principal objet a donc été d'examiner si les sons pénètrent dans l'eau, à quelle prosondeur ils peuvent s'y transmettre, combien ils y sont affoiblis, si leurs différentes modifications s'y confervent, & fi l'on peut les y distinguer.

C'est un sentiment généralement reçu & fondé sur les expériences les plus décisives, que le son n'est autre chose qu'un mouvement de vibration imprimé au corps sonore,

204 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE communiqué à l'air qui l'environne, & transmis à l'oreille où s'acce implitient les sensations de l'ouie: cela suppose un milieu élastique qui puisse recevoir & conserver pendant quelque temps les petites vibrations d'un corps actuellement fonnant, fremir avec lui & porter ailleurs ce fremissement; c'est pourquoi toutes les matières qui ne sont que slexibles & qui n'ont qu'un ressort très-soible, amortissent le son & piroissent toujours moins propies que d'autres à faciliter sa propagation.

Fondé sur ce principe on pourroit croire que l'eau d'un étang arrête le son & en interdit le sentiment à tous les animaux qui l'habitent, car c'est une opinion assez reçue que l'eau, en tant que siqueur, n'est pas compressible comme il taudroit qu'este le sur pour être jugee capable de transmettre le son, c'est-à-dire, pour être élassique; mais malgré cette raison, s'il étoit bien constaté qu'on entend dans l'eau, ce sait, quoique peu attendu, ne seroit pas moins recevable, & tout ce qu'il y auroit à faire, ce seroit d'y trouver une

explication.

Quelques expériences que je n'avois point faites dans cette vûe, me firent foupçonner que l'eau n'étoit point un obstacle invincible pour les sons. M. de Mairan ayant remarqué que deux sons différens le transmettent entemble & fans confusion d'une masse d'air à une autre, nonobstant l'interposition d'un corps solide, comme le verre, je voulus effayer s'il arriveroit quelque changement nouveau à différens sons que je ferois passer à travers une lame d'eau dont le pourrois varier en raison connue la densité & la température. Ce n'est point ici le lieu de rapporter ni les préparations ni les réfultats des expériences que j'ai faites dans ce dessein, mais je dois dire par rapport au sujet présent, que tous les corps sonores dont je me suis servi, se sont toûjours fait entendre du dedans au dehors des vaisseaux, malgré l'interposition de l'eau qui les environnoit de toutes parts, excepté seulement le cas où l'air qui les touchoit immédiatement avoit été beaucoup raréfié.

On voit aussi dans les Elémens de Physique de M. s'Gravesande, qu'un petit timbre ensermé dans un vaisseau & plongé dans un autre vale plein d'eau, se fait encore entendre,

quoique foiblement.

Mais ces fortes d'expériences ne pouvoient tout au plus faire naître que des foupçons sur ce qui saisoit l'objet de mes recherches, une si petite quantité de liqueur ensermée entre des parois solides ne me paroissoit pas dissérer assez d'un verre fort épais ou de toute autre matière compacte dont on sçait que l'interposition ne sait que diminuer la force du son, & je n'osois rien attribuer particulièrement à la sluidité de l'obstacle. Il me parut donc qu'il falloit des épreuves en grand, que l'organe devoit ètre placé dans l'eau même pour juger si les sons s'y transmettent; en un mot, je crus que pour sçavoir d'une manière certaine si les poissons peuvent entendre dans l'eau, en supposant que la Nature les en ait rendu capables, le moyen le plus sûr étoit de s'y placer comme eux.

Pendant l'été de 1740 je profitai des jours les plus chauds pour tenter ces expériences dans la Seine; je choifis un endroit affez profond sous une isle où le courant n'étoit pas fensible, j'y fis placer un pieu auquel je pouvois me tenir pour me plonger plus commodément, & je m'accoûtumai peu à peu à rester sous l'eau sans respirer, de manière qu'après m'être exercé quelques jours je soûtenois fort bien cet état pendant 12 secondes sans souffrir aucune violence qui pût me distraire; celui qui m'accompagnoit ne faisoit le bruit ou le son dont nous étions convenus, que quand je lui en donnois le fignal en tirant à moi avec une ficèle un morceau de liége qui flottoit, afin de faiffer un temps fullifant pour l'immersion & pour perdre l'idée d'un bruit consus causé d'abord par l'agitation & le choc de l'eau qui entre dans les oreilles. Je dois dire ici pour ceux qui seroient curieux de répéter ces fortes d'épreuves, que le calme qu'il faut dans les sens & l'attention nécessaire pour bien juger, ne s'acquièrent qu'après plusieurs jours d'exercice.

A peine avois-je fait cette espèce d'apprentissage que le temps devint trop froid pour continuer, & pour cette sois tout ce que je pus apprendre, ce sut qu'ayant la tête entièrement dans l'eau, on peut entendre, mais soiblement, le bruit d'un pistolet, une sonnette, un sisse, la voix humaine. Il me parut aussi (& c'est une chose que j'ai encore vérissée depuis) que le coup de pistolet qui sembloit devoir se faire entendre plus sort que les autres instrumens, faisoit un bruit à proportion moins sensible, & tel qu'on pourroit le com-

parer au soutile qui sort d'une sarbacane.

L'année dernière je repris ces expériences en suivant le procédé que je viens de rapporter, observant de plus que la hauteur de chaque immersion suit mesurée avec une jauge appuyée sur ma tête & conduite par celui qui m'assistioit dans ces opérations; & comme j'ai souvent remarqué que le son peut se communiquer par les corps solides qui traversent du dedans au dehors du vaisséau où se corps sonore est rensermé, je sis ensoncer le pieu auquel je me tenois, jusqu'à ce qu'il n'eut plus aucune communication avec l'air extérieur; je sis de cette manière plusieurs épreuves dont chacune sut répétée au moins trois sois, en voici les principaux résultats.

1° Ayant 4 pouces d'eau au dessus de la tête j'entendis le bruit d'un pittolet de poche, celui d'une sonnette de cabinet

& d'un sisset de chasse.

2" Je distinguai encore fort bien tous ces sons, & même la voix humaine, étant plongé à 8 pouces, à 1 pied, à 1 8 pouces, à 2 pieds, & c'est la plus grande prosondeur où je pus porter la tête dans le lieu où j'étois.

3° Pendant que j'étois entièrement plongé on a produit dissérens tons en même temps avec deux sonnettes ou avec deux sisseres, & je les ai toûjours bien distinguez, quoique j'eusse quesquesois environ 2 pieds d'eau sur la tête.

4° J'ai distingué pareillement les articulations de la voix humaine un peu sorcée, & j'ai rendu ensuite mot pour mot le phrase qu'on avoit prononcées pendant que j'étois plonaée.

5° Tous les sons que j'ai entendus dans l'eau ne m'ont

paru qu'affoiblis, & je ne me suis point aperçu que les tons

fussent changez.

6° Ayant comparé, autant que je l'ai pû, le même son entendu successivement à 4 & a 18 pouces de protondeur, je n'ai pas trouvé toute la différence que les volumes d'eau me faisoient attendre, c'est-à-dire que la plus grande diminution du fon ne me paroiffoit pas proportionnée à l'aug-

mentation de profondeur.

7 Ayant remarqué precédemment qu'un coup de piffolet ne se faisoit pas entendre sous l'eau autant par proportion que les sons continus, j'ai écouté à même prosondeur le son d'un timbre que l'on frappoit d'abord d'un seul coup, & que l'on continuoit de faire sonner ensuite par des coups qui se suivoient de sort près; j'ai eru l'entendre plus fortement dans le dernier cas. J'ai fait la même épreuve avec la voix humaine & avec des sifslets, & j'ai toûjours conclu de la même manière; quoiqu'à dire vrai, cette expérience étant affez délicate, ce qu'elle m'a fait connoître ne s'est pas présenté avec le même degré de certitude que j'ai trouvé dans les autres réfultats.

8° Ayant la tête presqu'à sleur d'eau je n'ai plus entendu une montre à réveil que l'on tenoit suspendue à quelques pouces au dessus: l'intensité du son étoit telle qu'en pleine campagne & par un temps calme je pouvois très-bien le distinguer à 45 pieds de dittance; je dis en pleine campagne, c'est-à-dire, dans un champ tout-à-fait découvert, car on scait que selon la circonstance des lieux le son s'entend plus ou moins.

Ces expériences, comme l'on voit, décident la question que je me suis proposée, elles prouvent avec évidence que si les poissons sont sourds, ce ne peut être que par privation d'organe, puisque le milieu où la Nature les a placez, n'est point un obstacle invincible à la propagation des sons; il est vrai qu'il les afsoiblit beaucoup, & qu'une telle altération nous les rendroit presqu'inutiles. Un homme qu'un accident fait tomber dans l'eau doit peu compter sur les cris ou sur

208 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE les avis de ceux dont il peut espérer du secours, le saissificment le met hors d'état d'y être attentif, l'agitation de l'eau lui fait un bruit confus qui esface toute autre impression. & l'organe mouillé n'a pas peut être le même reflort qu'il a coûtume d'avoir dans le milieu qui lui est naturel. Mais nous devons penser que si la Nature a donné aux poissons la faculté d'entendre les sons qui viennent de l'atmosphère, elle aura suppléé à la foiblesse des impressions par la délicatesse de l'organe, & que par une juste proportion entre le sens & son objet elle aura trouvé le moyen de rendre suffifamment sensible aux habitans des eaux ce qui ne l'est point trop pour ceux de l'air. Une chauve-fouris, un hibou, voit distinctement la nuit ce qui échappe à la vûe des autres animaux, parce que ses yeux sont faits pour sentir la plus foible lumière; une plus grande clarté le blesse, il n'en soûtient l'éclat qu'avec beaucoup de peine. Une carpe qui fort de son élément pour entrer dans le nôtre, souffre peut-être autant du grand bruit qui la frappe, qu'un oiseau nocturne du grand jour qui l'éblouit; peut-être aussi que les poissons ne doivent entendre distinctement que les sons qui naissent dans l'eau même, & que ceux qui se passent dans l'air leur étant comme étrangers, ne les touchent qu'imperceptiblement ou quand ils sont très-forts. On verra à la sin de ce Mémoire des expériences qui peuvent jetter quelque jour sur ces conjectures.

Mais si c'est un fait certain que les sons pénètrent dans l'eau, la manière dont ils s'y transmettent, est une chose peu connue & qui mérite de l'être. Quantité d'expériences ont fait connoître depuis long temps que le son ne se propage que par un fluide élastique; j'en viens de citer plusieurs qui prouvent clairement que cette propagation a lieu dans l'eau, & c'est une opinion reçue que les liquides n'ont point de ressort, puisqu'on ne les croit pas compressibles. La Nature est-elle donc contraire à else-même? non sans doute, mais nous ne l'interprétons pas toûjours dans son vrai sens, & nout lui taitons dire que partois des choses qu'elle desavour

tôt ou tard, ou bien nous manquons de l'entendre, parce que nous ne faififfons qu'une partie de ce qu'elle nous préfente. L'idée qu'on fe fait communément d'une maffe d'eau par rapport à la transmission des sons, est donc vrai-semblablement descelucuse, ou parce qu'elle supposé quelque qualité qui n'y est pas, ou parce qu'elle n'embrasse pas tout ce qui s'y trouve, c'est ce que je me propose d'examiner maintenant.

L'eau d'un étang ou d'une rivière n'est point un fluide homogène, elle est toujours mèlée avec des mutières étrangères, & depuis long temps il n'est plus permis d'ignorer qu'elle contient une quantité d'air aflez confiderable. On sçait même que cet air qui vient de l'atmosphère, passe jusqu'aux poissons, que ces animaux ont des parties propres à le filtrer & à l'extraire pour leur usage, & qu'ensin il leur est tellement nécessaire qu'on les sait mourir quand on les en prive; n'est-il pas naturel de penser que ce sluide mixte qu'ils habitent, je veux dire l'eau mêlée d'air, leur transmet les sons par cette partie de lui-même qu'on sçait être propre à cette fonction, tandis que l'autre en interrompant la contiguité de les molécules élassiques amortit son action, & diminue considérablement l'intensité des sons qu'elle transmet? Cette explication se présente avec tant de vrai-semblance qu'on regarderoit volontiers comme une chose superflue de poutser plus loin ces recherches, si l'on ne sçavoit qu'en Phylique ce qu'il y a de plus vrai-semblable est encore quelquefois très-loin du vrai. Je ne veux point dire affirmativement que l'air n'ait aucune part à la propagation des sons dans l'eau, mais j'ose avancer qu'il est assez douteux qu'il y contribue beaucoup, & qu'il y a des raisons pour croire que ses parties interposées entre celles de l'eau empêchent que les sons ne soient aussi sorts qu'ils le seroient dans un fluide plus homogène; proposition qui paroîtra peut-être un peu paradoxe, mais que je vais tâcher de justifier.

Si la quantité d'air contenue dans l'eau n'est point telle que ses particules puissent être supposées contigues les unes aux autres, si celles de l'eau beaucoup plus nombreuses les

empêchent de se toucher, si les unes & les autres ne sont point élassiques au même degré, & que la dissérence qui est entr'elles à cet égard soit extrêmement grande, on ne conçoit pas bien comment les sons qui viennent de l'atmosphère, peuvent s'étendre dans un fluide composé de parties si peu semblables, & qui paroitsent si peu propres à se communiquer & à conserver un mouvement de vibration dont l'isochronisme paroit absolument necessaire; car c'est un tait que je prouverai par la suite, que l'eau par elle-même transmet les sons, d'où il suit que si l'air qu'elle contient y contribue,

ce n'est qu'en partageant cette action avec elle.

Quand bien même on supposeroit que toutes les particules d'air indifféremment sont propres à toutes sortes de sens, interrompues comme elles le sont par d'autres parties qui ne sont point élastiques comme elles, à peine pourroit-on concevoir qu'elles pussent se transmettre leurs vibrations; mais la difficulté devient encore bien plus grande si l'on admet des parties d'air propres à chaque ton, seton la doctrine de M. de Mairan, doctrine cependant à laquelle il est dissicile de se refuser. On entend dans l'eau en même temps & sans contotion des sons différens & des paroles articulees sur plusieurs tons, comme on l'a vû par la 3 mc, la 4 mc & la 5 mc expérience, combien n'y faudroit-il point d'air pour fournir à quelque son que ce soit un véhicule suffisant & qui lui fût propre? Mais ne prévenons point par des raisonnemens ce que nous pouvons apprendre de l'expérience, sçachons par elle, si nous le pouvons, combien l'eau contient d'air communement, & s'il est nécessaire qu'elle en contienne pour transmettre les sons.

Je sçavois deja d'apres M. Hales*, que 54 pouces cubiques d'eau de puits donnent par la distillation un pouce cubique d'air semblable à celui de l'atmosphère, & j'aurois pû sur le témoignage d'un aussi habile Physicien établir mes conséquences, mais je prévoyois que j'aurois à éprouver de l'eau purgée d'air, & qu'il m'en saudroit pour une seule expérience plus qu'on ne peut commodement en appliquer en une sois

à sa machine pneumatique. J'avois donc besoin de sçavoir si cette eau purifice ne reprendroit point en très-peu de temps une quantité d'air confidérable, & si j'aurois le loisir de l'éprouver dans l'état que je lui aurois fait prendre dans le vuide: en cherchant un moyen de fatisfaire à cette dernière vûe j'en trouvai un qui pouvoit remplir en même temps la première, c'est-à-dire que par le même procédé je me suis assuré de la quantité d'air qui est ordinairement dans l'eau & du temps qu'il lui faut pour y rentrer en même quantité. Je crois qu'il n'est pas inutile de rapporter cette expérience en détail, non-seulement parce qu'elle peut servir en bien d'autres occasions, mais encore parce qu'on jugera mieux des raisons auxquelles je me suis rendu.

AB est un tuyau de verre d'environ 3 pieds de longueur, Fig. 1. de 5 ou 6 lignes de diamètre intérieurement, coudé aux deux extrémités en sens contraire; il est appuyé d'une part sur un support, & de l'autre il communique avec une espèce de carafe de verre en partie pleine d'eau, & dont l'orifice évafé est bouché au col avec du liége, ce bouchon qui est traversé par le tube, l'est encore par celui d'un thermomètre dont la boule est placée dans le vase à la superficie de l'eau, & cette carafe est elle-même dans un autre vaisseau cylindrique rempli d'eau que l'on rappelle, quand il le faut, à une

température connue.

Ayant donc préparé toutes ces pièces pour être assemblées comme on le voit par la figure, j'ai mis dans le vuide la carafe pleine jusqu'aux deux tiers d'eau de la Seine, qui avoit bouilli pendant un bon quart d'heure, & qui avoit encore, quand je l'appliquai à la machine pneumatique, 35 degrés de chaleur au thermomètre de M. de Reaumur; après en avoir ôté l'air de manière qu'on n'en apercevoit plus aucune bulle s'élever, je la laissai dans le vuide jusqu'au lendemain, tant pour la faire refroidir que pour n'avoir pas à craindre que ses pores encore dilatez ne laissaffent rentrer l'air dans le peu de temps que j'employerois à la transporter du vuide pour la mettre en expérience.

Dans le même moment qu'elle fut ôtée du récipient, elle fut placée dans le vaisseau CD, on y joignit le tube ABavec le thermomètre, & l'on versa de l'eau en A jusqu'à ce qu'elle le fut mile de niveau en L où l'on fit une marque; je versai sur le bouchon qui étoit fort enfoncé, de la cire fondue avec de la terebenthine environ l'epaisseur de 3 lienes, & forsque cette cire sut prise, je versai de l'eau autant qu'il en put tenir dans l'évasement du goulot; par cette dernière précaution l'air ne pouvoit ni entrer ni sortir par cet endroit, que je ne nien spergutie; s'il fortoit, il devoit faire bouillemer l'eau qui couvroit la cire; s'il entroit, cette même eau devoit paffer avant lui, ni l'un ni l'autre n'arriva, ce qui m'affura

que cette partie étoit exaclement bouchée.

Il est facile de voir maintenant que l'air en rentrant dans l'eau de la carafe a dû laisser un vuide dans le tuyau, & que ce vuide s'est rempli par un pareil volume d'eau poussé par le poids de l'atmosphère qui agissoit en A; car on sçait que l'air qui se mêle avec l'eau n'augmente pas sensiblement son volume, & l'on ne doit pas supposer que la surface de l'eau s'élevoit dans la carafe à melure que se vuidoit le tuyau qui fournissoit l'air. J'ai donc pû remarquer les progrès de ce rétabliffement d'air par l'élévation de l'eau au dessus du point E_i mais on doit fentir aussi de quelle importance il est en pareil cas d'avoir égard au degré de chaleur qui règne dans l'intérieur du vaisseau, car la condensation ou la raréfaction dont l'air est très-susceptible, peuvent varier beaucoup le volume qui refle dans le tuyau & dans la carafe, & l'on ne sçauroit bien juger de la quantité dont il diminue, quand on demeure incertain sur son degré de densité; c'est pour cette raison que j'ai placé un thermomètre dans la carafe même, afin de pouvoir remettre le tout à sa première température par le moyen d'un bain que je faisois avec de l'eau plus ou moins chaude dans le vaisseau CD; mais comme l'eau ne s'élève dans le tuyau que par le poids de l'atmosphère qui pèse en A, & que la force de cette pression est variable, j'ai eu soin d'observer la hauteur du baromètre en commençant, en

Fig. I.

suivant & en smissant mes expériences; je n'ai point oublie d'entretenir aussi l'eau du tuyau en équilibre avec elle-même. en observant que sa surface sût toûjours autant élevée au dessus de A, que la diminution de l'air sui permettoit de Fig. 1. monter au deflus de E; fans cette précaution l'observation du baromètre seroit presqu'inutile, la raison s'en présente d'elle-même.

Des Auteurs célèbres qui ont ingénieusement emprunté de l'hydrostatique des moyens pour mesurer des quantités d'air qu'ils s'étoient proposé de connoître, n'ont fait dans la description de leurs procedes aucune mention des égards qu'ils ont dû avoir au poids actuel de l'atmosphère & aux différens degrés de chaud & de froid; auroient-ils omis ces attentions dont on sent de reste les conséquences, & sans lesquelles on ne pourroit compter qu'avec quelque désiance sur les réfultats d'un grand nombre d'expériences nouvelles & intéreflantes dont ils ont enrichi la Phylique? j'aime mieux croire qu'ils ont oublié de le dire, que de leur reprocher de ne l'avoir point fait. Voici maintenant comment je conduisis ces expériences, je prens pour exemple celle qui fut commencée le 13 Mai à 10 heures du soir, le mercure du baromètre étant à 28 pouces, & le thermomètre de la carafe à 15 degrés au dessus du terme de la glace.

Le 14 à 10 heures du matin, ayant remis le bain du vaisseau CD à sa première température, je trouvai que l'eau du tuyau s'étoit avancée de 7 lignes au dessus du point E: cette alcension oblique répondant à trois quarts de ligne d'élévation perpendiculaire, j'élevai l'eau d'autant au dessus du point A, ce qui n'augmenta pas sensiblement les 7 lignes d'eau en E, & la hauteur du baromètre étant la même que le jour précédent, je jugeai qu'il y avoit équilibre entre l'atmosphère qui pesoit en A & l'air intérieur du tuyau & de la carafe; je comptai donc que le volume d'eau qui s'étoit avancé au dessus du point E exprimoit au juste le volume

d'air qui étoit rentré dans l'eau de la carafe.

Le même jour à 10 heures du soir, ayant observé les D d iii

medius clinte, je trouvai que le progre, de l'eau dans le triyan étoit augmenté de 2 lignes, mais comme le baromètre étoit l'anic de 2 lignes, je fongeui à retablir en A la prethon de l'air qui étoit diminuce, par quelque chole d'equivalent. La pelanteur spécifique du mercure étant à celle de l'eau comme 14 à 1, on peut compenser par une colonne d'eau de 14 lignes, élevée perpendiculairement, une diminution dans le poids de l'atmosphère, exprimée par une ligne d'abaissement du baromètre; j'ajoûtai donc 28 lignes d'eau en A, ce qui sit qu'au lieu de 2 lignes d'augmentation que j'avois aperçues au volume d'eau en E, j'en eus près de trois; le produit de 12 heures dans le jour, comparé à celui d'un temps égal pris dans la nuit, sut comme 3 à 7: je continuai ainsi les jours suivans soir & matin & aux mêmes heures.

Le 15 Mai au matin, toute correction faite, je comptai 6 lignes! d'augmentation dans le volume d'eau au dessus

du point E, le soir du même jour 1 ligne 1.

Le 16 au matin le baromètre étoit à 28 pouces 1 ligne, la pression en Actant donc plus grande que le jour où s'expérience avoit commencé, je retranchai cet excès en ôtant avec un siphon 14 lignes d'eau en A, & alors je comptai 6 lignes \frac{1}{2} d'augmentation dans le volume d'eau en E; le soir du même jour j'eus 4 lignes d'augmentation.

Le 17 au matin j'en comptai 7 lignes 1, le soir 3 lignes 1.

Le 18 au matin 3 lignes $\frac{1}{4}$, le foir 2 lignes. Le 19 au matin 3 lignes $\frac{1}{2}$, le foir 4 lignes $\frac{1}{2}$.

Le 20 au matin une ligne.

Le 21 & depuis, le volume d'eau en E n'a donné aucun

figne d'augmentation.

2 Ti . 2.

Toutes ces quantités prifes ensemble donnent 5 i lignes !, c'est-à-dire, 4 pouces 3 lignes !, qui expriment le volume d'air qui est rentre dans s'eau de la carate avec laquelle je le comparai de la manière qui suit.

Ayant mis l'eau du tuyau en équilibre avec elle-même, & débouché la carafe par un trou fait avec un poinçon, je tuit de l'eau en A avec un chalumeau de verre* rentle par

le milieu, jusqu'à ce qu'elle sut baissée exactement au point E; Fig. 1. cette quantité contenue dans le chalumeau étoit justement le volume dont j'avois besoin, car le tuyau AB dont je me suis servi, étoit assez cylindrique dans toute sa longueur, je comparai donc ce volume d'eau avec celui de la carafe, & ils se trouvèrent dans le rapport de 27 ½ à 1.

L'expérience dont je viens de décrire la préparation & le procédé, ayant été répétée plusieurs sois me donna toûjours des résultats dissérens les uns des autres, en prenant un

milieu entre les extrèmes, voici ce que j'ai conclu.

1° L'eau que l'on a tenue dans le vuide ne reprend l'air qu'elle y a perdu qu'en cinq ou fix jours, c'est-à-dire qu'après ce terme on ne voit pas qu'elle en reprenne davantage.

2° Pendant les trois ou quatre premiers jours elle en reprend en temps égaux des quantités à peu près égales, après

quoi cet effet va toûjours en diminuant.

3° Toutes ces quantités d'air prises ensemble & comparées au volume d'eau dans lequel elles sont reçues, en sont

à peu près la trentième partie.

Cette quantité d'air contenue dans l'eau de rivière excède beaucoup, comme l'on voit, celle que M. Hales trouva dans l'eau de puits, où elle n'étoit, selon son résultat, que la cinquante-quatrième partie du volume total; cette différence vient-elle de celle des eaux? j'ai peine à le croire, l'expérience que j'en ai faite avec l'eau d'un puits fortifie mes doutes, & j'entrevois dans les procédés ce qui peut avoir rendu les succès de nos expériences si peu semblables. C'est par la diflillation que M. Hales extrait l'air des matières qui le contiennent, l'eau distillée est reçue dans un récipient plein d'eu froide à Liquelle elle s'unit; n'est-il pas plus que probable qu'elle y porte une partie de son air, & que ce qu'il en reste entre la cornue & la surface de l'eau du récipient, n'est qu'une partie de ce qui a été dégagé par la distiflation? Ce qu'il y a de certain, c'est que dans l'expérience de M. Hales on voit une cause qui peut diminuer la quantité apparente de l'air extrait de l'eau, au lieu que dans la mienne

rien ne tend a produire une semblible diminution, & s'on ne voit pas qu'il y ait rien à rabattre du résultat: il y auroit plûtôt à ajoûter, si s'on supposoit, par exemple, que l'eau n'a pas perdu dans le vuide tout l'air qu'elle contenoit, ce qui mettroit encore une plus grande dissèrence entre le résultat de M. Hales & le mien. Je reviens maintenant à sa question qui fait l'objet principal de ce Mémoire.

S'il y a dans une rivière trente parties d'eau contre une d'air, il n'est guère probable que ce dernier sluide soit le principal vehicule du son qui ey transmet pour etre en droit de lui attribuer cette sonction, il saudroit avoir recours à des hypothèles qui sousirioient de grandes distreultes, & qu'il est inutile de prevenir ici par des raisonnemens, parce que l'expérience m'ayant appris que cela n'est point, je suis

dispensé d'examiner si cela peut être.

L'air n'est point nécessaire à la transmission des sons dans l'eau, il n'en est point par conséquent la cause principale si l'eau épuisée d'air n'en est pas moins propre à transmettre les sons, & si les sons qu'elle transmet n'en paroissent pas plus assoils. Pour m'assurer de ce fait je me disposai à placer des sons dans l'eau purgée d'air, ne voyant pas de moyens d'y placer s'or me de l'etile, ce que j'euste presert fans doute; mais comme je voulois faire cette épreuve asser en grand pour rendre les essets bien sensibles, au cas qu'il y en eût de nouveaux, j'appliquai à la machine du vuide en plusieurs sois environ 3 6 pintes d'eau de la Seine, en me servant de la préparation que je vais décrire.

Fig. 3.

AB est un vaisseau de verre capable de contenir environ 13 pintes d'eau, il est terminé haut & bas par deux parties cylindriques ouvertes de toute leur longueur & garnies de deux convercles de cuivre bien cimentez; le fond de celui qui est en A, est percé de deux trous, dont l'un reçoit le tuyau C, & l'autre par où l'on emplit le vase, se ferme avec un bouchon à vis qui presse une rondelle de cuir gras; au fond du couvercle B est soudé un tuyau garni d'un robinet, & ce tuyau aboutit au sond d'un grand sceau ou bacquet cylindrique

cylindrique de bois qui a environ un pied de diamètre & 14 pouces de hauteur; le vaisseau de verre est porté sur un trépied bien solide, il communique par le tuyau C avec le récipient d'une machine pneumatique auquel il est massiqué comme au sond du couvercle A, & de crainte qu'en faisant agir la pompe le mouvement ne dérange cet assemblé : à la nestatie rempre le tuyau qui est de verre, en arrete solidement le trépied & la machine pneumatique sur un même plan, de manière que l'une ne puisse se déplacer sans l'autre.

Tout étant ainst disposé, j'ai mis 1 2 pintes d'eau qui avoit bouilli, & qui avoit encore 3 5 degrés de chaleur, dans le vaitscau AB que j'ai bien terme entoite avec sen bouchon, & j'ai fait agir la pompe; lorsque les bouillons surent passez & que je n'aperçus plus de bulles d'air s'élever, je débouchai le vaisseau, j'ouvris le robinet du tuyau de décharge, & l'eau passa dans le bacquet : cette opération ayant été réitérée encore deux sois de suite, j'eus en dix heures de temps 3 6 pintes d'eau purgée d'air, qui n'avoit que 1 8 degrés de chaleur.

Ce n'est pas seulement pour opérer avec plus de commodité que je sis passer par un tuyau l'eau du vase AB dans un bacquet, cette attention me parut bonne pour empêcher que l'eau ne sût divisée, comme elle l'auroit été si je l'eusse versée ou laissé tomber, & qu'en repassant ainsi dans l'air avec beaucoup de surface elle n'en reprit une partie; je dois dire aussi que la superficie intérieure du bacquet avoit été mouillée pour empêcher que l'eau en s'élevant du sond, n'ensermât une couche d'air entr'elle & les parois.

Si l'on se rappelle maintenant ce que j'ai constaté par une expérience rapportée ci-dessus, qu'il faut cinq ou six jours pour faire reprendre à l'eau l'air qu'on lui a ôté, on conviendra sans doute qu'au moment où j'ai mis en épreuve les 3 6 pintes d'eau, on pouvoit les regarder comme purgées d'air, à moins qu'on ne vousût supposer que l'eau ne perd dans le vuide que sa moindre partie de son air, ce qui n'est

Mem. 1743.

pas probable, 1° parce qu'aucun autre procédé ne dégage de l'eau une plus grande quantité d'air; 2° en considérant ces particules d'air comme autant de petits ressorts tendus par le poids de l'atmosphere ou par la viscosite de l'eau, on doit concevoir qu'ils se développent & s'etendent quand l'une & l'autre de ces deux causes ne subtistent plu ; l. première cesse sans contredit par l'action de la pompe, & l'on ne voit pas que la feconde doive avoir grande force quand l'eau déjà dilatée par la chaleur, se divise de mille manières différentes par des bouillons & des élancemens qui durent presqu'autant que l'opération.

Figure 4.

Pour placer commodément le son au milieu de cette eau Veyez la purgée d'air, je fixai fur une plaque de plomb un peu épaisse un petit réveil dont j'ai coûtume de me servir pour les expériences des corps sonores dans le vuide; j'attachai par-delsus un petit récipient de machine pneumatique, & je suspendis le tout à une sicelle pour le faire plonger perpendiculairement dans le bacquet, de façon que le récipient & ce qu'il renfermoit, se trouvoient de toutes parts environnez de 4 pouces d'eau pour le moins.

> Dès la première immersion la question que je cherchois à résondre sut décidée, j'entendis sort bien le bruit du réveil, & s'il y avoit quelque différence entre le son communiqué par l'eau purgée d'air & celui qu'on entend par une eau ordinaire, ce ne pouvoit être que du plus au moins, voici ce

que je sis pour m'en assurer.

Dans un autre bacquet semblable au précédent je mis 3 6 pintes d'eau de la Seine à qui je sis prendre une température semblable à celle de l'eau purgée d'air, je sis plonger par une personne intelligente, dans ces deux bacquets succeffivement, le récipient qui contenoit le réveil, de manière qu'à l'exception de la circonstance de l'air tout étoit égal de part & d'autre; mais quelqu'attention que j'apportatle il ne me fut pas possible de remarquer aucune dissérence dans les sons, soit que je les écoutasse de près, soit que je me tinsse éloigné des corps sonores, il me parut toûjours que je les entendois de même à pareils degrés de proximité, & que je cessois de les entendre à des distances semblables.

Je répétai ces expériences la nuit pour jouir d'un plus grand calme, & pour n'avoir rien à craindre du préjugé je tis ecouter ces sons comparez par des personnes qui ne sçavoient pas quel étoit mon objet, & qui n'étoient pas prévenues sur la différence des deux eaux; leur décision acheva de me convaincre, & je regardai comme une chose absolument décidée que l'air n'est point nécessaire dans l'eau pour la propagation des sons, & que sa présence n'y augmente

point leur intenfité.

Si ce n'est point par les parties de l'air que les sons se sont entendre dans l'eau, c'est donc par celles de l'eau même qu'ils se propagent, car il est certain qu'on les y entend, & l'on ne voit rien autre chose dans le mélange de ces deux sluides à quoi l'on puisse attribuer cet esset; au reste pourquoi ne voudroit-on pas que l'eau pût transmettre les sons par elle-même, & sur quelle raison peut-on s'appuyer pour croire qu'elle en est incapable? La plus sorte & la seule peut-être qu'on puisse apporter, c'est qu'elle paroît incompressible, & que si elle l'est en esset, elle ne peut point avoir de ressort, qualité que l'on a toûjours cru absolument nécessaire pour recevoir & pour transmettre cette espèce de mouvement qui est essentiel au son.

Mais l'incompressibilité qu'on attribue communément aux liqueurs doit-elle se prendre dans un sens absolu, & n'abuse-t-on pas de cette expression quand on l'emploie pour faire entendre qu'aucune sorce sinie n'est capable de replier l'eau sur elle-mème? L'Académie del Cimento l'estaya de plusieurs manières, elle sit agir le ressort de l'air, celui des vapeurs dilatées par le seu, le poids des fluides & la percussion; il est vrai qu'après toutes ces tentatives elle déclare qu'elle n'a jamais pû diminuer le volume de l'eau en la comprimant, quoiqu'elle ait fait agir des sorces mille sois peut-être plus grandes qu'il n'en saudroit pour condenser l'air trente sois plus qu'il ne l'est dans l'atmosphère. Mais que

Ee ij

peut-on conclurre de là, finon que l'eau réfitle à de trèsgrandes forces, & que celles qu'on a employées n'ont point été suffisantes pour la condenser sensiblement? on doit préfumer que les Académiciens de Florence n'ont rien voulu dire autre chose, par ces paroles qu'on lit à la fin de l'article où ils rapportent ces expériences: « Nous ne pouvons pas atsurer, disent-ils, si nous aurions pû parvenir ensin à comprimer l'eau enarépétant nos épreuves dans des vaisseaux plus

· folides & avec des forces plus grandes. »

Boyle & quelques autres Phyficiens ont tenté pareillement de comprimer l'eau dans des boîtes de métal bien fermées, sur lesquelles ils ont fait essort pour tâcher de diminuer leur capacité. Il paroît à la vérité qu'ils se sont trompez en prenant pour des signes de la compression de l'eau ce qui ne devoit être attribué, selon toute apparence, qu'à la ductilité, ou bien au ressort des matières solides qui la contenoient; mais on en peut toûjours tirer cette conséquence, que des Auteurs d'une autorité considérable, bien loin d'admettre l'incompressibilité absolue de l'eau, ont cherché & ont cru voir des marques certaines du contraire, ce qui prouve incontestablement que cette doctrine n'est point aussi généralement reçue qu'on le pourroit croire, & qu'on peut la regarder comme un principe très-douteux sur sequel on ne doit rien établir.

Tous les corps folides que l'on connoît, les os, les métaux, les pierres les plus dures, se condensent ou changent de figure par compression, la raison qu'on en donne & qui est bien plausible, c'est que leur porosité permet aux parties de se rapprocher, & qu'elles ont encore assez de mobilité respective pour se déplacer les unes à l'égard des autres. Une liqueur n'est qu'un assemblage de petits corps solides, & tout nous porte à croire que ces petites masses sont poreuses, puisqu'elles se décomposent & se dissipent par l'action du seu, & que la liquidité d'une même matière augmente & diminue par les dissieres degrés de ténuité d'un se matieule. Sont late petitle. Pe augm à la même cause

(je veux dire la porofité) qui rend les grands corps compressibles, n'auroit-elle pas le même esset dans les petits? Il est vrai que la compressibilité doit décroître à mesure que les corps se divisent, & que leurs parties moins nombreuses laissent moins de vuides entr'elles; mais cette considération nous fait seulement apercevoir pourquoi les corps, toutes choses égales d'aisseurs, sont d'autant moins slexibles qu'ils sont plus petits, & par une conséquence naturelle on voit en même temps qu'une extrême ténuité, telle qu'on la doit admettre dans les parties des siquides, emporte avec elle un degré de roideur à l'épreuve des plus grandes sorces, & que l'instexibilité absolue ne peut convenir tout au plus qu'à des parties simples & primordiales à qui nous n'avons jamais assaire.

Au reste que les parties de l'eau soient compressibles & clastiques, comme il y a tout lieu de le croire, ou qu'elles fe comportent dans la transmission des sons comme ne l'étant pas, on voit également pourquoi les corps sonores ne se sont entendre que soiblement de l'air dans l'eau, car ce dernier sluide oppose aux vibrations de l'air plus de masse à mouvoir, ou des refforts moins flexibles, & l'une ou l'autre de ces deux causes sussit pour assoiblir beaucoup, & même pour faire cesser entièrement cette espèce de mouvement en quoi confiste le son; car d'un côté si l'eau est un obstacle inflexible, l'air qui la pousse ne peut continuer ses vibrations qu'en la déplaçant, & l'on voit assez qu'un pareil déplacement ne peut se faire sans rallentir ou sans éteindre presqu'entièrement le mouvement du fluide qui le cause. D'un autre côté si l'eau est élassique, on ne peut nier que son reffort ne soit plus roide que celui de l'air, & l'expérience nous apprend que plus un ressort a de roideur, & plus ses vibrations font fréquentes; dans cette dernière supposition l'air & l'eau ne peuvent donc pas faire & entretenir ensemble des vibrations isochrones, & l'on ne peut même les supposer rentrantes ou harmoniques qu'après des nombres fort grands,

fi l'on en juge par la différence qu'il doit y avoir entre les ressorts de ces deux sluides. C'est pour cette raison sans doute que les sons continus qui passent de l'air dans l'eau se sont mieux entendre que ceux dont la durée est très-courte, comme le bruit d'un pissolet, selon le résultat de la septième expérience; car puisque l'eau ne peut recevoir par l'air que des secousses momentances, & que les vibrations de l'un à l'autre milieu périssent dans le premier instant par le peu d'analogie qui est entre ces sluides, le son qui est transmis, quand il n'est pas l'esset d'un mouvement entretenu quelque temps par le corps sonore, ne fait sur l'organe qu'une impression très-soible, parce qu'elle dure très-peu.

On a vû par la fixième expérience, & je m'en suis encore mieux assuré depuis, que le même son transmis dans l'eau s'entend presqu'également à 4 ou à 18 pouces de profondeur; n'est-ce point une preuve que l'assolibilitément des sons se fait principalement à leur passage de l'air dans l'eau, & que quand ils sont une sois transmis dans ce nouveau milieu ils n'y soustrent plus d'autre altération que celle qui convient à tout mouvement dont l'activite s'etend en sorme de sphère? N'en peut-on pas insérer aussi que l'eau par rapport aux sons qu'elle transmet, fait moins l'office d'un obstacle que celui d'un milieu qui propage, car les atsoiblissemens qu'elle cause ne suivent point du tout la proportion des épaisseurs?

Mais si les sons s'assoiblissent en passant dans l'eau, parce qu'ils lui sont communique, par un sluide dont elle distère trop par la densité ou par le degré de ressort, n'y seroientils pas plus sorts si elle les recevoit immediatement du corps sonore? C'est une question qui me parut intéressante par rapport à l'ouse des poissons qui a été le premier objet de ce Mémoire, & sur laquelle je voulus m'instruire par des

experiences.

Je me plaçai dans une cuve de brasseur où je pouvois avoir de l'eau au dessus de la tête étant à genoux sur le fond,

& je me plongeai entièrement avec deux cailloux que je tenois dans mes mains, & que je heurtai à plufieurs reprifes l'un contre l'autre.

Le bruit de ces deux pierres me parut plus bref que dans l'air, mais d'une force qui étoit insupportable, je sentois sur tout le corps le frémissement imprimé à l'eau par le choc de ces deux corps durs, & à la tête une sorte d'ébranlement semblable à celui qu'on ressent lorsqu'on tient dans les dents un corps dur qui est heurté par un autre.

Je me servis ensuite de deux grosses cless & d'une sonnette dont je distinguai parsaitement bien les sons, & je remarquai que plus les corps étoient sonores, moins seur

impression étoit rude sur l'organe.

Lorsque je frappois un morceau de fer long de 1 o pouces ou environ, que je soûtenois par le milieu, je sentois pendant un espace de temps assez sensible les vibrations que le choc lui faisoit saire.

Enfin ces différens sons se transmettoient sort bien de l'eau dans l'air, & quoiqu'ils sussent alors beaucoup plus soibles, cet atsoiblissement ne croissoit pas comme l'épaisseur ou le volume d'eau qui couvroit le corps sonore; car lorsqu'on le tenoit à 8 ou à 15 pouces de prosondeur, à

peine les sons paroissoient-ils différer.

Ces dernières expériences font voir que l'affoiblissement des sons qui passent de l'air dans l'eau, n'est point une raison pour conclurre que les poissons soient sourds; car quand bien même ces animaux n'auroient pas l'organe de l'ouïe tel qu'il a coûtume d'être dans ceux qui vivent hors de l'eau, quand ils ne pourroient entendre que très-foiblement ou point du tout les sons qui naissent dans l'air & qui se transmettent dans leur élément, la Nature a pû mettre à prosit à leur égard ce frémissement que l'on ressent sur tout le corps lorsque le son naît dans l'eau même dans laquelle on l'écoute. Il pourroit se faire que les vibrations des corps sonores placez dans l'eau se communiquant, comme l'expérience le

fait connoître, par les parties de l'eau même, fissent leur impression sur quelque partie destince particulièrement à les ressentir & à les distinguer, & cette partie pourroit avoir toute autre conformation que celle d'une oreille, & être placée par-tout ailleurs qu'à l'endroit où l'on trouve cet organe dans les animaux terrestres. De cette manière les Poissons peuvent avoir un sentiment très-vif du bruit & des sons qui se passent dans le milieu qui leur est propre, & dont il leur importe le plus de connoître les dissérentes modifications.



ADDITION au Mémoire sur le Cas irréductible du troisième degré, imprimé dans le volume de l'année 1741, page 25.

Par M. NICOLE.

l'AI fait voir dans ce Mémoire que la réfolution compléte & générale du problème du Cas irréductible, se réduisoit à trouver les quatre formules qui exprimeroient les sommes de tous les termes du binome $a \mapsto r$, élevé à la puissance n, lesquels termes seroient pris de quatre en quatre.

C'est-à-dire, que la première formule doit exprimer la fomme des 1, 5, 9, 13, 17, &c. termes de la puissance n

du binome $a \rightarrow 1$.

Que la seconde formule doit exprimer la somme des 2, 6, 10, 14, 18, &c.

La troissème formule exprimer la somme des 3, 7, 11,

15, 19, &c.

Et la quatrième la fomme des 4, 8, 12, 16, 20, &c.

On trouvera dans celui-ci ces quatre formules générales, mais on n'en fera pas plus avancé pour la folution générale du Cas irréductible, car quoique ces quatre formules doivent repréfenter des grandeurs réelles, elles font composées de grandeurs réelles & de grandeurs imaginaires, & le mélange des unes & des autres est tel qu'on ne peut faire évanouir les quantités imaginaires que dans un feul cas, qui est celui qui faisoit l'objet principal du Mémoire auquel celui-ci sert d'addition.

Je ne me détermine même à donner ce nouveau Mémoire que pour empêcher ceux qui feroient encore tentez de chercher la folution générale du Cas irréductible par cette voie, de perdre à cette recherche autant de temps que j'y en ai perdu.

Mem. 1743.

Manière de trouver les sommes des termes pris de deux en deux & de quatre en quatre, d'un binome élevé à une puissance quelconque.

Soit élevé le binome a + 1 à la puissance n, on aura

$$a^{n} + n \times a^{n-1} + \frac{r \cdot \tau - 1}{1 \cdot 2} \times a^{n} + \frac{n \cdot \tau - 1 \cdot \dots - \tau}{1 \cdot 2 \cdot 3} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot 3} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5} \times a^{n} + \frac{r \cdot \tau - 1 \cdot \dots \tau}$$

Soit auffi élevé le binome a - 1 à la puissance n, on aura $a^n - n \times a^{n-1} + \frac{n \times n - 1}{1 \cdot 2} \times a^{n-2} - \frac{n \times n - 1 \times n - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} \times a^{n-3} + \frac{n \times n - 1 \times n - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} \times a^{n-3} + &c.$

la somme de ces deux suites est

$$2 \times \left[a^{n} + \frac{n \times n - 1}{1 \cdot 2} \times a^{n - 2} + \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \times a^{n - 4} + \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 5}{1 \cdot 2 \cdot \dots 6} \times a^{n - 6} + \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 7}{1 \cdot 2 \cdot \dots 8} \times a^{n - 8} + &c. \right]$$

& leur différence est

$$2 \times \left[n \times a^{n-1} + \frac{1 + n - 2}{1 + 2 + 3} \times a^{n-1} + \frac{1 + 4 - 1 \times 1 - 7 - 4}{1 + 2 + 1} \times a^{n-1} + \frac{1 \times 2 + 3}{1 + 2 + 1} \times a^{n-1} + 8C_{\bullet}\right]$$

D'où l'on voit que $\frac{1}{2} \times (a + 1)^n + \frac{1}{2} \times (a - 1)^n$ est égal à la somme des 1, 3, 5, 7, 9, 11, &c. termes du binome a + 1, élevé à la puissance n; & que $\frac{1}{2} \times (a + 1)^n - \frac{1}{2} \times (a - 1)^n$ est égal à la somme des 2, 4, 6, 8, 10, &c. termes du même binome a + 1, aussi élevé à la puissance n.

Soit encore élevé le binome $a \rightarrow V \rightarrow I$ à la puissance n, on aura

$$a^{n} - h \sqrt{-1} \times a^{n-1} - \frac{n \times n - 1}{1 \cdot 2} \times a^{n-2} - \frac{n \times n - 1 \times n - 2 \times y - 1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \times a^{n-3} + \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \times a^{n-4} - \frac{n \times \dots n - 4 \times y - 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \times a^{n-3}$$

Soit de même élevé le binome $a - \sqrt{-1}$ à la puilfance n, on aura

$$a^{n} - n \sqrt{-1} \times a^{n-1} - \frac{n \times n - 1}{1 \cdot 2} \times a^{n-2} - \frac{n \times n - 1 \times n - 2 \times \sqrt{-1}}{1 \cdot 2 \cdot 3} \times a^{n-1} - \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} \times a^{n-4} - \frac{n \times \dots n - 4 \times \sqrt{-1}}{1 \cdot 2 \cdot 3} \times a^{n-5} - &c.$$

la somme de ces deux dernières suites est

$$2 \times \left[a^{n} - \frac{n \times n - 1}{1 \cdot 2} \times a^{n-2} + \frac{n \cdot n - 1 \times n - 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \times a^{n-4} + \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 5}{1 \cdot 2 \cdot \dots 6} \times a^{n-6} + \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 5}{1 \cdot 2 \cdot \dots 8} \times a^{n-8} - &c. \right]$$

& leur différence est

$$2\sqrt{-1} \times \left[n \times a^{n-1} - \frac{n \times n - 1 \times n - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} \times a^{n-3} + \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 4}{1 \cdot 2 \cdot \dots 5} \times a^{n-5} - \frac{n \times \dots n - 6}{1 \cdot 2 \cdot \dots 5} \times a^{n-7} + &c.\right]$$

De la somme des deux premières suites on tire

$$1 \cdots \begin{cases} a^{n} + \frac{4 + n - 1}{1 + 2} \times a^{n-2} + \frac{n \times \dots n - 3}{1 + 2 \dots + 4} \times a^{n-4} + \frac{n \times \dots n - 5}{1 + 2 \dots + 6} \times a^{n-6} \\ + \frac{n \times \dots n - 7}{1 + 2 \dots + 8} \times a^{n-8} + \frac{n \times \dots n - 9}{1 + 2 \dots + 10} \times a^{n-6} + 80 \\ = \frac{1}{2} \times (a - 1)^{n} + \frac{1}{2} \times (a - 1)^{n},$$

& de leur dissérence on tire

$$2\cdots \left\{ \begin{array}{c} n \times a^{n-1} - \frac{n \times n - 1 \times n - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} \times a^{n-3} - \frac{n \times \dots n - 4}{1 \cdot 2 \dots 5} \times a^{n-5} + \frac{n \times \dots n - 6}{1 \cdot 2 \dots 7} \\ \times a^{n-7} - \frac{n \times \dots n - 8}{1 \cdot 2 \dots 9} \times a^{n-9} - \frac{n \times \dots n - 10}{1 \cdot 2 \dots 11} \times a^{n-11} - & & & & \\ = \frac{\tau}{2} \times (a - 1)^n - \frac{\tau}{2} \times (a - 1)^n. \end{array} \right.$$

De la somme des deux dernières suites on tire

$$3 \cdot \cdot \cdot \left\{ a^{n - \frac{n \times n - 1}{1 \cdot 2}} \times a^{n - 2} + \frac{n \times \dots n - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \times a^{n - 4} - \frac{n \times \dots n - 3}{1 \cdot 2 \cdot \dots 6} \times a^{n - 6} \right.$$

$$\left. + \frac{n \times \dots n - 3}{1 \cdot 2 \cdot \dots 6} \times a^{n - 6} + \frac{n \times \dots n - 3}{1 \cdot 2 \cdot \dots 10} \times a^{n - 10} + \text{S.c.} \right.$$

$$\left. = \frac{1}{2} \times (a + \sqrt{-1})^{n} + \frac{1}{2} \times (a - \sqrt{-1})^{n},$$

& de leur différence on tire

Si l'on ajoûte la première de ces quatre dernières suites à la troisième, il viendra

$$a^{n-1} = \frac{n \times \dots n-3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot +} \times a^{n-1} + \frac{n \times \dots n-7}{1 \cdot 2 \cdot \dots 3} \times a^{n-8} + \frac{n \times \dots n-11}{1 \cdot 2 \cdot \dots 12} \times a^{n-1}$$

$$- 1 - \frac{n \times \dots n-15}{1 \cdot 2 \cdot \dots 16} \times a^{n-16} + 8c. = \frac{1}{4} \times (a + 1)^n + \frac{1}{4} \times (a + 1)^n$$

$$- 1 - \frac{1}{4} \times (a + 1)^n + \frac{1}{4} \times (a + 1)^n.$$

Si l'on ajoûte la deuxième à la quatrième, on aura

$$-\frac{n \times ... n - 16}{1 \cdot 2 \cdot ... 17} \times a^{n-17} - \frac{8c}{4} \times (a - 1)^{n} - \frac{1}{4} \times (a - 1)^{n}$$

$$-\frac{1}{4^{n-1}} \times (a + \sqrt{-1})^{n} - \frac{1}{4^{n-1}} \times (a - \sqrt{-1})^{n}.$$

Si de la première on retranche la troisième, on aura

Et enfin fi de la feconde on retranche la quatrième, on aura $\frac{\pi \cdot n - 1 \cdot n - 2}{2} \times a^{n-3} + \frac{n \cdot \dots n - 6}{2} \times a^{n-7} + \frac{n \cdot \dots n - 10}{2} \times a^{n-1} + \frac{n \cdot \dots n - 14}{2} \times a^{n-1} + \frac{n \cdot \dots n - 14}{2} \times a^{n-1} + & (a-1)^n - \frac{1}{4} \times (a$

Les quatre formules qui expriment les termes pris de quatre en quatre, du binome a +- 1 élevé à la puissance n, sont donc

DESSCIENCES. 229

1...
$$\frac{1}{4} \times (a-1)^n - \frac{1}{4} \times (a-1)^n - \frac{1}{4^{\nu-1}} \times (a-1)^n - \frac{1}{4^{\nu$$

La première formule exprime la fomme des 1, 5, 9, 1;, 17, &c. termes de ce binome élevé à la puissance n.

La seconde est la somme des 2, 6, 10, 14, 18, &c.

La troisième celle des 3, 7, 11, 15, 19, &c.

Et la quatrième celle des 4, 8, 12, 16, 20, &c.

COROLLAIRI.

Si l'on suppose $a = \tau$, qui est le cas du Mémoire auquel celui-ci sert d'addition, ces quatre formules deviendront

Mais par ce Mémoire cité, on a vû que les quatre sommes cherchées étoient

$$\frac{1}{4} \times \left[(2)^{n} + (2)^{\frac{n+1}{2}} \right] \cdot \frac{1}{4} \times \left[(2)^{\frac{n+1}{2}}$$

$$\frac{1}{4} \times \left[2 \right]^{n} + \left[2 \right]^{\frac{n}{2}} \right] \cdot \left[2 \right]^{\frac{n}{2}} \cdot \left[2 \right]^{\frac{n}{2}}$$

En sorte que quand a = 1, soit que la valeur de n soit exprimée par un nombre pair ou impair, les quatre formules de ce cas qui renferment des imaginaires, peuvent se changer en quatre autres formules qui en sont délivrées; au lieu que pour toute autre valeur de a, quelle que soit la valeur de n indéterminée, les quatre formules générales qui sont embarrassées de grandeurs imaginaires, peuvent bien aussi en être délivrées, mais alors elles sont chacune exprimées par une suite d'un nombre infini de termes, dont on ne peut avoir les sommes autrement que par ces mêmes formules.

DISSERIATION

SUR LA CAUSE DU STRABISME

DES YEUX LOLCHES.

Par M. DE BUFFON.

E Strabisme est non sculement un désaut, mais une 19 Juin dissormité qui détruit la physionomie & rend désa- 1743. gréables les plus beaux visages; cette dissormité consiste dans la fausse direction de l'un des yeux, en sorte que quand un œil pointe à l'objet l'autre s'en écarte & se dirige vers un autre point. Je dis que ce défaut confiste dans la fausse direction de l'un des yeux, parce qu'en effet les deux yeux n'ont jamais tous deux ensemble cette mauvaise disposition, & que si on peut mettre les deux yeux en cet état dans quelque cas, cet état ne peut durer qu'un instant & ne peut pas devenir une habitude.

Le Strabisme ou le regard souche ne consiste donc que dans l'écart de l'un des yeux, tandis que l'autre paroît agir indépendamment de celui-là.

On attribue ordinairement cet effet à un défaut de correspondance entre les muscles de chaque œil, la dissérence du mouvement de chaque œil vient de la différence du mouvement de feurs muscles qui, n'agissant pas de concert, produifent la fausse direction des yeux louches; d'autres prétendent (& cela revient à peu près au même) qu'il y a équilibre entre les muscles des deux yeux, que cette égalité de force est la cause de la direction des deux yeux ensemble vers l'objet, & que c'est par le désaut de cet équilibre que les deux yeux ne peuvent se diriger vers le même point.

M. de la Hire & plusieurs autres après lui, ont pensé que le strabisme n'est pas caute par le defaut d'equilibre ou

de correspondance entre des muscles, mais qu'il provient d'un défaut dans la rétine; il prétend que l'endroit de la rétine qui répond à l'extrémité de l'axe optique, est beaucoup plus sensible que tout le reste de la rétine, que les objets ne se peignent distinctement que dans cette partie plus sensible, & que si cette partie ne se trouve pas correspondre exactement à l'extrémité de l'axe optique dans l'un ou l'autre des deux yeux, ils feront louches par la nécessité où l'on sera dans ce cas de les tourner de façon que leurs axes optiques puissent atteindre cette partie plus sensible & mal placée de la rétine. Mais cette opinion a été réfutée par plufieurs Physiciens, & en particulier par M. Jurin; & en esset il femble que M. de la Hire n'ait pas sait attention à ce qui arrive aux personnes souches lorsqu'elles ferment le bon œil, car alors l'œil louche ne reste pas dans la même situation, comme cela devroit arriver, si cette situation étoit nécessaire pour que l'extrémité de l'axe optique atteignit la partie la plus sensible de la rétine; au contraire l'œil se redresse pour pointer direclement à l'objet & pour voir distinctement, par conséquent l'œil ne s'écarte pas pour chercher cette partie prétendue plus sensible de la rétine, & il saut chercher une autre cause à cet effet. M. Jurin en rapporte quelques causes particulières, & il semble qu'il réduit ce défaut à n'être qu'une mauvaife habitude dont on peut fe guérir dans plufieurs cas; il fait voir aussi que le désaut de correspondance ou d'équilibre entre les muscles des deux yeux, ne doit pas être regardé comme la cause du strabisme, & en esset ce n'est qu'une circonstance qui même n'accompagne ce défaut que dans certains cas.

Mais la cause la plus ordinaire du strabisme, & dont perfonne, que je sçache, n'a fait mention, c'est l'inégalité de sorce dans les yeux. Je vais faire voir que cette inégalité, lorsqu'elle est d'un certain degré, doit nécessairement produire le regard souche, & que dans ce cas, qui est assez ordinaire, ce désaut n'est pis une mauvaise habitude dont on puisse se désaire, mais une habitude nécessaire qu'on est obligé de conserver pour

pouvoir le servir de ses yeux.

Lorfque

Lorsque les deux yeux sont dirigez vers le même objet, lorsqu'on regarde des deux yeux cet objet, si tous deux sont d'égale force, il paroit plus distinct & plus éclairé que quand on le regarde avec un seul œil. Des expériences affez aisées à répéter, ont appris à M. Jurin * que cette dissérence de * Fsay on vivacite de l'objet vu de deux yeux es aux ou d'un feul ceil, ind finet acest d'environ une treizième partie, c'est-à-dire, qu'un objet son, &c. vû des deux yeux paroît comme s'il étoit échiré de treize lumières égales, & que l'objet vû d'un feul œil paroît comme s'il étoit éclairé de douze lumières seulement; mais lorsque les yeux sont de force inégale, j'ai trouvé qu'il en étoit tout autrement, un petit degré d'inégalité sera que l'objet vû de l'œil le plus fort fera auffi diffinctement aperçu que s'il étoit vû des deux yeux; un peu plus d'inégalité rendra l'objet. quand it fera vû des deux yeux, moins diffinct que s'il est vû du feul œil le plus fort, & enfin une plus grande inégalité rendra l'objet vii des deux yeux, fi confus, que pour l'apercevoir distinctement on sera obligé de tourner l'œil foible & de le mettre dans une fituation où il ne puisse pas nuire.

Pour être convaincu de ce que je viens d'avancer, il faut observer que les limites de la vue distincte sont assez étendues dans la vision de deux yeux égaux; j'entends par limites de la vûe diffincle les bornes de l'intervalle de diffance dans lequel un objet est vu distinctement; par exemple, si une personne qui a les yeux également sorts peut lire un petit caractère d'impression à 8 pouces de distance, à 20 pouces & à toutes les distances intermédiaires, & si en approchant plus près de huit, ou en éloignant au delà de 20 pouces elle ne peut plus lire avec facilité ce même caractère; dans ce cas les limites de la vûe distincte de cette personne seront 8 pouces & 20 pouces, & l'intervalle de cette vûe distincte est depuis 8 à 20 pouces, c'est-à-dire, de 12 pouces. Quand on passe ces limites, soit en s'approchant, soit en s'éloignant, il se forme une penombre qui rend le caractère confus & quetquefois vacillant, mais avec des yeux de force inégale ces dimites de la vûe distincte sont fort étroites, car supposons

234 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE que l'un des yeux soit de moitié plus soible que l'autre. c'est-à-dire, que tandis qu'avec un œil on voit distinctement depuis 8 julqu'à 20 pouces, on ne puisse voir avec l'autre œil que depuis 4 pouces jusqu'à dix; alors la vision opérée par les deux yeux fera indittincte & confuse depuis 1 o pouces jusqu'à 20, & depuis 8 pouces jusqu'à 4, en sorte qu'il ne restera qu'un intervalle de 2 pouces, sçavoir, depuis 8 jusqu'à 10, où la vision pourra se faire distinctement, parce que dans tous les autres intervalles la netteté de l'image de l'objet vû par le bon œil est ternie par la confusion de l'image du même objet vû par le mauvais œil: or cet intervalle de 2 pouces de vue distincte en se servant des deux veux n'est que la fixième partie de l'intervalle de 12 pouces, qui est l'intervalle de la vûe distincte en ne se servant que du bon œil; donc il y a un avantage de 5 contre 1 à se servir du bon œil seul, & par conséquent à écarter l'autre.

On doit considérer les objets qui frappent nos yeux comme placez indifféremment & au hasard à toutes les distances différentes auxquelles nous pouvons les apercevoir, dans ces distances différentes il faut distinguer celles où ces mêmes objets se peignent distinctement à nos yeux, & celles où nous ne les voyons que confusément; toutes les fois que nous n'apercevons que consusément les objets, les yeux sont effort pour les voir d'une manière plus distincte, & quand les distances ne sont pas de beaucoup trop petites ou trop grandes, cet effort ne se fait pas vainement. Mais en ne faifant attention ici qu'aux distances auxquelles on aperçoit distinctement les objets, on voit aisément que plus il y a de ces points de distance, plus aussi la puissance des yeux par rapport aux objets est étendue, & qu'au contraire plus ces intervalles de vûe distincte sont petits, & plus la puissance de voir nettement est bornée; & lorsqu'il y aura quelque cause qui rendra ces intervalles plus petits, les yeux seront effort pour les étendre, car il est naturel de penser que les yeux, comme toutes les autres parties d'un corps organisé, combient to unles refferts de feur mechanique pour aufr avec

le plus grand avantage; ainst dans le cas où les deux yeux sont de sorce inégale l'intervalle de vûe distincte se trouvant plus petit en se servant des deux yeux qu'en ne se servant que d'un œil, les yeux chercheront à se mettre dans la situation la plus avantageuse, & cette situation la plus avantageuse est de ne se servir que du bon œil, & d'écarter l'autre.

Pour exprimer tous les cas, supposons que a-c exprime l'intervalle de la vision distincte pour le bon œil, & $b-\frac{bc}{a}$ l'intervalle de la vision distincte pour l'œil foible, b-c exprimera l'intervalle de la vision distincte des deux yeux ensemble, & l'inégalité de force des yeux sera $1-\frac{b-\frac{bc}{a-c}}{a-c}$, & le nombre des cas où l'on se servira du bon œil sera a-b, & le nombre des cas où l'on se servira des deux yeux, sera b-c; égalant ces deux quantités, on aura a-b=b-c ou $b=\frac{a+c}{c}$. Substituant cette valeur de b dans l'expression de l'inégalité, on aura

r — $\frac{\sqrt{a-1}}{a-c}$ ou $\frac{a-c}{2a}$ pour la mesure de l'inégalité lorsqu'il y a autant d'avantage à se servir des deux yeux qu'à ne se servir que du bon œil tout seul. Si l'inégalité est plus grande que $\frac{a-c}{2a}$, on doit contracter l'habitude de ne se servir que d'un œil; si cette inégalité est plus petite on se servira des deux yeux. Dans l'exemple précédent a=20, c=8; ainsi l'inégalité des yeux doit être $=\frac{3}{10}$ au plus, pour qu'on puisse se servir ordinairement des deux yeux; si cette inégalité étoit plus grande, on servit obligé de tourner l'œil soible pour ne se servir que du bon œil tout seul.

On peut observer que dans toutes les vûes dont les intervalles sont proportionnels à ceux de cet exemple, le degré d'inégalité sera toujours — Par exemple, si au lieu d'avoir un intervalle de vue distincte du bon œil depuis 8 pouces

236 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE jusqu'à 20 pouces, cet intervalle n'étoit que depuis 6 pouces à 15 pouces, ou depuis 4 pouces à 10, ou, &c. ou bien encore si cet intervalle étoit depuis 10 pouces à 25, ou depuis 12 pouces à 30, ou, &c. le degré d'inégalité qui fera tourner l'œil foible sera toûjours — Mais si l'intervalle absolu de la vûe distincte du bon œil augmente des deux côtés, en sorte qu'au lieu de voir depuis 6 pouces jusqu'à 15, ou depuis 8 jusqu'à 20, ou depuis 10 jusqu'à 25, ou, &c. on voie distinctement depuis 4 pouces ½ jusqu'à 18, ou depuis 6 pouces jusqu'à 24, ou depuis 7 pouces ½ jusqu'à 30, ou, &c. alors il faudra un plus grand degré d'inégalité pour saire tourner l'œil; on trouve par la formule que cette inégalité doit être pour tous ces cas — 3

Il suit de ce que nous venons de dire qu'il y a des cas où un homme peut avoir la vûe beaucoup plus courte qu'un autre, & cependant être moins sujet à avoir les yeux louches, parce qu'il faudra une plus grande inégalité de force dans ses yeux que dans ceux d'une personne qui auroit la vue plus longue; cela paroît assez paradoxe, cependant cela doit être: par exemple, à un homme qui ne voit distinctement du bon œil que depuis 1 pouce 1 jusqu'à 6 pouces, il faut d'inégalité pour qu'il foit forcé à tourner le mauvais œil, tandis qu'il ne faut que 3 d'inégalité pour mettre dans ce cas un homme qui voit distinctement depuis 8 pouces jufqu'à 20 pouces. On en verra aisement la raison si l'on fait attention que dans toutes les vues, foit courtes, foit longues, dont les intervalles sont proportionnels à l'intervalle de 8 pouces à 20 pouces, la mesure réelle de cet intervalle est ou 3, au lieu que dans toutes les vûes dont les intervalles sont proportionnels à l'intervalle de 6 pouces à 24, ou de 1 pouce \frac{1}{2} à 6 pouces, la mesure réelle est \frac{3}{2}, & c'est cette andree welle qui produit celle de l'inegalite, car cette melluq

237

étant toûjours $\frac{a-c}{a}$, celle de l'inégalité est $\frac{a-c}{a}$, comme on l'a vû ci-dessus.

Pour avoir la vûe parfaitement distincte il est donc nécessaire que les yeux soient absolument d'égale sorce, car si les yeux sont inégaux, on ne pourra pas se servir des deux yeux dans un affez grand intervalle, mais même dans l'intervalle de vûe distincte qui reste en employant les deux yeux, les objets seront beaucoup moins distincts. On a remarqué au commencement de ce Mémoire, qu'avec deux yeux égaux on voit plus distinctement qu'avec un œil d'environ une treizième partie; mais au contraire dans l'intervalle de vûe distincte de deux yeux inégaux, les objets aulieu de paroître plus distincts en employant les deux ye paroissent moins nets & plus mal terminez que quand on ne se sert que d'un seul œil; par exemple, si l'on voit distinctement un petit caraclère d'impression depuis 8 pouces jusqu'à 20 avec l'œil le plus fort, & qu'avec l'œil foible on ne voie distinctement ce même caractère que depuis 8 jusqu'à 15 pouces, on n'aura que 7 pouces de vûe distincte en employant les deux yeux; mais comme l'image qui se formera dans le bon œil sera plus forte que celle qui se formera dans l'œil foible, la sensation commune qui résultera de cette vision ne sera pas ausli nette que si on n'avoit employé que le bon ceil: j'aurai peut-être occasion d'expliquer ceci plus au long, mais il me suffit à présent de faire sentir que cela augmente encore le défavantage des yeux inégaux.

Mais, dira-t-on, il n'est pas sûr que l'inégalité de sorce dans les yeux doive produire le thabilme, il peut se trouver des souches dont les deux yeux soient d'égale sorce, d'ailleurs cette inégalité répand à la vérité de la consusion sur les objets, mais cette consusion ne doit pas saire écarter l'œil soible, car de quelque côté qu'on le tourne il reçoit toûjours d'autres images qui doivent troubler la sensation autant que la troubleroit l'image indittincle de l'objet qu'on regarde di-

rectement.

Je vais répondre à la première objection par des faits: j'ai examiné la force des yeux de plufieurs enfans & de plusieurs personnes souches, & comme la plupart des enfans ne sçavoient pas lire, j'ai présenté à plusieurs distances à leurs yeux des points ronds, des points triangulaires & des points quarrez, & en leur fermant alternativement l'un des yeux j'ai trouvé que tous avoient les yeux de force inégale; j'en ai trouvé dont les yeux étoient inégaux au point de ne pouvoir diffinguer à 4 pieds avec l'œil foible, la forme de l'objet qu'ils voyoient distinctement à 12 pieds avec le bon œil; d'autres à la vérité n'avoient pas les yeux aussi inégaux qu'il est nécessaire pour devenir louche, mais aucun n'avoit les yeux égaux, & il y avoit toûjours une dissérence très-sensible dans la dissance à laquelle is spere voi at leadigits, extra il difformes at toujours trouvé le plus foible. J'ai remarqué que quand on couvre le bon œil, & que ces louches ne peuvent voir que du mauvais, cet œil pointe & se dirige vers l'objet aussi régulièrement & aussi directement qu'un ceil ordinaire; d'où il est aisé de conclurre qu'il n'y a point de défaut dans les muscles, ce qui se confirme encore par l'observation constante que j'ai faite en examinant le mouvement de ce mauvais œil, & en appuyant le doigt sur la paupière du bon ceil qui étoit fermé, & par lequel j'ai reconnu que le bon œil suivoit tous les mouvemens du mauvais ceil, ce qui achève de prouver qu'il n'y a point de défaut de correspondance ou d'équilibre dans les yeux.

La feconde objection demande un peu plus de discussions je conviens que de quelque côté qu'on tourne le mauvais ce d'il ne l'ille plus d'admettre des images qui doivent un peu troubler la netteté de l'image reçue par le bon œil; mais ces images étant absolument dissérentes, & n'ayant rien de commun ni par la grandeur ni par la figure avec l'objet sur lequel est fixé le bon œil, la sensation qui en résulte est, pour ainsi dire, beaucoup plus sourde que ne seroit celle d'une image semblable. Pour le faire voir bien clairement, je vais rapporter un exemple qui ne m'est que trop fament, jui le desaut d'avoir la vue sort courte & les yeux

un peu inégaux, mon œil droit étant un peu plus foible que le gauche; pour lire de petits caractères ou une mauvaile écriture, & même pour voir bien distinctement les petits objets à une lumière foible, je ne me sers que d'un œil; j'ai observé mille & mille fois qu'en me servant de mes deux yeux pour lire un petit caractère je vois toutes les lettres mal terminées, & en tournant l'œil droit pour ne me fervir que du gauche je vois l'image de ces lettres tourner aufii & se separer de l'image de l'ecil gauche, en sorte que ces deux images me paroittent dans ditierens plans; celle de f'œil droit n'est pas plutôt séparée de celle de s'œil gauche, que celle-ci reste très-nette & très-distincte, & que si l'œil droit refle dirigé fur un autre endroit du livre, cet endroit étant different du premier me paroît dans un different plan, & n'ayant rien de commun ne m'affecte point du tout & ne trouble en aucune facon la vision distincle de l'ail gauche; cette fensation de l'ail droit est encore plus insensable si mon œil, comme cela m'arrive ordinairement en lisant. se porte au delà de la justification du livre & tombe sur la marge, car dans ce cas l'objet de la marge étant d'un blanc uniforme, à prine puis-je m'apercevoir, en y redechiffant, que mon ail droit voit quelque chose. Il paroit ici qu'en ccartant l'a il foible l'objet prend plus de netteté, mais ce qui va directement contre l'objection, c'est que les images qui sont différentes de l'objet, ne troublent point du tout la fensation, tandis que les images semblables la troublent beaucoup lorsqu'elle ne peuvent pas se réunir entièrement; au refle cette impossibilité de réunion parsaite des images des deux yeux dans les vûes courtes comme la mienne. vient moins de l'inégalité de force dans les veux que d'une autre cause, c'est la trop grande proximité des deux prunelles. ou, ce qui revient au même, l'angle trop ouvert des deux axes optiques qui produit en partie ce défaut de réunion, On fent bien que plus on approche un petit objet des veux, plus auffi l'intervalle des deux prunelles diminue, mais comme Il y a des bornes à cette diminution, & que les yeux sont

posez de saçon qu'ils ne peuvent saire un angle plus grand que de 60 degrés tout au plus par les deux rayons visuels, il suit que toutes les sois qu'on regarde de sort près avec les deux yeux, la vûe est satiguée & moins distincte qu'en ne regardant que d'un seul ceil, mais cela n'empêche pas que l'inégalité de sorce dans les yeux ne produise le même esset, & que par conséquent il n'y ait beaucoup d'avantage à écarter l'œil soible, & l'écarter de saçon qu'il reçoive une image dissérente de celle dont s'œil le plus sort est occupé.

S'il reste encore quelque scrupule à cet égard, il est aisé de le lever par une expérience très-facile à faire: je suppose qu'on ait les yeux égaux ou à peu près égaux, il n'y a qu'à prendre un verre convexe & le mettre à un demi-pouce de l'un des yeux, on rendra par-là cet œil fort inégal en sorce à l'autre; si l'on veut lire avec les deux yeux on s'apercevra d'une consusion dans les lettres causée par cette inégalité, laquelle consusion disparoîtra dans l'instant qu'on sermera l'œil ossusque par le verre, & qu'on ne regardera plus que

d'un œil.

Je sçais qu'il y a des gens qui prétendent que quand même on a les yeux parsaitement égaux en sorce, on ne voit ordinairement que d'un œil, mais c'est une idée sans fondement qui est contraire à l'expérience; on a vû ci-devant qu'on voit mieux des deux yeux que d'un seul lorsqu'on les a égaux, il n'est donc pas naturel de penser qu'on chercheroit à mal voir en ne se servant que d'un ceil lorsqu'on peut voir mieux en se servant des deux. Il y a plus, c'est qu'on a un autre avantage très-confidérable à se servir des deux yeux lorsqu'ils sont de sorce égale ou peu inégale, cet avantage confifte à voir une plus grande étendue, une plus grande partie de l'objet qu'on regarde; si on voit un globe d'un seul œil en n'en apercevra que la moitié, si on le regarde avec les deux yeux on en verra plus de la moitié, & il est aisé de donner pour les distances ou les grosseurs difsérentes la quantité qu'on voit avec les deux yeux de plus qu'avec un seul œil; ainsi on doit se servir & on se sert en effet

effet dans tous les cas des deux yeux lorsqu'ils sont égaux ou peu inégaux.

Au reste, je ne prétends pas que l'inégalité de sorce dans les yeux foit la feule cause du regard louche, il peut y avoir d'autres causes de ce désaut, mais je les regarde comme des causes accidentelles, & je dis seulement que l'inégalité de force dans les yeux est une espèce de strabisme innée, la plus ordinaire de toutes, & si commune que tous les fouches que j'ai examinez, sont dans le cas de cette inégalité; je dis de plus que c'est une cause dont l'esset est nécessaire, de sorte qu'il n'est peut-être pas possible de guérir de ce défaut une personne dont les yeux sont de sorce trop inégale. J'ai observé, en examinant la portée des yeux de plusieurs enfans qui n'étoient pas louches, qu'ils ne voient pas si loin, à beaucoup près, que les adultes, & que, proportion gardée, ils ne peuvent aussi voir distinctement d'aussi près, de sorte qu'en avançant en âge l'intervalle absolu de sa vûe distincte augmente des deux côtés, & c'est une des raisons pourquoi il y a parmi les enfans plus de louches que parmi les adultes, parce que s'il ne leur faut que $\frac{3}{10}$ ou même beaucoup moins d'inégalité dans les yeux pour les rendre louches lorsqu'ils n'ont qu'un petit intervalle absolu de vûe distincte, il leur faudra une plus grande inégalité, comme $\frac{3}{8}$ ou davantage, pour les rendre louches quand l'intervalle absolu de vûe distincte sera augmenté, en sorte qu'ils doivent se corriger de ce défaut en avançant en âge.

Mais quand les yeux, quoique de force inégale, n'ont pas cependant le degré d'inégalité que nous avons déterminé par la formule ci-detlus, on peut trouver un remède au strabisme; il me paroît que le plus simple, le plus naturel, & peut-être le plus efficace de tous les moyens, seroit de couvrir le bon œil pendant un temps, l'œil dissorme seroit obligé d'agir & de se tourner directement vers les objets, & prendroit en peu de temps cette habitude. J'ai ouï dire que quelques Mem. 1743.

Oculifica s'et sient fervi affez heureulement de cette pratique, mais avant que d'en faire usage sur une personne, il faut s'affarer du degre d'inegalite des veux, parce qu'elle ne reaffira jamais que sur des yeux peu inégaux. Ayant communiqué cette idée à plusieurs personnes, & entrautres à M. Bernard de Jussieu à qui j'ai lû cette partie de mon Mémoire, j'ai eu le plaisir de voir mon opinion confirmee par une expérience qu'il m'indiqua, & qui est rapporte Ch. N. 17.97 par M. Allen Medecin Anglois, dans fon Sway is ware je dan 1750. Medicine.

Il suit de tout ce que nous venons de dire que pour avoir la vue partaitement bonne, il faut avoir les yeux abfolument ¿zaix en force; que de plus, il faut que l'intervalle absolu soit fort grand, en soite qu'on puisse voir aussi-bien de fort près que de fort loin, ce qui dépend de la facilité avec la puelle les veux se contractent ou se dilatent, & changent de figure selon le besoin, car si les yeux ctoient solides, on ne pourroit avoir qu'un très petit intervalle de vue distincle. Il fait aussi de nos observations qu'un borgne à qui il reste un bon ceil, voit mieux & plus diffinctement que le commun des hommes, parce qu'il voit mieux que tous ceux qui ont les yeux un peu inégaux, & défaut pour défaut il vaudroit mieux être borgne que louche si ce premier defaut n'étoit pas accompagn' & d'une plus grande difformité & d'autres incommodités. Il suit encore évidemment de tout ce que nous avons dit, que les louches ne voient jamais que d'un œil, & qu'ils doivent ordinairement tourner leur mauvais œil tout près de leur nez, parce que dans cette situation la direction de ce maivais ceil est aussi coartée qu'elle peut s'être de la direction du bon ceil; à la vérité en écartant ce mauvais ceil du cort de l'angle externe la direction feroit aussi cloignée que dans le premier cas, mais il y a un avantage à tourner l'œil du côté du nez, parce que le nez fait un gros objet qui, à cette très-petite diffance de l'œil, paroît uniforme & cache la plus grande partie des objets qui pourroient être apereu. du mauvais ail, & par consequent cette situation

du mauvais œil est la moins désavantageuse de toutes.

On peut ajoûter à cette raison, quoique suffisante, une autre raison tirce de l'observation que M. W inflow a saite sur l'inégalité de la largeur de l'iris *, il assure que s'iris est plus étroite du côté du nez & plus sarge du côté des temples, en sorte que la prunelle n'est point au milieu de l'iris, mais qu'elle est plus près de la circonsérence extérieure du côté du nez; la prunelle pourra donc s'approcher de l'angle interne plus près que de l'angle externe, & il y aura par conséquent plus d'avantage à tourner l'œil du côté du nez que de l'autre côté, & le champ de l'œil sera plus petit dans cette situation que dans aucune autre.

* V. les Mén. de l'Ac. 1721.

Je ne vois donc pas qu'on puisse trouver de remède aux yeux louches lorsqu'ils sont tels à cause de leur trop grande inégulité de force, la feule chose qui me paroît raisonnable à propoler, seroit de raccourcir la vue de l'œil le plus fort, afin que les yeux se trouvant moins inégaux, on sut en état de les diriger tous deux vers le même point, sans troubler la vision autant qu'elle l'étoit auparavant; il suffiroit, par exemple, à un homme qui a 4 d'inégalité de force dans les yeux, auquel cas il est nécessairement louche, il suffiroit, dis-je, de réduire cette inégalité à 1 pour qu'il cessait de l'être. On y parviendroit peut-être en commençant par couvrir le bon ceil pendant quelque temps, afin de rendre au mauvais œil la direction & toute la force que le défaut d'habitude à s'en servir, peut lui avoir ôtée, & ensuite en faisant porter des lunettes dont le verre opposé au mauvais œil seroit plan & le verre du bon œil seroit convexe, insensiblement cet œil perdroit de sa force, & seroit par consequent moins en état d'agir indépendamment de l'autre.

En observant les mouvemens des yeux louches de plusieurs personnes, j'ai remarqué que dans tous les cas les prunelles des deux yeux ne laissent pas de se suivre assez exactement, & que l'angle d'inclination des deux axes de

l'œil est presque toûjours le même, au lieu que dans les yeux ordinaires, quoiqu'ils se suivent très-exactement, cet angle est plus petit ou plus grand à proportion de l'éloignement ou de la proximité des objets; cela seul suffiroit pour prouver

que les louches ne voient que d'un œil.

Mais il est aisé de s'en convaincre entièrement par une épreuve facile : faites placer la personne souche à un beau jour vis-à-vis une senêtre, présentez à ses yeux un petit objet, comme une plume à écrire, & dites-lui de la regarder; examinez ses yeux, vous reconnoîtrez aisement l'œil qui est dirigé vers l'objet; couvrez cet œil avec la main, & sur le champ la personne qui croyoit voir des deux yeux, sera sort étonnée de ne plus voir la plume, & elle sera obligée de redresser son autre œil & de le diriger vers cet objet pour l'apercevoir; cette observation est générale pour tous les louches, ainsi il

est sûr qu'ils ne voient que d'un œil.

Il y a des personnes qui, sans être absolument souches, ne laissent pas d'avoir une fausse direction dans l'un des yeux, qui cependant n'est pas assez considérable pour causer une grande dissormité, leurs deux prunelles vont ensemble, mais les deux axes optiques au lieu d'être inclinez proportionnellement à la distance des objets, demeurent toûjours un peu plus ou un peu moins inclinez, ou même toujours parallèles; ce défaut qui est assez commun, & qu'on peut appeller un faux trait dans les yeux, vrai-semblablement a souvent pour cause l'inégalité de force dans les yeux, & s'il provient d'autre chose, comme de quelqu'accident ou d'une habitude prise au berceau, on peut s'en guérir sacilement. Il est à remarquer que ces espèces de louches ont dû voir les objets doubles dans le commencement qu'ils ont contracté cette habitude, de la même saçon qu'en voulant tourner les veux comme les louches, on voit les objets doubles avec deux bons yeux.

En effet, tous les hommes voient les objets doubles, puisqu'ils ont deux yeux dans chacun desquels se peint une image, Se est tiell que par exprience Se par liabitude grion apprend à les juger simples, de la meme façon que nous jugeons droits les objets qui cependant sont renversez sur la rétine; toutes les fois que les deux images tombent sur les points correspondans des deux rétines sur lesquels elles ont coûtume de tomber, nous jugeons les objets simples, mais dès que l'une ou l'autre des images tombe sur un autre point, nous les jugeons doubles. Un homme qui a dans les yeux la fausse direction ou le faux trait dont nous avons parlé, a dû voir les objets doubles d'abord, & ensuite par l'habitude il les a jugé simples, tout de même que nous jugeons les objets simples, quoique nous les voyions en effet tous doubles: ceci ett confirmé par une observation de M. Folkes, rapportée dans les notes de M. Smith; if affure qu'un homme étant devenu louche par un coup violent à la tête, vit les objets doubles pendant quelque temps, mais qu'enfin il étoit parvenu à les voir fimples comme auparavant, quoiqu'il se servit de ses deux yeux à la fois. M. Folkes ne dit pas si cet homme étoit entièrement louche, il est à croire qu'il ne l'étoit que légèrement, fans quoi il n'auroit pas pû se servir de ses deux yeux pour regarder le même objet. J'ai fait moi-même une observation à peu près pareille sur une Dame qui, à la suite d'une maladie accompagnée de grands maux de tête, a vû les objets doubles pendant près de quatre mois; & cependant elle ne paroissoit pas être louche, finon dans des instans, car comme cette double sensation l'incommodoit beaucoup, elle étoit venue au point d'être louche tantôt d'un œil & tantôt de l'autre, afin de voir les objets simples, mais peu à peu ses yeux se sont sortifiez avec sa santé, & actuellement elle voit les objets simples, & ses yeux sont parfaitement droits.

Parmi le grand nombre de personnes souches que j'ai examinées, j'en ai trouvé plusieurs dont le mauvais œil au lieu de se tourner du côté du nez, comme cela arrive le plus ordinairement, se tourne au contraire du côté des temples; j'ai observé que ces souches n'ont pas les yeux aussi inégaux en sorce que les souches dont l'œil est tourné vers le nez, cela m'a sait penter que c'est la le cas de la mauvaire habitade

246 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE prife au berceau, dont parlent les Médecins; & en effet on conçoit aifément que si le berceau est tourné de saçon qu'il proente le cote au grand jour des senctres, l'ecil de l'enfant qui sera du côté de ce grand jour tournera du côté des temples pour se diriger vers la lumière, au lieu qu'il est affez duficile d'imaginer comment il pourroit se faire que l'ecil se tournât du côté du nez, à moins qu'on ne dit que c'est pour éviter cette trop grande lumière: quoi qu'il en soit, on peut toûjours remédier à ce désaut dès que les yeux ne sont pas de force trop inégale, en couvrant le bon œil pendant une quinzaine de jours.

Il est évident par tout ce que nous avons dit ci-dessus, qu'on ne peut pas être louche des deux yeux à la fois; pour peu qu'on ait réfléchi sur la conformation de l'œil & sur les usages de cet organe, on sera persuadé de l'impossibilité de ce fait, & l'expérience achevera d'en convaincre; mais il y a des personnes qui, sans être louches des deux yeux à la tois, sont alternativement quelquesois louches de l'un & ensuite de l'autre œil, & j'ai fait cette remarque sur trois personnes dissérentes, ces personnes avoient les yeux de force inégale, mais il ne paroissoit pas qu'il y eût plus de - d'incg dité de force dans les yeux de celle qui les avoit le plus inégaux. Pour regarder les objets éloignez, elles se servoient de l'œil le plus fort, & l'autre tournoit vers le nez ou vers les temples, & pour regarder les objets trop voisins, comme des caractères d'impression, à une petite distance, ou des objets brillans, comme la lumière d'une chandelle, elles se servoient de l'evil le plus soible, & l'autre se tournoit vers l'un ou l'autre des angles; après les avoir examinées attentivement, je reconnus que ce défaut provenoit d'une autre espèce d'inégalité dans les yeux; ces per-I unes pouvoient luc très diffinclement à 2 & à 3 pieds de diflance avec l'un des yeux, & ne pouvoient pas lire plus près de 15 ou 18 pouces avec ce même œil, tandis qu'avec l'autre a il elles pouvoient lire à 4 pouces de distance & à 20


& 30 pouces; cette espèce d'inégalité saisoit qu'elles ne se servoient que de l'œil le plus sort toutes les sois qu'elles vouloient apercevoir des objets éloignez, & qu'elles étoient sorcées d'employer l'œil le plus soible pour voir les objets trop voissins. Je ne crois pas qu'on puisse remédier à ce detaut, si ce n'est en portant des lunettes dont l'un des verres seroit convexe & l'autre concave, proportionnellement à la sorce ou à la soiblesse de chaque œil; mais il saudroit avoir sait sur cela plus d'expériences que je n'en ai sait, pour être sur de quelque succès.

J'ai trouvé plufieurs personnes qui, sans être louches, avoient les yeux fort inégaux en force, lorsque cette inégalité est très-confidérable, comme, par exemple, de $\frac{3}{4}$ ou de $\frac{4}{5}$, alors l'œil foible ne se tourne pas, parce qu'il ne voit presque point, & on est alors dans le cas des borgnes dont l'œil obscurci ou couvert d'une taie ne laisse pas de suivre les mouvemens du bon ceil; ainfi des que l'inégalité est trop petite ou de beaucoup trop grande, les yeux ne sont pas louches, ou s'ils le sont, on peut les rendre droits en couvrant dans les deux cas le bon œil pendant quelque temps, mais si l'inégalité est d'un tel degré que l'un des yeux ne serve qu'à offusquer l'autre & en troubler la sensation, on sera louche d'un feul ail sans remède, & si l'inégalité est telle que l'un des yeux soit presbite, tandis que l'autre est myope, on sera louche des deux yeux alternativement, & encore sans aucun remède.

J'ai encore vù des personnes que tout le monde disoit être louches, qui le paroitsoient en esset, & qui cependant ne l'étoient pas réellement, mais dont les yeux avoient un autre désaut, peut-être plus grand & plus dissorme, les deux yeux vont ensemble, ce qui prouve qu'ils ne sont pas louches, mais ils sont vacillans & ils se tournent si rapidement & si subitement qu'on ne peut jamais reconnoître le point vers lequel ils sont dirigez; cette espèce de vue égarce n'empêche pas d'apercevoir les objets, mais c'est toujours d'une manière

indiffincte; ces performes litent avec peine, & loriqu'on les regarde, l'on est fort etonne de n'aperecvoir quelquefois que le blanc de leurs yeux, tandis qu'elles difent vous voir & vous regarder, mais ce sont des coups d'est imperecptibles par lefquels elles aperçoivent; & quand on les examine de près on distingue aisément tous les mouvemens dont les directions sont inutiles, & tous ceux qui leur servent a reconnoître les

objets. Avant que de terminer ce Mémoire, il est bon d'observer une chose essentielle au jugement qu'on doit porter sur le degré d'inégalité de force dans les yeux des louches; j'ai reconnu dans toutes les expériences que j'ai faites, que l'œil louche, qui est teuj urs le plus foible, acquiert de la force par l'exercice, & que pluficuis perfonnes dont je jugeois le strabitme incurable, parce que par les premiers estais j'avois trouvé un trop grand degré d'inégalité, ayant couvert leur bon œil seulement pendant quelques minutes, & ayant par conséquent été obligées d'exercer le mauvais œil pendant ce petit temps, elles etoient elles-mêmes surprises de ce que ce mauvais œil avoit gagné beaucoup de force, en forte que, mesure prise après cet exercice, de la portée de cet œil, je la trouvois plus étendue, & je jugeois le fhrabitme curable; ainsi pour prenoncer avec quelqu'espèce de certitude sur le degré d'inegdite des veux & fur la possibilité de remedier au défaut des yeux louches, il faut auparavant couvrir le bon ail pendant quelque temps, afin d'obliger le mauvais ceil à faire de l'exercice & reprendre toutes ses forces, après quoi on sera bien plus en état de juger des cas où l'on peut esperer que le remede simple que nous proposons, pourra reussir.



SUITE DU MEMOIRE SUR LES REFRACTIONS.

Par M. CASSINI DE THURY.

Mars le dernier Mémoire que j'ai eu l'honneur de pré-fenter à l'Académie, je lui ai rendu compte du réfultat 1743. des remarques que j'avois faites fur les variétés que l'on obferve dans les hauteurs apparentes des Aftres; j'ai fait voir 1° qu'elles ne pouvoient être attribuées aux erreurs des obfervations; 2° qu'elles paroissoient avoir un rapport constant à la température de l'air, qu'elles étoient de la même quantité lorsque le degré du thermomètre étoit le même, qu'elles commençoient à croître ou à décroître selon que la liqueur montoit ou descendoit dans le thermomètre.

Le grand froid qu'il a fait en l'année 1742, qui a fort approché de celui de 1709, m'avoit fourni une occasion de determiner le maximum de ces variations en hiver, & j'ai profité de la chaleur que l'on a reffentie dans le mois de Juillet suivant, fort approchante de celle des années 1724 & 1738, pour trouver le second terme de ces variations, celui de l'été; j'ai suivi dans ces dernières observations le même ordre que dans les précédentes. Après m'être affuré par les voies ordinaires de l'état de l'instrument d'expérience, j'ai observé la hauteur du Soleil & de différentes Étoiles, depuis la hauteur de 4 degrés jusqu'à celle de 60 ; comme la plûpart de celles que javois observées pendant l'hiver, passoient alors de jour au méridien, je n'ai pû avoir des observations correspondentes que de quelques-unes, telles que Sirius, Arcturus, la Chévie & la Lyre, que l'on peut découvrir en tout temps à leur passage au méridien.

Quoique la hauteur des Fixes varie sensiblement dans le cours d'une année, cependant comme cette variation depend

Mem. 1743. . li

.

de deux cautes connues, dont l'une est l'effet de l'aberration. & l'autre de la précession des équinoxes, il est certain qu'on past representer avec exactitude feur hauteur apparente pour un temps quelconque, ayant égard à la dissérence que doit produire la combinaison de ces deux mouvemens; l'on trouve, par exemple, que la hauteur de Sirius a dû par l'effet de ces deux mouvemens, être observée plus grande de 6" dans le mois de Juillet que dans le mois de Janvier, celle d'Arcturus plus grande de 10" dans le mois de Juin que dans le mois de Février, celle de la Chévre moindre de 15" dans le mois d'Août que dans le mois de Février, & enfin celle de la Lyre plus grande de 21" dans le mois d'Août que dans le mois de Février; ainsi après avoir sait les corrections nécessaires aux observations des hauteurs des étoiles faites dans des temps éloignez, la différence que l'on y remirquera, appirtient à quelque cause dont la recherche est l'objet de ce Mémoire.

Ávant d'exposer ici nos observations, il est bon de saire remarquer que les grandes chaleurs de l'année 1742 ont commencé dans le mois de Juin, que pendant tout ce mois la liqueur de l'ancien thermomètre de M. de la Hire, à 7 heures du matin, qui est l'heure où M. Maraldi en sait l'observation, a toûjours été au dessis de 50 parties, ce qui est une marque de grande chaleur; qu'elles ont duré pendant tout le mois de Juillet; que le 3 de ce mois à 3 heures après midi, temps de la plus grande chaleur, la liqueur du thermomètre s'est élevée à 80 parties, le vent étant sud-est : en 1724 elle étoit montée à 82 parties, & en 1738 à 82½, & seu M. Maraldi remarque que la chaleur de l'année 1724 et à peu pres en le aux plus grandes qui soient arrivées depuis 36 ans, le thermomètre n'ayant jamais surpassé ce terme.

Pour constater l'état de l'instrument & reconnoître ses variations pendant le temps de nos observations, nous avons employé principalement Arcturus dont nous devions saire usage pour trouver le temps du Solstice.

Le 22 Mai 17.42, jour que l'ancien thermomètre de M. de

la Hire étoit à 51 parties à 3 heures après midi, j'ai observé la hauteur d'Arcturus de 61d 44' o"; le 15 Juillet lorsque le même thermomètre étoit à 54 parties à 7 heures du matin. M. Maraldi a déterminé la hauteur de la même étoile de 61 d 44' 5", plus grande de 5" que dans la première observation: or, par le mouvement de cette étoile en aberration depuis le 22 Mai jusqu'an 15 Juillet, sa hauteur apparente a dû être augmentée de près de 10", & au contraire diminuée de 3" par fon mouvement en declinaison, la dissérence 7" est la quantité dont la hauteur apparente a dû être augmentée, qui diffère de 2" de celle qu'on a trouvée par les observations; il paroîtroit donc que l'instrument n'a pas varié sensiblement depuis le 22 Juin jusqu'au 15 Juillet, ce qui se trouve confirmé par les observations de la hauteur du Sofeil comparée à celle qui résulte des Tables, car le 24 Mai mon père a déterminé la hauteur apparente du bord inférieur du Soleil. de 61d 44' 3"; supposant sa déclinaison de 20d 47' 17" telle qu'elle est marquée dans la Connoissance des Temps, l'on trouve la hauteur apparente du même bord du Soleil de 61^d '41' 47", différente de l'observation de 1' 16": le 13 Juillet M. Maraldi a trouvé la hauteur apparente du bord supérieur du Soleil de 63d 19' 30; employant la déclinaison du Soleil & les autres élémens, tels qu'on les trouve dans la Connoissance des Temps, on aura la hauteur apparente du même bord du Soleil de 63d 18' 14", différente de 1' 16" de l'observation; ainsi les observations de la hauteur du Soleil s'accordent parfaitement à celles d'Arclurus, & prouvent que l'état de l'instrument étoit le même dans les mois de Mai & de Juillet, & que toutes les variétés que l'on y remarquera dans cet intervalle de temps, sont celles que je crois devoir attribuer à la dissérente température de l'air, ce que j'avois tâché de prouver par nos observations.

Le 12 Juin, un des jours de la plus grande chaleur, où à 3th après midi la liqueur de l'ancien thermomètre s'est élevée à 69 parties, j'ai observé la hauteur apparente du Soleil de 64th 37' 45"; selon sa déclination tirée de la Connoissance

des Temps, cette même hauteur résultoit de 64^d 36' 45"; ainsi entre l'observation & le calcul il ne se trouvoit plus qu'une minute de difference au lieu de 1' 16, conformement à l'effet de la chalcur qui devoit diminuer la hauteur

Pour reconnoître si le même effet avoit lieu dans la hauteur des étoiles, j'ai observé le même jour celle de Sirius de 24^d 49' 45", plus petite de 20" que celle que j'avois trouvée le 28 Mai de 24^d 50' 5"; la hauteur d'Arcturus de 61^d 43' 35", plus petite de 25" que dans l'observation du 22 Mai; la hauteur de \tau du Scorpion de 13^d 35' 50"; celle de 4 de la queue de 7^d 30' 25", de \text{A du Scorpion de 4^d 27'

5", & de la Lyre de 79d 44' 35".

apparente.

Le 23 Juin, un des jours du mois où la liqueur du thermomètre est descendue le plus bas & répondoit à 50 parties, j'ai observé la hauteur du bord supérieur du Soleil de 64ª 55' o"; on l'a trouvée par le calcul de 64d 53' 45", différente de 1' 15" de l'observation, & telle qu'on l'avoit trouvée dans l'observation du 24 Mai. Par la même raison les hauteurs des étoiles devoient paroître plus grandes que celles qu'on avoit observées le 12 Juin, & égales à celles que l'on avoit déterminées le 22 Mai, & c'est précisément ce que nous ont donné nos observations : nous avons trouvé la hauteur de Sirius de 24d 50' 15", plus grande de 30" que dans l'observation du 12 Juin; celle d'Arcturus de 61d 44. o", plus grande de 25" que celle qui a été observée le 12 Juin, égale à celle que l'on avoit déterminée le 22 Mai; la hauteur de + du Scorpion de 13d 36' 10", plus grande de 20" que le 12 Juin; celle de & du Scorpion de 7d 30' 40", plus grande de 15"; & celle de A du Scorpion de 4d 29' 15". plus grande de 10".

Enfin le 3 Juillet, jour de la plus grande chaleur auquel la liqueur de l'ancien thermomètre s'est élevée à 80 parties à 3 heures après midi, j'ai observe la hauteur du Soleil de 64⁴ 27' 0" ou 5"; supposant sa déclinaison de 22^d 59' 52"; l'on trouve la hauteur du bord superieur du Soleil de 64³ 25'

57", différente de 1' 3" de l'observation, plus petite de 12" que dans l'observation du 23 Juin lorsque la chaleur étoit moindre; nous devions aussi trouver les hauteurs des étoiles plus petites que celles qu'on avoit observées le 23 Juin, ce qui s'accorde aux observations suivantes. J'ai trouvé la hauteur de l'étoile τ du Scorpion de 13^d 35' 50", plus petite de 20" que le 23 Juin; celle de ε du Scorpion de 7^d 30' 15", plus petite de 25" que le 23 Juin; & celle de λ du Scorpion de 4^d 28' 50", plus petite de 25" que le 23 Juin.

Il paroît par le résultat de ces observations, qui toutes ont été faites dans le temps que la liqueur du thermomètre étoit près des termes de la plus grande chaleur, que le plus ou le moins ne laisse pas de produire un effet sensible sur l'instrument, ou, ce qui revient au même, sur les hauteurs apparentes des astres, lesquelles se trouvent affectées des variations qu'éprouve l'instrument ; c'est ce que l'on reconnoîtra avec plus d'évidence par la comparaison de la hauteur de quelques étoiles observées en hiver & en été. Je dois ici faire remarquer qu'après avoir vétifié avec un grand soin & dans un temps tempéré, l'instrument mural dont je me suis servi pour ces expériences, j'ai trouvé que depuis un an il donnoit constamment les hauteurs trop grandes de près d'une minute, & que toutes les variations qui sont au dessus ou au dessous de ce terme, ont toujours éte proportionnelles à la différente constitution de l'air.

Le 8 Janvier 1742 lorsque l'ancien thermomètre étoit à 13^d, j'ai observé la hauteur de Sirius de 24^d 5 1' 0"; le 12 Juin le même thermomètre marquant 69 parties, la hauteur de la même étoile a été trouvée de 24^d 49' 45", plus petite de 1' 15", mais par l'esset de l'aberration & de la précession des équinoxes, else auroit dû être observée plus grande de 6"; l'on aura donc 1' 21" pour la dissérence des hauteurs de l'hiver à l'été, qui répond à 56^d du thermomètre.

Le 22 Février le thermomètre étant à 28^d, M. Grant a observé la hauteur d'Arcturus de 61^d 44' 0"; le 12 Juin le thermomètre étant à 69 parties, j'ai observé la hauteur

de la même étoile de 614 43' 35', la différence est 25; mais par l'effet de l'aberration & de la precession des equinoxes su hauteur auroit du être observée le 12 Juin plus grande de 10" que le 22 Février, l'on aura donc 35" pour la dissérence de hauteur correspondante à 41 degres du thermomètre.

Le 21 Février le thermomètre étant à 25 parties, la hauteur de la Chévre a cté observée de 86^d 53' 15'; le 15' Août le thermomètre étant à 57 degres, la hauteur de la même étoile a été trouvée de 86^d 52' 50", moindre de 25", mais par l'effet de l'aberration & de la précession des équinoxes, cette dernière hauteur devoit être moindre de 15', la disserence est 10" qui répond à 32 degrés du thermomètre.

Enfin le 23 Février j'ai déterminé la hauteur de la Lyre, de 79^d 44′ 45″, le thermomètre étant à 28 degrés; le 9 Juillet le thermomètre marquant 56 degrés, M. Maraldi a obfervé la hauteur de la même étoile de 79^d 44′ 40″, moindre de 5′; mais par l'effet de l'aberration & de la précession des équinoxes, cette hauteur auroit du être trouvée plus grande de 21′ que le 23 Février, la somme 26 est la quantite de la variation correspondante à 28 degrés du thermometre.

Le résultat de ces dernières observations confirme donc ce que nous avions conclu des précédentes, que la hauteur des mêmes étoiles a toujours été observée plus petite en été qu'en hiver, & que la chaleur produit un esset contraire à celui que nous avions remarqué être occasionné par le froid.

Je n'étois propose de faire les mêmes expériences avec des instrumens à pied, qui, quoique moins fixes que les autres, doivent cependant être moins sujets aux altérations que cause la différente constitution de l'air, puisqu'ils sont indépendans de celles que doivent éprouver les tenons de fer & autres parties qui embrassent le corps de l'instrument, & le tiennent fixement arrêté contre un mur; mais joint à ce qu'il n'est pas possible d'observer dans le même temps à deux instrumens, il étoit nécessaire pour avoir des termes exacts de comparaison que toutes choses sussent égales de part & d'autre, c'est-à-dire, que l'instrument à pied suit de

255

même rayon que l'instrument fixe, pour qu'il se trouvât à peu près la même quantité de matière, & que d'ailleurs dans l'observation l'on put également approcher de la précision que l'on obtient plus aisément avec les grands qu'avec les petits instrumens, dont les divisions sont moins sensibles; j'ai jugé devoir attendre que le nouvel instrument que le sieur Langlois construit dans la même sorme & avec les mêmes soins que le Secteur, sût achevé pour tenter ces mêmes expériences dont je rendrai compte dans la suite.

Nous allons rapporter ici diverses autres observations que nous avons saites pour vérisser quelques élémens d'Astronomie.

Détermination du Solstice d'été de l'année 1742.

Le temps n'ayant pas été favorable pour faire les observations correspondantes d'Arcturus dans le temps qu'il étoit dans le même parallèle que le Soleil, nous avons supposé, pour trouver l'heure du Solstice, l'ascension droite apparente de cette étoile de 210^d 58′ 53″, telle qu'elle résulte des observations de l'année dernière dont j'ai rendu compte à l'Académie, & nous avons déduit les autres élémens des differences d'ascension droite entre cette étoile & le Soleil, déterminées le jour du Solstice, en cette manière.

Passage du d	entre du Sol u quart+de-c	leil par le erc'e fixe,	fil vertical	Paff	ige d'A	rAurus ne fil.	Différ, entre les paffages du Soleil & d'Arcturus.				
20 Juin	c	h 3'	$13''\frac{1}{2}$	8 h	10'	59"1	8 h	7'	45"3		
21 Juin		3	29	8	7	5 1/2			36 =		
22 Juin		3	44	8	3	$1.1^{\frac{1}{2}}$	7	_	17.		

Retranchant 90^d de 210^d 58′ 53″, ascention droite d'Arcturus au temps du Solstice, on aura la distance en ascension droite d'Arcturus au colure des Solstices, de 120^d 58′ 53″, plus petite de 0^d 15 5′ que la disterence d'ascension droite entre le Solcil & Arcturus le 21 Juin à midi; c'est pourquoi l'on fera, comme 1^d 2′ 24″ mouvement du Soleil en ascension droite du 21 au 22 Juin, est à 0^d 15′ 5″, ainsi 24 heures sont à 5^h 52′ 30″ du soir; d'où il résulte que le 21 Juin à 5^h 52′ 30″ du soir, la difference d'ascension droite entre Arcturus & le Soleil étoit de 120^d 58′ 53″, égale à la distance d'Arcturus au colure des Solstices; donc l'heure viaie du Solstice est arrivée le 21 Juin à 5^h 52′ 30″ du soir.

Détermination de la Hauteur Solsticiale.

Nous deduirons cette détermination, 1' des hauteurs du Soleil observées avec le Secleur de 6 pieds de rayon, quelques jours avant & après le Soltlice, 2 des observations que mon père a faites dans le même temps à la Méridienne.

Quoique la ligne verticale ou le zenith de notre Secteur ne varie pas fenfiblement, & qu'elle réponde environ à 264 23' 6" de la division, nous avons attention cependant de la verifier de temps en temps, & fur-tout lorsqu'il s'agit d'observations qui demandent une certaine précision.

Par les observations de la Lyre faites les 8, 9, 10 & 11 Juillet de cette année, nous avons trouvé le point du limbe correspondant à la hauteur de cette ctoile, d'un coté de 16646" 34", & de l'autre, de 36d39' 25" 11", la somme est 52d46' 11" 45", dont la moitié 26d23' 5" 52" est le 7énith de l'instrument, la difference à 16d6' 46 34' est 10d 16' 19" 18", distance de la Lyre au zénith.

Observations de la Hauteur du bord supérieur du Soleil.

	1	Poi	nt do	linbe.		Réd	ed	au Solft.	Haute	ur foli	liciale.
Le 16 Juin 1742.	1 d	1.1 '	50'	42"	mid.		5	41"	644	54	26'
Lc 17	I	13	52	45	bonne,	+-	3	43	6+	54	29
Lc 18	ī	15	20	20	méd.	+	2	10	64	54	25
Ic 19	1	16	30	41	rı l	ļ -	1	2	6.4	51	26
Lc 20	I	17	16	1.2	bonne.	+	0	19	64	54	30
Lc 21	1	17	36	32	Lonne.	+	0	1	64	54	3 I
Le 23	1	16	57	35	bonne.	+	0	39	64	54	3 1

Quoique les observations du 16, du 18 & du 19 Juin ne foient pas auffi exacles que les suivantes, & que seur resultat en diffère considérablement, nous avons jugé cependant devoir les rapporter, en faisant observer les circonstances de chaque observation; mais nous ne serons usage que de trois dernières, desquelles il résulte que la hauteur sossiticale du bord supérieur du Soleil est de 64^d 54′ 30″ ½; d'où l'on déduit l'obliquité de l'écliptique de 23 28 30½.

Examinons présentement ce qui résulte des observations faites à la Méridienne.

Lei	8 Juil	11	1110	n	p	ère	a	d	éti	err	ni	né	I:	1]	121	iteur	du e	centre
du Sole	il, de					۰		٠		ú	٠			٠	٠	6.1	36	; 2 '.
Le 19	de.															64	37	42
Le 20	de .											•				64	38	27
Le 21	de .					•		•			0	0			•	64	38	50=
Le 23	de .										•	٠		۰	•	6.1	38	10

Supposant la réfraction moins la parallaxe de 25", la hauteur du pole de Paris de 41^d 9' 50", l'on trouve la déclimison du Soleil

indicate data control												
	Déclinaison.	Redact, au Solflice Obl. quité de l'éclip										
Lc 18 Juin	23d 26' 17"	+ 2' 10"	234 28 27"									
Lc 19	23 27 27	+ 1 2	23 28 2)									
Le 20 %	23 28 12	+0 19	23 28 31									
Lc 21	23 28 35	+0 1	23 28 36									
I e 23												
Mem. 1743.			Kk									

En prenant un milieu entre ces cinq déterminations, l'on trouvera l'obliquité de l'écliptique de . . . 23^d 28' 3 1"½, qui ne dissère que d'une seconde de celle que l'on a déterdeminée ci-dessus.

Il nous reste ici à rendre compte de quelques observations des passages de la Lune au maridien, suites dans le maris de Juin de l'année 1742, dont les résultats m'ont paru si conformes à celui que donne le calcul des Tables que mon père vient de publier, que j'ai cru devoir les rapporter; en ctilet, dans treize observations faites dans une même lanaiton, l'on remarque à peine 3 minutes de différence entre le lieu calculé & celui qui est déduit de l'observation.

Jours.	Passage		Lune	D	éclinaile	20.	Lor	gitude.	Latitude.			
12	8 h	4	40"	24	7	17"	2224	10'	25"	3 d	47	48"
14	9	26	44	14	59	36	m 16	29	20	1	52	37
15	10	10	45	19	7	35	m 28	41	45	0	47	30
16	10	57	28	22	28	0	}) 1 1	2	20	0	20	20
17	1.1	47	5	24	47	25	++)23	3 I	55	I	28	28
19	0	39	0	25	51	15	70 6	16	58	2	32	25
20	I	32	12	25	34	25	2019	10	15	3	30	30
21	2	25	16	23	51	15	≈ 2	19	ó	4	17	50
22	3	17	1.2	20	48	0	≈ 1 2	42	0	4	52	15
23	4	7	24	16	34	10	≈29	19	30	5	10	45
24	4	55	55	1.1	23	10)(13	1.1	40	5	10	54
27	7	19	48	7	3	5	Y26	25	0.1	5	23	5
28	8	1 1	6	13	7	40	811	21	20	2	14	35

Il est à remarquer que nous avons déduit tous les élémens qui entrent dans ce calcul, des Tables de mon père.



OBSERVATIONS

BOTANICO-METEOROLOGIQUES

POUR L'ANNE'E M. DCCXLII.

Faites aux environs de Pluviers en Gâtinois.

Par M. DU HAMEL.

A VANT que de commencer le Journal il est bon de se rappeller que les mois de Novembre & de Décembre de l'année 1741 ayant été doux & suffisamment humides, les Bleds & les Seigles étoient très-forts, & que la saison avoit été très-favorable pour les plantations.

JANVIER 1742.

Le 1^{er} il tomba une pluie douce, il neigea le 2, & le 3 la gelée commença par un très-beau temps, qui continua jusqu'au 10 que le thermomètre de M. de Reaumur étoit à 12 degrés ½ au dessous de zéro. Ce jour-là il fit du brouillard le matin, & les arbres surent couverts de givre.

Le 1 1 le thermomètre remonta à 6 degrés, & il neigea. Le 1 2 il fit brouillard, & le thermomètre continua à remonter.

Le 13 & le 14 le temps étoit beau & doux, & les murailles devinrent humides.

Depuis le 15 jusqu'au 24, le ciel a été tantôt serein, tantôt couvert : il a neigé plusieurs sois, & le thermomètre a varié depuis 3 degrés au dessus de zéro jusqu'à 4 au dessous.

Enfin jusqu'au 1er Février le thermomètre a toûjours été àu dessus de zéro, de 3, 4, 5 ou 6 degrés.

Ainsi pendant ce mois qui a été le plus froid de l'année, le thermomètre a été 3 degrés \frac{1}{2} plus bas qu'en 1741.

Kkij

260 Memoires de l'Academie Royale FE'VRIER.

Le temps s'étant entretenu beau & doux jusqu'au 17, les ble de qui paroilloient avoir souffert de la gelec, ctoient bien rétablis & en fort bon état.

Le 18, le 19 & le 20 il tomba tantôt de la neige, tantôt

de la grêle, & il fit froid.

Le 21 le thermomètre étoit à 4 degrés au dessous de zéro, & la gelée continua en diminuant jusqu'au 24 qu'il

tomba une petite rosce qui venoit du midi.

Le 20 le vent tourna au Nord-ouest, & il tomba quelques ondées de neige & de grêle, ce qui dura jusqu'à la sin du mois, pendant lequel il tomba sort peu d'eau. Durant sa plus grande partie de ce mois il n'avoit pas gelé assez sort pour empêcher qu'on ne travaillât à la terre, c'est pourquoi les labours pour les Mars étoient avancez. Les perce-neiges sleurirent comme l'année dernière les premiers jours du mois, & les petits ellébores, de même que les noisetiers, vers le 12.

On commença à tailler la vigne dès le 5.

MARS.

Ce mois a commencé par de petites ondées froides. Il tomba même le 3 beaucoup de neige, mais le temps se remit au beau jusqu'au 13, le thermomètre étant tous les matins à 2, 3 ou 4 degrés au dessous de zéro, & le froid étoit trèsincommode, parce qu'il étoit accompagné d'un vent de Nord très-violent.

Le 13 il tomba une petite rosce, & le temps s'adoucit un peu, ce qui ne dura pas, car depuis le 14 jusqu'au 22 il gela tous les matins & pendant le jour; quand le soleil disparoissoit il saisait saoid, ce qui continua jusqu'à la sin du mois, excepté le 26 & le 27 qui surent beaux & doux; sans les ondées de neige dont j'ai parlé, il ne seroit pas tombé pendant tout le mois une goutte d'eau. La terre étoit donc sort sèche, & une partie des avoines qu'on avoit semées d'eau la paussière ne pouvoient sortir de terre saute d'eau &

à cause du froid; ainsi on discontinua de semer les terres qui étoient préparées pour recevoir les grains qu'on a coûtume de semer en Mars.

On vit quelques fleurs de violette dès les premiers jours de ce mois, mais le froid & la sécheresse rendirent cette sleur très-rare.

Malgré le froid on vit le 17 des chauve-souris, le 22 quelques sleurs d'abricotiers s'ouvrirent, & les formicaléo avoient déjà fait leur trémui & étoient à l'affût, où ils ne perdoient pas leur temps, car les fourmis étoient en campagne.

On est en état à la sin de ce mois de connoître les désordres qu'ont causez les gelées d'hiver, il est donc à propos

d'en dire quelque chose.

Les figuiers, les lauriers francs, les grenadiers, les laurier-cerifes qui n'ont pas été couverts, font morts; il a péri auffi beaucoup de perfit, de laitues d'hiver, & de broccolis; on a peu réchappé d'artichaux, l'olivier franc & l'alaterne panachée, quoique couverts, font morts.

On se souviendra que l'automne 1741 beaucoup d'arbres étoient rentrez en sève & avoient poussé de nouveaux bourgeons; il n'est pas étonnant que ces nouveaux bourgeons aient péri pendant l'hiver, puisqu'ils n'etoient pas, comme

on dit, aoustez.

Les liéges se sont dépouillez, les laurier-thyms, les romarins, les arbres de Judée & les jasminoides ont perdu

toutes les branches qui étoient un peu tendres.

Les chênes verds, les oliviers fauvages, l'acacia de Virginie, les cytifes, les cédres du Liban & de Virginie, les fuffets, les paliurus n'ont point fouffert, non plus que les charmilles nouvellement plantées & les cyprès qui étoient depuis plufieurs années en terre.

Mais les gelées du mois de Mars ont fait périr plusieurs cyprès que nous avions transplantez à la fin de Février.

Il est bon de remarquer que les saurier-cerises & francs, de même que les siguiers qui n'avoient pas etc endommagez

en 1740, ont péri cette année, pendant que les jeunes expres planter quelques années auparavant, & les chrimities nouvellement plantées, qui ont presque tous été gelez en 1740, n'ont point du tout été endommagez.

Le catalpa qui avoit souffert en 1740, a supporté cet hiver, quoique son jeune bois ne sût pas fort mûr cette année; il en a été de même des oignons de safran qui n'ont presque pas été endommagez en 1740, & qui ont presque tous péri cette année.

On peut remarquer à cette occasion que le froid de cette année a été plus violent que celui de 1740, mais qu'il n'a pas été d'aussi longue durée, ni accompagné d'autant de verglas.

Je viens de dire que presque tous les oignons de safran avoient été gelez cet hiver, cet article est trop important à la province du Gâtinois pour négliger de rapporter les circonstances de ce ruineux accident.

Anciennement, pour mettre les oignons de safran à l'abri de la gelée, on les plantoit à la profondeur d'un pied en terre. On s'est aperçu que les oignons que l'on plantoit moins protondement en fleurifloient mieux, fur tout quand les automnes étoient sèches; cette pratique étoit moins fatiguante pour les paysans, & permettoit de mettre du l'ilran dans des terres qui avoient peu de fond. Voilà bien de bonnes raifons pour engager à planter le safran à une moindre profondeur qu'on ne faisoit.

D'abord on s'est contenté de ne mettre plus les oignons qu'à 9 pouces de profondeur au lieu de 12, mais bien-tôt on en est venu a ne planter plus le safran qu'a 8, 7 & même

6 pouces de profondeur.

Pendant plusieurs années les hivers ont été doux, & on s'appliudiffoit d'avoir abindonné l'ancienne méthode; mais cette année on a bien reconnu combien celle-ci est dangereuse, il y en a qui n'ont pas réchappé un oignon, & les moins maltraitez en ont perdu la plus grande partie.

Les safrans qui étoient dans les terres rouges ont plus

soussert que ceux qui étoient dans les terres noires.

Ceux qui étoient le plus près de la superficie de la terre,

ont été le plus endommagez.

Les sasrans de trois ans ont aussi beaucoup plus souffert que ceux qui n'étoient plantez que de l'année, & cela parce que tous les ans les oignons de sasran s'approchent de la superficie de la terre d'un bon pouce, comme je le prouverai par quelques observations que j'ai saites à ce sujet, & que je rapporterai dans la suite.

AVRIL.

Le froid & la sécheresse ont continué jusqu'au 14.

Le baromètre a beaucoup descendu le 16, le 17 & le 18 il est tombé quelques rosées.

Le 19 & le 20 il tomba quelques ondées froides venant

du nord-ouest.

Le 21 il plut un peu.

Et le 28 le temps paroiffoit disposé à la pluie, il n'en tomba pas assez pour humecter la terre qui étoit extrêmement sèche.

Ainsi tout le mois sut encore sec & froid; néanmoins ces petites pluies sirent sortir de terre les avoines qui avoient été semées les premières, celles qui avoient été semées plus tard ne parurent que 10 ou 12 jours après, & ensin on se détermina à semer encore quelques avoines, des orges & des pois.

À l'égard des bleds ils étoient fort bas, mais ils étoient bien tallez, il fembloit qu'il ne leur falloit que de la chaleur

& de l'humidité pour faire des merveilles.

Le 3 presque toutes les vignes étoient taillées, les amandiers & les abricotiers étoient en pleine sleur.

Le 10 il y eut quelques sleurs d'abricotiers de gelées, &

il s'épanouit quelques fleurs de pêchers.

Les deux marroniers d'Inde que j'observe tous les ans, & qui ouvrirent leurs boutons en 1740 le 9 Avril, & en 1741 le 18 Mars, les avoient dans le même état cette année vers le 4 d'Avril.

Cette année comme la dernière, on a aperçu quelques hirondelles dès les premiers jours de ce mois, & on a été

ensuite long-temps sans en revoir.

Le 14 on entendit le rossignol & le coucou au bord de la fait, mais ces oileaux ne se surent entendre dans les bosquets de la plaine que sept ou huit jours plus tard.

Alors les abricotiers étoient désleuris.

Au reste la campagne étoit encore désagréable, puisqu'on voyoit beaucoup mains de verdure qu'a la sin de Decembre 1741, aussi les bestiaux souffroient-ils beaucoup.

Le 17 les boutons des pruniers étoient prêts à s'épanouir, de même que ceux des poiriers, & la vigne commençoit à

pleurer.

Le 21 il y avoit une partie des boutons de poiriers & de pruniers d'épanouis, les boutons des charmilles étoient fort gros, & les petites pluies qui fairment, firent paroitre

des morilles.

Quoiqu'il fût tombé un peu d'eau le 24 & le 25, le baromètre qui avoit été très bas les jours précedens, remonta, ce qui mortifioit fort, car les presetoient auffi fees qu'ils le font ordinairement au fort de l'hiver, & toutes les productions de la terre avoient un extrême besoin de chaleur & d'humidité. Néanmoins la vigne pleuroit beaucoup, & quoiqu'il gelat toutes les nuits, il y avoit plus de huit jours qu'on entendoit croasser les grenouilles, & qu'on avoit vû des couleuvres.

Le 28 malgré la variation du thermomètre le temps sembloit promettre beaucoup de pluie, il en tomba effectivement abondamment en quelques endroits, mais nous n'en eumes que peu, qui néanmoins fit, comme je l'ai dit, sortir de terre les avoines qui avoient été semées les premières, & reverdir ses prés.

MAI.

Le temps a continué à être froid & sec, le vent étant au nord jusqu'au 12 qu'il sit assez chaud.

Dès

Dès le soir on aperçut les premiers hannetons, & le 1 3 au soir il y en avoit une quantité prodigieuse. Ces animaux dévorèrent toute la verdure, d'abord des sycomores, ensuite des marroniers d'inde, ils se jetèrent après sur les érables, sur les charmilles & sur les pruniers, mais ils ne touchèrent point aux tilleuls ni aux ormes.

Les bleds étoient un peu bas, mais bien verds dans les terres rouges & un peu légères, ils étoient bas & jaunes dans

les terres blanches.

Ces fortes de terres, qui font les meilleures pour ce grain & qu'on appelle dans le pays, des terres froides, font plus tardives que les autres; ordinairement les bleds ne commencent à profiter dans ces terres que quand les chaleurs du printemps ont échauffé le fol, jusque-là les bleds n'y paroissent rien, mais quand ces terres ont été humeclées par les pluies d'Avril, & qu'il vient des chaleurs, les bleds y profitent admirablement bien, & ne tardent pas à devenir plus beaux que ceux des terres légères.

Le printemps étant sec & froid les bleds languissoient dans les bonnes terres, pendant qu'ils étoient assez beaux dans les

terres médiocres.

Je dis simplement que les bleds étoient afiez beaux dans les terres médiocres, car il n'est pas douteux que les pluies d'Avril qui sont si favorables aux prés, ne soient aussi trèsavantageuses pour les bleds, principalement pour la paille; voici ce que j'ai pû découyrir sur la cause de cette observation.

L'autonne quand le bled germe, il pousse en terre plusieurs racines, & peu de temps après il paroit à la superficie de la terre quelques seuilles. A ces premières seuilles & à ces premières racines il s'en joint d'autres, sur-tout quand l'automne est humide & douce. A l'endroit de l'insertion des seuilles & des racines il se forme une grosseur ou une espèce d'oignon, c'est de cette grosseur que partent de nouvelles racines & de nouvelles seuilles; pour peu que les gelées d'hiver soient un peu sortes, presque toutes les seuilles & presque toutes les racines d'automne périssent, il saut donc

Mem. 1743.

que l'apres d'ainnen dant j'ai pule, preduile de nouvelles feuilles & de nouvelles racines; c'est ce qui arrive ordinairement en Avril quand ce mois est doux & pluvieux, mais s'il est froid & sec, ce nacine printaniere ne se developpent que lentement & foiblement, & comme les seuilles ne protitent que proportionnellement aux rucines, il en resulte necessairement un retard qui est ordinairement très-préjudiciable aux bleds.

Mais, dira-t-on, quand la pluie ne viendroit qu'à la fin de Mai, ou même au commencement de Juin, ces racines ne se formeroient-elles pas comme en Avril? J'en suis tres perfuadé, mais rarement produiront-elles le même esset, parce que c'est à la fin de Juin que viennent ordinairement les grandes et aleurs qui détechent la paille, murissent le grain,

& arrêtent le progrès de ces plantes.

Ce n'est pas ici le lieu de rapporter toutes les circonstances des experiences que j'ai faites pour m'attorer de ce que je viens d'avancer, ainsi je me contenterai d'avertir, en attendant que je traite cette matière plus au long, que j'ai reconnu la première germination des grains en en semant sur de petits morceaux d'eponge qui flottoient sur l'eau, & que je me suis atsuré de ce qui arrivoit aux racines en arrachant du bled dans différentes saisons de l'année.

Quoi qu'il en soit, les bleds étoient jaunes dans les terres blanches extroides, & dans le terres plus legeres ils ctoient

bas, mais verds & fort drus.

L'herbe avoit un peu reverdi dans les prés, où elle formoit un tapis extrêmement ras.

Les avoines étoient levées à peu près aux deux tiers.

On ne put, à caute de la fécheretse, semer que peu de légumes, & ceux qui l'avoient été de bonne heure linquissoient.

Le 14 le temps étoit fort adouci & paroissoit disposé à l'orage, on crut même entendre quelques coups de tonnerre, mais dès le soir le vent retourna au nord, étant froid & violent, ce qui continua jusqu'au 17, que l'après midi le vent tourna à l'est sans cesser d'être froid & violent.

Le 18 après midi le vent tourna au sud, il mollit & amena une petite pluie douce.

Ce jour-là on entendit la tourterelle dans le bois.

Le vent & le froid n'avoient point empêché les hannetons de devorer la verdure, les fycomores de les maironiers d'inde étoient comme en hiver, & les érables, les charmes & les pruniers avoient perdu une partie de leurs feuilles.

La chaleur du 14 avoit fait paroître tout d'un coup une quantité de demoiselles, le froid les sit disparoître pendant quelques jours, mais on les revit le 18, de même que plu-

sieurs espèces de papillons & de chenilles.

Le 19 & le 20 le vent tourna au sud-ouest, & il tomba quelques rosces qui sirent du bien aux bleds & aux avoines.

Le 24 il tomba une petite pluie par un vent d'ouest.

La nuit du 25 il gela très-fort, on crut que tous les fruits étoient perdus, mais il n'y eut que les vignes qui furent légèrement endommagers: on n'en jugeoit pas de même dans le temps, on croyoit tout perdu, néanmoins la vendange a été affez abondante, comme on le verra dans la suite.

Voilà le quatrième mois qui a été froid & sec, car pendant ces quatre mois il n'est pas tombé plus d'eau qu'il en

tombe souvent dans le seul mois d'Avril.

Il y a eu pendant tout ce mois beaucoup de sièvres malignes, de sluxions de poitrine & de pleurches dangereus...

JUIN.

Le 1er il faisoit chaud & le temps étoit couvert.

Le 2 & le 3 il tomba des rosées extrêmement douces.

Le 4 il plut toute la journee affez abondamment, ce qui fit un grand plaisir, car les bleds, les avoines, les legumes & les prés en avoient également besoin.

Le 5 le temps fut couvert & frais.

Le 6 il faisoit très beau & chaud, ce qui continua jus-

qu'au 12.

Le 13 les bleds & les avoines premières semées étoient magnifiques, & l'herbe commencoit à pouffer dans les press

A l'égard des avoines qui avoient été semées dans la poufsière, elles étoient mal levées, & on ne comptoit pas qu'elles pûtsent jamais se réparer.

La vigne commença à seurir vers le 17.

Jusqu'au 19 les matinées & les soirées étoient fraîches, & les journées sort belles; néanmoins il passa sur un de nos vergers un brouillard qui dessécha toutes les seuilles & les bourgeons des arbres fruitiers.

Le 19 on commença à saucher les sainsoins qui étoient

fort bas.

La disette des sourrages embarrassoit beaucoup pour ramasser les sainsoins & pour acoller les vignes, car la botte de paille de seigle qu'on appelle dans le pays, de la gerbée, valoit douze à quinze sols, au lieu qu'elle coûte ordinairement deux à deux sols & demi.

Vers le 15, lorsqu'on ne voyoit presque plus de hannetons, parurent tout d'un coup les cantarides qui dépouillèrent tous nos frènes & nos chévre-seuilles.

Le 20 on vit des perdreaux qui ne pouvoient encore voler.

Le temps continua à être beau & sec jusqu'au 29, qu'il

étoit chaud & disposé à l'orage.

A Paris il s'éleva sur les cinq heures du soir un coup de vent violent qui ne dura qu'un instant, mais l'air sut dans le moment si rempli de poussière, qu'on se trouva comme au milieu d'un brouillard épais; il tonna & plut un peu, le sort de l'orage sut entre Sceaux & Argenteuil, où il tomba beaucoup de grêle.

Le 30 il tomba encore de la grèle qui fit beaucoup de tort à Aubervilliers, & qui endommagea Montmorency.

Revenons aux environs de Pluviers.

Le 26 on commença pour la première fois à cueillir la fleur d'orange, & la cerise hâtive de Montmorency étoit en maturité.

Malgré la sécheresse qui continuoit presque sans interauption depuis le 4 Juin, les bleds, les avoines premières

semées & les prés sembloient saire des merveilles; ce ten-

étoit sur-tout très-savorable à la sleur de la vigne.

On trouvoit peu d'herbe pour les vaches, mais elle étoit très-nourrissante, car celles qui en avoient à discrétion, donnoient du lait en abondance, & ce lait fournissoit une quantité surprenante d'excellent beurre, ce que les servantes de basse-cour regardoient comme une chose fort extraordinaire.

Enfin le 30 il tomba dans notre voifinage un peu de

grêle qui ne sit pas beaucoup de dommage.

JUILLET.

Le 2, & le 3 sur-tout, il sit une chaleur extrême, ce jourlà le thermomètre étoit à midi à 25^d au dessus de zéro, & à 4 heures du foir à 27 ½ par un vent de sud-est. On craignoit que cette grande chaleur n'endommageat les bleds & les avoines; mais sur les 3 heures du soir il s'éleva une nuée de mauvais présage qui venoit du sud-ouest, heureusement elle se sépara en deux, une moitié suivit la forêt & fondit en grêle sur l'extrémité de nos terres ; de ce côté-là le dommage que nous fouffrimes dans la paroisse de Vrigny ne sut pas considérable, mais celles de Linnier, Vérine, Beaune, Barville, &c. souffrirent extrêmement.

L'autre portion de la nuce ayant suivi la rivière d'Essonne, passa par-dessus le Monceau qui en soussirit peu, & alla tomber à Angeanville, Mallezerbe, Courance, &c. où

elle perdit tous les grains.

Il passa seulement par-dessus Denainvilliers une petite portion de la même nuée, qui fit beaucoup de dommage

dans notre voifinage où cette grêle tomba.

Toutes les portions de la même nuée étoient accompagnées d'un vent asfreux qui nous abattit beaucoup d'arbres, & causa bien du désordre à nos couvertures. Il tonna encore le 4 & le 5.

Le 6 par un même vent il s'éleva du même point de l'horizon une nuce pareille, qui se partagea de même & qui fondit en grêle presque dans les mêmes endroits que la 270 MEMOTRES DE L'ACADEMIE ROYALE première; nous en fumes encore quittes pour des coups de vent contrel ablec : on compte pres de cinquante parailles, qui font les unes absolument ruinées, & les autres fort endommagées par ces deux orages.

Le - il tonna encore, mais toutes les nuces suivirent la sorèt.

Les orages dont je viens de parler ayant couché l'herbe des prés, on se détermina le 9 à la faucher, quoique sans cet accident elle eût pû encore profiter.

Le besoin qu'on avoit de paille pour acoller les vignes, engagea le 12 à comper les seigles, quoiqu'ils sustent un peu

verds.

Il parut à peu près dans ce temps une grande quantité de ces petits papillons blancs qui furent fi abondans il y a quelques années, & qu'on n'avoit presque pas vûs depuis; ces papillons viennent de la chenille que M. de Reaumur a nommé la commune.

La vigne n'avoit pas coulé, & les verjus faisoient admi-

rablement bien.

Le 14 les bleds commençoient à jaunir, & comme il pleuvoit, le temps n'étoit pas propre à fanner les soins, ni à serrer les seigles qui étoient coupez.

On commençoit à avoir des abricots précoces & des

mûres en maturité.

Le 17 le temps qui étoit frais & humide, n'étoit pas favorable pour ferrer les foins, mais il l'étoit beaucoup pour les bleds.

On commença le 20 à couper les méteils.

Le 27 on commença à servir la plus hâtive de toutes les prunes.

10 UST.

On commença la moisson des bleds presque avec le mois. Il tomba le 5 une pluie qui sit encore du bien aux bleds qui étoient sur pied.

Il est presqu'inutile de rapporter qu'elle sut aussi très-

avantageuse aux avoines, aux pois, aux séves, &c.

Le 12 on voyoit quelques grains de verjus qui commençoient à tourner; mais les nuits étoient faiches, & il auroit fallu de la chaleur pour avancer la maturité de ce fruit, furtout parce que les vignes étoient fort garnies de feuilles.

Le 14 on fauchoit les avoines premières semées, quoique dans le même champ il y en eut de vertes, & d'autres qui étoient trop mures; c'est un inconvénient qui ne manque jamais d'arriver quand la sevée s'est saite en différens temps.

Il faisoit un vent considérable de nord, & un grand hâse

qui faisoit tomber beaucoup de fruits.

Le vent qui avoit été presque toûjours au nord depuis le commencement du mois, continua d'etre violent depuis le 14 jusqu'au 23. A en juger par le temps qu'il faisoit, on auroit cru être dans le mois de Novembre, ce qui étoit avantageux pour faire mûrir les avoines tardives, qui auroient féché sur pied avant que le grain eût été formé, si la saison avoit été aussi chaude qu'elle l'est ordinairement. On commençoit à perdre l'espérance d'avoir de bon vin, mon frère visita lui-même cinquante souches de vigne, sans trouver un seul grain qui fut tourné, & il remarqua que les grappes les plus avancées & les plus exposées au soleil n'avoient pas une demi-douzaine de grains qui tuffent rouges. On le plaignoit qu'il y avoit beaucoup de grains de verjus qui s'ouvroient au point de laisser apercevoir les pepins, étoit-ce le froid & le hâle qui produisoient cet accident, ou étoit-il produit par des infectes? Je sçais qu'au printemps & au commencement de l'été il y a quelquefois de petits scarabées qui produisent un inconvénient pareil, mais je ne suis pas certain fi ce sont de semblables animaix qui occasionnoient le désordre dont je viens de parler.

Il parut dans le mois de Juin beaucoup de vers qui deviennent de petits scarabées, qui mangèrent tout le parenchyme des seuilles des ormes, le vent & le hâle desséchèrent le reste, & ces arbres étoient avant la sève d'Août comme ils-

sont ordinairement à la sin de l'automne.

Le grand hâle avoit aussi brûlé toute l'herbe des préss

La prune de monsseur étoit en pleine maturité, & ses impossibles, la reine-claude & la peche magdeleine comme : coient à murir.

Ver la fin du moi. le temps l'adoucit, & le 20 il 1 l'ait

fort chaud.

Ensin les sièvres éphémères, la sièvre tierce & doubletierce, de même que les sluxions, surent assez communes pendant tout ce mois.

SEPTEMBRE.

Le commencement de ce mois jusqu'au 14 sut assez chaud, il y eut même des éclairs, un peu de tonnerre, des nuits douces, & des jours où le thermomètre monta à 22 degrés au dessus de zéro.

Il tomba aussi de temps en temps de la pluie qui sit beaucoup de bien au raisin, & qui mit en état de serrer les avoines.

Le raisin mûrissoit, & dans l'espérance qu'on avoit que ce temps favorable continueroit, on reprenoit l'espérance de faire de bon vin; mais le 14 le vent tourna à l'ouest, il plut & il sit sort sroid, ce qui sit tomber beaucoup de fruits.

Le 15 il ne plut pas, mais le froid continua.

Le 16 le froid augmenta.

Le 17 il gela, & le vent du nord devint violent.

Le 18 le temps fut couvert le matin, il s'adoucit, & la gelée ne fit aucun tort aux fruits ni aux feuilles de la vigne.

Le 19 le vent étant ouest-sud-ouest, le temps sut couvert

& fort adouci.

Le 20 le froid recommença, & il gela le 21, le 22 & le 23 au matin la terre étoit toute couverte de gelée blanche, 12 manimale plante, attint allez delleutes, n'en furent point endommagées.

Depuis le 24 jusqu'au 27 il sit de grands vents d'ouest,

& il plut.

Ce temps n'étoit guères avantageux pour la maturité des raisins, aussi étoient-ils encore sort verds, & plusieurs croyoient qu'il convenuit de le laister aux vigne, a autres approblems

qu'il

qu'il ne leur arrivat le même accident qu'en 1741, commencèrent leur vendange. Le 38 le vent tourna au nord, il

fit beau, mais le froid devint très-cuisant.

Il est bon de remarquer que malgré les gelées assez fortes dont je viens de parler, les vignes n'étoient point dépouillées & les raisins n'étoient point fanez ni pourris, ce qui arrive ordinairement après des gelées beaucoup moins fortes; au contraire, les grains groffissant considérablement se chaffoient les uns les autres. Voici à quoi j'ai cru devoir attri-

buer cette fingularité.

J'ai dit dans mon Journal de l'année dernière qu'il m'avoit toûjours paru que les arbres qui étoient encore en sève, réfiftoient plus aux petites gelées d'automne que ceux qui avoient perdu leur sève : or les végétaux qui étoient reflé dans l'inaction à cause de la grande sécheresse, reprirent sève quand la pluie eut suffisamment humeché la terre, les feuilles devinrent fermes & vigoureuses, & les raisins groffirent prodigieusement. La vigne étoit donc en sève, & par conséquent plus en état de se défendre des gelées qui l'auroient pû endommager dans d'autres circonstances.

Mais voilà des raifins qui font remplis d'eau & qu'on coupe avant que le Soleil ait pû préparer le fuç dont ils ne viennent que de se remplir, qu'en résultera-t-il à l'égard de la qualité du vin? c'est ce que je ferai sentir dans la suite. Il gela encore le 29 & le 30 par un vent de nord violent.

OCTOBRE

Le vent de nord devint moins violent dès le 1er de ce

mois, & le temps s'adoucit.

Une partie de ceux qui n'avoient pas voulu vendanger par le froid, commencèrent leur vendange; mais d'autres dans l'espérance qu'à la fin il viendroit de beaux jours, laissèrent leur raisin aux vignes.

Jusqu'au 14 le temps sut fort doux, il plut de temps en

temps & on eut de beaux jours.

Le 14 le vent tourna au sud-ouest & étoit violent, néan-Mem. 1743. . Mm

274 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE moins l'air étoit doux, ce qui dura jusqu'au 21. La fin du mois sur sort agréable, il tomboit de temps en temps des plaie chandes qui ctoient tres avantageules pour les semailles sans nuire aux vendanges.

Une partie des pèches tardives qui avoient été attaquées par les gelées du mois de Septembre, étant tombées, on les mit dans la fruiterie pour achever de mûrir, mais elles devinrent cotonneuses, au lieu que celles qui n'ayant pas soutiert de gelees, ctant rette aux arbres, furent sort honnes.

Le vin bouilloit très-lentement dans les cuves, & au lieu de jeter une grotie écume, épaitie & sale, comme il arrive souvent, on ne voyoit sur les cuves qu'une écume claire comme celle d'un sucre bien clarissé.

Le vin sut long-temps à se faire, & quand on le tira, au lieu d'être trouble comme il l'est ordinairement en pareil cas,

il étoit clair comme le vin qui est prêt à boire.

Les raisins fondoient tout en vin, il restoit peu de marc sur les pressoirs, le vin n'étoit ni verd, ni amer, ni acre, quoi-qu'il eût long-temps resté dans les cuves, & il avoit peu de couleur: voila encore de mauvais presages pour leur qualité, j'en parlerai dans la suite.

NOVEMBRE.

Le commencement de ce mois ne sut pas si beau que l'avoit été le précédent, le 5 il s'éleva un vent violent & il tomba un peu de grêle, ce qui dura jusqu'au 17; vers ce temps l'air s'adoucit & continua d'être tel jusqu'à la sin du mois, n'anmoins il y cut quelques coups de vent très-considérables, & assez abondamment de pluie.

Je n'ai point parlé de la récolte du safran, parce qu'il n'y en a point eu, mais la levce des bleds étoit charmante.

DECEMBRE.

Tout le courant de ce mois fut beau, doux & suffissement pluvieux pour la saison. L'eau qui avoit considérable

ment baissé dans les puits & dans les sources, augmenta un peu vers le 18. La gelée commença & elle continua en augmentant de sorce jusqu'à la fin du mois.

IDE'E GE'NE'RALE ET ABRE'GE'E

de la température de l'air, & des productions de la terre pendant toute cette année.

Le vent de nord a régné pendant toute l'année, le froid de l'hiver a été très-confidérable, les gelées du printemps ont continué jusqu'à la fin du mois de Mai; excepté quelques jours de Juillet & d'Août, & les 15 premiers jours de Septembre, l'été a été très-frais, les gelées d'automne ont commencé dès la moitié de ce mois, ainsi on peut dire en général que toute l'année a été très-froide.

Il n'est pas tombé beaucoup d'eau pendant le mois de Janvier, il n'en est presque pas tombé pendant les mois de Février, Mars, Avril & Mai, il en est venu un peu à la fin de Juin, & encore plus pendant le mois de Juillet, celui d'Août a été fort sec, & le reste de l'année a été dans un état moyen.

Le printemps a donc été extraordinairement sec, & toute

l'année a été peu pluvieuse.

Il y a cu au printemps quelques fievres m lignes, des pleuréfies & des fluxions de poitrine dangereuses. Il n'y a eu pour toutes maladies pendant l'été, que des fluxions & des fièvres intermittentes qui n'étoient point dangereuses, & je n'ai jamais vû moins de malades qu'il y en a eu cette automne, il y a cependant eu cette année des fruits de toute espèce en abondance, & en 1741 que les fruits étoient d'une rareté extrême, il y a eu des maladies épidémiques des plus sacheuses, & presque toutes vermineuses.

BLEDS.

Les fromens étoient très-forts avant l'hiver, les grandes gelées les ont arrêtez, la grande sécheresse & le froid du printemps ont fait qu'ils ont peu prosite pen lant cette saison, M m ij

sur-tout dans les terres blanches & sortes qu'on appelle des terres froides, heureusement que les chaleurs de Juin & de Juillet n'ont pas été assez considérables pour les dessécher, & qu'ils ont pû prositer des pluies qui sont survenues à la fin de Juin & au commencement de Juillet.

Néanmoins la paille est resté assez courte, mais le grain est beau, de bonne qualité, & il y en a assez abondamment; en général on peut dire que cette récolte est fort bonne. Il y paroit par le prix du bled, l'élite n'excède pas douze livres le sac, qui valoit plus de trente livres en 1741. Cependant les boulangers assurent que les farines de cette récolte ne boivent pas tant d'eau en pétrissant, que celles de l'année précédente, & ils évaluent cette dissérence à cinq pour cent : c'est ce qui ne manque pas d'arriver quand les années sont froides & les moissons humides.

AVOINES.

On se souviendra que la sécheresse du printemps a fait semer cette espèce de grain dans des temps bien dissérens, les plus tardives ne valent absolument rien, le grain n'ayant pû se sormer; celles qui ont été semées des premières, ont été beaucoup meilleures, & avec le secours des pluies de Juin & de Juillet, elles auroient été fort bonnes pour le grain si toute l'avoine d'un même champ avoit levé & mûri dans le

même temps.

En distinguant les avoines de cette année en 3 classes, suivant le temps où elles ont été semées, on peut dire que les premières rendront peu de fourrage, mais raisonnablement de grain de bonne qualité; que les secondes sont meilleures pour le sourrage, mais qu'elles ne rendent pas tant en grain, & que ce grain n'est pas si bon; à l'égard des troissèmes, qui sont les plus tardives, le grain n'en vaut absolument rien. Ce qui prouve que cette récolte n'a pas été abondante, c'est que l'avoine coûte actuellement au marché cinq à six livres de sac, au lieu que dans les bonnes années elle ne vaut que trois livres dix sols ou quatre livres.

MENUS GRAINS ET LÉGUMES.

La paille des seigles a été assez longue, mais le grain n'a été ni abondant ni beau, peut-être parce qu'on les a coupez

un peu verds pour les raisons que j'ai dites.

Les orges ont très-mal réuffi, elles ont épié au raz de terre, & le grain est retrait & mal conditionné. Il n'y a eu ni pois, ni vesce, ni lentille, la récolte des féves a été abondante, mais elles sont fort petites.

Les menus légumes ont bien réussi dans les potagers qui

ont été à portée d'être arrosez.

Les melons ont été fort beaux, mais il n'y a eu que ceux qui ont muri de bonne heure qui aient été passablement bons.

FRUITS.

Il y a eu abondamment de fruit rouge, de prunes, d'abricots, de pêches & de poires, la pomme n'a pas donné aussi abondamment; il y a eu assez de noix qui ne valent rien, même pour faire de l'huile, médiocrement de châtaignes & de genièvre, point du tout de gland, les érables & ses charmes ont donné beaucoup de graines.

J'ai dit que tous les figuiers avoient été gelez l'hiver, ainst il est inutile de rapporter qu'il n'y a point eu du tout

de figues.

On sera sans doute surpris qu'il y ait eu tant de fruits cette année quand on sera attention à la rigueur du printemps, on en a probablement l'obligation à la grande sécheretse de cette saison, qui a empeche les désordres de la gelée.

FOINS.

Les fainsoins & les soins étoient très-bas quand on les a fauchez, & on n'en a presque pas plus recueilli que l'année dernière, mais cette petite récolte est de bonne qualité.

VINS.

La vendange a été tardive, comme je l'ai remarqué, & M m iij

les raisins ont été nourris d'eau dans le temps de seur masurité; quand on les a coupez il faisoit froid, & quoiqu'ils ne paruffent pas fort mûrs, ils n'avoient pas beaucoup d'acidité, ils n'étoient pas non plus aussi sucrez qu'ils le sont dans les bonnes années; le vin a été long-temps à le faire dans la cuve, il a peu bouilli, il ne s'est pas fort échaussé. il a jeté peu d'écume qui étoit fort claire au lieu d'être bourbeule comme elle l'est ordinairement, & quand le vin a été fait, il étoit au fortir de la cuve clair comme presque quand on le boit; il n'avoit pas beaucoup de verdeur ni une certaine amertume qui caraclérise les bons vins, tout cela annonçoit dès le temps de la vendange, que ces vins seroient de médiocre qualité, ils le sont en effet; néanmoins comme on a été obligé de faire deux cuvées, il s'ensuit qu'on a des vins de deux qualités, ceux de la première cuvée sont verds & n'ont pas beaucoup de couleur, ceux de la seconde cuvée font moins verds & ont plus de couleur; on espère cependant que la verdeur des vins premiers faits se tournera en force.

Dans une épreuve que nous avons fait faire dans une brûlerie que nous avons dans la forêt d'Orléans, il a fallu fept poinçons de vin blanc de Rebrechien pour en avoir un d'eau de vie, au lieu que dans les bonnes années on auroit eu cette même quantité d'eau de vie avec quatre pièces & demie de ce vin; il est vrai qu'ils ont beaucoup de liqueur, il est probable qu'ils fourniront plus d'eau de vie quand cette liqueur sera passée.

On peut donc regarder la récolte de cette année comme avantageuse pour la quantité, puisque les vignes ont sourni à peu près dix pièces l'arpent, mais la qualité des vins est

médiocre.

CHANVRE.

In sécheresse, les gelées du printemps n'ont pas été savorables au chanvre.

ABEILLES.

Le succès du travail des abeilles dépend en partie de la réussite des sleurs de la campagne, le sainsoin & les prés ont mal réussit, il n'y a point eu d'herbe dans les prés, il y a donc cu peu de sleurs cette année; d'où l'on peut conclurre que le travail des abeilles n'a pas été fort avantageux.

GIBIER.

Il y a eu médiocrement de perdrix, une quantité prodigieuse de lievres, fort peu d'alouettes & presque point de cailles, ce qui arrive presque toujours quand le vent de nord regne dans la saison où ces oiseaux de passage arrivent dans nos pays.

PLANTATIONS ET SEMIS.

Les femis & les plantations que nous avons fait faire à la fin de 1741 & au commencement de 1742, n'ont pas bien réuffi, tant à cause de l'énorme sécheresse du printemps, qu'à cause de la fraîcheur de cette saison: il ne nous est pas mort à la vérité beaucoup d'arbres, mais tous ont poussé très-soiblement.

Il n'y a point eu cette année de mortalité sur les bestiaux,

non plus que sur les volailles.

Suivant une lettre que m'a écrite M. Gautier Médecin du Roy à Quebec, la recolte a été très médiocre en Canada, à caufe des chaleurs de l'ete, qui ont eté fi grandes qu'elles ont fait monter le thermomètre de M. de Reaumur à 24 degrés au dessus de zéro; cet instrument étoit exposé au nord.

La paille des bleds a été menue & courte, ce qu'il y avoit d'épis étoit bien guni de grain, mais les pluies continuelles qui tombèrent un peu avant & dans le temps où on auroit dû faire la récolte, obligèrent de laiffer les bleds fur pied, quoiqu'ils futfent plus murs qu'il ne talloit pour les ferrer; la paille le noircit, les épis s'ouvrirent, & il furyint

des vents violens qui firent tomber beaucoup de grains : on estime que cette récolte n'excède pas le tiers d'une bonne an ac; le grain est d'ariez bonne qualité, quoiqu'il soit un peu retrait & cchaudé. Les bleds qu'on a recueillis sur les bords du fleuve Saint-Laurent sont un peu mouchetez ou charbonnez.

La récolte a été meilleure du côté de Montréal, parce qu'elle le l'ait de meilleure heure, le clim it y ctant plus chaud que celui de Quebec: c'est aussi pir cette raison que les fruits, pommes, poires, raisins, cerises y ont assez bien mûri, tandis qu'ils ne l'ont fait qu'imparfaitement a Quebec.



OBSERVATION

DU PASSAGE DE MERCURE

SUR LE DISQUE DU SOLEIL,

Faite à l'Observatoire Royal le 5 Novembre 1743.

Par M. MARALDI.

E 5 Novembre, le cicl étant screin, je commençai dès 20 Décemb. les 8 heures du matin à regarder le Soleil avec une 1743. lunette de 1 6 pieds, il n'y avoit aucune tache sur son disque, mais il étoit extrêmement ondoyant, & ses bords ne paroiffoient pas terminez.

A 8h 39' 46", temps vrai, j'aperçus Mercure qui entroit fur le Soleil.

A 5h 40'46" je jugeai qu'il étoit entièrement entré, & que fon bord ratoit celui du Solcil; il étoit rond, bien terminé, & je n'apercus autour de fon difque aucune nébulofité; le Soleil ctoit encore bien ondoyant, & fa circonférence mal terminee.

Je me suis ensuite appliqué, & aussi-tôt qu'il me sut possible, à observer le passage des bords du Solcil & de Mercure par les fils horizontal & vertical de la lunette d'un quartde-cercle de 2 pieds & demi de rayon, & j'ai fait les obfervations suivantes.

A 8h 42' 43" le bord supérieur du Soleil au sil horizontal.

8 42 45 le bord précédent du Soleil au vertical.

8 44 o Mercure au vertical.

8 45 22 le bord suivant du Soleil au vertical.

8 47 3 Mercure à l'horizontal.

8 47 10 le bord inférieur du Soleil à l'horizontal.

A 8 55' 34" le bord supérieur du Soleil à l'horizontal.

8 56 35 le bord précédent du Soleil au vertical.

8 57 49 Mercure au vertical. . Nn Mem. 1743.

- 8h 59' 11' le bord suivant du Soleil au vertical.
- 8 59 56 Mercure à l'horizontal.
 - 9 0 12 le bord inférieur du Soleil à l'horizontal.
- A 2" 2' 37" le bord supérieur du Soleil à l'horizontal.
 - 9 3 38 le bord précédent du Soleil au vertical.
 - 9 5 11 Mercure au vertical.
 - 9 6 33 le bord suivant du Soleil au vertical.
- 9 7 1 Mercure à l'horizontal.
- 9 7 21 le bord insérieur du Soleil à l'horizontal.
- A 9h 32' 42" le bord supérieur du Soleil à l'horizontal.
- 9 34 22 le bord précédent du Soleil au vertical.
- 9 35 28 Mercure au vertical.
- 9 36 51 le bord suivant du Soleil à l'horizontal.
- 2 37 23 Mercure à l'horizontal.
- 9 38 8 le bord inférieur du Soleil à l'hosizontal.
- A 9h 42' 10" le bord supérieur du Soleil à l'horizontal.
 - 9 43 21 le bord précédent du Soleil au vertical.
 - 9 44 24 Mercure au vertical.
 - 9 45 47 1 le bord suivant du Soleil au vertical.
 - 9 46 39 1 Mercure à l'horizontal.
 - 9 47 34 le bord insérieur du Soleil à l'horizontal.

La dernière observation a été faite par le P. du Périer Jésuite, qui a assissé aux précédentes; comme dans ces dernières observations le Soleil étoit près de sortir de la funette avant d'arriver au sil horizontal, & que par cet inconvénient j'avois déjà manqué deux observations, je pris le parti de me servir de la machine parallactique pour continuer à déterminer la route de Mercure, en observant le passage des bords du Soleil par les sils qui se croisent à angles de 45 degrés au soyer d'une funette de 6 pieds : voici trois observations que j'ai saites de cette manière.

- A 9h 56' 43" le bord précédent du Soleil à l'horaire.
 - 9 57 29 Mercure à l'oblique.

A 9h 57' 54" Mercure à l'horaire.

9 58 20 Mercure au second oblique.

9 59 o le bord suivant du Soleil à l'horaire.

Le bord inférieur du Soleil parcouroit le parallèle dans ces observations.

A 10h 30' 46" le bord précédent du Soleil au fil horaire.

10 31 16 Mercure à l'oblique.

10 31 46 Mercure à l'horaire.

10 31 17 Mercure au second oblique.

10 33 3 le bord suivant du Soleil à l'horaire.

A 11h o' 57" le bord précédent du Soleil à l'horaire.

11 0 11 Mercure à l'oblique.

11 1 46 Mercure à l'horaire.

11 2 21 Mercure au second oblique.

11 3 12 1 le bord suivant du Soleil à l'horaire.

Il faisoit un grand vent qui m'incommodoit beaucoup en agitant la lunette, je sinis mes observations voyant l'apparence de beau temps, & j'attendis le patlàge de Mercure au méridien; j'ai trouve par l'observation que j'en ai faite, qu'il précédoit le centre du Soleil de 39" \frac{1}{2}, & qu'il étoit éloigné du bord supérieur du Soleil de 21' 40" de degré.

J'ai continué après midi les observations à la machine parallactique, muis le vent, qui avoit encore augmenté, ne me permit pas de faire des observations exactes, & de pluticurs que j'ai faites, il n'y a que la dernière dont j'aie été un peu content, & que je rapporterai par conséquent toute seule.

A 1h o' 42" Mercure au premier oblique.

1 34 le bord précédent du Soleil à l'horaire.

1 1 39 Mercure à l'horaire.

1 2 35 Mercure au fecond oblique.

1 2 49 le bord suivant du Soleil à l'horaire.

Après cette observation je repris ma lunette de 16 pieds pour observer la sortie de Mercure du disque du Soleil.

A 1h 10' 17" Mercure me parut raser le bord du Soleil.

1 12 18 Mercure est entièrement sorti.

Nnij

Le vent agitoit ma lunette, ce qui a pû rendre cette observation de atcute de quelques secondes; j'ai cu soin d'avertir ci-dessus qu'à l'entrée de Mercure sur le Soleil, le bord du Soleil n'étoit pas terminé, ainsi on ne peut guère compter qu'à quelques secondes près sur la durée de l'éclipse & sur son milieu, qui sont les deux phases qu'on tire de l'immersion & de l'émersion. Si cependant on compare l'immersion totale de Mercure sur le Soleil & le commencement de son émersion, qui sont les deux phases qu'on distingue plus aisément, on trouvera le milieu de l'éclipse à 10h 55' 31"½; & en comparant l'entrée & la sortie du centre de Mercure, on trouve sa demeure sur le disque du Soleil, de 4h 31' 31".

Pour déterminer la route de Mercure sur le Soleil, & trouver les autres élémens de sa théorie qu'on peut tirer de cette observation, j'ai calculé la longitude & la latitude de Mercure par le moyen des cinq premières observations, par celle du passage au méridien, & par la dernière observation faite à la machine parallactique, je les ai rangées dans la Table suivante, & j'y ai ajoûté la longitude du Soleil pour le temps de chaque observation, avec la dissérence de la longitude de Mercure à celle du Soleil.

				Longit, de Mercure.			Longitude du Solcil.			Difference.		Latit, de Mercure.	
rratio			32"	2224	44	40"	2224	32'	43	11'	57"	10'	43" merida
							222						
							222						
	9	36	25	222	41	2.1	222	34	52	G	27	9	5 1
							222						
	1 1	59	2.1	222	38	39	222	40	50	7	28	8	5
aprés midi-	1	1	39	222	29	38	222	43	20	13	42	7	7

On trouvera aisément par la comparaison de ces sept situations de Mercure prises deux à deux, le temps de la conjonction de Mercure avec le Soleil, sa latitude apparente dans le même temps, l'inclinaison apparente de son orbite avec l'écliptique, sa distance au centre du Soleil dans le milieu de l'éclipse, la dissence entre le milieu & la con-

jonction, la corde que Mercure a parcourue fur le disque du Soleil, enfin son mouvement horaire; & pour en donner un exemple, nous choisirons la première & la dernière obfervation, qui, toutes choses d'ailleurs égales, doivent donner des déterminations plus exactes. Le temps écoulé entre ces observations est de 4h 16'7", le mouvement apparent de Mercure en longitude a été de 25' 39", & son mouvement en latitude a été de 3' 36": or comme 25' 39" mouvement apparent de Mercure en longitude, font à 4h 16'7", ainsi 11' 57" différence entre la longitude de Mercure & celle du Soleil au temps de la première observation, sont à 1h 59' 19", qui, étant ajoûtées au temps de la première observation, donnent 10h 44' 51" pour le temps de la conjonction: & comme 4h 16'7" sont à 3'36" mouvement de Mercure en latitude, ainsi 1 h 59' 19" sont à 1' 40" 36", qui, étant ôtées de 10' 43" latitude de Mercure dans la première observation, donnent 9' 2" 36" pour la latitude méridionale de Mercure au temps de la conjonction: & comme le mouvement de Mercure en longitude est à son mouvement en latitude, ainfi le rayon est à la tangente de l'inclinaison apparente, qu'on trouvera de 8d 15' 27": & comme le rayon est au sinus complément de l'inclinaison, ainsi la latitude de Mercure dans la conjonction est à 9' 0" 5", distance de Mercure au centre du Soleil au milieu de l'éclipse. Enfin on trouvera la corde que Mercure a parcourue sur le disque du Soleil, de 26' 58", qui, étant divisées par 4h 31' 31", temps que le centre de Mercure a employé à la parcourir, donnent 5' 58" pour le mouvement horaire de Mercure.

La distance de Mercure à la Terre étoit dans cette conjonction à celle de Mercure au Soleil, comme 6759 à 3144; ainsi ayant réduit suivant ce rapport les dissérences de longitude entre le centre du Soleil & de Mercure au temps de chaque observation, on aura la dissérence entre le lieu de la Terre & de Mercure vû du Soleil, qui étant retranchée du lieu de la Terre avant la conjonction & étant ajoûtée après la conjonction, donnera le lieu de Mercure vû du Soleil au 286 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE temps de chaque observation. La première & la dernière différence étant ajoûtées ensemble, donnent le mouvement de Mercure ou du Soleil pendant le temps écoulé entre ces observations : si on réduit de même, suivant le rapport de 6759 à 3144, la latitude de Mercure vû de la Terre, on aura la latitude de Mercure vû du Soleil, & son mouvement en latitude.

En comparant le mouvement en longitude de Mercure vû du Soleil à son mouvement en latitude, j'ai trouvé l'inclinaison véritable de son orbite, de 6d 42' 40", sa distance au nœud ascendant de 3d 15' 53", & le lieu du nœud en 8 15' 22"; voilà les élémens qu'on peut tirer immédiatement de cette observation.

Le lieu du nœud & l'inclinaison sont deux élémens de la théorie de Mercure ses plus nécessaires pour calculer les passages de Mercure sur le Soleil, j'ai cru qu'il étoit plus sûr de les déterminer par la methode que M. Casimi a expliquée dernièrement à l'Académie.

J'ai cherché pour cet effet la conjonction de Mercure par la comparaison des cinq premières observations avec la dernière, & par la comparaison de la première observation avec celle qui a été saite au méridien, & j'ai trouvé

Par la 1ere obs. & la dernière, la conjonction à 10h44' 51", & la latitude de 9'	2"30"
Par la 1ere & celle du mérid. la conjonction à 10 44 48, & la latitude de 9	5 0
Par la 26 & la dernière	1 0
Par la 3º & la dernière	0 0
Par la 4º & la dernière	9 0
Par la 5º & la dernière	2 0

Donc en prenant un milieu l'on aura la conjonction à 10h 43' 1", & la latitude de Mercure au temps de la conjonction, de 9' 1" \frac{1}{2} méridionale, le lieu de Mercure étant 1 \frac{1}{2} \frac{1

J'ai donc comparé la longitude & la latitude de Mercure que je viens de déterminer dans cette conjonction, avec la latitude ex la latitude de Mercure que j'ai determinee, dans

la conjonction de 1736, & j'ai trouvé la distance véritable de Mercure à son nœud ascendant dans cette conjonction. de 2d 39' 37", & par conséquent le lieu du nœud en 8 15d 17' 17"; d'où j'ai conclu l'inclinaison véritable de son orbite avec l'écliptique, de 6d 56' 5", à 3 minutes près de ce que je l'avois trouvée en 1736; & ayant réduit la distance véritable de Mercure au nœud, à la distance apparente, j'ai trouvé par son moyen & par le moyen de la latitude observée dans cette conjonction, l'inclinaison apparente de 8^d 20' 0", la distance entre le milieu de l'éclipse & la conjonction, de 1' 18", qui, étant réduites en temps à raison de 25' 29" en 4h 16' 7", donnent 13' 4", qui, étant ajoûtées à l'heure de la conjonction déterminée ci dessus à 10h 43' 1", donnent le milieu à 10h 56' 5", à 34 secondes près de ce qui a été conclu par l'immersion totale & le commencement de l'émersion. On trouve aussi la distance de Mercure au centre du Soleil dans le milieu de l'éclipse, de 8' 56", & la corde que Mercure a parcourue sur le Soleil, de 27' 4", qui, étant divifées par 4h 31' 31" que le centre de Mercure a employées à le parcourir, donnent le mouvement horaire apparent de 5' 59"; enfin on trouvera le diamètre véritable de Mercure de 6" 50", à 10 tierces près de ce qu'il a été trouvé en 1736.



SIXIE ME ME MOIRE SUR LES OS.

Par M. DU HAMEL.

30 Juillet 17+3.

DE bons Anatomistes & d'excellens Chirurgiens m'ont quelquefois fourni des Observations anatomiques ou des faits de Chirurgie qui leur sembloient fort propres à confirmer les principes que j'ai établis sur les Os, mais d'autres fois ils m'ont demandé l'explication de quantité d'observations de Chirurgie ou d'Anatomie qui leur paroissoient inexpliquables dans mes principes; c'est ce qui m'a engagé à faire ce fixième Mémoire, qui ne contient que des observations qui sont connues & reques par tous les bons Anatomilles & tous les habiles Chirurgiens, auxquelles j'ai joint des réflexions pour faire voir qu'elles s'accordent à merveille avec mes principes. Quoique j'aie rassemblé dans ce Mémoire un assez grand nombre d'observations, je sçais néanmoins que j'en ai omis une grande quantité, mais je suis persuadé que les bons Anatomisses suppléeront très-aisément à ce que j'ai omis, pourvû qu'ils veuillent y prêter un peu d'attention.

Vers la partie movenne des os on aperçoit une certaine Observation. Jongueur du canal médullaire qui est uniquement remplie par la moëlle, & où il n'y a point ces lames, ces plaques & ces filets qui forment le tiflu spongieux des os.

Reflexion.

Si ce que j'ai dit sur la formation du tissu spongieux est vrai, si ce tissu est principalement formé par l'extrémité des couches offeuses qui, étant trop endurcies, cessent de s'étendre, on ne doit trouver ce tiffu qu'à la partie du canal médullaire où les couches offeuses les premières endurcies ont terminé leur alongement ; ainfi vers la partie moyenne de l'os il doit y avoir une portion du canal médullaire où il

11 Y

n'y a point de tissu spongieux, c'est aussi ce que tous les

Anatomisses ont remarqué.

Un peu au-delà de cet espace on aperçoit quelques seuillets qui s'avancent vers l'axe de l'os, & qui y forment un

peu de tillu spongieux.

Si-tôt qu'il y aura des lames qui cesseront de s'étendre, il fe doit former un peu de tissu spongieux, ainsi je soupconne que les plaques dont je viens de parler, indiquent l'endroit où les lames les plus intérieures ont cessé de s'etendre.

A mesure qu'on approche de l'extrémité de l'os, le tissu

spongieux devient plus abondant & plus serré.

Ordinairement plus un animal approche de sa grandeur, moins les lames offeuses sont susceptibles d'accroiffement; il y aura donc moins de distance entre l'extrémité d'une lame qui cesse de s'étendre, & une autre qui perd peu après cette propriété; le tiffu spongieux étant formé pur l'extrémité des lames, il doit être plus abondant dans l'endroit où dans un même espace il y a un plus grand nombre d'extrémités de lames, ce qui s'observe à mesure qu'on approche des extrémités des os.

Vers les extrémités des os on aperçoit que les lames osseules rentrent vers l'axe de l'os, où elles forment des

espèces de voûtes plus ou moins surbaissées.

Il me femble que l'explication que j'ai donnée de cette observation, est simple & naturelle; car si-tôt qu'on sçait qu'il y a une continuité entre le cartilage intermédiaire & le périoste, il est naturel de penser que les sames qui forment le cartilage intermédiaire étant une prolongation de celles du périolte, elles doivent s'offisier & s'endurcir de même que celles du périoste, & l'endurcissement de ces lames doit former les espèces de voûtes dont il s'agit.

· Les arcades dont je viens de parler sont plissées, froncées,

& il en part des plaques, des lames & des filets offeux.

A l'égard du froncement & des plis de ces voûtes, outre Réflexien. qu'ils existoient dans les lames membraneuses du cartilage intermédiaire, ces lames du cartilage intermédiaire ne

Mem. 1743. . 00 Ol fervation.

Réslexion.

Observation.

Réflexien.

Obseivation.

Réflexion,

200 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE s'endurcissent probablement qu'après les lames osseuses. elles tont donc plus long-temps capables d'extention, & étant renfermées entre les limites du canal médullaire, si elles s'étendent, elles sont obligées de se replier, ce qui peut contribuer à former les froncemens qu'on observe.

Pour ce qui est des plaques, des filets & des autres productions offeuses qui s'observent entre les seuillets en voûte dont je viens de parler, ces productions peuvent venir, ou de quelques lames qui s'étendent plus que les autres, ou d'une extention du titlu parenchymateux ou véficalité qui prend dissérente forme à peu près comme on l'observe

dans les fruits, les seuilles & la moëlle des arbres.

O! Jervation.

Quel pictois à l'endroit où l'epiphyle ctoit jointe à l'extrémité de l'os, on aperçoit quelques lames osseuses du titlu spendieux qui sont sort epaities, & l'on voit plusieurs des lames voûtées dont j'ai parlé, qui sont assez près les unes des autres.

Réstexion.

Je crois que les lames osseuses fort épaisses qu'on observe à l'endroit où les épiphyses se joignent aux os, ne sont autre choie que plutieurs des feuillets du cartilage intermédime qui font reflé attachez les uns aux autres. A l'egard de la plus grande quantité des lumes voutées, elle n'a rien de furprenant, puifque, fuivant plufieurs circonflances, les lames du cartilage peuvent s'écarter plus ou moins les unes des autres.

Observation.

Le cartilige intermédiaire est tort epais dans les ensans, il devient de plus en plus mince avec l'âge, enfin fouvent dans les vieillards il disparoît entièrement.

Reflexion.

Tout cela doit arriver, car assurément à mesure qu'il se det chera des lames du cartilage intermediaire pour former le titiu spongieux, le cartilage en deviendra plus mince, & entin il disparoitra tout-à-sait si toutes les lames de ce cartilage se sont séparées pour former le tissu spongieux.

Observation.

Dans les vicillards le tiflu spongieux des os paroît continu avec celui des épiphyses.

Réflexion.

Cest le cartilage intermédiaire qui separe dans les ensans

ie tissu spongieux des os, de celui des épiphyses, ainsi quand ce cartilage fera detruit, le tiflu spongieux de l'os & de l'épiphyse sera continu.

Pour ce qui est de la formation du tissu spongieux dans les épiphyses, je crois qu'elle est la même que dans les os.

Dans les enfans l'épiphyse ne tient au corps de l'os que par le périofte, quand on a enlevé cette membrane de dessus Observation. l'os jusqu'au cartilage intermédiaire, l'epiphyse se detache de

l'os presque d'elle-même.

Suivant mon sentiment les épiphyses doivent être bien Réslexion. peu adhérentes au corps des os dans les jeunes gens, puifqu'il y a entre l'os & les épiphyses des lames membraneuses qui ne sont unies les unes aux autres que comme le sont les lames du périoste, c'est-à-dire, par des réseaux de vaisseaux très-déliez, & par des productions du tissu vésiculaire ou parenchymateux, & ces substances venant à s'étendre & à s'offifier, peuvent bien contribuer à la formation du tiffu spongieux; mais indépendamment de cette conjecture, on concoit que quand on aura enlevé le périofte, les épiphyses fe detacheront bien aisement, sur-tout quand la substance qui unit les lames du cartifage intermédiaire, sera tendre, comme elle l'est dans les animaux fort jeunes.

Dans les enfans le tissu cellulaire qui est abondant aux extrémités des os, n'est recouvert que par une lame ofleuse Observation.

fort mince & d'un tissu assez lâche.

Pour sentir la raison de cette observation, il faut se souve- Résexion. nir 1° que j'ai prouvé dans mon quatrième Mémoire qu'il y a plutieurs lames qui font offifices vers la partie movenne des os, & cartilagineuses vers les extrémités: car voilà déja un déchet sur la partie compacte ou corticale des os; & en fecond lieu, il faut faire attention que puisqu'il y a intégeurement bien des lames qui se replient vers l'axe des os pour former le tiffu spongieux, comme je l'ai dit, la partie compacte des os en sera d'autant plus mince.

Dans les vieillards le tiflu spongieux est recouvert par une couche d'os affez mince, mais dure, qui fuit partie de

IIme

la substance corticale ou compacte, & alors les épiphyses sont si adhérentes aux os, que les couches extérieures ne parattient point interrompues à la naissance des épiphyses,

le tout ne paroît former qu'une seule pièce.

Kiflexien.

Le périoste se continue de l'os sur l'épiphyse; avec cette seule réslexion on conçoit que quand les lames du périoste qui se prolongent jusqu'aux extrémités des os, seront ossities, se tissu spongieux sera enveloppe d'une couche d'es compacte & dure, qui unira si intimement l'épiphyse avec l'os, que le tout ne sera plus qu'une pièce.

Chiervation.

Sous les cartilages qui revêtent les articulations, il y a dans les animaux agez des lames offcuses affez serrecs, qui prennent la sorme des éminences & des cavités articulaires.

Réflexion.

Si-tôt qu'on sçait que les cartilages des articulations sont des continuations du périoste, on concevra aisément la formation des couches osseules dont il s'agit.

Observation.

Les éminences des os qui se trouvent à l'insertion des ligament, & tur-tout des tendons, sont plus considerables dans les vieillards que dans les jeunes gens.

Réflexion.

Les tibres ligamenteuses ou tendineuses qui s'insèrent dans les os, s'offisient, les lames du périoste qui revêtent les ligamens & les tendons, s'offisient aussi; en voita allez pour produire dans les vieillards les éminences dont il s'agit.

() ;;;

La substance des os est en partie compacte & en partie spongieuse, la partie compacte occupe principalement le dehors & la spongieuse le dedans.

Riflexion.

Observation.

L'extérieur des os étant composé de l'assemblage des lame du pariente ossitues, qui sont posées immediatement les unes sur les autres, doit être compacte, pendant que l'intérieur qui est sormé par l'épanouissement de l'extrémité de ces mêmes lames, doit être spongieux.

Aussi M. Winslow a-t-il remarqué (j'emploie ici ses termes) que les lames qui composent la partie compacte des os, paroissent quitter la sorme régulière de leurs couches,

pour faire la partie spongieuse.

Je continue a copier M. Winflow. Outre le tiffa spon

gieux, il y a un tissu réticulaire particulier dans les grande. cavités de plusieurs os longs, qui est comme un espèce de réseau formé par des filets osseux, longs, déliez, branchus, très-artistement entrelacez d'espace en espace, souples & plians à cause de leur finesse.

Ce tissu semble naître en partie des parois des lames intérieures de l'os, en partie de leurs extremités, & en partie

du tiffin cellulaire.

Ce tiffu réticulaire est-il produit par une dilatation d'une portion du cartilage primitif, ou par un prolongement de la membrane médullaire, ou par un épanouissement du tissu vésiculaire ou parenchymateux, ou par des sibres qui se seroient détachées des lames offcuses les plus intérieures? c'est

ce qu'il n'est pas aisé de décider.

Mais comme ce réseau paroît quelquesois posé au milieu du canal osseux, où il semble suspendu au tissu cellulaire, je dois saire remarquer qu'il ne s'ensuit pas qu'il n'ait en aucune union avec les parties voisines, car il pourroit se faire que ce qui le joignoit aux parois offcuses n'étant point offisie se sût détruit, ce qui empêcheroit qu'on n'aperçût la con nexité de ce tissuréticulaire avec les parties qui l'environnent.

Même dans les vieillards la telbilance compacte des os eft plus quiffe vers leur partie movenne que vers leurs extrémités.

Comme les fances interieures s'étendent moins que les fames exterioures, comme elles ne parviennent pas julqu'aux extrémités des os, il est naturel que la substance compacte des os soit plus épaisse dans l'endroit où il y a un plus grand nombre de couches.

Les os ont des porcs par où transude le suc médullaire.

Jen'ai point observe ce que Havers dit de leur disposition, mais comme les lames offeuses sont, de même que les couches ligneuses, composées d'un releau de sibres longitudinales dont les mailles sont remplies par un tissu vésiculaire ou parenchymateux, il me paroit naturel de foupçonner que les pores des os sont à peu près disposez comme ceux du pois.

Riflexion.

1600 0'.00

Richar

O' crevi n Richer

18me Observation.

Outre les pores dont je viens de parler, il y a des trous d'un diamètre assez considérable qui traversent toutes les lames offeuses, & par lesquels passent des vaisseaux sanguins.

On peut remarquer que ces trous sont dans les os des adultes à peu près à la même place, relativement à la longueur de l'os, qu'ils étoient dans les jeunes animaux; c'està-dire, que si un de ces trous au tibia d'un petit animal est éloigné d'un tiers de la longueur de l'os de son extrémité supérieure, ce même trou, lorsque l'animal sera adulte, sera encore à peu près éloigné de l'extrémité supérieure d'un tiers de la longueur du grand os.

Réflexion. Il semble qu

Il semble que cette observation sournisse une sorte objection contre mon sentiment sur l'alongement des os, car on pourroit demander pourquoi les trous que j'ai faits aux os de dissérens animaux, ne conservent pas, lorsque l'animal croît, une même position proportionnelle à la longueur des os, comme le sont les trous naturels dont je viens de parler.

On sentira combien il est aisé de répondre à cette question, quand on aura examiné avec attention un de ces trous, par exemple, celui qui est à la partie supérieure du tibia des poulets, car j'ai remarqué que la direction de ce trou étoit fort oblique, ou presque parallèle à l'axe de cet os, de sorte que le vaisseau qui passe dans ce trou, suit une direction presque parallèle aux sames osseuses, ce qui fait qu'il s'insère dans l'os par une gouttière alongée & assez profonde, qu'on aperçoit à la superficie de l'os. Maintenant ne voit-on pas que l'origine de ce trou remonte beaucoup vers l'extrémité supérieure de l'os, à mesure qu'il s'ajoute de nouvelles conches offeufes qui augmentent la groffeur de l'os? d'ailleurs, il faut joindre à cela que le trou en question est place a une partie de l'os qui conferve long-temps la proprieté de s'etendre; néanmoins je dois en avertir, il n'est pas exactement vrai que le trou en question conserve dans l'animal qui croît, la même position relativement à la longueur totale de l'os, il m'a paru qu'il étoit proportionnellement plus écarté de l'extremite de l'os dans les adultes que dans les jeunes fuiets;

DES SCIENCES.

mais assurément il n'en est pas si éloigné que le seroit un trou qu'on seroit avec un poinçon, parce que ce trou auroit une direction perpendiculaire sur l'axe de l'os, au lieu que les trous naturels ont une direction oblique.

On aperçoit sur les os des impressions très-sensibles des vaisseaux sanguins, la feuille de figuier peut être donnée pour exemple, ou, encore mieux, la carotide interne qui est reçue dans une gouttière profonde, qui semble creusce dans des os fort durs de la base du crâne.

Il est naturel que les vaisseaux sanguins sassent une impression sur les parties molles, les os commencent par être mols, & ils conservent, en s'endurcissant, la sorme qu'avoient pris leurs cartilages primitis.

Les os des fœtus sont plus larges, plus évasez vers leurs extrémités qu'à leur partie moyenne, de telle sorte que si de deux points opposez pris à la circonférence des os, on tire deux lignes qui suivent la direction des parois de cet os, ces deux lignes se croiseront à un point de l'axe qui sera vers la partie moyenne; maintenant si l'on prolonge ces deux lignes par leur autre extrémité pour leur donner autant d'étendue qu'en aura l'os dans un adulte, on aura un évasement beaucoup plus grand que n'ont les os des adultes.

Ncanmoins cet évalement femble devoir résulter de l'idée que j'ai donnée de la crûe des os suivant leur longueur, puisque j'ai avancé que les os cessoient de s'étendre à leur partie principale, lorsqu'ils continuoient à jouir de cette propriété par leurs extrémités, & long-temps avant que l'animal sût parvenu à sa grandeur.

Cette objection seroit des plus fortes si les os ne croiffoient que par leurs extrémités, mais j'ai prouvé que les os des animaux très jeunes s'etendoient dans toutes leurs parties; ils sont à la vérite encore sort jeunes quand leurs os cessent de s'étendre à leur partie moyenne; alors il y a une portion considérable de ces os qui est extensible & qui s'étend réellement, ce qui écarte beaucoup les extrémités évasées des os, de leurs parties moyennes.

Observation.

Réflexion.

20me Observations

Réflexion.

Il est vrai que quand les animaux approchent du terme de leur grandeur, je crois que leurs os ne s'étendent plus que par leurs extrémités, ce qui doit produire un élargissement à cette partie, mais dans cette circonstance l'alongement des os, & par consequent leur evalement, est peu confidérable.

Il me convient de présenter deux considérations qui assoiblissent beaucoup l'objection; la première est que les épiphyses sont paroître les os plus évasez qu'ils ne sont réellement, & en second lieu, que les cartilages perdent probablement de leur grosseur quand ils s'endurcissent en os, comme j'ai remarqué que le périosse tumes se sur les tractures dimi-

nuoit de grosseur à mesure que le cal se formoit.

= 1 me fervation.

Quand j'ai nourri des animaux un peu grands alternativement avec de la garence & fans garence, j'ai remarqué qu'à l'extrémite de leurs os, si je finitiois par les alimens ordinaires, il y avoit un espace qui n'étoit point du tout teint de rouge, pendant que plus près de la partie moyenne on voyoit duns le tissu spongieux des plaques rouges & des plaques blanches mêlées les unes avec les autres.

Réflexion.

A l'egard des plaques rouges & des plaques blanches, elles dépendent des temps où s'est fait leur endurcissement, mais l'espace exempt de toute teinture, prouve encore que quand les animaux sont parvenus à une certaine grandeur, leurs os s'étendent principalement par leur extrémité.

Observation.

Quoique je n'examine dans ce Mémoire que l'accroissement des os longs articulez, je crois qu'il n'est pas hors de propos de saire remarquer que plusieurs os qui ne sont articulez que par une de leurs extremités, comme sont les sausses cotes & les apophyses styloides, muttoides & nazulles, étoient rouges par leur extrémité non articulée, si je sinissois par l'usage de la garence; & au contraire ils étoient blancs à cette partie, si je sinissois par leur faire user des alimens ordinaires.

Réflexion.

Cette observation sait voir comment croissent ces sortes d'os dans seur partie qui ne tient qu'aux chairs, toute cette partie cel enveloppee par le periette, ce qui fait qu'il doit

se

fe former des espèces de tuvaux coniques, qui s'enveloppant les uns les autres, forment l'alongement de ces os. L'accroitlement de ces os non articulez est affez étranger au sujet qui fait l'objet de ce Mémoire; d'ailleurs, je ne pourrois expliquer le machanitme de feur développement fans beaucoup étendre cette digression, c'est pourquoi je me bornerai pour le prefent aux idees ; nerales que je viens de proposer, d'autant qu'elles suffiront à ceux qui se donneront la peine de réfléchir sur ce que j'ai dit en parlant de la formation de quelques apophyles.

Havers dit expressement que la moëlle n'est point dessinée à la nourriture des os, mais qu'elle coule dans les jointures, Obietvation. dont elle facilite le mouvement, & qu'elle entretient la sou-

plesse des os, qui en sont moins fragiles.

Bien loin que la moëlle des os produise seur endurcissement, je crois qu'elle le ralentit, & qu'en les entretenant dans un état de fouplesse, elle fait qu'ils sont plus long-temps capables de s'étendre, ce qui facilite leur accroissement; c'est encore un avantage qu'il faut joindre à ceux qu'a remarqué Havers.

Les Observations des meilleurs Anatomistes sur les os sains s'expliquent donc très-naturellement dans mes princi- Observation. pes; je vais examiner s'il en sera de même à l'égard des os malades, & je commence par les enchyloses.

Tous les Auteurs qui ont traité des maladies des os, ont remarqué qu'il y a lieu de craindre qu'il ne se forme une

enchylose;

1 Quand on a reçu une violente contusion sur une articulation.

- 2° Quand une luxation a été accompagnée d'une grande tention.
- 3° Quand même il n'y auroit pas de suxation, il y a lieu d'appréhender une enchylose, si l'on a soussert une entorse
- 4° Quand on a été long-temps sans faire la réduction d'une luxation.

. Pp

Mem. 1743.

Réflexion.

5° Quand il y a une fracture dans une articulation, ou dans fon voifinage.

Fillin un de l'econfiderable fur une articulation produit

fouvent une enchylose.

Presque tous les Auteurs prétendent que ces enchyloses sont occasionnées par l'épaissifitsement de la synovie, ou par l'estusion du suc osseux qui soude les deux os, comme le suc pierreux joint dans la terre des corps qu'il pénètre, & qui

étoient précédemment séparez.

Pour moi je ne nie point l'épaississement du suc synovial, non plus que l'essistion du suc otseux, quoique je n'aie paint de preuves de l'existence de ces causes, mais je crois que les enchyloses dont je viens de parler, dépendent principalement d'une cause bien dissérente, & pour saire comprendre quelle est sur cela ma pensée, je demande qu'on se souvienne;

1 " Que j'ai prouvé dans mes premier & fecond Mémoires fur les os, que les parties ligamenteuses, tendineuses, aponévrotiques & le périoste qui est de ce genre, se gonssent considérablement quand elles ont éprouvé une contusion, une tension violente, ou d'autres irritations considérables.

2° J'ai aussi prouvé dans les mêmes Mémoires, que quand ces parties sont tumésiées, elles tendent naturellement à l'ossification, & qu'il saut le plus souvent s'opposer à leur endur-

cissement par des secours que la Chirurgie sournit.

3° J'ai fait à dissérens animaux des luxations considérables & des fractures dans les articulations de leurs os, j'ai disséqué quelques jours après ces membres assligez, & j'ai aperca que le ligumens, les tendons & les membranes etolent extrêmement gonssées. Si à dessein je tenois ces membres dans une même situation, j'observois au bout de quelque temps que ces parties avoient acquis une roideur considérable, il y avoit même de ségers commencemens d'ossissimates.

Après ces réflexions ne puis-je pas avancer que tout ce qui pourra produire le gondement des puties tendinente, qui mévrotiques ou ligamenteules, pourra occasionner des

enchylofes, fins avoir recours à l'epaiffitsement de la synovie, non plus qu'à l'épanchement du suc osseux; ses observations suivantes me semblent propres à confirmer ce sentiment.

On lit dans un des meilleurs ouvrages que nous ayons sur

la maladie des os:

Oblervation.

1 ° Que les luxations incomplétes des articulations en genouil, sont plus sujettes à occasionner des enchyloses que les complétes, parce qu'il y a, dit l'Auteur, plus de tiraillement dans les luxations incomplétes.

2° La luxation incompléte du bras n'est pas toûjours fuivie d'enchylose, principalement lorsqu'elle n'a pas été accompagnée de douleurs & de gonflement, ou lorsqu'on n'a pas procuré ces accidens par les mauvailes manœuvres qu'on aura tentées pour la réduction.

On voit que la tenfion des parties ligamenteuses & tendineuses produit seur gontlement, & que ce gontlement est

souvent suivi d'une enchylose.

Ainsi je crois qu'on peut regarder, avec M. Petit, comme un axiome de Chirurgie, que tout gonslement, soit qu'il procède de cause interne ou de cause externe, est un acheminement à l'enchylose, bien entendu si on ne sçait pas les prévenir; car assurément s'il y a des Chirurgiens ignorans qui occasionnent des enchyloses par leurs mauvaises pratiques, il est incontestable que la Chirungie fournit des moyens très-efficaces pour pr. venir des enchyloses qui se sormeroient. si on les abandonnoit à la Nature, & qui même dissipent des enchyloses qui commencent à se former; je vais rapporter quelques-uns de ces moyens.

Les bons Praticiens recommundent, pour empécher qu'il ne se forme une enclivlose, d'appliquer sur l'articulation d médicamens qui ont la propriete d'amollir, de detendre & 🖰 relâcher, & sur-tout de procurer le plus souvent qu'on le pourra, un peu de mouvement à l'articulation; s'il y a un commencement d'enchylose, ils ordonnent, outre les embracations dont je viens de parler, les bains & les douches.

J'ai dit que je croyois que les figamens qui tont dans les 1, ...

articulations, ou qui les recouvrent, ne s'ossissent pas, parce qu'ils étoient humeclez par la synovie & par la graisse, peutètre aussi, comme le pense Havers, par le suc médullaire, & je crois que les topiques émolliens & relâchans agissent de concert avec la synovie, la graisse, le suc médullaire, &c. pour entretenir la souplesse & la slexibilité des ligamens.

J'ai encore regardé comme un obstacle à l'endurcissement des ligamens des articulations, le mouvement continuel qu'ils éprouvoient; il est donc à propos de procurer un mouvement modéré aux articulations qui menacent de s'enchy-

loser.

J'ai de plus prouvé que les parties tendineuses, ligamenteuses ou aponévrotiques, si-tôt qu'elles étoient enslammées & gonssées, tendoient à s'endurcir; il saut donc tendre à dissiper l'instammation & le gonssement, c'est aussi ce qui doit naturellement résulter des remèdes que je viens d'indiquer.

A l'égard de l'effet des douches, puisqu'on reconnoît qu'elles peuvent dissoudre des callus déja assez endurcis, il n'est pas douteux qu'elles peuvent dissiper des commencemens d'ossission qui roidissent les ligamens des articula-

tions.

La pratique des meilleurs Chirurgiens bien soin d'être opposée à ma théorie, semble donc lui fournir de nouvelles preuves; c'est ce que je me suis proposé de faire sentir par les observations que je viens de rapporter.

Observation.

J'ai vû des enchyloses où on apercevoit les cavités & les éminences articulaires, de sorte que les os n'étoient joints l'un à l'autre que par des productions qui paroissoient s'étendre d'un os à l'autre.

Riflexion.

Ces productions m'ont paru être formées par l'endurcissement de plusieurs ligamens de l'articulation.

2800

J'ai vû dans la collection d'os qui est à l'Académie, une concrétion osseuse assez mince, qui partoit des bords du cartilage qui revêt les articulations.

M. flexion.

Cette production offeule, qui avoit en quel pres endroits

plusieurs lignes de longueur, me paroit être une offisication qu

ligament capsulaire.

On voit assez fréquemment des enchyloses où on ne découvre aucune inégalité à l'endroit de l'articulation, le tibia Observation, & le fémur ne paroissoient être qu'un seul os. Si l'on scie ces enchyloses, on ne découvre intérieurement aucune des éminences & des cavités articulaires, & la substance spongieuse est continuée d'un os à l'autre, sans qu'il y ait aucune

interruption.

Je crois que ces enchyloses se sont formées lorsque les animaux étoient fort jeunes, & que le cartilage des articulations s'étant épanoui en tissu spongieux, comme j'ai dit que le faisoit le cartilage intermédiaire, il en résulte que le tissu spongieux ne sera point interrompu, & que les lames ofseuses s'étendront du tibia sur le sémur sans qu'il y ait d'interruption, comme elles s'étendent du corps de l'os sur les épiphyses quand le cartilage intermédiaire cesse de paroître.

Outre les enchyloses dont je viens de parler, il y en a qui sont produites par un boursous llement des extrémités des os. qui d'abord genent le mouvement, & qui l'interrompent quand les productions offeuses se touchent, ce qui est bien-

tôt fuivi d'une vraie enchylofe.

Ces sortes d'enchyloses sont des suites des exostoses qui les ont précédées; ainfi on verra ce qui les concerne dans les observations que je vais rapporter sur les exostoses.

Mais avant que de quitter les enchyloses, je crois devoir encore avertir que je ne nie point qu'il n'y en ait qui soient produites par un épanchement du suc osseux, je me contente d'avouer que je n'ai rien vû qui m'en ait prouvé l'existence.

Il y a des exostoses qui sont fermes, dures, serrées, composées de lames, & qui paroissent organisées comme la sub- Observation.

stance compacte des os.

Je crois que ces exostoses sont uniquement formées par Rislexion. l'épaissifissement du périoste en ces endroits où il s'est formé pour cette raison des lames osseuses plus épaisses qu'ailleurs. Il se forme souvent de ces éminences osseuses à la tête & au

20 me

References

30mc Observation,

Réflexion.

3100

tibia, lorsqu'on y a reçu des coups violens, néaumoins il est assez naturel de penser qu'il y en a qui peuvent venir de causes internes.

Au rette, ces exostoses sont de la nature des callus qui se forment sur les fractures, ainsi on peut consulter ce que j'ai dit à ce sujet.

Observation.

Aux environs des fractures réduites & réunies, on aperçoit assez fréquemment de petites exostoses, ou des éminences osseules qui ont différentes figures; on en aperçoit aussi de semblables au fond des ulcères qui auront pénétré jusqu'au près de la substance des os.

Réflexion.

Je crois que dans le premier cas les petites exostoses qu'on aperçoit aux environs des fractures, viennent du déchirement & des plaies que le périoste a sousferts; & dans le second, du gontlement inégal que le périoste a éprouvé, suivant qu'il a été plus ou moins attaqué par le suc de l'ulcère.

Observation.

Il y a des exostoses sort dures de figure hémisphérique, qui ne renserment point ordinairement de substance spongieuse, & dont les sibres ne paroissoient point avoir de direction régulière; au reste, ces exostoses ne causent point de douleur à ceux qui les portent, elles sont seulement génantes & incommodes.

M. Morand en conserve une très-belle dans son cabinet, elle est implantée sur un pariétal, & elle a plus de trois

pouces de diamètre.

Réflexion.

Je crois pouvoir comparer ces exostoses aux soupes qu'on observe assez souvent sur les arbres, celles-ci sont de même que celle des os hemisphériques, seur subtance est sort dure, & on ne distingue pas de direction uniforme dans les sibres en les compasses est seur solutions.

qui les composent.

Néanmoins si on essaie de connoître la substance qui compose les lospes ligneuses, il paroit qu'elles resemblent assez aux gelles, & qu'elles sont principalement tormes par un amas très-serré du tissu vésiculaire ou parenchymateux, den le pal on spersoit seusement quelques sibres longitudinales répandues irrégulièrement de côte & d'autre; l'analogie

DES SCIENCES.

me feroit foupconner que les exefloses offeuses dont il s'agit, sont de même formées pour la plus grande partie, par une extension du tissu vésiculaire ou parenchymateux des os, mais c'est une pure conjecture qui n'est sondée que sur l'analogie.

Il y a des exostoses qui paroissent une masse d'os trèsbourfoutilée, difforme, & qui retiemblent plutot au tiffu spon- Observation. gieux des os, qu'à leur substance compacte; ces sortes d'exostoles s'observent plus fréquemment aux extrémités des os

qu'à leur partie moyenne.

Je crois que ces exostoses procèdent d'une maladie du périoste qui se gonsle, qui se boursoussle, qui se rarésie, pour ainsi dire; les lames osseuses séparées les unes des autres s'étendent en dissérens sens, comme j'ai dit que le saisoient les lames intérieures pour sormer le tissu spongieux, & ce sentiment me paroît d'autant plus probable, que j'ai entre les mains des os de fœtus malades, où même à la partie moyenne les lames offeuses sont séparées les unes des autres, & on voit entre deux une espèce de diploé.

M. Petit, qui assurément a bien observé les maladies des os, dit qu'il a trouvé quelquefois le périoste fort épaissi sur Observation. des exoftofes scorbutiques, & que dans d'autres scorbutiques le périoste étoit détaché des os presque par-tout, & qu'il étoit relache, de même que les figamens & les tendons qui

ne tenoient presque plus aux os.

Le premier cas pouvoit saire une exostose compacte, & Réslexion. le second une exottose spongicuse, peut-être de la nature de

celle dont je vais parler dans l'observation suivante.

Dans le cabinet de l'Académie, dans celui de M. Morand & dans plusieurs autres, j'ai vû des fémurs gros, difformes & creux, qui renferment dans leur cavité un petit fémur

tout entier, & qui remue dans la cavité du grand.

Je crois que cette singularité peut avoir été la suite de Réslexion. la maladie qu'a observé M. Petit; le périoste s'est détaché de l'os qui est mort, & est resté sans croître davantage & dans les proportions qu'il avoit; le périoste relâché s'est ensin endurci & a forme une enveloppe offcule & spongicule qui

34mc

Réflexion.

36mc Observation.

304 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE s'est étendue, & qui a remplacé en partie le premier os de cet animal.

J'ai plusieurs fois observé la même chose dans les arbres qu'on appelle roulis ou roules, où j'ai vû le tronc d'un petit arbre mort, qui étoit renfermé au centre du tronc d'un gros arbre vivant, & le petit arbre étoit si bien à l'aise dans son

enveloppe, qu'il étoit facile de l'y faire remuer.

Il est aisé de concevoir comment se forment ces roulures singulières, par quelqu'accident que ce puisse être; quelquesunes des couches, ou de l'aubier, ou du liber qui joint l'écorce à l'aubier, ayant péri, l'écorce s'est trouvé détachée du corps ligneux qui est mort, pendant que l'écorce qui est resté vive, a formé des couches ligneuses, qui par leur asfemble je ont fait la boate qui renfermoit le petit arbre mort.

Il y a des caries qui attaquent le cœur des arbres, qui se trouvent entièrement pourris sans qu'il y paroisse à l'extérieur.

Il y a de même des caries qui attaquent l'intérieur des os, & Heyne Médecin Suédois dit qu'il a vû la substance des os pretique detruite fans que le periotle parat avoir beau-

coup fouffert.

Une goutte de suif n'est point attaquée par l'eau forte qui ronge puissamment le fer, ainsi une sanie corrosive pour un os fort dur, peut ne l'être pas pour le périotte; d'ailleurs cette sanie qui ronge l'os intérieurement, peut se former une issue, la maladie peut devenir moins considérable, alors le périotte bourfoufflé formera des couches offeuses peu compactes, ce qui peut expliquer la formation de ces exoftoses spongieuses où la partie compacte des os ne se trouve point.

J'ai quelquefois coufu des os de jeunes animaux avec un fil d'argent qui les traversoit en dissérens sens dans seur longueur, d'autres fois après avoir fait une plaie à l'os d'un jeune anim d, j'y ai introduit des corps étrangers, & je suis

pirvenu à fiire mître des exostoses.

J'ai examiné de ces exostoses, les unes bien endurcies, les autres qui étoient encore toutes cartilagineuses, & d'autres

qui cioient dans un état moyen.

Observation.

Reflexion.

2 Cme ofervation.

Quand

Quand ces exostoses étoient dans l'état de cartilage, elles étoient fort adhérentes au périotle, & au refle elles refiembloient beaucoup aux tumeurs du périoste qui recouvrent les fractures.

Quand l'endurcissement étoit médiocre, on pouvoit par l'ébullition détruire ces exostotes qui paroissoient se séparer par grains; enfin quand elles étoient bien endurcies, elles étoient compactes & solides: en un mot, ces exostoses qui étoient de la même nature que celles qui font dures & compacles, m'ont semblé être produites par une production du tissu parenchymateux ou vésiculaire, mais il ne m'a pas encore été possible de faire naître sur les os des exostoses spongieuses.

Pour mieux faire comprendre ce que je viens de dire sur l'épanouissement du tissu vésiculaire des os, je suis obligé Observation. de rappeller ce que j'ai dit dans mon premier Mémoire à l'occasion des fractures, & de rapporter quelques expériences

que j'ai faites fur les arbres rompus.

J'ai dit que j'avois fait de petites plaies à des os, & que j'avois observé une production du périoste qui d'abord remplissoit la petite plaie d'une espèce de bouchon cartilagineux, que ce bouchon s'offifioit, & qu'il réparoit la plaie que j'avois faite à deffein; ce ne sont donc pas des lames offeuses qui réparent les plaies qu'on leur a faites, c'est le périoste qui doit produire cet effet.

J'ai dit que j'avois de même aperçu quelquefois quelques productions du périoste qui s'inséroient dans les petits vuides qui restoient après la réduction entre les os rompus.

De quelle nature sont ces productions du périoste? il m'a paru qu'elles étoient formées par un épanouissement du tissu cellulaire semblable à celui qui forme les exottoses solides, & on sera plus disposé à adopter ma conjecture quand on connoîtra les expériences que je vais rapporter, je les ai faites sur de jeunes arbres.

Le printemps je fis au tronc de quelques arbres des plaies étroites, mais profondes, qui pénétroient dans le bois, je les Mem. 1743. . Qq

recouvris de cire, & avant que la sève sût entièrement passée,

ie les disséquai & les examinai avec soin.

Dans la même saison j'appliquai tantôt sur de gros arbres des gresses en couronne, ou sur de sort petits des gresses en sente; après que les gresses eurent pousse, & avant que les productions tant de la gresse que du sujet sussent endurcies, je disséquai ces gresses pour reconnoître en quel état elles étoient à l'endroit de seur insertion.

Ensin, encore au printemps je rompis des jeunes arbres presqu'entièrement, je les redressais & les liai, j'ai couvert la rupture avec de la mousse & de l'argile, & j'examinai de ces arbres les uns peu de temps après cette opération, & les autres l'hiver suivant.

Or dans tous ces cas je reconnus que les fibres ligneuses endurcies ne contribuoient pas sensiblement à la réunion des plaies, non plus qu'à l'union de la gresse ou à la réparation des os rompus.

Toute la réparation paroissoit venir de l'écorce qui s'épaississoit autour des plaies, sur les gresses, sur les ruptures, & qui renaplitée it par des productions les vuides que les sibres

ligneuses laissoient entr'elles.

J'ai examiné avec soin ces productions de l'écorce, & je n'ai paint aperçu qu'elles sustent sources par des ubres qui eussent une direction constante; toutes ces productions paroissoient formées par une substance alors succulente, formée par des sibres courtes qui suivoient toutes sortes de directions, & que je ne puis mieux comparer qu'à la chair d'une poire verte, ou à la substance de certaine galle. Si j'examinoi, ces productions à l'entree de l'hiver, toriqu'elles ctoient en partie endurcies, c'étoit un bois court & qui n'avoit, comme disent les ouvriers, aucun sil, ce qui me persuade que ces productions ne sont formées que par le titsu vésiculaire ou parenchymateux; d'un autre côté il m'a paru que les productions du périoste qui remplissent les plaies des os ou les intervalles qui sont entre les os rempus, resemblaient le aucoup a celles de s'ecorce, ce qui me sait penser que les

unes & les autres sont formées par un développement des vésicules qui remplissent les mailles que forme le réseau de

fibres longitudinales.

Maintenant si l'on se rappelle ce que j'ai dit des soupes ligneuses & des exostoses solides, je crois qu'on concevra plus aisément comment elles peuvent être formées par un épanouissement du même tissu vésiculaire, puisque toute la différence consiste en ce qu'il s'étendra au dehors au lieu de

se prolonger vers le dedans.

Ainsi je crois qu'on peut regarder comme un axiome que tout ce qui blesse, irrite, enslamme ou tumésie le périosse, peut produire une exottole, & on sent que pour les prévenir, ou dissiper celles qui ont commencé à se former, il faut employer les mêmes remèdes que pour les enchyloses, ce qui est consirmé par la pratique des bons Chirurgiens. Je dois avertir en terminant ce que j'ai à dire des exoltoses, comme je l'ai fait en parlant des enchyloses, que je ne prétends point assurer qu'elles procèdent toutes d'une maladie du périoste, je parle uniquement de ce que j'ai été à portée d'observer, sans prétendre décider sur ce que je n'ai pas vû.

Le rachitis est une maladie des os qui est trop commune pour que je puisse me dispenser d'en dire quelque chose.

40me Ol Rivati n.

Le Docteur Majour veut que la courbure des os des rachitiques vienne de ce que les muscles tirent plus d'un côté que d'un autre, & pour appuyer son sentiment il dit que si l'on attache une corde au haut & au bas de la tige d'un arbre, cet arbre sera obligé de se courber du côté de

la corde lorsqu'il croîtra.

Athorément la tige de cet arbre ne se combera pas si les R = 1. deux extrémités de la corde répondent à des portions de la tige déjà endurcie en bois, puisque, comme je l'ai prouvé, il n'y a plus d'extension à cette partie; mais si la partie supérieure de la corde répondoit à l'extrémité encore herbacée d'un bourgeon, il est certain que ce bourgeon se courberoit du côté de la corde, comme le dit Majour, & c'est-là le cas où sont les os des rachitiques. Cette maladie n'attaque

308 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE que les enfans dont les os sont capables d'extension dans toute, ou du moins dans la plus grande partie de seur longueur.

Neanmoins Havers refute tres-folidement le fentiment de Mueur, en difant qu'il faudroit pour que ce fentiment fut fonde, que l'origine & l'attache d'un meme muscle partissent de l'extrémité d'un os à l'autre, ce qui n'est pas, puisque l'origine d'un muscle tient toujours à un os, & sen insertion à un autre.

Effectivement, comme les ligamens des articulations sont plus capables de prêter que le corps des os, il est clair que la tension immodérée d'un musele derangeroit beaucoup les articulations sans presqu'endommager le corps des os.

Glisson attribue la combure des os des rachitiques à ce

que les os croissent plus d'un côté que d'un autre.

Ce sentiment, qui est assez généralement adopté, est trèsconforme à mes observations, car comme le rachitis est une maladie qui n'attaque que les enfans, leurs os qui sont capables d'extension, peuvent croître plus d'un côté que d'un autre; beaucoup de choses peuvent produire cette dissérence, & lorsqu'une sois le petit os d'un enfant aura pris une petite courbure, elle deviendra d'autant plus considérable que s'os acquerra plus de longueur.

La différence qu'il y a entre le fentiment de Havers & celui de Glitson, c'est que le premier dit que l'os croît moins du côte qui s'endureit le plus, & que Glisson pensoit que le plus grand accroissement étoit du côté où l'os étoit le plus

dur.

Toutes mes expériences décident pour Haverr, ce qui me fait conjecturer qu'il conviendroit d'effayer d'appliquer à la partie concave de le jambe d'un rachitique des topiques émolliens, & à la partie convexe des defficatifs. Si à la tige d'un jeune arbre qui est courbe, on fait à la partie concave quelques incisions de travers avec la pointe d'une serpette, on observe que la tige se redresse un peu : par cette petite manceuvre on coupe les sibres longitudinales de l'écorce qui croient en tension, on donne lieu au titsu vésculaire de se

41 me Observation.

Réslexion.

dilater dans les petites plaies, enfin on fait croître un peu cet arbre de ce côté pendant qu'il ne croît point de l'autre, & il s'ensuit un petit redressement.

Il est bon de remarquer aussi que les pieux ou tuteurs qu'on met aux arbres pour les redreffer, produisent le même effet que les botines dans lesquelles on assujétit les jambes des

enfans qui se nouent.

Quoique j'aie traité affez au long dans mon premier Mémoire de ce qui regarde les fractures, je vais néanmoins Observation. rendre compte de quelques observations qui y ont rapport, & qui conviennent mieux au fujet que je traite qu'à ce qui

faisoit le sujet de mon premier Mémoire.

Tout le monde convient que les os se réunissent plus facilement & plus promptement quand les animaux sont jeunes que quand ils sont vieux, & Verduc dit que c'est parce que les vieillards ont le sang trop épais, & les tuvaux offeux trop étroits; je ne nie point que ces causes ne concourrent avec celles que j'ai rapportées dans mon premier Mémoire, qui me semblent sculement plus prochaines, mais je dis de plus que comme les os des jeunes animaux sont dans un état d'accroissement, comme ils ont encore à acquerir de la groffeur par l'addition de beaucoup de lames du périoste, il n'est pas surprenant qu'ils se rejoignent plus promptement & plus solidement que ceux des vieillards.

Néanmoins il faut encore remarquer que la prompte réunion des os dépend souvent du tempérament des animaux,

qui est plus ou moins disposé à l'ossification.

Il n'arrive que trop fréquemment, quoique ce foit prefque toûjours par accident, qu'un cal nouvellement formé, Observation, se rompt, & la Mothe, après en avoir cité plusieurs exemples dans la Chirurgie compléte, dit que le second cal se sorme plus promptement que le premier.

La raison en paroîtra simple si l'on fait attention que le premier cal àu moment de la seconde rupture, étoit à peu près dans le même état qu'est l'os d'un enfant dans un état mitoyen entre l'os & le périoste, & ce qui ajoute de la

12mc

Réflexion,

310 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE vrai-semblance à cette idée, c'est que probablement ces secondes ruptures arrivent à ceux qui ont un tempérament peu disposé à l'ossification.

On a remarqué que les os des doigts, & généralement Observation, tous les petits os se reprennent plus promptement que les gros.

Réflexion.

A l'égard des os des doigts, on sçait qu'ils s'endurcissent plus tard que les autres os, & généralement tous les petits os ont plus de periode relativement à leur malle, que les gros, ce qui doit faciliter leur réunion.

Et tout cela a son application à l'égard des arbres qui, quand ils ont ete grefie ou rompus, se retablifient d'autant

plus aisement qu'ils sont plus jeunes.

Observation.

Dans des fractures que j'ai faites aux os de disférens animaux, j'ai remarqué que quand elles avoient été faites avec éclat, & lorsqu'il y avoit beaucoup de désordre, ce qu'on appelle des fractures complèques, la tument du periotte prenoit quelquefois differentes figures, qu'elle ctoit fort grotie, & qu'elle le confondoit avec les tendons & les tuniques propres des muscles voisins, &c.

Résection.

Si j'avois pû être certain par avance de l'existence de cette consussion, je me serois bien gardé de tuer ces animaux pour reconnoitre après la parfaite gaerilon, s'il ne se seroit point fait quelque nouvelle adhérence des tendons avec le cal; mais comme la confusion dont je viens de parler, n'existe pas dans toutes les fractures compliquées, j'ai abandonné cette recherche.

Obtervation.

La Mothe, dans l'ouvrage que j'ai déjà cité, dit qu'ayant été appellé pour traiter une tracture compliquée avec celit, il l'avoit enfin guérie après y avoir employé beaucoup de temps & de peine. Ce malade mourut peu de temps après la guariton de la jumbe, & la Mothe dit qu'il fut fort surpris de trouver un éclat d'os qui avoit gliffé sur la portion d'os qui étoit resté entière, & s'y étoit attaché.

L'auteur que je viens de citer ajoûte qu'il en fut d'autant plus étonné, qu'il ne paroissoit pas qu'il y eût eu aucune exfoliation à l'endroit où l'esquille s'étoit appliquée, & que le périoste paroissoit même n'avoir éprouvé aucune blessure en cet endroit.

La Mothe, à en juger par ses ouvrages, étoit un Chirurgien fort adroit & plein de bon sens, & dans l'idée qu'il avoit que les os se réunissoient par un suc osseux qui suintoit des fibres des os, il avoit bien raison d'être surpris de voir une esquille d'os s'attacher à une portion d'os qui n'avoit point été entance, & qui même étoit resté recouverte de son périosle; mais dans mon sentiment il n'y a rien de plus étonnant de voir le périofte de l'esquille se souder au périofte de l'os, que de voir des écorces se souder l'une à l'autre comme elles le font dans les gresses.

M. de Fouchy a vû une cuillier d'yvoire qui ayant trempé long temps dans du petit lait aigre, étoit devenue affez molle. Observation.

Feu M. Hunauld fit voir l'été dernier à l'Académie, des os d'enfans qui devenoient mols comme du chamois quand on les mettoit tremper quelque temps dans l'eau, & qui reprenoient leur dureté quand on les laissoit quelque temps exposez à l'air; & ces os avoient acquis cette propriété en les laissant tremper long-temps dans du vinaigre.

Avec le secours de ces expériences, on conçoit comment par certaines maladies les os peuvent perdre leur dureté, & affurément si l'on peut parvenir à guérir ces sâcheuses maladies, il en peut résulter bien des changemens à la substance des os; mais je n'ai point du tout suivi cette recherche, qui m'a paru fort étrangère au sujet que je traite, & si j'en dis quelque chose en passant, ce n'est que pour prévenir quelques objections qu'on auroit pû me faire relativement à l'attendrissement des os.

Il me semble que les caries & les exfoliations n'ont pas plus de rapport au fujet que je traite, néanmoins la cure de Observation. cette maladie a donne lieu à une des plus fortes objections qu'on m'ait encore faites; je l'ai rapportée fort au long à la fin de mon second Mémoire, & je me trouve obligé de la rappeller ici en peu de mots, si ce n'est pas pour resoudre

Réflexion.

Réflexion.

48me

312 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE entièrement la dissiculté, je crois du moins être en état de

l'affoiblir confidérablement : voici l'objection.

Si après avoir découvert de ces aponévroses & de ces muscles un os carié, un pariétal, par exemple, on rugine cet os pour bien emporter le périoffe, on voit quelquefois bourgeonner de la subtrance de l'os des points charnus, & la plaie se cicatrister; donc, dit-on, ce n'est pas le perioste qui sert à l'accroissement & à la réparation des os.

Réflexion.

Indépendamment des réflexions que l'on peut trouver dans mon second Memoire, & que je ne répéterai point ici, voici une experience que j'ai faite bien des fois fur des arbres, qui prouve, ce me semble, que l'observation précedente

ne fait rien contre mon sentiment.

J'ai enlevé à la tige de jeunes arbres un anneau d'écorce de la largeur de quatre à cinq pouces, j'ai ensuite patse la tige de ces arbres dans un gros tuvau de cryffal qui enveloppoit toute la plaie; enfin j'ai aflujcti ce tuvau haut & bas à la tige de mes jeunes arbres avec de la vessie mouille. j'ai eu foin de mettre du côté du Soleil quelques corps opaques pour empêcher que par son action il ne dessechat trop la portion de l'arbre qui lui étoit exposée, & j'ai aperçu qu'il fortoit d'entre les mailles du réseau de fibres longitudinales, des points herbacez qui se joignoient les uns ses autres, & qui reparoient si bien l'écorce que j'avois enlevée, que l'arbre poutloit comme les autres. Oteroit-on conclurre de-là que ce n'est point l'écorce des arbres qui sait leur augmentation de groffeur? pourquoi donc conclurrat-on de l'expérience precédente que ce n'est pas le périoste qui sert à l'augmentation de grosseur des os?

Je me tiendrai pour le présent à cette seule réslexion. car pour donner une explication latisfaitante de cette obfervation, je ferois obligé de rapporter beaucoup d'experiences que j'ai faites sur le même sujet, qui me paroit affez intéressant pour être traité plus en détail dans un Memoire par-

ticulier.

On scait que quand une portion d'os est carice, il saut 40me Observation. que

que la partie viciée de cet os s'exfolie pour parvenir à une bonne cicatrice; cependant on rapporte dans les Mémoires de l'Académie de Chirurgie, plutieurs exemples de bonnes cicatrices qui fe font formées fur des os noirs & cariez, quoiqu'il n'y eût point eu d'exfoliation, & on a remarqué que quand cela arrivoit, il y avoit un petit cercle blanc adhérent à l'os, qui accompagnoit & précédoit en quelque façon les chairs grenues qui s'avançoient pour recouvrir la carie.

On ne voit que trop souvent dans les vergers des arbres dont le bois est carié, d'où il suinte une espèce de sanie rousseâtre qui détruit toutes les nouvelles productions que

l'écorce fournit pour fermer la plaie.

Les Jardiniers nomment ces espèces d'ulcères des Chancres; quelquesois ces caries se dessèchent, ou s'il en suinte une sanie, elle n'est plus mal faisante, puisque toutes les productions de l'écorce subsistent, & au bout de quelque temps la plaie est entièrement sermée, bien-tôt il n'y a plus de plaie, on n'aperçoit plus sur s'ulcère qu'une écorce nouvelle & un bois vis qui recouvrent néanmoins du bois mort qui reste dans l'intérieur.

De même je pense que s'il sort d'un os carié une sanie qui s'oppose aux efforts que le périoste sait pour recouvrir la carie, il sera impossible de procurer une bonne cicatrice pendant qu'il se tormera une lame offcuse bien conditionnée, & de bonne chair sur une carie qui ne détruira point les nouvelles productions du périoste; alors l'os mort sera renfermé comme un corps étranger sous le nouvel os qui l'aura recouvert.

J'ai vû, & ce n'est pas un exemple unique, une sille de dix-huit à vingt ans qui avoit perdu tout l'humerus, j'ai vû un morceau de cet os long de trois pouces ou environ, qui sortoit de la partie moyenne de son bras d'environ deux pouces de longueur; autant qu'on en pouvoit juger au toucher, il y avoit un bon pouce de cet os qui étoit enchâtse dans les chairs qui serroient sortement cet os de toute put, de telle sorte que sans qu'il y eût aucune plaie, & sans que cette tille soussirité

. Rr

Mem. 1743.

Reflexion.

Ol torvations

aucun mal, on voyoit un tronçon d'os tout entier, le canal medullaire & toute la fubilance compacte qui torme la partie principale de ce canal, qui fortoit de la partie movemae du bras de cette fille, & on pouvoit manier cet os qui cte le lett blanc, & le pencher meme de côte & d'autre fans faire de doub ur a la fille qui le portoit; elle m'affura qu'il ctoit des lorti de lon bras pluficurs troncons pareils, & elle me montra les cicatrices des trous par où ils étoient sortis; néanmoins cette fille remuoit son bras dans tous les sens, & à cela près qu'il étoit un peu plus foible que l'autre, il lui étoit tout temblable, car il étoit aussi bien nourri & de la même longueur.

Riflexion.

Je crois que cet os avoit été affligé d'une maladie fingulière, qui peu à peu l'avoit endommagé de même qu'une partie du periode, que cependant il ctoit reflé une portion de cette ny imbrane dans un ctat de fanté, qui s'étoit offifice, avoit profité & remplacé l'os qui avoit été endommagé; ful vu arriver quelque chose d'assez semblable à des arbres qui ont perdu presque tout seur tronc, & à qui il s'en étoit forme un nouveau par une fanière d'ecorce qui étoit reflé vive, pendant que tout le reste étoit mort.

Observation.

M. Hunauld a fait voir à l'Académie un crâne où l'on avoit appliqué une couronne de trépan; le trépané étant mort avant la guérifon du trepan, on voyoit une membrane qui occupoit toute l'étendue du trou & qui sortoit de la table * Vey les Mein. interne; il me paroît, dit M. Hunauld *, que cette membrane étoit la base de l'offitication qui devoit se faire; voilà, continue-t-il, qui est bien différent de l'idée qu'on donne de la façon dont le trou du trépan se remplit.

Remarque.

del'Ac. 1740.

. ., .

Atturement l'idée de M. Hunauld est bien différente de celle qu'on a ordinairement sur l'oblitération des trous du trépan, mais elle s'accorde très-bien avec mes idées sur la guerison des plaies des os; c'est probablement le périotte interne qui avoit formé cette membrane qui commençoit à sofficer, & c'eff ce qu'on aperçoit affez evidemment a finfpestion de ce crane, qui ett maintenant dans le cabinet de l'Académie.

RÉCAPITULATION.

Pour se former une idée du périoste des os & de l'écorce des arbres, il faut concevoir des fibres extrêmement sines, roulées en spirales, & rassemblées par faisceaux qui sont disposez en forme de réseau; voilà la charpente des lames du périoste ou de l'écorce, & si l'on imagine plusieurs de ces plans réticulaires posez les uns sur les autres, & dont les mailles sont rempties par une substance vesiculaire ou parenchymateuse, on aura une idée générale de la texture de ces enveloppes.

L'écorce recouvre le tronc, toutes les branches & tous les bourgeons des arbres dont même l'extrémité est toute écorce.

Le périoste recouvre tous les ligamens, tous les tendons & tous les os dont les extrémités dans les fœtus sont tout périoste.

Les bourgeons des arbres commencent par n'être que de l'écorce.

Les os commencent par n'être que du périosse, car je regarde les cartilages comme un périosse fort épais, & effectivement le périosse tumésié sur les fractures ressemble beaucoup à un cartilage.

L'alongement des bourgeons & des os est d'autant plus considérable qu'ils sont plus mols que les os, approchans plus de l'état de périoste & les bourgeons de l'état d'écorce; l'alongement diminue à proportion que l'endureissement sait du progrès, & il cesse quand l'endureissement est parfait; quand l'intérieur d'un bourgeon est bien converti en bois, il ne s'alonge plus, & de même l'os cesse de s'alonger quand il a acquis presque toute sa dureté.

Les os croifient donc en longueur comme les bourgeons des arbres; après les expériences que j'ai rapportées dans ce Mémoire, je ne crois pas qu'on fasse difficulté de me l'accorder, & c'est ce que je m'étois proposé de prouver.

Mais outre cela les principes que je viens de rapporter, étant une fois bien établis, j'ai cru pouvoir rendre raison de toutes

les obtervations qu'on trouve dans les meilleurs livres d'Anatemic au fujet des os, & pouvoir expliquer la formation des et is hyles, pourquoi elles ne font point adherentes aux os dins les entans, pourquoi elles ne font plus qu'une pièce avec les os dans les vieillards, comment le forme la fubiliance spongicule & la subtance corticale des os, pourquoi le cartilage intermediaire qui ett fi confiderable dans les enfans, s'efface avec l'age, pourquoi la fubiliance spongicuse des os est continue avec celle des epiphyles dans les animaux agez, pourquoi la labitance corticale est bien plus epaitle à la partie movenne des os longs que vers les extrémités, pourquoi on aperçoit des éminences plus confiderables aux os des vicillards qu'a ceux des enfans, comment les lig mens & les tendons s'insèrent dans les os; moyennant mes observations toutes ces choses qui appiravant paroidoient des mythères presqu'impenetrables, s'expliquent avec facilité.

J'ai passé de l'examen des os sains à celui des os malades, & connostiunt une sois que le perioste, les tendons & les liz mens qui ont reçu une contusion, une violente extension, une irritation considérable, ou qui se sont enslammez par des causes internes, tendent à l'ossissation, il m'est très aisé d'expliquer la sommition de presque toutes les enchyloses & les exostoses,

de même que la réunion des fractures.

L'extension du tissu vésiculaire dans les plaies des arbres qui forme à leur extérieur des loupes ligneuses, m'a encore facilité l'explication de quelques enchylotes & des cicatrices

des os.

Si-tôt que je sçais qu'un os continue de s'étendre dans la partie où il est encore tendre, si-tôt que je sçais qu'il y a des cusses particulières qui peuvent ralentir l'endureitément des os seulement dans certains endroits, & en même temps que la propriété de s'étendre en longueur diminue à mesure que l'endureitsement sait du progres, papercois une cause plus que probable de la difformité des os des rachitiques. Les observations que ses plus célèbres Anatomistes & les meilieux. Chirurgiens ont saites sur les os malades, bien loin de

DES SCIENCES.

contredire ma théorie, semblent donc la consirmer; c'est ce que j'ai cru devoir saire sentir avant de finir ce Mémoire.

Je sçais qu'il s'en saut beaucoup que je n'aie épuisé toutes les observations qu'on a saites tant sur les os sains que sur ceux qui sont malades, je crois bien même que s'on en pourra trouver qui paroîtront contraires à ma théorie, & si j'avois eu le temps de saire une recherche plus exacte des observations qui se trouvent dans les traités d'Anatomie & de Chirurgie, j'en aurois rapporté un plus grand nombre, & j'aurois principalement intissé sur celles qui m'auroient paru contraires à mon sentiment; car quoique je n'aperçoive pas qu'on puisse me saire d'autres objections que celles que j'ai discutées dans ce Mémoire, je suis neanmoins persuadé qu'il s'en présentera peut-ètre même de bien sortes, c'est le sort des découvertes : mais j'aurai lieu d'être satissait de mon travail si l'Académie juge que j'aie jeté quelque lumière sur un point de Physique qu'il est très-intéressant & qui n'avoit presque pas été ébauchés



DE LA CONJONCTION DE MARS AVEC SATURNE ET JUPITER.

Par M. CASSINI.

24 Juillet 1743. Ls Planètes de Saturne, Jupiter & Mars ont formé cette année 1743, un fort beau spectacle dans le Ciel par leur reunion dans la constellation du Lion, où elles sont

restées pendant l'espace de plusieurs mois.

Dans le mois de Février ces trois Planètes se sont trouvées en opposition avec le Soleil successivement les unes après les autres dans l'intervalle de 12 jours, Mars y avant passé le 16 de Février, Saturne le 21 & Jupiter le 28 du même mois, ou, ce qui revient au même, la Terre vûe du Soleil qui est au fover des orbes des Planètes principales, a passé en conjonction avec Mars, Saturne & Jupiter dans l'espace de 12 jours, ce qui est une circonstance très-rare, & qui ne peut arriver qu'après un intervalle d'un grand nombre d'années & peut être de fiècles; car comme Saturne & Jupiter ne peavent le rencontrer ensemble en opposition avec le Soleil, à la diffance de quelques degrés l'un de l'autre, qu'apres un intervalle d'environ 20 années, on peut juger qu'il faut un temps bien plus confiderable pour que Mars retourne avec Saturne & Jupiter dans fon opposition avec le Soleil, dautant plus que les oppositions de Mars avec le Soleil sont encore moins fréquentes que celles de Saturne & de Jupiter.

Ces Planètes étoient alors toutes trois dans la constellation du Lion, entre le cœur du Lion qu'on nomme ordinairement Régulus, qui est de la première grandeur, & la queue qui est de la seconde, & formoient par la variété de leurs mouvemens, différentes configurations qui ont attiré les regards du public, & nous ont paru mériter les recherches des Astronomes, qui doivent être toujours attentifs à prostiter de ces occasions rares pour perfectionner de plus en

plus les mouvemens des corps célestes.

Ce n'est pas que l'on ne puisse, en comparant les Planètes au Soleil & aux Fixes, déterminer dans tous les temps seur situation dans le Ciel, avec à peu près autant de précision que lorsqu'elles sont en conjonction les unes avec les autres; mais comme, suivant presque toutes les hypothèses playsiques, il doit y avoir quelques variations dans seurs mouvemens, suivant les différentes positions où elles se trouvent les unes à l'égard des autres, il est necessaire de les reconnoître pour y avoir égard dans seur théorie.

Vers le commencement du mois d'Avril, la Planète de Mars, après avoir été rétrograde, commença à devenir directe & à se rapprocher de Saturne & de Jupiter, dont les rétrogradations sont de plus longue durée; & le 16 Mai, jour qui précédoit celui où Mars devoit être en conjonction avec Saturne, nous observames avec M. Maraldi son passage par le Méridien, de même que celui de Saturne &

du cœur du Lion.

Quoiqu'il fift alors grand jour, le temps qui étoit fort ferein, permit de voir Régulus, Mars & Saturne par la lunctte du quart-de-cercle fixe, quoique très-foiblement.

Nous déterminames ensuite par le moyen d'une lunette montée sur la machine parallaelique, la disti, cence en ascension droite & en déclinaison entre Régulus, Mars & S. turne, qui

320 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE étoient à peu près sur le même parallèle, & passoient successivement par la même ouverture de la lunette.

A 10h 16 34', temps vrai, Régulus passa par le sil horaire.

10 27 24 Mars.

10 29 of Saturne.

Suivant ces observations la différence d'ascension droite entre Mars & Régulus étoit à 10h 27' 24", de 10' 50", qui, converties en degrés, font 2d 42' 57" dont Mars étoit plus oriental que Régulus; & la différence d'ascension droite entre Saturne & Mars étoit de 1' 36" ½, ou 24' 10" dont Saturne étoit plus à l'orient; ce qui faisoit voir que Mars n'étoit pas encore arrivé à sa conjonction avec Saturne.

Nous trouvames aussi que Régulus étoit plus méridional que Mars, de 14' 46", & que Saturne de 15' 26", avec une disserence de déclinaison entre ces deux Planètes, de

o' 4.0" seulement.

L'ascension droite de Régulus étoit alors de 148^d 39' 46", & sa déclinaison de 13^d 12' 50" vers le nord; ce qui donne l'ascension droite de Mars pour le temps de l'observation, de 151^d 22' 43", & sa déclinaison de 13^d 27' 36"; l'ascension droite de Saturne de 151^d 46' 55", & sa déclinaison de 13^d 28' 16".

Le lendemain 17 Mai, jour de la conjonction de Mars & de Saturne, on ne pût à cause de la lumière du jour, distinguer ces deux Planètes & Régulus à leur passage par le Méridien, & nous déterminames, de même que le jour précédent, leur alcension droite & seur déclination par le moyen de la machine parallactique.

A 10h 6' 6', temps vrai, Régulus passa par le fil horaire.

10 18 27 Mars.

10 18 39 Saturne.

Suivant ces observations la dissérence d'ascension droite entre Régulus & Mars étoit à 10h 18' 27", de 12' 21" \frac{1}{2}, ou de 3\frac{d}{5}' 53", & entre Mars & Saturne, de 0' 11" \frac{1}{2}, ou de 2' 53" de degré dont Saturne étoit plus à l'orient.

Nous

Nous trouvames auffi que Régulus étoit plus méridional

de 4' 53" que Mars, & de 14' 46" que Saturne.

Calculant par le moyen de cette observation & de celle du jour précédent, la situation de Mars & de Saturne, on trouve que leur conjonction en longitude est arrivée le 17 Mai à 9^h 23′ 25″ du soir, ces deux Planètes étant à 29^d 2′ 37″ du Lion, la latitude de Saturne étant de 1^d 44′ 46″ vers le nord, & celle de Mars de 1^d 34′ 42″; & que leur conjonction apparente dans le temps qu'elles ont éte le plus près l'une de l'autre, a dû paroître à 8^h 49′ 0″, Saturne étant plus septentrional que Mars de 0^d 10′ 3″. Comme cette conjonction est arrivée dans l'intervalle entre les observations du 16 & du 17 comparées à la même étoile, sa détermination doit être plus exacte que dans toute autre circonstance.

La conjonction de Mars avec Saturne a été suivie de celse de Mars avec Jupiter, qui devoit arriver au commencement

du mois de Juin de cette année.

Le 1^{er} de ce mois à 10^h 1' 48" du foir nous observames. à Thury, M. Maraldi & moi, avec une lunette dressée sur une machine parallactique, la différence d'ascention droite entre ces deux Planètes, que nous trouvames de 0^h 0' 29", ou de 0^d 7' 15" dont Mars étoit plus à l'occident que Jupiter, & leur dissérence en déclinaison de 0^d 1' 52" dont Mars étoit plus vers le nord. Comme le Ciel étoit presqu'entièrement couvert, on ne put pas ce jour-là comparer ces deux Planètes avec quelques étoiles du Lion qui futient dans le même parallèle.

Le 2 Juin à 9^h 47' du soir nous observames de la même manière la différence d'ascension droite entre Jupiter, Mars & une étoile dans l'aisselle du Lion, nommée p par Bayer, qui étoit à peu près dans le même parallèle, dont l'ascension droite étoit alors de 154^d 48' 43", & la déclinaison septentrionale de 10^d 36' 50"; & l'on trouva à 9^h 47' 10", la dissérence d'ascension droite entre la Fixe & Jupiter, de 13' 0"½, ou 3^d 15' 40", & entre Jupiter & Mars, de 0'. 53"½, ou de 13' 25" de degré dont Mars étoit plus à Mem. 1743.

Forient, au lieu que le jour precedent il ctoit plus à l'occident, ce qui fait voir que ces deux Planètes avoient été en confonction dans l'intervalle entre les deux observations du 1^{er} & du 2 Juin. On trouva aussi que la Fixe étoit plus septentrionale que Jupiter de 5' 47", & que Mars de 13' 0".

Suivant ces observations l'ascension droite de Jupiter étoit de 158d 4' 24", & sa déclinaison de 10d 31' 3" vers le nord; l'ascension droite de Mars de 158d 17' 47", & sa

déclinaison de 10d 23' 50" vers le nord.

Enfin le 3 Juin ayant comparé Mars & Jupiter avec la même étoile, on trouva à 10^h 1' 47" l'ascension droite de Jupiter de 158^d 9' 53", & sa déclination de 10^d 29' 5" vers le nord; l'ascension droite de Mars de 158^d 44' 7",

& sa déclinaison de 10d 11' 57".

Calculant par le moyen de ces observations la conjonction en longitude de ces deux Planètes, on trouve qu'elle eff arrivée le 2 Juin à 5h 51' du matin, à 5d 45' 34" de la Vierge, la latitude de Jupiter étant de 1d 12'40" vers le nord, & celle de Mars de 1 d 11' 28" du même sens, avec une différence seulement de 1' 12" entre leur centre, & d'environ 40 secondes entre les deux bords; de sorte que ces deux Planètes ont passé fort près l'une de l'autre, & ont du même le contondre ensemble à la vue simple, à cause des ravens de Jupiter qui s'etendent beaucoup au dela de sa circonterence. Comme cette conjonction est arrivee 5 heures après le coucher de ces Planètes sur notre horizon, elle n'a pû être aperçue que par les Astronomes qui sont dans les Indes ecci lentales, a qui il a ete réfervé de pouvoir l'observer immediatement; nous tommes expendant perfuade? d'avoir determiné la diffrace entre ces deux Planètes pour le temps de leur conjonction, avec à peu près autant de precifion que si elle avoit paru sur notre horizon.

Avant que de faire usage de ces observations, nous avons d'abord examiné quelle étoit la situation de ces Planètes entr'elles, & par rapport à l'écliptique au temps de leur opposition avec le Soleil qui aveit précède; car comme leur

vrai lieu vû du Soleil par rapport à l'écliptique est alors le même que leur vrai lieu vú de la Terre, on ne leur a reconnu jusqu'a présent dans cette situation d'autre inégalité que celle qui résulte de seur mouvement sur leur orbe.

La première de ces oppositions, qui est celle de Mars avec le Soleil, est arrivée entre le 16 & le 17 Février, & nous l'avons déterminée par le paffage de Mars au meridien, obfervé le 14 & le 18, avant & après cette opposition, comparé à Régulus qui en étoit peu éloigné.

Suivant ces observations l'opposition de Mars avec le Soleil est arrivée le 16 Février 1743, à 6h 40' du matin, le vrai lieu de Mars étant à 27d 16' 10" du Lion, avec une

latitude de 4^d 29' 6" vers le nord.

Calculant pour ce temps, suivant nos Tables, le vrai lieu de Mars, on trouve sa longitude à 27d 17' 3" du Lion, plus grande seulement de 0' 53" qu'elle n'avoit eté observée. & sa latitude vûe de la Terre de 4d 29' 6", précisément de même que suivant l'observation.

La seconde de ces oppositions, qui est celle de Saturne avec le Soleil, est arrivée entre le 20 & le 21 Février, quatre jours après celle de Mars, & nous l'avons déterminée par le puffage de Saturne par le méridien observé le 1.4 & le

28 Février, comparé à celui de Régulus.

Suivant ces observations l'opposition de Saturne avec le Soleil est arrivée le 21 Février 1743, à 5^h 44' du matin, le vrai lieu de cette Planète étant à 2^d 15' 50" de la Vierge, avec une latitude septentrionale de 1^d 49' 51".

Calculant pour le temps de cette opposition le vrai lieu de Saturne, on trouve sa longitude à 2d 28' 25" de la Vierge, plus grande de 12'35 que fuivant l'observation, & sa latitude vue de la l'erre de 14 49 36, avec une difference seulement de 15 secondes de celle qui avoit été observée.

Cette différence de 12' 35" entre le calcul du vrai lieu de Saturne & l'observation, m'a paru si considerable que j'ai cru devoir examiner d'où elle pouvoit provenir; j'ai pour cet esset choiti une opposition de Saturne avec le Solcil, qui

est arrivée le 18 Février de l'année 1684, 59 années & 2 jours avant celle de 1743, dans laquelle le vrai lieu de Saturne sut observé à 0^d 34' 27" de la Vierge. Calculant pour ce temps le vrai lieu de Saturne, on le trouve à 0^d 32' 18" de la Vierge, moins avancé de 2' 9" que suivant l'observation, au lieu qu'en 1743 il étoit plus avancé de 12' 35".

Dans l'observation de 1684 Saturne étoit éloigné seulement de 1^d 41' du lieu où il étoit dans l'observation dernière, après avoir achevé deux révolutions entières sur son orbe, son anomalie moyenne, ou la distance à son aphélie, étoit dans le même degré qu'en 1743; de sorte que cette Planète étant au même endroit de son orbe dans les deux observations, devoit avoir une même équation. D'ailleurs, comme elles sont arrivées à deux jours près l'une de l'autre, le Soleil dont on emploie les mouvemens pour déterminer le temps & le lieu des oppositions, devoit aussi avoir à peu près la même équation.

Toutes ces circonstances sont savorables pour pouvoir discerner à quoi l'on doit attribuer la dissérence que l'on a

trouvée entre l'observation & le calcul.

Car comme l'équation des Planètes doit être la même dans le même point de leur orbe, quelque figure & quelqu'excentricité qu'on leur attribue, Saturne se trouvant en 1743 dans le même degré de son orbe où il étoit en 1684, on auroit dû trouver les mêmes dissérences dans l'une & l'autre de ces observations, puisque d'ailleurs le Soleil se trouvant aussi à peu près dans le même lieu de son orbe, il n'y a pû produire aucune variation sensible.

Mais comme on pourroit soupçonner que ces dissérences provienment de ce qu'on a suppose dans les l'ables le mouvement de Saturne sur sen orbe & celui de son aphelie différens de ce qu'ils sent effectivement, j'ai examine deux observations interm diaires de l'opposition de Saturne avec le Soleil, du 12 Février 17 13 & du 26 Février 17 14, dans lesquelles cette Planète s'est trouvée à peu près dans le même endroit de son cibe qu'en 1684 & 1743, avec une différence de quelques

degrés en plus ou en moins; dans la première de ces obter-

vations j'ai trouvé le lieu de Saturne à 24d 45' 41" du Lion, plus avancé de 12' 7" que celui qui résulte des Tables. & dans la seconde, à 8d 10' 0" de la Vierge, plus avancé aussi de 13' 14" que suivant le calcul, dissérences à peu près les mêmes que celles que l'on a trouvées en 1743; de sorte que si l'on attribuoit ces différences au mouvement de Saturne sur son orbe, il saudroit qu'après que cette Planète auroit eu une certaine quantité de mouvement pendant l'espace d'environ trente années, ce mouvement se sût ralenti dans le même intervalle jusqu'a présent, d'une quantité d'environ 3 o secondes par année, ce qui dans la même progression produiroit so minutes en cent années, & plus de 15 degrés depuis les plus anciennes observations de Saturne jusqu'à nous, ce que l'on ne peut pas admettre sans rejeter entièrement toutes les anciennes observations; il faudroit aussi supposer une dissérence encore beaucoup plus grande dans le mouvement de l'aphélie de Saturne, pour représenter le vrai lieu de Saturne tel qu'il a été observé; on ne peut donc point attribuer ces dissérences à quelqu'erreur dans les élémens que nous avons employez dans la theorie de Saturne, & il est nécessaire de conclurre que si quelques Tables astronomiques réussissent mieux à représenter les observations modernes, elles ont dû s'en écarter dayantage dans celles qui les ont precedees, & que cela revient à peu près au même.

Nous nous étions déjà aperçus de ces différences dans nos Elémens d'Astronomie, où nous avons remarqué que la fituation du périhélie de Saturne, déduite des observations saites avant & apres son pallage par ce parihelie, étoit différente de celle de l'aphélie; on ne peut guère supposer que cette dissérence provienne de ce que ces deux points de l'aphélie & du périhelie ne se trouveroient point à l'opposite l'un de l'autre dans la ligne qui passe par le Soleil, & nous jugeames que cet effet pouvoit provenir de quelque libration dans l'axe de l'orbe de Saturne; cette conjecture paroît être appuyée par les observations que nous venons de rapporter. Il se peut faire

Sliij

autif que le position de Saturne à l'egard des autres Planètes contribue à ces irrégularités, c'est ce que nous tâcherons de vérisser par les observations que nous nous proposons de saire dans les circonstances propres à nous en éclaireir.

L'opposition de Saturne avec le Soleil, du 21 Février, a été suivie de celle de Jupiter qui est arrivée le 28 du même mois.

Pour la déterminer nous avons observé le passage de Jupiter & celui du cœur du Lion par le méridien le 28 Février & le 1^{er} Mars, immédiatement avant & après le temps où cette Planète devoit être dans son opposition, & nous avons trouvé qu'elle est arrivée le 28 Février à 5^h 45' du matin, Jupiter étant à 9^d 17' 33" de la Vierge.

Calculant pour ce temps le vrai lieu de Jupiter, on le trouve à 9^d 15' o" de la Vierge, avec une dissérence seule-

ment de 2' 33".

Il est à remarquer que ces oppositions ont été déterminées toutes les trois par rapport à la même étoile du cœur du Lion, ce qui doit donner une plus grande précision que si l'on y avoit employe différentes étoiles dont la situation pourroit n'être pis connue audi partaitement & différer de quelques

secondes ou minutes en plus ou en moins.

Il nous reste présentement à examiner de quelle manière nos l'ables representent les conjonctions de Mars avec Saturne & Jupiter, des 17 Mai & 1^{er} Juin, qui étant arrivées hors de l'opposition de ces Planètes, demandent qu'on y emploie un plus grand nombre d'elemens, & principalement la seconde inegalite qui est produite par la différence entre le vrai sieu des Planètes vues de la Terre & du Soleil, & suppose que l'on connoisse exaclement la sigure & la grandeur des orbes de ces Planètes par rapport à l'orbe annuel.

Ces observations sont meme d'aut un plus savorables pour cette recherche, qu'elles ont etc faites près des moyennes distances entre leurs conjonctions & oppositions avec le So-

leil, où cette inégalité est la plus grande.

Dans la conjonction de Mus avec Saturne, qui est arrivée le 17 Mai à 9^h 23' du foir, nous avions trouvé la longitude

de ces deux Planètes, de 4^f 29^d 2′ 3^{-#}; calculant pour ce temps le vrai lieu de Mars, on trouve la longitude de Mars de 4^f 29^d 4′ 45[#], plus grande de 2′ 8″ qu'elle n'a été observée; on l'avoit trouvee dans le temps de son opposition, plus grande de 5 3 secondes que suivant l'observation, de sorte qu'il n'y a qu'une différence de 1′ 15[#] que l'on puisse attribuer au défaut de précision dans la seconde inégalité de cette Planète.

Calculant pour le même temps la longitude de Saturne qui doit être la même que celle de Mars, on la trouve de 4¹ 29⁴ 15' 10", plus grande de 12' 33" que fuivant l'observation, ce qui ne s'éloigne que de 2 secondes de la différence qu'on

a trouvée au temps de son opposition avec le Soleil.

Enfin si l'on calcule le vrai lieu de Mars & de Jupiter pour le temps de leur conjonction qui est arrivée le 2 Juin à 5^h 50' du matin, la longitude de ces deux Planètes étant de 5^f 5^d 45' 34", on trouvera d'abord celle de Mars de 5^f 5^d 47' 45", plus avancée de 2' 11" que suivant l'observation; on l'avoit trouvée au temps de son opposition plus grande de 53 secondes, de sorte qu'il n'y a que 1' 18" de dissérence que l'on puisse attribuer au désaut de précision dans la seconde inégalité de cette Planète.

Calculant pour le même temps la longitude de Jupiter qui doit être la même que celle de Mars, on la trouvera de 5 5 4 42 43", plus petite de 2 5 1" qu'elle n'avoit été observée; on l'avoit trouve au temps de son opposition plus petite de 2 33", de sorte qu'il n'y a qu'une dissérence de 0 18", qui

est très-peu sensible.

Toutes ces observations font voir que les élémens dont on l'est servi pour determiner la seconde inégalité de Mars, Jupiter & Saturne, representent aflez exaclement la sigure que l'on a attribuée à leur orbe, & le rapport de leur grandeur entr'elles, & à l'orbe annuel; ce qui est d'une très-grande conséquence pour la perfection de la theorie de ces Planètes, car comme on ne les voit jamais dans le lieu où elles sont véritablement dans le ciel qu'au temp de leur opposition, que celles de Saturne n'arrivent qu'une sois en un an & quelques

jours, celles de Jupiter qu'en treize mois, & celles de Mars qu'après l'espace de plus de deux années; si l'on pouvoit être assuré de l'exacte figure & de la grandeur de seur orbe, on auroit dans tous les temps de l'année seur veritable sétuation dans tous les points de seur orbe, au lieu qu'on n'en a qu'un petit nombre dans l'espace d'une révolution entière de ces Planètes autour du Soleil.

L'observation que nous avons faite cette année de la conjonction de Mars avec Jupiter par rapport au cocur du Lion, nous a donné occasion de taire de noavelles recherches sur la

théorie de ces deux Planètes.

On peut voir dans mes Elémens d'Astronomie la dissiculté qu'il y a de représenter seur longitude & seur latitude suivant les observations anciennes qui paroissent se contredire, ce qui a jeté jusqu'à présent les Astronomes dans un grand embarras pour tâcher de les concilier ensemble.

La plus ancienne de ces observations est celle de la conjonction de Mais avec le front borcal du Scorpion, observee l'annec 5 2 depuis la mort d'Alexandre, la 4-6 de Nabonatiar, entre le 20 & 18 h au méridien d'Alexandrie; cette observation réduite à nos époques & à notre méridien, se rapporte au 17 Janvier de l'année 27 1 avant J. C. à 16 h 8′, suivant notre manière de compter, ce qui s'accorde au temps que Képler, Bouilland & le l'. Riccioll lui ont assigné: ainsi il n'y a aucune difficulté sur celui auquel cette observation est arrivée.

Il n'en est pas de même sur le choix de l'étoile qui se trouva

alors en conjonction avec Mars.

Képler dans la theorie de Mars trouve que supposant que l'étoile désignée par Ptolémée soit la plus boréale des trois Chaires qui sont dans le front du Scorpion, le vrai lieu de cette Planète avec laquelle elle étoit en conjonction, dissère de 1^d 3 1' 28" de celui qui résulte de ses Elémens, ce qui lui fait juger que Ptolémées'est trompé, ce qu'il prétend prouver par ses paroles mêmes; « car le front du Scorpion a, dit-il, six étoiles claires dont il y en a trois plus remarquables qui

font

72)

font de la troisième ou plûtôt de la seconde grandeur, les « trois autres sont de la quatrième ou plûtôt de la troisième « grandeur, dont l'une est plus élevée & plus septentrionale que « les trois Claires; or si, ajoüte Képler, l'Observateur avoit nommé Front boréal la luisante qui est dans le front, n'y auroit-il « pas eu de l'équivoque dans ses expressions, puisqu'il auroit « appellé simplement Boréale celle qui étoit la plus claire des « boréales, mais qui n'étoit pas la plus boréale? » D'où il conclud que celle qui a été jointe à Mars, est la plus boréale de toutes celles qui sont dans le front du Scorpion, d'autant plus qu'elles accorde mieux à la longitude de Mars qu'il a supputée.

Il avoue cependant qu'il y a quelque dissiculté sur la latitude de cette Planète qui, dans sa conjonction avec cette étoile, se trouve plus grande que celle qui résulte de ses hypothèses, ce qu'il tâche d'expliquer par un mouvement qu'il attribue aux étoiles sixes en latitude; il conjecture même que cette conjonction de Mars pouvoit n'être pas précise, mais seulement en longitude, & il se réduit ensin à dire qu'il se pourroit faire qu'y ayant trois étoiles dans la partie boréale du front du Scorpion en sorme de triangle, on ait dit que Mars étoit joint au front du Scorpion lorsque cette Planète étoit au milieu de ces étoiles, ce qui, selon lui, peut s'expliquer de cette manière avec d'autant plus de raison que l'Observateur n'a pas dit que Mars sût joint à la boréale du front, mais au front boréal, ce qui ne s'entend point d'une étoile singulière, mais d'une partie de toute la constellation.

Quelque déférence que nous ayons pour les sentimens de Képler, nous ne croyons pas devoir nous y conformer dans cette occasion, & nous sommes persuadez que l'étoile du front boréal du Scorpion ne peut s'entendre que de la plus boréale des trôis qui sont dans le front du Scorpion, appellée & par Bayer, & qui est de la seconde grandeur; car Ptolémée, dans le rapport qu'il fait de cette observation, dit que Mars parut en conjonction avec le front boréal du Scorpion, & que, suivant ses observations, l'étoile qui est dans le front boréal du Scorpion étoit éloignée de 6^d 20' du Scorpion, ce qui est

Mem. 1743.

p. 250. exprimé en ces termes: Stella Martis cernebatur boreali Scorpionis incumbere fronti; Fixa verò qua est in boreali fronte Scorpionis, à nobis observata est etiam distans à Scorpione gradibus 6

nis, à nobis observata est etiam distans à Scorpione gradibus 6
p. 180. minutis 20. Et dans son Catalogue des étoiles fixes il attribue à la boréale des trois Claires qui sont dans le front du Scorpion, la même longitude de 6d 20' du Scorpion, ce qui est écrit en ces termes: Borealis de tribus Splendidis que sunt in fronte m 6d 20'; ce qui semble lever toute équivoque, puisqu'il s'explique lui-même en désignant dans son Catalogue par la plus boréale des trois Claires qui sont dans le front boréal du Scorpion, celle qu'il avoit nommée ailleurs Front boréal: ainsi je crois qu'il n'y a aucune dissiculté sur l'étoile que Pto-lémée a jugé avoir eté en conjonction avec Mars; & comme nous ne tenons cette observation que de lui, il ne paroît pas qu'il y ait aucun moyen de la lui contester.

Supposant donc que l'étoile qui étoit en conjonction avec Mars, est la plus boréale des trois Claires qui sont dans le front du Scorpion, dont la longitude est marquée dans mes Tables pour le 1^{et} Janvier de l'année 1741, à 29^d 35'50" du Scorpion, & la latitude de 1^d 3'10' vers le nord, nous avons retranché de cette longitude 27^d 56'40" qui mesurent le mouvement des étoiles fixes à raison d'un degré en 72 années, pendant l'intervalle de 2012 années depuis le 17 Janvier de l'année 27 1 avant Jesus-Christ, jusqu'au 1^{et} Janvier 1741, & nous avons trouvé qu'au temps de cette conjonction la longi-

tude de cette étoile devoit être en m 1d 39' 10".

Calculant, suivant mes Tables, le lieu de Mars vû de la Terre pour le même temps, on trouve sa longitude en m 2d 6' 1", plus avancée de 26' 51" que l'étoile B du Scorpion avec laquelle il devoit être en conjonction, & sa latitude de 1d 13'31" vers le nord, plus grande de 10' 21" que celle de cette étoile.

Depuis la conjonction de Mars avec l'étoile & du Scorpion, il s'en trouve deux autres de cette Planète avec Jupiter, rapportées par Bouillaud dans son Astronomie Philolaïque, qu'il a tirées d'un manuscrit grec, dont la première est marquée en ces termes:

P ,--

"J'ai vû après le coucher du Soleil l'année 214 de Dioclétien, entre le 6 & le 7 de Pachon, à deux heures de nuit, « l'étoile de Mars jointe a celle de Jupiter, de manière qu'il n') « avoit entr'elles aucun intervalle. »

Cette observation réduite à nos époques se rapporte au 1 er Mai de l'année 49 8 après J. C. à 8h 18' du soir au méridien de Paris.

Calculant pour le temps de cette conjonction, suivant nos Tables, le vrai lieu de Mars, on le trouve en m od 7' 4", avec une latitude boréale de 1d 28' 29"; si l'on calcule pour le même temps le vrai lieu de Jupiter, on le trouve en m od 35' 33", plus avancé de od 28' 29" que celui de Mars, avec une latitude septentrionale de 1d 21' 24", plus méridionale de 7' 5" que celle de Mars avec lequel il devoit être en conjonction; ainsi au lieu que par l'observation précédente Mars paroissoit plus avancé de 26' 51" que l'étoile \(\mathcal{B} \) avec laquelle il étoit en conjonction, il se trouve au contraire que dans cette observation il étoit moins avancé de 28' 29" que Jupiter auquel on l'a comparé.

Mais comme cette différence pourroit bien être causée en tout ou en partie par le défaut de précision dans les mouvemens de Jupiter que l'on a employez dans cette recherche, nous avons jugé devoir nous en assurer par une observation de la conjonction de Jupiter avec Régulus, qui est arrivée dix années après, & qui est rapportée par Bouilland en cette manière: p. 23.

"L'an 225 de Dioclétien le 30 de Thoth, Jupiter parut fi prè du cœur du Lion, qu'il n'en étoit éloigne que de trois « doigts dans le temps qu'il en étoit le plus proche."

Le temps de cette observation se rapporte au 26 Septembre

de l'année 508 à 16h 8' au méridien de Paris.

La longitude du cœur du Lion étoit au 1^{er} Janvier 1741 en Ω 26^d 14' 10'', dont retranchant 17^d 7' 0'' pour fon mouvement dans l'intervalle de 1232 années & 4 mois, on aura la longitude pour le temps de la conjonction avec Mars en Ω 9^d 7' 10''.

A l'égard de sa latitude, si l'on suppose qu'elle n'a pas T t ij

varié dans l'intervalle de temps depuis cette observation jufqu'à nous, elle devoit être, comme on la trouve présentement, de 0^d 26' 40" vers le nord. Y ajoûtant 7' 30" qui repondent à trois doigts dont Jupiter étoit plus boréal que cette étoile, on aura la latitude de Jupiter pour le temps de cette obser-

vation, de od 34' 10" vers le nord.

Calculant pour ce temps le vrai lieu de Jupiter, on trouve fa longitude en Ω 9^d 5' 50", qui ne dissère que de 1' 20" de celle de l'étoile, & sa latitude de 0^d 37' 5", plus grande seulement de 2' 55" qu'elle n'auroit du être au temps de sa conjonction, ce qui est d'une précision sussition sus sance cette observation n'a été saite qu'à la vûe simple, il se peut saire qu'à cause de la lumière de Jupiter dont les rayons se répandent à quelque distance, le cœur du Lion ait paru joint à cette Planète lorsqu'il n'en étoit éloigné que de peu de minutes.

Le vrai lieu de Jupiter ayant donc été représenté avec assez de précision pour le temps de cette observation, il suit que s'il y a quelque correction à faire, ce doit être dans les mou-

vemens de Mars.

J'ai donc examiné s'il y avoit quelque moyen de concilier la conjonction de Mars avec l'étoile & du Scorpion, de l'année 271 avant J. C. avec celle de cette Planète & de Jupiter qui a été observée en 498, & j'ai trouvé qu'en supposant le mouvement de Mars plus grand de 1' 30" en cent années, celui de son aphélie plus petit de 15 minutes dans le même intervalle de temps, & celui de son nœud plus grand de la même quantité, on représente ces deux conjonctions avec affez de précifion, puisque dans la première on trouve la longitude de Mars en m 1d 46' 56", éloignée seulement de 7' 46" de l'étoile & du Scorpion, avec une latitude de 1 d 4' 13" vers le nord, qui ne dissere que de 1'3" de celle de la Fixe, & qu'au temps de la conjonction de Mars avec Jupiter du 1er Mai de l'année 498, ces deux Planètes ne devoient être éloignées l'une de l'autre que de 4 minutes en longitude & 2 minutes en latitude.

Enfin pour nous assurer encore davantage de la quantité

des mouvemens de Mars, nous avons employé une semblable observation de la conjonction de Mars avec Jupiter, tirée du

même manuscrit, & conçue en ces termes:

"L'année 225 le 19 de Pauni, après le coucher du Soleil l'étoile de Mars fut jointe à l'étoile de Jupiter, de manière qu'elle paroifsoit en être éloignée d'un doigt contre la suite ques signes, & de deux doigts vers le midi, quoique les nom- bres de la Table & de la grande Syntaxe marquassent que ces deux Planètes devoient être au même endroit le 23, "temps auquel elles parurent sort éloignées l'une de l'autre."

Cette observation réduite à nos époques se rapporte au 13 Juin de l'année 509, à 8h 18' du soir au méridien de Paris. Calculant pour ce temps le vrai lieu de Mars, en y employant la même correction que ci-dessus, on trouve sa longitude en Q 12^d 5' 23", à laquelle si l'on ajoûte 2' 30" qui répondent à un doigt dont Mars avoit paru éloigné de Jupiter contre la suite des signes, on trouvera que Jupiter devoit être alors en Q 12^d 7' 53", éloigné seulement de 1' 15" de son vrai lieu qui, suivant nos Tables, devoit être en Q 12^d 9' 8".

On ne trouve pas un accord si pars it dans la latitu le de ces d'ex Planctes, celle de Mass devant être de 1ª 8' 44' & celle de Jupiter de 0ª 55' 49", avec une différence de 12' 55" à laquelle il saut ajouter 5 minutes dont Massa para plus méridional que Jupiter, ce qui produiroit une erreur de 17'

55" for la latitude de Mars.

Comme dans la conjonction de cette Planète avec Jupiter, qui étoit arrivée onze années auparavant, on avoit repréfenté fa latitude avec une affez grande précifion, il n'y a aucun moyen de les concilier ensemble, parce que le lieu du nœud auquel il faudroit faire une correction de plusieurs degrés, ne peut pas être sujet à une variation si grande dans un intervalle aussi petit : de sorte que se son ve it admettre cette obtenvation il saut qu'il se soit glissé quelqu'erreur dans la détermination de la latitude de Mars, qui auroit pû être, par exemple, boréale à l'égard de Jupiter, au lieu qu'on l'a marquée australe,

334 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE ce qui n'est pas sans exemple; l'étoile & de l'Ecrevisse, nommée ordinairement l'Afne austral, dont la latitude est certainement de cd 3' 50" vers le nord, étant marquée dans le Catalogue des étoiles fixes de Tycho, de od 4' vers le midi, ce qui est, selon les apparences, une erreur de copiste, à moins que cette étoile n'ait eu un mouvement réel de 7 à 8 minutes dans l'intervalle d'un siècle & demi, depuis Tycho jusqu'à nous, ce que l'on ne doit point admettre sans l'avoir vérifié.

Nous avons supposé dans cette recherche que les mouvemens de Jupiter tels qu'ils font marquez dans nos Tables, avoient été déterminez avec assez de précision, & nous y avons été fondez sur ce qu'ils représentent exactement la conjonction de cette Planète avec le cœur du Lion arrivée en 508; mais il faut avouer qu'en examinant une conjonction de Jupiter avec l'étoile & de l'Écrevisse, qui est arrivée le 3 Septembre de l'année 240 avant J. C. & qui est rapportée p. 410. par Ptolémée dans son Almageste dont nous avons sait mention dans nos Elémens, on trouve cette Planète en 5 64 44' 10", éloignée de 52 minutes de la longitude du cœur du Lion, determince pour le même temps, quoique la latitude soit précifement la même, ce qui jette quelqu'incertitude fur ces obtervations qu'il nous a cte impossible de pouvoir concilier, quelque correction que l'on ait faite aux elemens qui fervent à la théorie de cette Planète.

Ainsi il est absolument nécessaire de conclurre qu'il y a eu quelque variation dans le mouvement de ces Planètes, jusqu'à présent inconnue, ou que dans quelques-unes de ces observations il s'est glissé quelqu'erreur que, selon les apparences, l'on ne pourra découvrir que lorsque par les observations modernes on aura réglé avec affez de précision leur mouvement pour pouvoir déterminer quelle a dû être leur véritable situation dans les temps les plus reculez.

452000

REMARQUES SUR LES MONSTRES.

Cinquième & dernière Partie.

Par M. WINSLOW.

J'AVOIS commencé mon Mémoire de 1 142 par avertir que sans un reste d'engagement je me serois volontiers déterminé à ne plus toucher à cette matière, & à laisser au jugement du public mes autres Mémoires là-dessus, de même que ceux qui y ont été opposez, étant persuadé que par les miens on pouvoit clairement voir que je n'ai nullement prétendu exclurre en toute occasion les conformations extraordinaires par accident, ni admettre en toute occasion les conformations extraordinaires d'origine, & que je n'ai fait que proposer sur un système général & exclusis mes dissicultés, dont plusieurs sont restées entièrement sans réponse.

J'avois dit à la fin du même Mémoire que je donnerois dans la fuite simplement le résultat général de toutes les remarques précédentes que j'avois promis, & mes observations sur les essets qu'on attribue à l'imagination de la mère par rapport au sœtus dont il est fait mention dans le titre de mon Mémoire de 1733, & que ce seroit ainsi que je sinirois ces matières sans nouvelle discussion, d'autant plus que M. Haller peu de temps après sa Dissertation de 1739, dont j'ai donné l'extrait & rendu compte dans le sussit Mémoire de 1742, en a encore publié une autre intitulée: De Monstris. Dissertatio II, è c. quà ... ad contraria D. Lemeryi argumenta responsiones continentur.

Mais comme parmi plufieurs exemples que j'avois omis exprès dans mes deux premiers Mémoires pour en éviter la longueur, quelque, -una m'ont depuis paru très remarquables,

336 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE & que d'autres ont été ensuite communiquez à l'Académie, j'ai cru devoir les rapporter ici auparavant avec des restensions pareilles.

ARTICLE PREMIER.

Rapport de quelques exemples emis ci-devant, & d'autres observez depuis.

(1) 1706. Histoire de l'Académie Royale des Sciences. M. Méry a fait voir un œuf de poule cuit dont le blanc rensermoit un autre petit œuf revêtu de sa coque & de sa membrane intérieure, & rempli de la matière blanche, sans jaune. Comme ce petit œuf avoit été donné cuit à M. Méry,

il n'a pû remarquer s'il avoit un germe. *

(2) 1709. Hill. de l'Acad. Roy. des Sc. M. Plantade de la Société Royale de Montpellier étant à Paris, a trouvé à ses repas, deux fois de suite en assez peu de temps, deux poulets qui avoient chacun deux cœurs. Il donna ceux du dernier à M. Cassini le fils qui les porta à l'Académie. M. Littre les examina, il commença par les ramollir dans de l'eau tiède pour les mettre en état d'être difféquez; ils étoient égaux entr'eux, & seulement tant soit peu plus petits chacun que le cour d'un poulet de même age; ils éterent fituez à côté l'un de l'autre à demi-pouce de distance, avoient chacun leurs ventricules, leurs oreillettes & tous leurs vaisseaux sanguins comme les cœurs ordinaires, & n'avoient rien de singulier, finon qu'ils étoient attachez tous deux par leur veine-cave inférieure à un des lobes du foie ... « Cette conformation » qui, selon ce qu'on a vû (dit là-dessus M. de Fontenelle) » n'est pas apparemment sort rare dans cette espèce, ne doit pas » être impossible dans l'homme, & peut-ètre a-t-elle déjà produit des phénomènes qui ont confondu les Phyliciens. »

(3) Ce que M. de Fontenelle avoit alors préfumé par rapport à l'homme, s'est trouvé à la sin après 34 ans, squoir

^{*} Voyez n.º 7 ci-après, une observation presque semblable par M. Petit en 1742.

DES SCIENCES.

en 1743, vérifié par une observation de M. Collomb le sils, Chirurgien juré & de l'Académie des beaux Arts à Lyon, sur un enfant disséqué par sui-même, & ensuite exposé sous les yeux de ladite Académie. Cet ensant n'avoit qu'un œil, avec deux cornées transparentes, deux iris, deux prunelles, & un feul cristallin; point de nez ni de bouche; les oreilles à l'endroit du larynx, &c. Quant au dedans du corps, il suffira ici de rapporter l'article suivant des remarques envoyées par M. Collomb: « J'ouvris, dit-il, la poitrine, & nous y trouvames deux cœurs enveloppez chacun d'un péricarde « & séparez par le médiastin, leurs pointes étoient tournées a l'une du côté gauche, l'autre du côté droit, & les vaisseaux « qui en partoient & qui s'y rendoient, étoient par confé- « quent doubles, mais ils se réunissoient à neuf lignes environ « de distance des cœurs pour ne former ensuite que des « trones ordinaires. »

Je dirai volontiers sur cela non seulement ce que M. de Fontenelle dit après l'histoire des deux poulets, sçavoir, qu'une telle conformation a peut-être produit des phénomènes qui ont confondu les Phyliciens, mais je dirai même qu'elle a peut-être déjà occasionné aux Médecins des méprises funestes, selon ce qu'il avoit auparavant insinué en 1705, à l'occasion de l'histoire de la double matrice observée par M. Littre, sçavoir, que les dispositions extraordinaires des parties internes doivent faire naître dans la Médecine des cas imprévûs qui rompent toutes les mesures de l'Art.

Quant à ce que M. de Fontenelle ajoûte à l'histoire des deux poulets de M. Plantade, scavoir, qu'une telle conformation n'est pus apparemment fort rare dans cette espèce, il est bon d'avertir qu'on s'y peut sacilement méprendre, & que si cette histoire n'avoit pas été exposée avec ce détail anatomique de M. Littre, on auroit pú y soupçonner méprise par la ressemblance de quelqu'autre partie avec un second cœur: c'est ainsi qu'en examinant un cœur de poulet qu'on avoit cru double, & donné comme tel à M. de Reaumur; je n'y trouvai d'extraordinaire qu'une masse olivaire comme une espèce de

Mem. 1743. . * Vu

338 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE concrétion polypeuse adhérente au bas du cœur naturel.

(4) 1720. Hist. de l'Acad. des Sciences. L'observation de M. Petit Médecin sur le cadavre d'un Soldat dont les parties qui manquoient dans le scrotum se sont trouvées dans le basventre, avec une matrice & ses trompes, laquelle étoit placée derrière la vesse, attachée à son col, & entre ce col & ses prostates perçoit l'urètre.

(5) 1726. Hist. de l'Acad. des Sc. M. du Puy Médecin du Roi à Rochesort envoya à l'Académie une observation sur deux muteles extraordinaires couches sur le grand pederal de chaque côté; les deux muscles palmaires manquoient dans ce sujet. M. du Puy demande si la Nature les auroit transportez

fur la poitrine. *

(6) 1741. Hist. de l'Acad. des Sc. Observations de M. Morgagni; six vertèbres lombaires dans un sujet qui avoit vingt-six côtes; la première de ces vertèbres soûtenoit les petites côtes surnuméraires.

Dans un autre sujet la veine iliaque droite après avoir sait quelque chemin au dessous du tronc de la veine-cave, revenoit à son origine & par-là formoit une espèce d'isle.

Dans une semme, quatre valvules au lieu de trois à l'orifice

de l'artère pulmonaire.

(7) 1742. Hist. de l'Acad. des Sc. M. Petit a fait voir à l'Académie un petit corps ovisorme d'environ dix lignes de longueur & de cinq lignes de diamètre, qu'il avoit trouvé dans le blanc d'un œuf ordinaire. M. de Mairan alors successeur de M. de Fontenelle, ajoûte que j'ai dit en avoir vû un semblable; je me suis souvenu dans la suite que c'étoit Mile Delisse seur des Académiciens du même nom, qui me l'avoit montré.

(8) 1743. En cette année nous avons vû dans une des assemblées de l'Académie des Sciences, un petit garçon âgé de feize mois, qui avoit fix doigts à chaque main & à chaque pied; le fixième doigt de la main droite étoit à côté du petit

^{*} La mention de ces Muscles palmaires me fait souvenir d'une faute d'impression dans les Tables des Mémoires, &c. par M. Godin, sequoir, qu'au lieu de Muscles palmaires on a mis Muscles pulmenaires.

doigt & articulé avec le même os du métacarpe, qui vers son extrémité étoit plus large qu'à l'ordinaire & s'y terminoit par deux petites éminences ou tetes, dont l'une soutenoit le petit doigt ordinaire & l'autre le doigt surnuméraire; à la main gauche le doigt surnuméraire étoit aussi à côté du petit doigt ordinaire, mais articulé sur un os particulier ou surnuméraire du métacarpe; le sixieme doigt de chaque pied étoit, comme aux mains, à côté du petit doigt ordinaire, mais ils avoient chacun seur os propre de métatarse, de sorte qu'au sieu de cinq os à l'ordinaire, chaque métatarse en avoit six; cette augmentation de doigts saisoit seulement paroitre un peu plus de largeur aux mains & aux pieds de l'ensant, mais sans dissormité; il remuoit tous les doigts surnuméraires avec la même facilité que les autres.

(9) Thomas Bartholin dans les Actes de Copenhague vol. II, n° xxxII, rapporte un pareil exemple de fon temps. Un Nègre de M. le Comte Ant. Gunther à Oldenbourg avoit à chaque main & à chaque pied fix doigts très bien conformez, avec le métacarpe & le métatarfe, & loin d'en être incommodé, il paroifloit avoir par-là plus de force dans les membres. Bartholin dit après ce rapport, qu'il avoit bien vû dans quelques-uns un appendice au petit doigt ou au pouce fans aucun os de métacarpe, mais que dans cet homme ci on voyoit une fi grande proportion des doigts, que l'on pouvoit dire que la Nature n'avoit pas erré, mais avoit à deffein au menté

ce nombre de doigts.

(10) M. Ruysch dans le Catalogue des choses rares, à la sim de son traité intitulé, Objernatione Anatomax et Change au donné la description d'un squelette qui avoit grand nombre de doigts surnuméraires, & qu'il appelle pour cela Suita que bydactylon; la main droite avoit sept doigts, la main gauche six & outre cela le pouce double; le pied droit avoit huit doigts, le pied gauche neuf, le métatarse droit six os, & le metatarse gauche sept. La sigure & la description du la sefquelette se trouvent dans le traité de Kerkringius intitulé, dy icilogue. Anatomicam; & M. Ruysch en parle encore dans le se

340 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE derniers ouvrages intitulez, Adversaria, & c. decad. I, n° vIII.

Les quatre petits ou sixièmes doigts de l'ensant & du nègre dont je viens de parler, auroient, selon le système exclusif des accidens, été originairement les quatre petits ou cinquiemes doigts, avec seurs os de métacarpe & de métatarse, d'un autre sœtus, dont tout le reste du corps, suivant la même idée, auroit été totalement détruit par une rencontre ou pression accidentelle, & dont les quatre cinquièmes ou petits doigts échappez de la destruction, auroient été joints aux petits ou cinquièmes doigts des mains & des pieds du sœtus entier.

Mais quel accident pourroit-on imaginer par lequel la destruction totale d'un fœtus, excepté ces quatre doigts si éloignez les uns des autres, seroit arrivée? Par quel méchanisme accidentel ces quatre petits ou cinquièmes doigts auroient-ils été transportez & appliquez avec tant de symmétrie aux côtés des cinquièmes ou petits doigts du sœtus entier, & sur-tout par que le tournure des petits doigts des pieds de l'un auroient-ils pû être si naturellement arrangez avec ceux des pieds de l'autre? Les os du métacarpe & du métatarse rendroient la que s'illum encore plus emburatiunte, ce que le Polydactylon

de Ruysch seroit bien davantage.

(11) M. Geoffroy avoit déjà fait voir à l'Académie deux petits lièvres joints ensemble par le devant de leur poitrine & par le derrière de leur tête, que M. de Courteil Ambassadeur de France en Suisse lui avoit envoyez en présent comme une pièce curieuse qui pourroit lui faire plaisir. Les parties antérieures de ces têtes étoient tournées vers l'union latérale des poitrines; l'une des têtes étoit plus petite que l'autre, la plus grande avoit deux yeux à l'ordinaire, l'autre n'avoit qu'un ceil au bas du front; il y avoit quatre oreilles bien formées, deux de chaque côté fort près l'une de l'autre; les dos & toutes les autres parties postérieures de l'un étoient directement à l'opposite de celles de l'autre depuis le derrière des têtes jusqu'à l'extrémité des queues, à peu près de la même manière que les têtes des petits veaux de seu M. le Cardinal de Pojunac, dont les sigures se trouvent dans les Mémoires de

l'Académie de 1 = 34, scavoir, qu'en regardant directement le dos de l'un on vovoit en meme temps le profil des deux têtes, & en regardant l'une des têtes direclement de front, on voyoit en même temps le profil de tout le reste des deux corps. Il est marqué à la fin de ce rapport que la disposition de ce monstre de veaux étoit en cela à peu près comme celle du fœtus humain monftrueux dont M. de la Condamine a donné la description & la figure dans les Mémoires de cette année; je devois dire de l'année 1.732; le retardement de l'impression m'avoit occasionné cette méprise, & me contenter de marquer la ressemblance par le terme en cela, car le monstre de M. de la Condamine en étoit différent en ce que les deux corps étoient unis dos à dos.

Mais pour revenir aux petits lièvres de M. Geoffroy, on en avoit entièrement vuidé les têtes, les poitrines & les ventres, on avoit rempli ces cavités d'une autre matière, recousu la peau & dressé les deux corps debout par le moyen des fils d'archal, sur une pièce de bois. M. Geosfroy me les mit entre les mains pour les examiner chez moi, sans les entamer; ensuite la vermine s'en empara & on en fit un squelette dont voici la description détaillée.

Les deux thorax ou poitrines offenses ne faisoient qu'une seule capacité ample, commune aux deux corps par l'écartement de l'extrémité antérieure de toutes les côtes de l'un & de l'autre; par cet écartement toutes les côtes étoient comme redressées ou moins courbes qu'à l'ordinaire, & les extrémités des cotes du coté droit d'un corps s'avançoient réciproquement vers les extrémités des côtes du côté gauche de l'autre corps: il y avoit à chaque côté de la capacité commune des deux poitrines un sternum, auquel aboutissoient de part & d'autre les extrémités des côtes droites & gauches de chaque corps; ces deux sternums étoient situez l'un vis-à-vis de l'autre. & chacun d'eux étoit commun aux deux poitrines opposées, de sorte que le plan de l'intervalle des deux sternums croisoit avec le plan de l'intervalle des deux colonnes vertébrales ou épines du dos.

Il y avoit quatre omoplates, deux à chaque corps, fituées V. u iii

à l'ordinaire, & quatre pattes antérieures dont les deux de l'un étoient tournées vers les deux de l'autre; il y avoit deux cols le parement composée des vertebres ordinaire, leur arrangement étoient relativement la suite; les vertebres des bombes & leur suite jusqu'à l'extrémité des queues, étoient séparément dans le même arrangement, sçavoir, celles de l'un visà-vis celles de l'autre, comme aussi les os innominez ou os des hanches, & les pattes possérieures de chaque corps.

La structure & la disposition des parties offeuses de la tête commune ou double de ces animaux ctoient sont singuleres; il y avoit deux occiputs situez à l'opposite l'un de l'autre, diaque os occipital avoit, comme à l'ordinaire, son grand trou & ses deux apophyses condyloïdes, & chacun aboutissit à deux os parietaux; de ces quatre os parietaux les deux voisins d'un occipital s'avançoient ensuite par leurs bords antérieurs vers les bords antérieurs des deux voisins de l'autre occipital, en faissant entreux au sommet des deux têtes un grand intervalle.

Au bas de chaque côté de cet intervalle entre les portions inférieures des os pariétaux étoient comme enclavez les os frontaux de chaque tête vis-à-vis les uns des autres, de forte que les bords supérieurs des os frontaux formoient avec les bords supérieurs des os pariétaux, l'ouverture qu'on appelle vulgairement la fontanelle du factus, & qui étoit ici

commune aux deux têtes.

Les os frontaux de l'une des têtes étoient plus petits que ceux de l'autre; les grands os frontaux formoient, comme à l'ordinaire, le haut de deux crbites fatuées l'une pres de l'autre; les petits os frontaux formoient ensemble une seule or-

bite au milieu & plus bas qu'à l'ordinaire.

Les os occipitaux avoient chacun en dessous & devant leur grand trou & leurs apophyses condyloïdes, un alongement splénoidal, comme à l'ordin ire; ce deux alongement s'avançoient l'un vers l'autre, & s'unissoient ensemble par la rencontre de leurs extrémités antérieures.

Les os des tempes, les os du palais & ceux qui formoient les machoires & le museau de chaque tête, étoient attachez transversalement au bas de chaque côté de la rencontre & de l'union de ces alongemens sphénoïdaux; ceux de l'une des têtes étoient peu avancez, & le museau en étoit très-court; ceux de l'autre tête étoient plus formez, le museau en étoit plus long, & les mâchoires, tant la supérieure que l'insérieure, étoient garnies de dents.

Par cet arrangement particulier des os dont ces deux têtes étoient combinées, les deux occiputs étoient réciproquement dans la même direction que les deux épines ou rangs des vertèbres, & les deux museaux étoient réciproquement dans celle des deux sternums; de sorte que le plan vertical des parties antérieures des deux têtes & de leurs parties postérieures, se croisoit dans le même sens que celui de l'intervalle des

deux sternums & des deux épines vertébrales.

Ce qui m'a paru le plus fingulier dans la composition de ces deux têtes, étoit la rencontre directe & l'union immédiate d'une grande moitié postérieure de l'une avec une pareille moitié de l'autre, & la situation transversale ou croisée de leurs moitiés antérieures, attachées l'une vis-à-vis de l'autre au bas de chaque côté de l'union des moitiés postérieures. Le fingulier de la composition des deux thorax unis entemble étoit l'augmentation de leur capacité commune par le grand écartement des extrémités antérieures de leurs côtes moins courbes qu'à l'ordinaire, la rencontre réciproque de ces extrémités des côtes d'un thorax avec les pareilles extrémités de l'autre thorax, & enfin, ce qui m'a paru encore plus furprenant, la fituation des deux sternums entre les extrémités de ces différentes côtes, de manière qu'à chaque sternum aboutissoient & étoient attachées les côtes du côté droit de l'une des poitrines & celles du côté gauche de l'autre poitrine, comme à l'ordinaire les côtes des deux côtés d'une seule poitrine aboutissent & sont attachées à un seul sternum.

J'avois été fort fâché d'avoir perdu l'occasion d'examiner de la même saçon la thaclure & la combination particulture.

344 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE des pièces ofleuses dont étoient composées les têtes & les poitrines des petits veaux de M. le Cardinal de Polignac. représentez dans les figures du Mémoire de 1734: mais la ressemblance des petits lièvres de M. Geosfroy avec ces veaux, quant à l'extérieur, & l'examen détaillé que j'ai eu occasion de faire de leur squelette, ont très-bien réparé ma perte, en me fournissant le moyen de rendre par-là plus sensibles les difficultés que j'ai proposées dans le même Mémoire de 1734, sur l'articulation commune des deux têtes ou de la tête double du faon du Roi, avec la seule première vertèbre du col, sur celle de la double tête du petit veau de M. de Reaumur, & fur celle des deux têtes du second pigeonneau de M. le Cardinal de Polignac; comme auticles dimeultes propolees for l'arrangement extraordinaire des articulations de la seconde & de la troissème vraie côte de chaque côté, &c. avec le sternum dans un grand squelette d'homme, que j'ai montré en même temps à l'Académie; toutes lesquelles difficultés sont restées sans réponse, & sans que personne d'ailleurs en ait sait espérer solution, quoique M. Haller les ait encore expressément rapportées dans sa seconde Dissertation, pour en faire sentir aussi l'importance.

C'est ce qui m'a engagé particulièrement à examiner fort en détail la composition du squelette commun des petits lièvres de M. Geossiroy, asin de n'omettre aucune circonstance dans la recherche de l'idée la plus soûtenable, pour comprendre & expliquer la formation de ces sortes de struc-

tures extraordinaires.

Je me suis d'abord appliqué avec une impartialité entière à faire cet examen suivant l'idée de ceux qui attribuent, sans aucune exception, tout cela à quelqu'accident survenu après la conformation ordinaire préexistente. On sçait que, selon eux, ce seroit par une rencontre forcée de deux œuss ou germes que les parties des deux ou de l'un des deux les plus délicates & les plus exposées à la compression par cette rencontre forcée, seroient détruites, & que les autres parties moins pressées ou non comprimées seroient, selon la variété & le degré

degré de leur approximation, unies & comme confondues entemble; c'est ainsi que M. Goësson dans sa Dissertation de 1702, M. Marcot a la sim des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de 1716, M. Duvernoi dans le second tome des Commentaires de l'Académie Imperiale de Pétersbourg, & M. Lémery dans plusieurs M. moires, ont expliqué ces dissertes jonctions extraordinaires quelconques, soit dans l'homme, soit dans les animaux.

M. Goëffon pour mieux exposer son idée, a imaginé trèsingénieusement une sigure qui represente la formation de deux
reins, de leurs uretères & d'une seule vessie par l'anéantissement de deux autres reins, de seurs uretères & des moitiés
de deux vessies, comme on le peut voir dans sa Dissertation
imprimée; M. Lémery a trouvé à propos de placer en saveur
de la même idée une pareille représentation à la suite de son
dernier Mémoire de 1742, & de sinir par-là tous ses Mémoires sur les Monstres, dans le premier desquels il avoit aussi
pour cela exprès commencé ses raisonnemens par une exposition tres-détaillee du squelette des deux ensans unis ensemble, & par une représentation à peu près semblable de moitiés du même squelette.

Cependant à mesure que j'examinois de la manière que j'ai dit, l'airangement de toutes les pièces offeuses dont ctoient composces les têtes & les poitrines des petits lièvres de M. Geotfroy, je trouvoisde plus en plus insoutenable l'explication qu'on voudroit essayer d'en faire par le système des accidens; car selon cette idée les parties antérieures de l'un & de l'autre, seavoir, le sternum & les extrémités des côtes de chaque poitrine auroient du être détruits par la compression reciproque que leur rencontre directe auroit occasionnée; m is toutes ces parties de l'une & de l'autre poitrine étoient très entieres, & il n'y avoit nulle apparence qu'elles cussent soutiert la moin-

dre pression par cette rencontre.

Les extrémités des côtes de chacun, au lieu d'être courbées, étoient redressées, de sorte que par là l'épine du dos de l'un étoit plus cloignée de l'épine du dos de l'autre, & le sternum

aufir plus cloigné du flernum & des extrémités des côtes de chaque conce de l'autre; par confequent on ne pourrait y frapcounter aucune prefirm recipie que, puilque par cet arrangement extra nelluaire la capacité commune des deux poitrines étoit très-augmentée, ce qui étoit encore une preuve contre

la prétendue pression réciproque.

Je demande par quel accident arrivé aux deux petits lièvres les deux sternums entiers qui, selon le système exclusif, devoient avoir été détruits par leur rencontre & pression réciproque, auroient pû être contournez & placez vis-à-vis l'un de l'autre entre les extrémités des côtes de deux différentes poitrines? Pourroit-on s'imaginer ou que le sternum de chaque poitrine eût été détaché des côtes d'un côté de l'une & ensuite transporté pour être attaché aux côtes de l'autre côté de la plittine oppose, ou s'imaginer que le fternum de chique poitrine eût été partagé en deux moitiés latérales felon La longueur, que ces moitics cuffent etc enfuite ceartée l'une de l'autre, & que par cet écartement la moitié droite du sternum de l'un eût été intimement unie à la moitié gauche du sternum de l'autre? Mais quel accident pourroit-on imaginer qui pût produire ce transport réciproque des deux sternums entiers ou les partager en quatre disférentes moitiés, & qui pour les rejoindre tout différemment, pût redresser les côtes du dedans en dehors & écarter celles d'un côté de celles de l'autre côté?

Je le demande aux experts qui voudroient se donner sa peine entière de l'examiner attentivement, & je le demande d'autant plus que dans les Mémoires de 1724 la 2de sigure du monstre de M. Lémery représente une partie du même phénomène, sçavoir, un sternum entier uni réciproquement aux côtes entières des deux poitrines, & que M. Lémery après avoir supposé, par exemple, deux squelettes tronquez par la moitié & ces deux moitiés appliquées latéralement s'une contre l'autre, s'est contenté de dire que « les côtes de la moitié a l'epine du squelette placé à droite, concour-

ront alors avec les côtes que ches retlées à l'épine du sque cue « placé à gauche, à la formation d'une nouvelle capacité de « poitrine», sans dire un seul mot de ce sternum entier représenté dans la figure entre les extrémités des côtes de deux dissérentes poitrines, ni comment ces côtes entières de part & d'autre auroient été attachées à ce sternum commun, quoique pour démontrer l'anéantissement de l'autre sternum, & la rupture ou le désaut de développement des deux rangs des autres cotes par la rencontre & la pression réciproque de deux soriginairement séparez & entiers, il ait employé plus de cinq pages.

J'ai etl yé aussi d'expliquer par le même système la composition bizarre des pièces otseules de la tête commune des petits lièvres de M. Geotsfroy, j'y ai rencontré la même dissiculté qui m'oblige de faire là-dessus la même demande, sçavoir, par quel accident & comment, selon cette idée, les moitiés postérieures des deux têtes seroient jointes par leur rencontre direcle, sans en avoir par cette rencontre détruit les moitiés antérieures; & comment ces moitiés antérieures au lieu d'être détruites, auroient été transportées de côté & d'autre pour se croiser avec les postérieures; car les occiputs de ces sièvres étoient dans la même direction que les deux épines du dos, leurs museaux ou faces dans la même que ses deux thernums, &, ce qui ctoit encore plus singulier, chaque màchoire insérieure étoit articulée de part & d'autre avec les os temporaux des deux têtes.

Je demande encore, si pour savoriser le système des accidens, on pourroit dans ce cas-ci s'imaginer, ou que chaque tête eût été partagée depuis le sommet jusqu'à la base du crâne entre l'occiput & le front en deux portions, que les deux portions occipitales ou postérieures eussent été unies par la rencontre & approximation directe de leur coupe, que les portions frontales ou antérieures eussent été transportées sur les côtés de cette union des portions occipitales, & que-les quatre portions sussent par là arrangées & soudées ensemble, de manière qu'elles representatient une especie de croix d'un

une traverse seroit formée par les portions occipitales, & l'autre traverse par les portions frontales; ou s'imaginer que par la rencontre & la pression réciproquement directes des partions strontales avec les portions occipitales, chaque portion frontale eût été fendue en deux parties latérales, & que de part & d'autre ces parties ainsi tendues curient ete lateralement écartées par leurs extrémités antérieures, de manière que la partie laterale du cote droit s'unit reciproquement à

la partie latérale du côté gauche.

A cette occasion il me paroît à propos de rappeller ici les difficultés semblables que j'ai proposees dans mon Mémoire de 1734, touchant la jonction réciproque des os des hanches des jumeaux dont M. Duverney a fait l'hitloire en 1706, & pour mieux les faire sentir, j'exposerai plus en détail leur composition, en ayant été moi-même le spectateur & en partie l'examinateur : ces jumeaux étoient si près unis enfemble par leurs hypogathres, que les deux batfins offeux formoient une feule capacité, sans que les os pubis fuffent detruits, ni que les os ischiums & les os iliums sussent tronquez par une telle approximation réciproque, comme ils auroient dû être selon le système des accidens. Tous ces os étoient entiers. & leur courbure naturelle étoit si fort applatie & redressée de dedans en dehors, que par-là il y avoit un grand intervalle entre les os du côté droit & ceux du côté gauche de chaque enfant, de forte que les deux bafsins formoient une seule capacité ovale très-grande. J'avois dit dans ma réflexion là-dessus que je ne comprends pas comment on peut expliquer par le système des monflres accidentels le grand écartement de ces os pubis, & pourquoi par la rencontre des deux germes ces os n'ont pas plûtôt été détruits ou courbez en dedans comme ils auroient dû être selon le système des accidens, que separez s'un de l'autre & renversez en dehois comme ils étoient, & comme je les ai vûs moi-même.

Réfultat général.

Le premier fondement de la defense du système exclusivement universel des monstres par accident, a été de comparer avec la jonction des moitiés de deux squelettes supposez tronquez & mis à côté l'un de l'autre, la formation du squelette d'un monstre composé, & de regarder l'union des bouts des deux rangs des côtes tronquées comme une espèce de véritable monument de la rupture ou du défaut de développement de ces deux rangs de côtes, & comme une preuve convain-

cante de cette supposition.

Je laisse aux connoisseurs experts à en juger, & à juger en même temps si je ne puis pas aussi poser pour dernier fondement de toutes mes remarques précédentes, la composuion réelle du squelette d'un monttre double par l'union de deux squelettes aucunement tronquez, & de regarder aussi l'union des têtes & des poitrines du squelette du monstre composé des petits lièvres de M. Geoffroy, & l'union des bassins du squelette du monstre de M. Daverney, comme un monument de la formation de ces montlres, par le feul arrangement inexplicable de ces parties toutes entieres, lesquelles, selon le système des accidens, auroient du être par leur rencontre & pression de part & d'autre, ou tronquées ou détruites; & si je ne puis pas aussi par conséquent regarder ces squelettes de M. Geoffroy & les os des hanches du monstre de M. Duvernev comme une preuve que non sculement il y a des conformations extraordinaires arrivées accidentellement par deffruction, depravation, &c. à quelques parties auparavant entières, en quoi j'ai toûjours convenu avec les désenseurs du système des accidens, muis qu'il s'est trouvé aussi des conformations extraordinaires qu'on n'a pû expliquer par la plus parfaite connoissance anatomique, puisque plusieurs des difficultés proposees là-dessus depuis 1733 tont restées fans réponse. C'est aussi ce que M. Haller, après aveir examiné Environ cinq cens relations de ces conformations extra350 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE ordinaires, & après avoir ensuite fait lui-même avec toute l'exactitude d'un la bile Anatomitte Physicien la diffection de plusieurs monstres, a parfaitement bien fait comprendre par le deux distertations dont s'ai repporte en partie la première en 1740, & indiqué la seconde en 1742.

Les remarques, les réflexions & les difficultés proposées dans mes premiers Memoires sur chaque exemple rapporte de ces sortes de conformations extraordinaires du corps humain & de celui des animaux, m'avoient dès ce temps-là donné lieu d'en projeter une espèce de résultat en concluant:

1° Qu'en général les deux systèmes peuvent être relativement employez selon les differens cas de ces conformations

extraordinaires.

2° Que dans certains cas on ne peut raisonnablement en employer qu'un, sans pouvoir apporter aucune raison satis-

faisante pour y pouvoir employer l'autre.

3° Qu'il y a des cas où l'on pourroit avoir raison de recourir en partie à l'un & en partie à l'autre, en ce qu'aux conformations extraordinaires d'origine il peut en ctre survenu d'autres par accident.

4° Qu'on peut rencontrer des cas qui embarrasseroient foit dans le choix de l'un ou de l'autre système les plus habiles

Physiciens Anatomistes.

J'avois même fini par-là le manuscrit de mon Mémoire de 1733, comme on le peut voir dans les Registres de l'Académie, mais je l'avois omis dans l'impression à dessein d'en faire une application plus étendue dans la suite, comme je l'ai fait aussi remarquer à la sin de ce même Memoire. Après ce la les raitonnemens physiques & moraux avancez avec beaucoup de vivacite & d'etendue dans plusieurs Memoires de l'Académie, puur preuves démonstratives & incontestables de l'unique système des monstres par accidens, de la nullité entière de l'autre sentiment, & de l'invalidité des dissicultés proposees là-dessus; ces raisonnemens, dis je, dont par la soiblesse de mon ouïe je n'avois pas pû asse entendre la lecture dans l'Académie, ce que je n'avois lus qu'imprimez trois ans après,

me sirent prendre le parti d'examiner encore avec tranquillité le pour & le contre, d'autant plus que presqu'en même temps la differtation de M. Goësson & la premiere de M. Haller me tombèrent très-à-propos entre les mains, & que le monstre en dersi compa l'aufact de Combana.

ou demi-corps d'enfant de Cambray me fut envoyé.

J'aurois pû, pour m'acquitter de la promesse d'un résultat général, me contenter de joindre aux quatre articles de mon premier projet exposé ci-deslius, les sept notes postérieures de la susdite dissertation de M. Haller avec leur conclusion, que j'ai rapportées dans mon Mémoire de 1742, & y ajoûter ce que dans le même Mémoire j'ai aussi rapporté tout au long de M. Regis, de M. l'Abbe Bignon & de S. Augustin, avec le contenu de la dernière page de ce Memoire jusqu'à la fin; cependant pour ne rien laisser d'obscur ou d'équivoque dans les difficultés propofees, & pour abandonner enfuite sans retour la discussion & le jugement de tout cela au public, je crois devoir finir par quelques éclaireissemens omis dans le Mémoire de 1742, que je trouve à présent trèsnécessaires pour avertir ceux qui voudront écrire sur cette matière, de ne me pas attribuer ce que je n'ai avancé nulle part, & dont il n'y a pas la moindre marque dans tout ce que j'ai présenté là-dessus à l'Académie.

Dans mon premier Mémoire sur les Monstres en 1-33, à l'occasion de deux moities intérieures du corps d'une tille de douze ans, que j'avois examinées avant & après sa mort, & à l'occasion du saon à deux têtes envoyé de sa part du Roi à M. d'Ons en Bray; dans ce Mémoire, dis-je, avant que d'entrer en matière j'ai déclaré le seul objet de mes remarques, & dans la suite j'ai tenu continuellement sans le moindre changement, le même langage: voici les propres termes dont je me suits servi au commencement de ce premier Médoute de la part du commencement de ce premier Médoute suits servi au commencement de ce premier Médoute suits services de services suits services de services de

moire pour exprimer tout mon dessein.

sur Les deficiles que je proposerai ici à l'occasion des deux p. 373. Systèmes re indust non seulement ce qu'on a coûtume d'ap- se peller monttre, muis aussi tent a que se trave d'extracrellante « dans la structure du corps humain & dans celle des animaux, «

" par addition, par defaut, par difformité, par transpolition, son par contution, &c. de contuins paraco, foit dans un feul pajet,

» soit dans deux ou plusieurs sujets, mais contre nature.

" J'exposerai ces difficultés en maniere de rellexions sur des sur activités ou faits rapportez dans les Memoires de l'Academie, & sur quelques autres bien avérez. " Je commencerai par les sujets simples.

» Exemples de la première Classe.

2.374. a 1686. M. Méry fit duns l'Hôtel royal des Invalides "l'ouverture du cadavre d'un Soldat, & il y trouva généra-"lement toutes les parties internes de la poitrine & du bas-"ventre fituées à contre-sens.

p. 377. » Je ne puis m'imaginer en aucune manière comment la » cerfermation . . . à contre sens se peut expliquer par le système

" des monstres accidentels.

p.378. ... Je demande par quel accident ... cette construction ... partire lière à contre-sens pourroit arriver à un germe en prais, rement ordinaire.

p. 379. ... Comment par le système des germes accidentelle-

ment monstrueux expliquer cette particularité ...»

On peut voir par ces expressions, de même que par plusieurs autres, & par le seul titre de la première Classe, qu'elle renserme en général les exemples de ce qui, dans des SUJETS simples, se trouve & d'extraordinaire, comme par transposition de certaines parties, &c. & de monstrueux proprement dit; & par consequent dans cette premiere Classe des sujunts se ples, l'exemple du Soldat n'y est pas rapporté comme celui d'un monstre proprement dit, mais comme l'exemple d'une thructure extraordinaire par rapport à la situation de ses parties internes, de même que les autres exemples d'une pareille consormair n'extraordinaire que s'ai rapportez immediatement après, sans avoir donné en aucun endroit le nom de monstre, ni au Soldat, ni à ses autres semblables.

Environ cinq ans après, sçavoir en 1738, M. Lémery su mention de ce Soldat dans son second memoire sur les

monstres,

monstres, & yannonça qu'il donneroit là-dessus un mémoire particulier, « qui seroit le dernier sur les monstres, & dans lequel il seroit voir que leur caractère avoit été jusqu'à présent « ignoré, & que c'étoit cette ignorance qui a donné lieu à « l'objection du Soldat. Deux ans après M. Lémery donna ce « mémoire particulier, en avertissant que son objet étoit 1° de « faire voir ce qui désigne, distingue & caractérise les monstres » issus d'un mâle & d'une sémelle de la même espèce, 2° de « résoudre les distinuités qu'à sait naître le Soldat ou l'homme sia » a solut se particulaire de soldat ou l'homme sia » a solut se particulaire de soldat ou l'homme sia » a solut se particulaire de soldat ou l'homme sia » a solut se particulaire de soldat ou l'homme sia » a solut se particulaire de soldat ou l'homme sia » a solut se particulaire de soldat ou l'homme sia » a solut se particulaire de solution de solution

gulier, » ce sont ses propres termes.

Le fecond article de ce mémoire me regarde en particulier; M. Lémery v dit d'abord « qu'il s'agit d'un Soldat mort dans l'Hôtel royal des Invalides... ensuite il rapporte expref- « sément p. 518, qu'à côté des exemples monstrucux j'ai en ... grand soin de placer celui du Soldat; p. 520, qu'on veut le faire passer pour un monstre; p. 522, que j'ai donné le nom de monstre au Soldat que j'ai fait un monstre du Soldat; p. 526, que je l'ai traité de monstre; p. 530, que je me suis cru autorisé à donner le titre de monstre au Soldat & à tous ceux de la même espèce; p. 531...à qui le nom de monstre a été donné; p. 532, le Soldat que je confonds avec les monfres proprement dits, & dont je tire de fausses consequences en a faveur des œufs monstrueux; p. 537; qu'on a mis l'exemple ... du Soldat à la tête & dans la classe de plusieurs exemples de a monstres proprement dits, pour tirer de l'un & des autres la a même conséquence en faveur des œufs monstrueux. »

Cependant malgré toutes ces expressions entièrement disférentes des miennes, je crois devoir présumer que M. Lémery dans les premiers temps du projet de ce memoire s'est d'abord contenté de faire à la hate & a comme crayonné quelques petits extraits interrompus en manière de notes, pour y revenir à loisir, & qu'après sept années d'intervalle ayant été de plus en plus occupé par ses différentes charges, indépendamment de ses travaux personnels pour l'Academie, il n'a pas trouvé le loisir d'examiner de nouveau ces extraits imparsaits & comme surannés; que par cette inattention jointe à son

Mem. 1743.

extrême vivacité pour avancer ses sentimens, il sui est arrivé d'abord d'omettre de mon mémoire de 1733 le paragraphe tout entier, par lequel j'ai averti tout exprès que mes difficultés ne regardoient pas seulement ce qu'on a coûtume d'appeller monstre, mais aussi tout ce qui se trouve d'extraordinaire... soit par transposition... soit dans un seul sujet, et c. & que M. Lémery par inadvertence s'est échappé de rapporter dans son mémoire de 1740 ces endroits de mon mémoire de 1733, avec des expressions toutes différentes des miennes propres, & de m'imputer ce que je n'ai avancé nulle part, ni dans mon mémoire de 1733, ni dans aucun autre mémoire depuis.

Je suis d'autant plus porté à présumer ce que je viens de faire remarquer pour excuser M. Lémery, que comme selon mon avertissement préliminaire en 1733, le Soldat & ses semblables ne sont dans la première classe de mes remarques que des exemples de la structure extraordinaire qu'on a observée dans leurs cadavres, & non pas des exemples de monstres qui sont aussi rapportez dans la même classe générale de SUJETS simples, M. Lémery a lui-même dès le commencement de son mémoire de 1740, appellé ce Soldat homme singulier, & dans plusieurs endroits de la seconde partie de ce mémoire il en parle avec des expressions à peu près semblables, par exemple, p. 519, ces fortes d'hommes ... comparant la construction particulière de ces hommes singuliers avec celle des hommes ordinaires; pp. 524, 525, (pluticurs fois) l'homme ordinaire; p. 526, deux espèces d'hommes; p. 533, le Solaat & ses semblables peuvent & doivent être regardez comme autant de chef-d'œuvres qui le disputent de perfection avec l'homme construit à l'ordinaire.

Ainsi je me détermine entièrement à présumer que la seule inadvertence remarquée ci-dessus a porté M. Lémery à finir la seconde partie de son quatrième mémoire par cette conclusion, p. 537, « Il suit de ce qui a été dit que c'est à tort & faute de bien connoître & la nature de ce monstre proprement dit dont il est question, & la dissérence essentielle de cette espèce de monstre & du Soldat singulièrement formé, qu'on les a tous consondus, & qu'on a mis l'exemple du Soldat à la

tête et dans la classe de plusieurs exemples de monstres propre a ment dits, pour tirer de l'un & des autres les mêmes conse-a

quences en faveur des œufs originairement monstrucux. »

A l'égard de la première partie de ce quatrième mémoire de M. Lémery, je suis assez d'accord avec sui en plusieurs points de ce qu'il y avance par les remarques suivantes, pp. 435, 436. On ne peut voir sans étonnement jusqu'où va la différence des visages... les variétés qui se trouvent toûjours dans les individus d'une même espèce... ne portent point préjudice aux fonctions des parties où elles se trouvent... ces espèces de variétés sont dans l'ordre naturel & aux vûes du Créateur, ce sont les utilités & même les nécessités indispensables dont elles sont, sur-tout à l'égard des hommes... & en effet... s'ils étoient tous si parsaitement semblables... ils se perdroient à tout instant sans se retrouver, & ce mantyre continuel, conclud M. Lémery, leur feroit d'autant plus détester la société qu'elle ne pourroit leur sournir les biens qu'elle leur procure dans la situation contraire.»

Non seulement je conviens en général de ces remarques avec M. Lémery, mais je lui fuis très-redevable de m'avoir par là fait rappeller des réflexions très-importantes qui n'auroient peut-être pas manqué de se présenter dans la suite à lui-même, sçavoir, que si ces variétés que M. Lémery appelle r victes perement faperficielles, p. 436, font des utilités & même des nécessités si indispensables à l'égard des hommes, que leur defaut leur feroit un martyre continuel, on pouriz à plus forte raison dire que les variétés internes, quoique non préjudiciables aux fonctions de l'individu, quoique pouvant & devant, sclon M. Lemery, p. 532, être regardres comme autint de chef d'œuvres qui déclarent aussi la Sagesse & la Toute-puissance du Créateur; p. 533, que ces variétés, dis-je, n'étant pas connoissables extérieurement, peuvent donner, & pent-être ont déjà donné occasion de mal traiter & même de faire périr les malades, faute de ne pas avoir connu ces

variétés particulières des parties internes.

Cela me fait souvenir que seu M. Enguehard sameux

Medecia de Paris & Profeticar au College royal, n'avant pas senti le battement du cœur d'un malade dans l'Hôtel-Dieu, & l'ayant quitté après en avoir témoigné un mauvais pronoslic. un garçon Chirurgien courut après lui, & dit qu'il venoit de trouver le battement, non pas sous la mamelle gauche, mais fous la droite. J'ai manqué, en rapportant les remarques de Riolan sur un exemple pareil à celui du Soldat, de rapporter auffi son avertissement là-dessus, sçavoir, qu'un Médecin intelligent apercevra bien une telle fituation, fi, en maniant le bas-ventre d'un malade, il trouve un certain volume sous l'hypocondre gauche jusque vers le bas du sternum, Es trèspeu sous l'hypocondre droit, & si le battement du cœur, au lieu de se saire sentir sous la mamelle gauche, se manifeste sous la mamelle droite; à l'occasion de quoi il exhorte les Médecins d'être à l'avenir plus circonspects en examinant les malades, afin de ne pas prendre la rate pour le foie & le foie pour la rate. J'ai déjà rapporté au commencement de ce mémoire la remarque de M. de Fontenelle sur un autre cas dans fon Hittoire de 1705, servoir, que les dispositions extraordimires des parties internes de ivent faire mitre dans la Medecine des cas imprévûs qui rompent toutes les mesures de l'Art.

Mais pour revenir au mémoire de M. Lémery, comme outre les sussities expressions échappées il me sait presque continuellement & en toute manière passer pour désenseur des auss originairement monstrucux, & marque expressément que j'ai proposé mes disticultés, &c. en saveur de ces œuss, quoique, s'il avoit en le loisir de confronter ses premières notes avec mes mémoires, il auroit pû voir que je n'y ai sait dans aucun endroit mention d'auss à mon égard; je crois, pour détourner toute attaque inutile, devoir indispensablement répéter aussi ce que j'ai dit dans mon mémoire de 1742 p. 110, en ces termes: « Avant que d'entrer dans le det il des éclaireits mens, il est nécetsaire de tine observer que dans tous mes Mémoires sur cette matière, je n'ai parlé que des germes, des conformations primitives, des extraordinaires priginelles, &c. & que je n'ai fait, ni dans les endroits citez

par M. Lémery, ni dans aucun autre, mention d'aufs; non pas « parce que je nie leur existence, ou que j'en doute, mais « parce que je n'ai encore trouvé ni appris aucune preuve « réelle de la préexistence des prétendus linéamens dans les aufs « avant leur fécondation par le concours des deux sexes; & « qu'ainsi dans tout ce que j'ai avancé sur cette matière je n'ai « considéré les germes, ou, si s'on veut, les œuss, * que dans leur « état naturel après la secondation, & avant leur alteration par « aucun accident.»

Les observations de M. de Reaumur sur diverses réproductions qui se sont dans les écrevisses, les omars, les crabes, &c. dans les Mémoires de l'Académie de 1712, m'ont rendu très-retenu sur le mystère de la propagation des espèces, & me le rendent encore davantage par les réflexions que j'ai saites sur deux endroits de son mémoire que voici, 1° p. 236, « Dans le sond il paroît que la réproduction des jambes des écrevisses est une matière où nous ne sçaurions « guères espérer de voir clair; outre ses dissidualies, elle a toutes « celles de la génération du sætus; 2° p. 238, Il est dangereux « de se sier aux raisonnemens sonder sur l'anadogie (car on peut a trouver de l'analogie par-tout) . . . la formation d'une partie « capable de mouvement est encore plus difficile à concevoir « que celle des plantes.»

Enfin les verifications diversement réitérées que M. de Reaumur a faites des expériences sur la multiplication surprenante des polypes d'eau par une espèce de bouture, me consirment entièrement la nécessité de ma retenue, sans cependant craindre de faire une application générale de ce que M. de Reaumur, dans le même mémoire sur les écrevisses, &c. dit d'un fentiment particulier sur la génération, & sans craindre de dite, à son imitation, que ces reproductions de quelque partie d'un animal, & ces productions complétes d'un animal entier de chaque petit morceau d'un animal haché, donnent des objections sortes contre tous les systèmes avancez jusqu'à

^{*} Cette particule que a cir cublice dans Empression de ce memoire de 3742, au bas de la page 110.

158 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE préfent fur la fécondation & fur les linéamens de fœtus dans les ceufs non fecondez.

C'est ainsi que j'abandonne entièrement tout ce qui regarde la production des monftres & des ftructures extraordinaires; & comme dans mon mémoire précédent de 1742, après une fimple citation de S. Augustin par M. Haller au sujet d'un monstre de son temps, j'ai rapporté plus au long la description qu'il en a donnée, je crois ne pouvoir mieux faire que de finir toutes mes remarques & mes réflexions par un passage de ce Père, pareil à celui que j'ai produit immédiatement apres lulite deferption, & cela conform menta ce que M. de Fontenelle en 1699, dans son Histoire générale de l'Académie, p. 15, dit en particulier par rapport à l'Astronomie & à l'Anatomie, sçavoir, que la véritable Phytique s'élève jusqu'à devenir une espèce de Théologie. Voici le passage de S. Augustin * : Accusa ergo Deum si placet, operis The Late of the State of the Stylender also part a great was for the state of nonnulla in eis nimia deformitate ctiam MONSTRA dicantur... Sed with Dear I make in figher of the relative or rather day for referas ad grave jugum supra silios Adam, invenies cum plane justum propter originale peccatum, qualem fides catholica novit, à qua veller error exorbitavit. Neque enim, fi nemo peccallet, fada atque MONSTROSA etiam in paradifo corpora nafecrentur. Je termine avec d'aut int plus de confiance mes Menaires par ce paffage. que plufieurs fiècles après il se trouve autorisé par le decret a saivant du Comile, en ral de Frente * : de par en reinner PRIMUM HOMINEM ... TOTUMQUE Adam per illam pravaricationis offensam, SECUNDUM CORPUS & animam in DETERIUS COMMUTATUM fuiffe, anothema fit. Si quis Ada pravaricationem fibi foli, & non ejus propagini afferit nocuiffe, anathema fit.

> Je donnerai dans un mémoire particulier les observations promifes sur les essets attribuez à l'imagination des mères enceintes, avec des remarques sur d'autres articles qui regar-

dent le fœtus.

va Tr

Picc. criz.

CONJONCTION INFERIEURE DE MERCURE AU SOLEIL,

Observée à Paris le 5 Novembre 1743.

Par M. LE MONNIER Fils.

8h 39' 27" ½, avec une lunette de 15 pieds, Mercure 24 Décemb.
parut entamer le bord inférieur du Soleil, lequel étoit 17±3.

fupérieur dans la lunette.

Soit donc à 8h 39' 22" a ou 25" de temps vrai, l'entrée de Macaro fui le Soleil, que je crois determinée foit exactement, malgré une espèce d'ondulation qu'on remarquoit dans la circonférence du disque du Soleil.

Observations saides à mon nouveau Quart-de-cercle riviril*, de 5 pieds de rappe.

Passage du 24 hord de la Lune, 26 45' 22"-1 (bottlinsstrieur, 224 28' 15")

Passage du 2^d bord de la Lune. 2^h 45' 23'' $\frac{1}{4}$ } Distances au zénit $\frac{1}{2}$ Distances au zén

Donc à 2h 48' 4' ½ de temps vrai, le second bord de la Lune a précédé μ de 4h 9' 01' ½ à la pendule, dont 23h 56' 01' répondoient à 360d 00' 00".

A 11h 55' 14" le 1st bord du Soleil a passé)
11 55 41 la passage de Mercuré.
11 57 28 la passage du 2d bord du Soleil fçavoir 3" s plus tard qu'au vrai meridien.

I differences on dealing in the reset of most out of Message of his best of the contract of

Avec l'arc de division, selon la methode de Vernerius,

Avec le micromètre,

On peut donc établir la différence en déclinaison apparente, de . . . of 10' 47 ! ou 50'

^{*} Le lieu où les observations seront saites dorénavant avec cet instrument & avec le secur, est plus septentrional de 1' 50", & plus occidental de 0° 0' 2' que l'Observatoire Royal, étant situé près la porte S. Honore, au nord du jardin des l'uilerier.

360 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE A 1h 9' 52' Mercure touche intérieurement la circontérence du disque du Solcil.

1 12 00 ou 5" sortie de Mercure.

Ainti depuis la première appuition de Mercure jusqu'à fa fortie entière du disque du Soleil, on aura 4^h 3 2′ 40″, & le milieu du temps écoulé à 10^h 55′ 42″½; ce qui, étant retranché du temps auquel le centre de Mercure sortoit du disque du Soleil, donne la demi-durce apparente de sa traverse, de 2^h 15′ 15″: le diamètre apparent du Soleil corrigé, étoit alors 3 2′ 3 2″½.



C O N S T R U C T I O N

D'UN OBE'LISQUE

A L'EXTREMITE SEPTENTRIONALE

DE LA ME'RIDIENNE

DE L'E'GLISE DE SAINT SULPICE.

'UN des principaux avantages de l'instrument dont on 24 Décemb.
va donner la description, c'est de servir à déterminer 1743.
les ascensions droites du Soleil en hiver, & par conséquent son véritable lieu dans l'écliptique vers les temps de son

passage par le périhélie.

On a recherché pour cet effet plusieurs jours de suite au commencement du mois de Novembre, le point de la Méridienne qui doit répondre au bas de la base de l'Obélisque, à distance de 180 pieds de l'ouverture de la plaque scellée dans l'épaisseur du mur: ce mur est celui de la fenêtre du portail méridional, lequel à été sondé immédiatement sur le roc

il y a près de vingt ans.

Il est évident d'abord que se point de la Méridienne qu'on se proposoit de marquer sur la base de l'Obélisque, étoit l'un des plus nécessaires à découvrir, & même qu'il étoit essentiel de le bien déterminer, puisque le mouvement de l'image du Soleil paroitioit alors le plus rapide, cet affre étant dans ce temps-là de 7 à 8 degrés moins éloigné de l'équateur qu'au temps du solstice d'hiver. Mais il y a de plus une autre remarque à faire ici, & qui semble assez importante, c'est que les observations des hauteurs du Soleil devoient être alors bien moins sujettes aux inégalités de la rétraction que pendant l'hiver, puisque cet astre étoit élevé de 20 degrés sur l'horizon, lorsqu'on a observé les hauteurs correspondantes de son bord supérieur à 10 heures du matin & à 2 heures du foir. D'ailleurs la saison n'étoit pas encore foit avancée, & · Zz Mem. 1743.

les nuits d'automne n'étant pas alors trop froides, le thermomètre marquoit assez constamment plusieurs heures de suite

la même température de l'air.

Il n'y a donc pas de doute qu'après tant de circonstances réunies dans une saison assez favorable, la ligne méridienne verticale n'ait été tracée avec beaucoup de justesse sur l'obé-lisque; qu'elle n'indique desormais avec la plus grande certitude le mement du pusse des bonds du Soleil pur le méridien, & cela pendant près de trois mois entiers, sçavoir, tant que l'image du Soleil paroîtra sur cet obélisque, où elle doit s'élever jusqu'à 25 pieds ou environ au temps du solstice d'hiver.

Il n'est pas moins évident, après ce qui a été publié dans l'Hindire Celette, que dans l'e p'us grands stoids qui arrivent ordinairement aussi-tôt après le solstice d'hiver (c'est-à-dire, à peu près vers les temps auxquels la Terre vient à passer par le grand axe de son orbe) la méthode des hauteurs correspondantes ne soit le plus souvent désclueuse, si s'on veut déterminer les ascentions droites du Soleil; car quoique dans d'autres saisons cette méthode soit regarde à juste titre comme la meilleure de toutes celles qui peuvent nous saire connoître les passages des astres par le méridien, cependant il est aisé de reconnoître que dans les grands froids, les résractions du matin sont plus grandes à 10 & à 12 degrés que celles du soir à pareille hauteur.

Il est vrai qu'en 1739 lorsqu'il a été question de corriger par les observations d'hiver & d'été, le sieu de l'Apogée des Tables de Mrs de Louville & Flamsteed, s'on avoit voulu éviter cette méthode de déterminer les ascensions droites en Décembre & en Janvier, par les hauteurs correspondantes du Soleil; & qu'on y avoit employé d'autres observations saites à la lunette mobile autour de son axe horizontal & sixée dans le plan du méridien; qu'ensin on ne s'étoit pas aperçu de plus d'une seconde de dissérence en comparant le midi qui résultoit de l'une ou l'autre méthode. Cependant il faut avouer qu'il nous est toûjours resté quelqu'incertitude de sujet, putilique si les parties qui compositent l'instrument

des passages, & qui sont vers la droite, par exemple, sont plus échauffées ou plus refroidies que celles qui sont vers la gauche, cet instrument se dérange visiblement & n'est plus dans le méridien; en forte qu'on ne sçauroit prendre trop de précautions pour le défendre des rayons du Soleil, qui venant à l'échauffer inégalement, le rendent très fentallement variable. Enfin quelque différence que l'on eût remarquée entre le midi conclu des hauteurs correspondantes & les passages observez à la lunette mobile bien vérifiée à l'égard du méridien, il restoit néanmoins à découvrir s'il n'y auroit pas eu quelque compensation, & si de plus grands instrumens auroient donné les mêmes dissérences; mais ce n'est pas ici le lieu d'examiner les difficultés qui se rencontrent dans la construction d'une functte mobile qui surpasseroit de beaucoup la longueur de celle dont nous nous fommes fervis. laquelle n'avoit que 2 pieds tout au plus.

Au reste rien ne pouvoit mieux servir à consirmer ces inégalités dans la rétraction, que les passages observez à la méridienne de l'obélisque & comparez aux midis determinez dans les plus grands troids par les hauteurs correspondantes. En esset, si l'on peut s'en tenir à ce que nous avons déjà remarqué, l'on s'imagineroit d'abord, comme nous l'avons vû en Decembre, que la ligne qui a cté tracée est fausse, & qu'il faudroit y en substituer une autre, quelquesois à près d'un tiers de pouce de distance; au lieu que l'erreur ou la différence a dû être rejetée totalement sur l'esset de la résraction.

D'un autre côté on ne sçauroit rejeter des différences de cette espèce sur la dissiculté d'observer le midi à la ligne meridienne, puitqu'à l'obelisque qu'on vient de constraire l'image du Soleil parcourt au solstice d'hiver 2 lignes par seconde, & que sa vitesse même est d'un peu plus de 3 lignes lorsque le Soleil étant dans le parallèle de Sirius, son image est descendue au bas de l'obélisque où elle occupe un espace d'environ 25 pouces de diamètre. Aussi l'expérience a-t-elle sait connoître jusqu'ici qu'on y pouvoit déterminer communément par les passages des bords l'instant du midi à moins

364 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE d'une demi-seconde, & l'on est même parvenu quelquesois à le conclurre pendant le mois de Décembre, à un quart de seconde près, lorsque le ciel s'est trouvé fort serein. Cet instrument nous devant donc être d'un très-grand secours dans la recherche du moment auquel le Soleil a dû passer par son périhésie, nous nous sommes préparez à déterminer par ce

moyen, plus exactement qu'on ne l'a tenté jusqu'ici, la po-

sition du grand axe de l'orbite terrestre.

Mais indépendamment de cette rapidité apparente dans le mouvement de l'image du Soleil, nous ne doutons point qu'avec un gnomon d'une grandeur si prodigieuse, l'on ne patte d'terminer assez part itement les mouvemens diurnes du Soleil en déclinaison vers le sossitie d'hiver, puisque l'on reçoit presque directement sur le plan de l'obélisque les

rayons du Soleil à plus de 170 pieds de distance.

Enfin l'image qui occupe alors 20 pouces \(\frac{1}{3}\) est presque ronde, & par conséquent n'est point assoiblie vers les bords, comme sont celles des autres gnomons, qu'on n'apercoit plus assez distinctes dans le sens du grand axe, & cela parce que cette im ge se trouve tellement alongce en sorme d'ellipse au solttice d'hiver, qu'il est presqu'impossible d'en saisn les termes, & par conséquent d'arrêter quelque chose de bien précis à l'égard du point qui doit répondre à la hauteur du Tropique du Capricorne.

Avant l'application des lunettes d'approche aux quart-decercles, exécutée pour la première fois par M^{rs} Picard & Auzout, il est certain que les plus grands gnomons avec leurs divisions le long de la tangente étoient presentables aux quart-de-cercles & aux sextans, tels que ceux de Bouillaud, de Mouton ou de Riccioli; & que c'étoit sans doute l'unique moven de determiner les hauteurs absolues, tant de Soleil que de la pleine Lune, ou de suppléer au désaut d'un aussi grand appareil d'instrumens que ceux de Tycho & de Hevelius. Mais depuis 1667 l'usage des gnomons paroît ensin borné aux seules dissérences observées aux temps des équinoxes ou des solssies d'hiver ou d'été; car de prétendre qu'avec ces

fortes d'instrumens l'on puisse déterminer l'obliquité de l'écliptique & la Latitude d'un lieu avec autant de précision qu'avec nos quart-de-cercles ordinaires, c'est ce qu'il me semble qu'on ne sçauroit prouver; au contraire nous vovons que Manfredi qui s'étoit attaché aux hauteurs absolues, a introduit des variations dans la hauteur du Pole, qui n'ont point lieu dans la Nature, & la même chose est arrivée au gnomon de Rome construit il y a environ quarante ans. lorsque Bianchini a cru s'apercevoir d'une diminution reelle dans l'obliquité de l'écliptique. Ceci ne doit pa être confondu avec ce qu'il dit de l'étoile de Sirius, liquelle paroiffoit à ce gnomon 57 secondes plus haut dans un temps de l'année que dans l'autre : cette inégalité dans la hauteur de Sirius est contraire aux plus récentes & aux meilleures observations qui aient été faites sur cette étoile, les dissérences qu'on y a remarquées n'ayant jamais excédé 30 secondes.

Ainfi puisqu'avec les plus grands & les plus solides gnomons, l'on ne sçauroit guère conclurre autre chose, que des passages ou des différences réelles dans les declinaisons du Soleil au temps des solstices, & nen pas des hauteurs absolues; on s'est donc uniquement proposé dans celui de Saint Sulpice, de résoudre, s'il ctoit possible, les difficultés qui se presentent

dans les quatre questions suivantes.

La première, comme il a été dit ci-dessus, consiste à bien établir le moment du passage du Soleil par son perihelie: on a déjà fait voir par les observations de l'année 1739, que les meilleures l'ables paroissoient s'ecarter au moins d'un huitieme de degré dans le lieu du perihelie: mais ce perihelie n'est-il pas variable, & se meut-il uniformément?

En second lieu, il s'agit de faire connoître les petites variations qui doivent arriver en différentes années dans la retraction a la hauteur de 18 degrés, qui est celle du Soleil au solstice d'hiver, & quelles sont les limites de ces variations.

3° Comme les deux points des sossitices d'hiver & d'été doivent prouver également, à ce qu'il semble, si l'obliquité de l'écliptique est constante ou si elle diminue, il s'ensuit

20", 1".... 1. 0 report à 7" de hauter.

366 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE qu'étant une sois assuré de la plus grande solidité, soit dans l'obelle : , intré ins les autres principale per il a du gnomon. ces deux points doivent concourir à donner les mêmes dissérences. Mais il est à remarquer qu'il y a un grand défaut * A an gro-dans tous les gnomons au temps du solstice d'été*, & que l'on mordes opieds, n'a pas encore évité jusqu'ici: c'est que le rayon du solstice répont et le : d'été est projeté à Paris sur le carreau, à une distance trois sois moindre qu'au solstice d'hiver, en sorte que si à ce dernier sil a So just une minute vaut un pouce dans le mouvement de l'image, il paroîtra beaucoup moins sensible au solstice d'été.

C'est pourquoi si l'on veut y remédier il faudra placer un verre objectif de 80 ou 100 pieds de foyer dans le plan meme de la méridienne, ce qui pourroit donner desti un ravon beaucoup plus grand que celui du gnomon. On aura d'ailleurs une image intiniment plus vive que l'image ordinaire du gnomon : elle fera entierement depouisse de penombre, & terminée vers les bords, ce qui ne contribuera pas peu à ficiliter l'observation des différences qu'on se propote d'observer dans chaque retour du Soleil au Tropique du Cancer.

Entin l'une des plus belles questions qu'on sera peut-être à portée de resoudre avec le gnomon de Saint Sulpice, lorsqu'il sera entièrement achevé, c'est de saire connoître avec certitude, si les mêmes mouvemens que nous observons chaque année dans les étoiles qui passent au zénit, & qui paroissent périodiques; si ces mêmes mouvemens, dis-je, e ion n'a pu apercevoir jusqu'ici qu'avec d'excellens secleurs, atieclent d'une man, re semblable les hauteurs folfficiales du Soleil; en un mot, s'il arrive en esset que l'obliquité de Péchatique au mente & diminue alternativement, & s'il n'y a pas d'autres variations.



SEPTIEME MEMOIRE SUR LES OS.

Detail d'une Maladie singulière pendant laquelle une Fille a perdu à différentes fois presque tout l'humerus, sans que son bras se soit accourci, & sans qu'elle en ait été du tout estropiée.

Par M. DU HAMEL.

ANS le dernier Mémoire que je lûs à l'Académie sur les Os avant les dernières vacances, je parlai d'une sille qui avoit perdu a disserentes sois presque tout s'os du bras sans en être estropice, & j'essayai d'expliquer cet evénement singulier en suivant les principes que j'avois établis dans mes précédens Mémoires; l'Académie parut alors desirer un détail plus circonstancié de cette singulière maladie, je promis de le donner, & je satissais aujourd'hui à cet engagement.

Dans le mois de Juin 1735 une fille qui n'avoit point encore eu ses règles, quoiqu'elle sut âgée de dix sept à dixhuit ans, ressentit une violente douleur à l'épaule droite; elle eut recours à un Chirurgien qui la purgea & la saigna plusieurs sois dans l'espace de quinze jours, sans lui procurer le moindre soulagement.

Les vives douleurs qu'elle fouffroit, l'engagèrent à avoir recours à une d'une charitable chez laquelle elle demeura pendant quinze jours.

On appliqua d'abord differens cataplasmes sur la partie soussirante; au bout de quelque temps la douleur quitta l'épaule, elle se jeta sur la partie insérieure du bras, où il se sorma un petit dépôt qui sut suivi d'un autre plus considérable sous le muscle biceps, & d'une susée qui s'étendoit sous le brachial interne. Le cataplasme ayant sait suppurer cet

368 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE abcès, on employa des onguens dont on continua l'usage pendant six mois; ensin après cette longue suppuration il sortit de la première plaie une esquille de la largeur d'un pouce & épaisse au moins d'une ligne; peu de temps après il sortit une pareille esquille de la seconde plaie, les trois plaies s'agrandirent peu à peu & n'en sirent plus qu'une, de laquelle il sortit quantite d'esquilles les unes après les autres, jusqu'à ce qu'ensin il se dégagea un morceau d'os de quatre pouces de longueur, & qui avoit par un bout un pouce de largeur, alors la plaie se ferma, & la sille se crut quitte des soulle succes, qui depuis dix huit mois avoient été presque continuelles.

Sa latisfaction ne dura pas long-temps, puisqu'au bout d'un mois la partie supérieure de la grande plaie cicatrisée se r'ouvrit, ce qui donna issue à un pus sanieux qui continua à s'écouler pendant plusieurs années; au bout de ce long espace de temps, lorsque la plaie sembloit tendre à se cicatriser, on aperçut une éminence aux environs de l'attache du deltoïde, cette tumeur s'ouvrit, il en sortit beaucoup de pus, & la suppunation continua pendant six mois; ensin après ce long espace de temps il parut un morceau d'os tout entier, qui peu à peu sortit de la longueur d'un bon pouce, la suppuration cessa, les chairs se rassermirent, assujétirent & enchâsèrent cet os à peu près comme les dents paroissent l'être dans les gencives.

Les choses étoient en cet état en 1741 quand le père de cette fille me pria de lui dire ce qu'il convenoit de faire

à ce bras malade.

Cette fille étoit grasse, elle avoit des couleurs, elle semisseit je uir de la plus parsaite santé, & je sus extrêmement surpris quand je vis un tronçon d'os qui sortoit tout entier de

la partie moyenne & antérieure de son bras droit.

Ce tronçon d'os excédoit les chairs de la longueur de plus d'un pouve, il ctoit affez blanc, la circonference offcuse qui forme le canal medullaire étoit dans son entier & remplie de chairs songeuses.

Si

DES SCIENCES.

Si j'essayois de remuer cet os, je sentois qu'il étoit sermement retenu par les chairs, mais qu'il ne l'étoit que par les chairs, pair a'il obcidoit aux mouvemens que je lui donnois, sur que le malade en soutsist en aucune fron. Je pouvois de même manier le bras assez sortement sans lui faire la moindre douleur, elle exécuta de son bras tous les mouvemens possibles avec sacilité & sans soussirance; ensin elle m'assura qu'elle n'avoit presque pas senti de mal depuis que la cicatrice s'étoit formée tout autour de cet os, qu'elle avoit bon appétit, qu'elle dormoit bien, & qu'elle travailloit de son métier de couturière, elle se plaignoit seulement d'avoir ce bras un peu plus soible que l'autre, & que le bout d'os saillant qui frottoit continuellement contre la manche de ses habits sui étoit fort incommode.

Je ne sçais si c'étoit avec raison, mais je jugeai que tous les accidens dont je viens de parler, étoient produits par une humeur sérophuleuse, & c'est dans cette vûe que je lui confeillai de légers purgatifs, des fondans & des bouillons convenables à cette maladie.

Ce font les souffrances qui font ordinairement surmonter le dégoût des remèdes, aussi je ne crois pas que cette sille qui ne souffroit plus, ait sait grand usage de ceux que je sui donnai.

A l'égard de son bras, je lui promis d'engager M. Dupas Chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Pluviers de la voir gratis; ce Chirurgien s'en chargea avec plaisir, & je convins avec lui qu'il ne seroit aucune opération pour ne point sormer de plaie à une partie qui pendant si long temps avoit servi à un écoulement considérable d'humeur, mais qu'il essay avec des caustiques de détruire les chairs songeuses qui remplissionnt le canal médullaire, car il nous paroitsoit que ces chairs contribuoient beaucoup à empècher cet os de se dégager.

M. Dupas la traita suivant cette idée en la voyant seulement une ou deux sois le mois jusqu'en 17.93, ne remarquant autre chose, sinon que l'os sortoit toûjours de plus en

Alem. 17-43.

plus du bras, mais fort lentement, la malade emportoit de temps en temps avec ses ciseaux un peu de cet os qui avoit été attaqué par les caustiques; ensin M. Dupas satigué de ces lenteurs, prit un parti plus violent, il résolut d'ébranler cet os à tous les pansemens qu'il saisoit alors tous les jours, & au bout de cinq jours il le tira avec violence & l'arracha, il laissa couler environ une palette de sang, il pansa la plaie avec une teinture de myrrhe & d'aloès, & au bout de trois jours elle sut bien cicatrisée.

Le bras droit de cette fille, qui étoit le malade, est aussi long que le gauche, il est un peu plus gros, on peut le manier sans qu'elle en ressente la moindre douleur, & quoique cette fille soit sort grasse, on sent, en pressant sortement les chairs, une concrétion osseuse qui s'étend depuis l'olécrâne jusqu'à la tête de l'humerus. Il y a apparence que cette sille est ensin quitte d'une maladie qui l'a tourmentée pendant

huit ans.

Buth lin rapporte dans les Actes de Copenhague comme une el se extremement l'injulière, qu'un jeune berger ayant reffenti une vive douleur à l'os tibia, cet os s'étoit ulcéré & étoit forti tout entier à différentes reprifes, qu'il s'étoit néanmoins formé un cal qui avoit tellement réparé cet os, que l'enfant fut abfolument guéri, & si parsaitement qu'il

ne boitoit presque pas.

M. de la Renauldy Chirurgien de Pluviers m'a fait part d'un fait tout pareil, & M. Falconnet célèbre Médecin & Membre de l'Académie des Belles-Lettres, m'a fait voir l'année dernière une portion de l'os cubitus, de la longueur de 4 pouces, qui étoit fortie de l'avant-bras d'un homme qui n'en étoit pas resté estropié: ces exemples sont moins singuliers que celui que j'ai rapporté, parce qu'il y a deux os à la jambe & à l'avant-bras, au lieu qu'il n'y en a qu'un au bras; mais dans tous ces cas il faut qu'il se forme un nouvel os qui répare celui qui est sorti, sans quoi les mouvemens du bras & de la jambe ne pourroient s'exécuter. Je renvoie

pour l'explication physique de la formation de ces os a ce que j'en ai dit dans mon fixième Mémoire sur les Os.

EXPLICATION DES FIGURES.

LA première Figure représente le bras de la fille en question avec l'os qui en sort, comme il étoit en 1741 quand je le vis pour la première sois.

La feconde Figure représente l'os que M. Dupas a tiré de ce bras, la portion depuis a jusqu'à b étoit hors les chairs, & celle depuis b jusqu'à e étoit dans les chairs.

La troissème Figure représente l'os qui étoit sorti de la jambe du jeune berger dont parle Bartholin.



OBSERVATION

DU PASSAGE DE MERCURE DEVANT LE DISQUE DU SOLEIL,

Faite le 5 Novembre de cette année 1743.

Par M. CASSINI.

près du Soleil, duquel elle ne s'écarte jamais en apparence de plus de 28 degrés, elle se trouve presque toújours plongée dans les rayons de cet astre, ce qui la rend très-dissicile à apercevoir; aussi les anciens Astronomes ne nous ont-ils laissé qu'un très-petit nembre d'observations de cette l'Innere taired dans ses digressions à l'égard du Soleil, qui est la seule situation où on pouvoit l'apercevoir, mais en même temps la moins savorable pour déterminer son mouvement par des raisons qui sont assez connues des Astronomes.

On n'ignoroit pas que Mercure devoit dans quelques-unes de ses révolutions passer devant le disque du Soleil, & y former une éclipse véritable, de même que la Lune forsqu'elle passe entre nous & cet astre; mais comme son diamètre n'occupe que quelques secondes sur le disque du Soleil, il ne pouvoit point être aperçu à la vûe simple, & ces sortes d'observations étoient réservées aux Astronomes après s'invention des lunettes qu'i a produit tant d'autres belles découvertes.

La première observation du passage de Mercure devant se disque du Soleil a été saite à Paris par Gassendi le 3 Novembre de l'année 1631, elle a été ensuite suivie de plusieurs autres dont on a déjà sait mention en divers mémoires, & celle dont nous faisons ici le rapport est la neuvième que s'on ait observée dans l'espace de 112 années, depuis 1631 jusqu'en 1743.

373

Entre ces observations il ne s'en trouvoit que deux qui eussient été entièrement complétes, c'est-à-dire, où s'on eût aperçu l'entrée de Mercure dans le Soleil & sa sortie, l'une saite à l'Isse de Sainte-Hélène en 1677, & l'autre en 1736 à Paris & en diverses villes de la France & de l'Europe; ainsi celle-ci qui a commencé le 5 Novembre 1743 après le lever du Soleil & a sini long-temps avant son coucher, est la troissème qui ait été observée dans les circonstances les plus savorables, & il n'y en aura plus de semblable à Paris qu'en 1799, vers la sin de ce siècle.

Dans celle de 1736 j'étois resté à Thury pour saire cette observation, pendant que M. Maraldi & mon sils étoient à l'Observatoire, asin que si le ciel étoit plus serein dans un de ces endroits que dans l'autre on pût en profiter.

Cette précaution nous parut encore plus nécessaire dans cette dernière observation, les jours qui l'ont précédée, ayant été presqu'entièrement couverts & nous laissant peu d'espé-

rance d'un temps serein.

En esset, le 5 Novembre au matin, jour de cette observation, il s'éleva pendant la nuit à Thury un brouillard épais qui continua jusqu'au lever du Soleil, après quoi il se dissipa peu à peu, & nous laissa entrevoir le Soleil sur les huit heures du matin; le ciel s'éclaircit ensuite, & à 8h 39' 47" je commençai à apercevoir par une lunette de 14 pieds, Mercure sur le disque du Soleil assez précisément dans sa partie la plus méridionale.

Il y parut en forme d'un point noir qui y formoit une petite échancrure, il augmenta ensuite de grandeur, & je déterminai l'immersion totale de Mercure à 8h 40' 37", temps auquel son bord touchoit exaclement celui du Soleil, qui, de même qu'à sa sortie, est de toutes les phases celle qui s'obferve avec plus de précision, comme tous les Astronomes en

convienment.

Je fus ensuite attentis à remarquer s'il n'y avoit point autour de Mercure quelqu'anneau lumineux comme M¹⁵ de la Societe Roy, le de Montpellier s'avoient observe en 1736,

& je crus y apercevoir une espèce d'atmosphère très-délice, à peu près semblable à celle que l'on voit autour des taches du Soleil, ce que je continuai d'observer pendant presque tout le cours de Mercure dans le Soleil, ce que je n'oserois cependant assurer, car comme le brouillard qu'il avoit fait le matin avoit laissé quelques vapeurs dans le ciel, je jugeai qu'elles pouvoient être la cause de cette apparence, de même que de la variété que l'on apercevoit dans la figure de Mercure qui ne paroissoit pas toûjours exactement ronde.

Pour déterminer la route de cette Planète dans le Soleil, j'employai successivement deux méthodes, dont la première consiste à compter le moment auquel Mercure & les bords du Soleil passent par les sils horizontal & vertical d'un quart-

de-cercle.

Cette méthode n'est point sujette aux erreurs causées par la réfraction & la parallaxe, comme on l'a déjà remarqué en d'autres occasions, mais comme elle n'est praticable que lorsque le Soleil par son cours traverse assez obliquement le sil horizontal pour que tout son diamètre puisse passer dans l'ouverture de la lunette, ce qui cesse lorsqu'il approche du midi, je me servis ensuite de la seconde méthode où s'on fait passer Mercure & le Soleil par les sils horaires & obliques d'une lunette montée sur une machine parallactique; je continuai ainsi ces observations jusqu'à ce que Mercure sut près du bord occidental du Soleil, auquel temps je repris ma lunette de 14 pieds pour observer le commencement de son émersion dans le temps que son bord occidental touchoit celui du Soleil, que je déterminai à 1 h 10 3 2 ".

A 1^h 1 1' 3 2" il formoit sur le bord du Soleil à peu près la même apparence que sorsque j'avois commencé à l'apercevoir, je sus ensuite obligé de remuer ma lunette, ce qui me saissa le doute de quelques secondes sur le temps de la sortie entière de Mercure du disque du Soleil, que je jugeai

à 16 12'2".

Suivant cette observation la durée du passage de Mercure pur le duque du Sacil de la disson immersion totale jusqu'au commencement de fon émersion, qui, comme nous l'avons remarqué, sont les phases que l'on observe avec le plus d'évidence, a été de 4^h 29' 55", ce qui donne son passage par le milieu du Soleil le 5 Novembre à 10^h 55' 30".

A Paris mon fils a auffi observé Mercure dans le temps qu'il formoit une petite échancrure sur le bord du Soleil à 8h 39' 34", son immersion totale à 8h 40' 34", à 3 secondes près de celle que j'avois déterminée; le commencement de son émersion à 1h 10' 26", avec une dissérence de 6 secondes seulement de mon observation, & sa sin à 1h 12' 24", ce qui donne la durée de l'immersion totale de Mercure dans le disque du Soleil, de 4h 29' 52", plus petite seulement de 3 secondes que celle que j'avois observée, & se temps de son passage par le milieu du Soleil, à 10h 55' 34".

Comme le Méridien de mon Observatoire de Thury est éloigné de 6 secondes vers l'occident de celui de Paris, le passage de Mercure par le milieu du Soleil, observé à Paris à 10^h 55′ 34″, auroit dû arriver à Thury à 10^h 55′ 28″, avec une dissérence seulement de 2″ de celui que j'avois déterminé; ce qui fait voir qu'on peut avoir par ce moyen la dissérence des Méridiens entre les lieux où ces observations ont été saites, avec autant de précision que par les meilleures

méthodes que l'on ait employées jusqu'à présent.

Nous avions déjà fait usage de cette méthode pour déterminer les longitudes des différens lieux où l'on avoit observé en 1736 le passage de Mercure devant le disque du Soleil, ce qui nous avoit donné la situation de plusieurs villes de la France & de l'Europe, & nous espérons que les observations que les Astronomes dispersez en divers pays de la terre voudront bien nous communiquer, serviront de même pour déterminer la longitude de divers autres lieux, dont la connoitlance est nécetiaire pour le progrès de la Geographie, y ayant peu de pays de la terre habitables, tant dans l'Europe que dans les Indes orientales & occidentales, où l'on n'ait pa observer le passage dernier de Mercure dans le Soleil, ou du moins quelques-unes de ses phases.

376 Memoires de l'Academie Royale

Mais outre l'avantage que l'on peut retirer de ces fortes d'observations pour la connoitsance des longitudes, elles peuvent aussi être employées avec succès pour déterminer la parallaxe du Soleil, qui est une des connoissances des plus importantes pour l'Astronomie, & en même temps dont la recherche est des plus dissiciles, à cause du peu de quantité de cette parallaxe, qu'il faut trouver le moyen de dissinguer des autres élémens dans lesquels elle se trouve compliquée.

M. Delisse de cette Académie & Astronome de celle de Pétersbourg, dans une lettre que j'ai reçue de lui pendant ces vacances, remarque dans un mémoire qui y est joint, que supposant la parallaxe du Soleil de 12 secondes, telle qu'on l'a trouvée par les dernières observations de l'opposition de Mars avec le Soleil, l'entrée de Mercure dans le Soleil y devoit paroître à Paris 1' 3" plus tard qu'étant vûe du centre de la Terre, & sa sortie 25 secondes plûtôt; de forte que la durce de cette éclipse vûe de Paris a dû y être plus courte de 1'28" qu'étant considérée du centre de la l'erre, & il ajoûte que si cette observation pouvoit être saite au Cap de Bonne-espérance, la demeure du centre de Mercure sur le disque du Soleil y devroit paroître plus courte de plus d'une minute qu'à Pétersbourg. Si l'on pouvoit donc s'assurer d'avoir déterminé dans ces deux lieux la durée du passage de Mercure devant le disque du Soleil à deux secondes près, qui est la précision à laquelle on est parvenu par la comparaison des observations que j'ai saites à Thury avec celles de mon sils à Paris, on auroit la parallaxe du Soleil à un quart de seconde près, ce qui donneroit la distance du Soleil à la Terre avec une précision encore plus grande que celle à laquelle on est parvenu par les autres méthodes que l'on a employées jusqu'à présent pour découvrir cette parallaxe.

Pour déduire présentement de nos observations les élémens nécessaires pour la théorie de Mercure, j'ai décrit la ce de cette Planète sur le disque du Soleil par rapport au que cet assire décrivoit par son mouvement journa-

lette mamere.

Ayant choisi une des observations des plus exacles, suivant la juelle on a déterminé l'intervalle de temps que le Soleil a employé à passer par le fil horizontal du quart-de-cercle de 6'39", & par le fil vertical de 2'24" $\frac{1}{2}$, j'ai construit un triangle rectangle SED, dont le côté ED est au côté SE, comme 6'39" à 2'24" $\frac{1}{2}$, ou 399 à 144 $\frac{1}{2}$.

Du point S & de l'intervalle SE j'ai décrit le cercle AEB

qui coupe l'hypoténuse SD en A.

Le cercle AEB représente le disque du Soleil, & l'hypoténuse SD la portion du parallèle que le Soleil a décrit depuis le passage de son centre jusqu'à celui de son bord méridional par le sil horizontal.

J'ai divisé cette hypoténuse SD par 199 $\frac{1}{2}$ moitié de l'intervalle que le disque du Soleil a employé à passer par le til horizontal, & j'ai cu par ce moyen le parallèle que le Soleil a décrit par son mouvement journalier divisé en secondes.

La portion SA de ce parallèle, comprise par le demidiamètre du Soleil, m'a donne le temps que ce demi-diametre a employe à passer par un cercle horaire, que j'ai trouve d'une minute & près de 8 secondes.

Cette opération étant faite je m'en suis servi pour toutes les observations qui ont précédé ou qui ont suivi, en eette

manière.

Du point S comme centre, j'ai décrit à un intervalle quelconque SK un arc de cercle KFLG, qui a coupé la ligne DEG en $F \otimes G$, \otimes j'ai divifé la corde FG en deux parties égales au point E qui a dû se rencontrer à l'angle droit SED du triangle rectangle SED; j'ai conservé sa grandeur de FE ou EG que j'avois prise avec un compas pour m'en servir dans les autres observations.

Le Soleil ayant, par exemple, employé dans la première observation 4' 43" à passer par le sit horizontal, j'ai pris $2' 21'' \frac{1}{2}$, moitié de cet intervalle sur les divisions du parallèle SD, depuis S jusqu'en H, & j'ai tiré du point H la ligne HKIL tangente au cercle qui a coupé l'arc KFLG aux points K & L où j'ai placé une pointe de mon compas,

Mem. 1743. Bbb

dent l'ouverture étalt é ale à l'E ou l.G. l'autre pointe a mu que le point I par lequel pai the le rayon SI, & je l'ai pratique de même pour toutes les observations suivantes; III maque la position du sil horizontal de la functie par rapput au pardice SD dons le temps du passage du centre du Soleil par ce sil, & SI la position du sil vertical pour le

même temps.

Cette opération revient à peu près au même que ce que fon a pratique en d'autres occ tions, & tout l'avantage qu'elle peut avoir, est d'être fort simple & de pouvoir s'exécuter avec une grande précision; car comme les lignes KL, FG, &c. comprises par des arcs égaux KFL, FLG doivent être égales entr'elles, il est aisé de s'apercevoir si elles ont été décrites exactement, & de les reclisier. On peut même vériter si le instructions du passage des bonds du Solcil par les fils du quart-de-cercle ont été faites exactement, en talant IQ onde a 3 I, & menant du point Q la ligne Q R parallele 1 S I, qui coupera S D au point T, lequel marquera les minutes & secondes que le Solcil a du employer à passer par le fil vertical.

On a supposte ici que les fils de la lunette se coupent exactement à angles droits, ce que l'on peut vérifier en divifant le rayon 5.4 en autant de parties que le demi-diamètre du Soleil a employe de secondes à patier par le sit vertical lorsqu'il ctoit au Meridien; on prolongera ces divitions fur fa ligne SD, & l'on prendra SH et de au temps que le demidi mi tre du Solcil a employé à passer par le sil horizontal. On menera du point II la tangente HI, fur laquelle on prendra IQ égale à SI ou SA, & l'on tirera du point Q la tangente QR qui coupera le parallèle SP au point T; ST doit marquer fur les divitions de ce parallele le temps que le demi diamètre du Soleil a employe a patier par le til vertical fortque les fils fe croifent à angles droits, suppotant l'obfervation exacte. Sil y a quelque différence, on prendra \mathcal{F} is all au temps du passage observe & l'on menera pur le point I la tangente AZ qui fera avec IIL un angle AZI qui

mesurera l'inclinaison du sil horizontal à l'égard du vertical.

Pour déterminer préfentement la fituation de Mercure for le disque du Soleil dans chaque observation, comme, par exemple, dans la première où le passage du centre du Soleil par le fil horizontal est arrivé à 8h 56' 28", & celui de Mercure à 8^h 5 8' 3 5" $\frac{1}{2}$, on prendra fur SD la différence entre $F_{i,j+1,j}$ ces passages, qui est de 2' 7" qui répondent au point M, & l'on tirera MN parallèle à HI. On prendra aussi l'intervalle entre le passage de Mercure & du centre du Soleil par le fil vertical, qui a été observé de 4" 1/2 que l'on portera de S vers B, comme en O, à cause que le passage de Mercure avoit précédé celui du centre du Soleil, & l'on tirera OP parallèle à SI qui coupera MN au point P, lequel marque le lieu de Mercure sur le disque du Soleil pour le temps de la première observation, & ainsi des autres. Dans les cas où l'on a reconnu que les fils du quart-de-cercle ne se coupent pas parfaitement à angles droits, au lieu de tirer OP parallèle à SI ou QR, il faudra mener du point Q une parallèle à XZ, dont l'interfection avec la ligne MN marquera le lieu de Mercure sur le disque du Soleil.

Cette opération est exacte forsque dans l'observation proposée Mercure a passé par le centre de la lunette, mais lorfqu'il y a eu quelqu'intervalle entre son passage par le fil horizontal & le vertical, il faut y employer une correction,

en cette manière.

Dans l'exemple que l'on vient de rapporter, on a observé le passage de Mercure par le sil vertical à 8h 58' 15", & par le fil horizontal à 8h 58' 35" 1/2, avec une différence de 20"1; le passage du centre du Soleil par le fil vertical est arrivé à 8h 58' 19" 1, 4" 1 après celui de Mercure.

Dans l'observation suivante le passage de Mercure par le fil vertical est arrivé à 9h 5' 54" 1/2, & celui du centre du Soleil à 9h 6' 0", 5" \frac{1}{2} après celui de Mercure, au lieu que dans la première observation on l'avoit trouvé de 4" 1, ce qui fait voir que pendant l'intervalle entre le passage de Mercure par le fil vertical dans ces deux observations, qui est Bbb ij

de 7' 39" ½, Mercure s'est avancé d'une seconde de temps. On sera donc, comme 7' 39" ½ sont à 20" ½ intervalle entre le passage de Mercure par le sil horizontal & le vertical dans la première observation, ainsi 1" est à 2"' ½ qu'il saut ajoûter à 4"½, dissérence observée entre les passages du centre du Soleil & de Mercure par le sil vertical, à cause que le passage de cette Planète par le sil vertical a précédé son passage par le sil horizontal, & s'on aura 4" 32" ½ pour la dissérence véritable entre le passage de Mercure & du centre du Soleil par le sil vertical, à 8h 58' 35", temps auquel cette Planète a passé par le sil horizontal.

On voit par cet exemple qu'une différence de 20 secondes entre le passage de Mercure par les sils de la lunette, en produit une de 2" ½ sur la position de Mercure à l'égard du vertical, ce qui est à raison de 7 à 8 tierces par minute dont on peut se servir pour corriger les observations où les dissé-

rences font plus grandes.

-m.,

Par le moyen de ces observations & des autres que j'ai stites ensuite par la machine parallactique en la manière accoûtumée, j'ai trouvé que l'inclinaison de la route de Mercure par rapport au parallèle que le Soleil décrit par son mouvement journalier, étoit de 26 degrés & quelques minutes, & qu'au temps du passage de Mercure par le milieu de cette route sa distance au centre du Soleil étoit de 9'5", ce qui ne disser que de 3 secondes de celle qui est marquée dans la Connoissance des Temps, & fait voir que l'inclinaisson de l'orbite de Mercure à l'égard de l'écliptique & le lieu de son nœud, dont cette distance dépend principalement, sont déterminez avec assez de précision.

A l'égard de l'heure du passage de Mercure par le milieu de sa route sur le disque du Soleil, elle devoit être, suivant la Connoissance des Temps, à 11h 10'29", plus tard de près de 15 minutes qu'on ne l'a observée, ce qui pourroit paroître considérable, si l'on ne faisoit point attention que le mouvement horaire apparent de Mercure n'est que d'environ 6 minutes de degré, ce qui, dans l'espace d'un quart d'heure,

ne produit qu'une erreur de 1/4 de degré for le mouvement T : 1. combiné de cette Planète, précifion qui doit paroître suffifante, attendu le peu d'observations que l'on en a eues jus-

qu'à présent.

La distance de Mercure au centre du Soleil Iorsqu'il étoit au milieu de sa route, ayant été déterminée de 9' 5", on trouvera que la corde qui mesure cette route, a été de 26' 52". Suivant l'observation faite à Paris la durée de l'immersion totale de Mercure a été de 4h 29' 52", à laquelle il saut ajoûter 1' 58" pour le temps que son demi-diamètre a employé à entrer & à sortir, & l'on aura 4h 3 1' 50, qui mesurent le temps que le centre de Mercure a employé à parcourir sa route dans se Soleil, qui est de 0d 26' 52", ce qui donne son mouvement horaire apparent de 5' 55" 50".

L'inclinaison de la route de Mercure à l'égard du parallèle du Soleil ayant été déterminée de 26 degrés, si l'on y ajoûte l'angle de l'écliptique avec le Méridien qui étoit alors de 72^d 16', on aura l'angle que la route du Soleil sait avec l'écliptique, de 98^d 16', ce qui donne la latitude de Mercure pour le temps de sa conjonction avec le Soleil, de 9' 11", au moyen de laquelle on trouvera que cette conjonction est arrivée le

5 Novembre 1743 à 10h 42' du matin.

La latitude de Mercure au temps de sa conjonction, & l'inclinaison apparente de son orbite à l'égard de l'écliptique étant ainsi connues, on pourra s'en servir pour déterminer le vrai lieu du nœud de Mercure, & l'inclinaison véritable de son orbite à l'égard de l'écliptique. Mais comme les moindres erreurs dans les observations en peuvent causer de très-considérables dans l'inclinaison de cette orbite, nous y employerons une méthode qui a été déjà proposée, qui consiste à comparer cette observation avec une précédente dans laquelle la latitude de Mercure étoit d'une autre dénomination; ce qui se rencontre dans l'observation de 1736 où elle sut trouvée de 14' 7" ½ vers le nord, au lieu que dans celle-ci elle étoit de 9' 11" vers le midi.

Comme Mercure dans ses conjonctions ecliptiques avec Bbb iii

le Solell ne peut être cloigne que de gecliques degrés de fes neuds, on aveit hipput pour cette recherche les trian-Fig. 2. gle BND. ANC formez par f. diffunce au noval & par sa latitude, comme rectilignes, ce qui donnoit à très-peu pres la fituation de les mouds & l'inclimifen de len gibite; cependant pour une plus grande précision, nous donnerons ici la méthode de les calculer géométriquement, en cette

manière.

Soient A & B le lieu du centre du Soleil dans le temps de sa conjonction avec Mercure en 1736 & 1743, AE sa latitude en 1736, qui, réduite à sa vraie latitude AC vûc du Solcil faivant la proporti n des dillances de Mercure à la Terre & au Soleil qui étoit alors comme 3 1 174 à 67730, est de 30' 43"; BI sa latitude en 1743 de 9' 11", qui, réduite aussi à sa vraie latitude BD suivant le rapport des diffunces de Mercare la la Lerre & au Soleil, qui ettit e mine

31441 à 67592, est de 19' 44" 1.

Soient prolongez CA & BD en P, en sorte que les arcs AP & BP soient de 90 degrés, on aura CP ou CA-AC, de 90d 30' 43", & PD ou PB - BD, de 89d 40' 15"1; & dans le triangle sphérique DPC dont les côtés CP, PD sont connus, de même que l'angle BPA compris entre ces côtés, qui est de 6d 45' 58", & qui mesure la différence entre le lieu où étoit le Soleil dans le temps de sa conjonction avec Mercure, de 1736 & de 1743, on trouvera l'angle PDC de 96d 59' 4", & son supplément BDN de 83d o' 56"; enfin dans le triangle sphérique NBD, reclangle en B, dont le côté BD est connu de od 19' 44" 1, & l'angle BDN de 83d o' 56", on trouvera l'arc BN de 2d 38' 44"; l'ajoûtant au fieu du Soleil qui étoit dans la conjonction de 1743 en m 12d 37' 36", parce que Mercure s'approchoit de son nœud, on aura le vrai lieu du nœud de Mercure en m 15d 16' 20" pour un temps intermediaire entre ce eblervations, que l'on trouvera en faisant, comme 6d 45' 58" dissérence entre le vrai lieu du Soleil en 1736 & 1743, sont à 2d 38' 50"; ainsi sept

années communes moins cinq jours, intervalle entre ces Fig. 2. observations, sont à deux années & 268 jours; les retranchant du 5 Novembre 1743, on aura le 10 Février 1741 pour le temps auquel le nœud de Mercure étoit en m 15d 16' 20".

Comme dans ce calcul on n'a pas eu égard au mouvement du nœud de Mercure que nous avons trouvé à peu près égal à celui des Etoiles fixes, il faut ajoûter à BN. qui a été déterminé de 2d 38' 54" le mouvement de ses nœuds dans l'espace de deux années & 268 jours, qui est de 2' 18", & l'on aura la distance véritable BN de Mercure à son nœud le 5 Novembre 1743, de 2d 41' 1", au moven de laquelle on trouvera l'inclinaison de son orbite à l'égard de l'écliptique, de 6d 59' 32", peu différente de celle

que j'avois déterminée par mes Tables de 7d 0'0".

Pour abréger ce calcul il faut ajoûter à l'arc B A ou à l'angle BPA, qui est de 6d45' 58", le mouvement des nœuds de Mercure dans l'espace de 7 années moins 5 jours, qui est de 5' 50", & déterminer comme on l'a fait, la valeur de l'angle BND qui mesure l'inclinaison véritable de l'orbite de Mercure, que l'on trouvera de 6^d 59' 32", & la distance B Nde Mercure à son nœud, de 2^d 41' 1", qui, étant ajoutées au lieu du Solcil qui ctoit le 5 Novembre 1743 au temps de sa conjonction avec Mercure en m 12d 37'36", donnent le lieu du nœud pour ce temps en m 15d 18' 37".

Le mouvement horaire de Mercure sur le disque du Soleil vû de la Terre, ayant été déterminé de 5' 55" 50", on aura fuivant le rapport des diffances de Mercure au Soleil & à la Terre, son mouvement horaire vû du Soleil, de 12' 44"3: on trouvera aussi par les Tables le mouvement horaire du Soleil vû de la Terre, de 2' 30" 3. Soit pris sur BN le point O, de manière que DO soit à ON, comme 12' $4.4^{\circ\prime}$ à 2' 30" 1, auquel cas DO représente le mouvement de Mercure à l'égard de la Terre vû du Soleil, & ON le mouvement de la Terre qui lui répond : dans le triangle DNO dont l'angle DNO a eté determine de 6d 59' 32, & le

384 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
1. pport des côtes DO. ON est connu, on trouver, l'angle
DO Vele 1 1 2, 1 2, et la n'upplement BOD qui metare
l'inclinaillem apparente de la route de Mercure par rapport à
l'ediptique, de 8 1 8 5 8 ; ajoutant à l'angle BOD 1 - 4,4'
qui memoient alors le complement de l'angle de l'ecliptique
avec le Méridien, on aura l'inclinaison de la route de Mercure par rapport au parallèle du Soleil, de 26d 3' que l'on
doit présérer à celle que l'on avoit trouvé par l'observation
immédiate, par les raisons qu'on a rapportées ci-dessus.

1 .. j.

L'inclinaison apparente de la route de Mercure à l'égard de l'écliptique étant connue de 8d 18' 58", & la distance SM de Mercure au centre du Soleil dans le temps de fon partize par le milieu de la route ayant eté determinee par l'observation, de od 9' 5", on aura sa latitude SN, de od 9' 10" 54" pour le temps de sa conjonction véritable, & la distance MN entre le milieu de sa route & le vrai lieu de sa conjonction, de od 1' 20" 7"; les réduisant en temps à raison de od 5' 55" 50" mouvement horaire apparent de Mercure sur le disque du Soleil, on aura oh 13'30" qu'il faut retrancher de 10h 55' 30", temps auquel Mercure a passé par le milieu de sa route, & on aura le temps de sa conjonction véritable le 5 Novembre 1743 à 10h 42' 0". du matin. Calculant pour ce temps le vrai lieu du Soleil, qui est le même que celui de Mercure, on aura le vrai lieu de la conjonction de cette Planète avec le Soleil en m 12d 37' 36".

Dans toutes ces recherches on n'a point eu égard à l'esset de la parallaxe de Mercure qui, suivant qu'on l'a remarqué, a dû faire anticiper ou retarder l'entrée & la sortie de Mercure suivant les dissérens lieux de la Terre d'où ses phases ont été observées, & qui a dû faire paroître cette Planète sur le disque du Soleil dans un lieu dissérent de celui où on l'auroit vûe du centre de la Terre, auquel on rapporte tous mouvemens des corps célestes; cependant comme cette llaxe, conque sont petite, peut insluer sur les élémens théore de Mercure, & qu'il est nécessaire d'en tenir

compte

compte pour determiner la différence des Méridiens entre les divers lieux où l'on a observé l'entrée de Mercure dans le disque du Soleil & sa sortie, nous donnerons ici une mé-

thode affez fimple pour en discerner les effets.

Soit TSD la parallaxe horizontale du Soleil que l'on Fig. 4. suppose de 12 secondes, M Mercure dont la distance MT à la Terre au temps de cette observation étoit à la distance ST de la Terre au Soleil, comme 67592 à 99032, on trouvera la parallaxe horizontale de Mercure TMD, de 17" 35"; prenant la différence entre l'angle TMD de 17" 35" & l'angle TSD de 12 fecondes, on aura l'angle MDS ou PDS de 5" 35" qui mesurent sur le disque du Soleil la distance PS entre le lieu S de Mercure vû du centre de la Terre, & son lieu P vû du point D de sa surface. Nous appellerons cette distance PS la différence entre la parallaxe horizontale de Mercure & du Soleil.

Soit présentement DC la route que Mercure a décrite Fig. 3. dans le Soleil par rapport au parallèle AB, SM étant à DCcomme 9' 5" à 26' 52", on aura l'angle CSD de 111452', & l'angle DCS de 34^d 4', dont retranchant l'angle SEDinclinaison de la route de Mercure à l'égard du parallèle du Soleil, qui a été trouvé de 26d 3', reste l'angle BSC ou l'arc BC de 8d 1'; l'ajoûtant à l'angle CSD de 111d 52', on aura l'angle BSD de 119d 53'. Ayant fait les angles ASF de 50d o' & BSL de 77d 11' égaux à l'inclination du vertical à l'égard du parallèle du Soleil, calculée ou observée dans le temps de l'entrée & de la sortie de Mercure, soient menez les rayons SF, SL qui représentent le vertical du Soleil dans ces deux observations : soient tirées du point D la tangente DH & la ligne ODG parallèle au vertical SFdans le temps de l'entrée de Mercure; soient aussi tirées du point C la tangente C1 & la ligne CK parallèle au vertical SL dans le temps de la sortie de Mercure.

Il est évident que Mercure vû du centre de la Terre au point D sur le bord du Soleil, paroîtra à Paris, par l'effet de la parallaxe, en quelqu'endroit de la ligne DG, comme

Mem. 1743.

. Ccc

386 Memoires de l'Academie Royale

Fig. 3.

en G chique da point D d'une quantite DG que l'en trouvera de 5" 28" en faisant, suivant la règle des parallaxes, comme le sinus total est au sinus du complément de la hauteur du Soleil sur l'horizon, qui ctoit alors de 11d 47; ainsi le sinus de 5 25, différence des parallaxes horizontales de Mercure & du Soleil, est à la dissérence cherchée.

Si donc l'on mène du point G la ligne GH parallèle à DG qui coupe au point H la tangente DH qui, à cause de l'extrême petitesse de l'arc DH qui n'est que de 3 ou 4 secondes, ne différe pas tentiblement du cercle, la ligne G/I metrera par rapport à DG, déterminé de 5" 28" la route de Mercure depuis le temps que cette Planète vûe du centre de la Terre étoit au point D jusqu'au temps qu'on l'a vûe à Paris sur le bord du Soleil au point H, que l'on trouvera par une sigure, de G'' de degré que Mercure parcourt en 1' 9", à raison de 5' 55" 50" par heure.

On trouvera de même que Mercure vû en C du centre de la Terre à fa fortie du disque du Soleil, doit par l'esset de la parallaxe paroître en quelqu'endroit de la ligne CK parallèle au vertical SL, comme en K, éloigné du point C d'une quantité CK de 5' 7", qui est mesurée par la dissérence des parallaxes qui répond à la hauteur du Soleil, qui

étoit alors de 23d 4'.

Si donc l'on mène du point K la ligne KI parallèle à DC, qui rencontre la tangente CI au point I, cette ligne mesurera par rapport à CK la route de Mercure, depuis le temps qu'il a paru à Paris sortir du disque du Soleil jusqu'au temps que cette Planète vûe du centre de la Terre a dû répondre au point C, que l'on trouvera par la figure, de 2 secondes que Mercure a parcourues en 20 secondes de temps.

On peut aussi trouver par un calcul très-facile le temps que l'entrée de Mercure ou sa sortie ont dû anticiper ou retarder à l'égard des mêmes phases vûes du centre de la Terre, car l'angle DES que la route de Mercure sait à l'égard du parallèle AB, étant connu de 26^d 3', & l'angle BOD ou BSF que ce parallèle sait avec le vertical SF, ayant été

déterminé de 121^d o', on aura l'angle *ODE* ou *DGH* de Fig. 3. 32^d 57'. L'angle *BSD* ou l'arc *BD* distance du point *B* au point *D* ou Mercure a paru entrer dans le Soleil, détermine par observation, est de 119^d 53; le retranchant de l'angle *BSP* qui est de 121^d o', on aura l'angle *ISD* ou *SDO* de 1^d -', qui, etant retranché de l'angle dre it *SDH*, donne l'angle *ODH* de 88^d 53, & son supplément *GDH* de 91^d 7'; on aura donc l'angle *DHG* de 55^d 56', & dans le triangle *DGH* dont les angles sont connus, & dont le c'té *DG* est de 5" 28"', on trouvera *GH* de 6" 38" que Mercure a parcourues en 1' 7", qui mesurent le temps dont l'entrée de Mercure dans le Soleil, observée à Paris, a dû retarder à l'égard de cette entrée vûe du centre de la Terre.

On déterminera de même le temps que la fortie de Mercure, observée à Paris, a dû anticiper sa fortie vûe du centre de la Terre, car l'angle SEX étant connu de 26^d 3′. & l'angle ESL de 77^d 1 1′, on aura l'angle SXE ou XCK de 76^d 46′. L'angle DCS a été déterminé par l'observation, de 34^d 4′, dont le complément 55^d 56′ mesure l'angle XCI ou CIK; le retranchant de l'angle XCK de 76^d 46′, on aura l'angle ICK de 20^d 50′, & dans le triangle ICK, dont ses angles CIK, ISK sont connus, & dont le côté CK a été déterminé de 5″ 7″, on trouvera KI de 2″ 10″ que Mercure a parcourues en 22 secondes de temps, qui mesurent l'anticipation de la sortie de Mercure, observée à Paris, à l'égard de cette sortie vûe du centre de la Terre.

Ayant ainsi déterminé le temps du retardement de l'entrée de Mercure dans le Soleil à Paris, & de son anticipation à sa sortie, on trouve que son immersion dans le disque du Soleil, vûe du centre de la Terre, est arrivée à 8h 39' 27", & le commencement de son émersion à 1h 10' 48", ce qui donne la durée de son immersion totale de 4h 31' 21", plus longue de 1' 29' que saivant l'observation saite à Paris, à peu près de la même quantité que M. Deliste l'a de terminée par sa méthode. Ajoûtant à 4h 31' 21", 3 minutes 56 secondes pour se temps que le diametre de Mercure a employé

Ccc ij

à entrer & à sortir, on aura 4h 35' 17" qui mesurent la durée entière du passage de Mercure vû du centre de la Terre, qui ne dissere que de 23 secondes de celui que s'on a marqué dans la Connoissance des Temps, où s'on n'a pas cu caurd à l'esset de la parallaxe, parce que s'on n'a pas jugé que la theorie de Mercure sut poutsee à une assez grande pré-

cision pour en devoir tenir compte.

Il est à remarquer que si l'on pouvoit s'assurer de pouvoir déterminer par le calcul la durée du passage de Mercure à 23 secondes près, comme il résulte de cette observation, on pourroit en déduire immédiatement la parallaxe du Soleil sans le secours d'aucunes correspondantes avec assez de précision; car la durée de l'immersion totale ayant été observée à Paris de 4h 29' 52", auxquelles il saut ajoûter 3' 56" pour l'entrée & la sortie du disque de Mercure, on aura 4h 33' 48" pour le temps que cette Planète a employé à passer devant le disque du Soleil, qui disserent de 1' 42" de celui que suivant le calcul, on auroit vû du centre de la Terre, ce qui donneroit la parallaxe horizontale du Soleil de 15 secondes, plus grande seulement de 3 secondes qu'on ne l'a déterminée par les dernières observations de l'opposition de Mars avec le Soleil.

Nous nous réservons de déterminer dans la suite l'esset de la parallaxe dans les dissérens lieux de la Terre où l'on aura observé le passage de Mercure devant le disque du Soleil, & il nous sussira de saire remarquer ici que la déclinaison du Soleil étant alors de 1 5 d 40' vers le midi, son bord méridional qui étoit à Paris le plus près de l'horizon, s'est trouvé le plus près du zénith dans tous les pays dont la latitude méridionale excède 15 d 40'; d'où il suit que la parallaxe qui nous a fait paroître Mercure plus éloigné du centre du Soleil qu'étant vû de la Terre, & qui avoit diminué la durée de son passage, doit y faire un esset contraire en approchant Mercure du centre du Soleil, & augmentant le temps de cette durée, de sorte que par la comparaison de nos observations avec celles qui auroient été saites dans ces pays-là.

DES SCIENCES.

on trouveroit encore une plus grande différence dans la durée du passage de Mercure, que celle que nous avons remarquée, ce qui fait voir qu'on peut déduire de pareilles obtervations la parallaxe horizontale du Solcil avec affez de

précision.

Il ne nous reste plus qu'à essayer de déterminer par le moyen de notre observation, la grandeur réelle de Mercure, nous employerons pour cet effet le temps que son disque a employé à fortir du Soleil que l'on a observé à Paris de 1' 58", ce qui, à raison de 6 minutes de degré par heure, donne 12 secondes de degré, qui, à cause de l'obliquité de sa route & du rapport de la distance de la Terre & de Mercure au Soleil, se réduisent à 6 secondes, à peu près de même qu'on l'a trouvé en 1736; d'où il réfulte que la grandeur réelle de son diamètre est à peu près égale à celui de la Lune.



TROISIEME ME'MOIRE

Renjement plufieurs O'ejerratiens für une maladie du Siphon lacrymal, dont les Auteurs n'ont point parlé.

Par M. PETIT.

A malidie dont il s'agit ici ett quelquerois la fuite de la Fiflule lacrymale & de la tumeur lacrymale qui n'est point sistule, mais elle est encore plus souvent causée par la rougeole & par la petite vérole. Dans la sissule lacrymale la longue branche du siphon est bouchée, le sac lacrymal est percé, ses points lacrymaux sont ouverts & ses larmes tombent sur la joue; dans la tumeur lacrymale qui n'est point sistule, les points lacrymaux sont ouverts, la longue branche du siphon est bouchée, & les sarmes ne pouvant passer dans le nez dilatent le sac nazal & forment une tumeur au grand angle de s'œil; quand les sarmes ont rempli cette tumeur, le surplus tombe sur la joue & produit le sarmoiement. La maladie dont il s'agit, est s'obstruction totale des conduits lacrymaux, en contaquence de laquelle les sarmes tombent continuellement sur la joue.

On voit que le fiphon lacrymal peut perdre ses sonctions, 1° Lorsque la longue branche de ce siphon est bouchée, comme il arrive à la tumeur & à la sistule lacrymales.

2° Lorsque cette longue branche se trouve percée à la hauteur de la petite, comme lorsqu'un abcès ou un ulcère la ronge, ou lorsqu'on a sait l'opération à la tumeur ou à la sistue lacrymale suivant la méthode de ceux qui percent le sac lacrymal & l'os unguis.

3" Enfin ce siphon sera privé de ses sonctions toutes les sois que les points & conduits lacrymaux, qui sont la courte branche, se trouveront bouchez, soit à la suite de la petite

vérole ou de quelqu'autre inflammation des paupières. C'est ce que j'ai annoncé dans mon second memoire, & ce qui sera le sujet de celui-ci.

Dans tous ces cas, le fiphon lacrymal privé de ses sonctions ne pouvant plus déposer les larmes dans le nez, il s'enfuit nécessairement un farmoiement continuel; c'est apparemment parce que cet accident, je veux dire le larmoiement, est commun à toutes ces maladies, que quelqu'un a pû tomber dans l'erreur de les croire & de les nommer toutes fissules lacrymales, quelques disserences d'ailleurs qu'il y ait entr'elles. Ces différences sont 1° que forsque la longue branche du siphon est bouchée, les larmes peuvent bien entrer dans les conduits lacrymaux par l'action des paupières, elles passent même dans le sac lacrymal & dans le canal nazal, jusqu'au lieu où se rencontre l'obstruction de cette longue branche du siphon; mais ne pouvant passer outre pour s'écouler dans le nez, elles s'amassent dans cet endroit, dilatent le sac & forment la tumeur lacrymale qui n'est point fistule, ainsi que je l'ai démontré plus haut dans le premier mémoire, dont cette maladie a fait le sujet. 2° Si l'on néglige cette tumeur elle fait du progrès, les larmes retenues s'accumulent de plus en plus, elles crèvent le sac, ou bien elles y causent inflammation. d'où s'ensuit un abcès qui le perce & sorme la vraie sistule simple ou compliquée, ce qui a donné lieu à mon second mémoire. Ces deux maladies, comme on le voit, différent entr'elles, mais toutes deux dissèrent d'une tumeur au grand angle de l'œil, qui fera le sujet de cette troisième partie.

Celle-ci est différente de la tumeur lacrymale qui n'est point sistule, parce qu'elle n'est point remplie de larmes; elle n'est point sistule, puisqu'elle n'est point ouverte, & quand même elle s'ouvriroit & deviendroit sistuleuse, elle ne seroit point nommée sistule lacrymale, parce que les points lacrymaux étant bouchez, les larmes ne pourroient point couler par son ouverture; car si les larmes dans les deux premières sont le principal désordre, elles ne doivent contribuer en rien, ni à la formation, ni aux accidens de

celle-ci, puisque les points lacrymaux étant bouchez, elles ne

penvent entrer dans le fiphon facrymal.

Quoique le passage des larmes soit interdit du côté du siphon, il se forme cependant dans ce même siphon une tumeur semblable en apparence à la tumeur qui n'est point sistule; je dis semblable en apparence, parce qu'il s'en faut bien qu'elle soit la même. Premièrement elle n'est point formée par les larmes : en second lieu, si l'on presse la tumeur lacrymale qui n'est point sistule, elle se vuide dans s'œil par les points lacrymaux, & il n'en sort que des larmes ou quelquesois un peu de pus; au lieu que si l'on presse la tumeur dont il s'agit ici, quelquesois elle ne se vuide point quand les deux ouvertures du siphon sont bouchées, & si elle se vuide, c'est dans se nez, mais il n'en sort pour l'ordinaire que du pus, ou du moins une matière puriserme.

La première fois que je vis cette espèce particulière de maladie, je la pris d'abord pour la tumeur lacrymale, mais l'ayant en vain comprimée pour la vuider, je suspendis mon jugement; comme cette tumeur étoit non seulement dou-loureuse & enslammée, mais que j'y sentois de la sluctuation, je pensois d'abord qu'elle pouvoit être un abcès, je ne voulus cependant rien décider sans avoir auparavant interrogé la

malade.

Elle m'apprit que cette tumeur étoit venue à la fuite de la petite vérole qu'elle avoit eue il y avoit douze ans, qu'elle avoit été précédée d'un larmoiement confidérable, & qu'elle n'avoit paru qu'un peu avant l'entier desséchement des pustules. Tous les remèdes qu'on avoit employez pour rétablir le cours des larmes, avoient été inutiles, aussi-bien que le bandage compressif dont elle avoit fait usage dès le commencement; ce bandage avoit causé de si vives douleurs qu'elle avoit été obligée de le quitter : quelque temps après elle sentit un écoulement par la narine du côté de l'œil malade, & la matière qui en sortoit, étoit du pus. La tumeur qui s'étoit vuidée par cette narine, s'étant remplie peu à peu, reparut le lendemain aussi grosse qu'auparavant, alors sa malade comprima

comprima sa tumeur, elle la vuida par la narine, & depuis douze ans qu'elle faisoit la même manœuvre deux ou trois fois par jour, elle en tiroit constamment, à chaque compresfion, de la matière semblable à celle qui s'étoit échappée la première fois, avec cette différence seulement qu'elle n'étoit ni si épaisse ni si formée; cela venoit sans doute de ce que la malade la comprimant si souvent, ne lui donnoit pas le temps de séjourner & de s'épaissir. Sur ces premières connoissances je jugeai que cette maladie étoit une suppuration dans tout l'intérieur du fiphon lacrymal, & que si elle ne se vuidoit que par le nez, c'est parce que les points lacrymaux étoient bouchez : cette suppuration est bien dissérente de celle qui fort quelquefois de la tumeur lacrymale conjointement avec les larmes; le pus & les larmes coulent ensemble du côté de l'œil par les ouvertures des conduits lacrymaux, au lieu que dans l'autre, ce qui s'évacue par le nez, n'est que du pus sans aucune goutte de larmes. Tel sut le jugement que je portai fur cette maladie.

Je pensois donc que le pus qui s'écouloit, pouvoit avoir fon fiége dans le fac nazal, mais on m'objectoit qu'un abcès formé aux environs du fac auroit pû également se vuider par le nez, en suivant la gouttière offeuse dans laquelle ce fac est logé: on disoit de plus que les points lacrymaux se trouvant bouchez, il ne paroiffoit pas que le fac feul pût fournir toute la matière que rendoit cette tumeur à chaque fois qu'on la pressoit. Tout cela pouvoit être, mais comme cela ne changeoit en rien l'indication curative, les moyens de guérir la maladie étant les mêmes, je persistai dans ma façon de penser, d'autant mieux que je trouvois beaucoup de facilité à expliquer la formation de cette tumeur, sans sortir de mon sentiment, & en suivant toûjours la méchanique du fiphon lacrymal, sur laquelle j'ai fondé tout ce que j'ai dit de ces maladies & des opérations que j'y ai faites; j'étois donc non seulement convaincu que le sac lacrymal étoit le véritable siège de la maladie, mais je concevois encore la manière

dont elle avoit pû s'y former.

Mem. 1743.

La malade dans sa petite vérole avoit été plusieurs jours sans pouvoir ni ouvrir les yeux ni se-moucher, tant elle avoit de grains aux paupières & au nez; l'inflammation qui survint au canal nazal & aux points lacrymaux, causa l'adhérence de leurs orifices, ce qu'il y avoit alors de larmes dans le siphon, s'étoit trouvé ensermé sans pouvoir se faire jour ni du côté de l'œil ni du côté du nez; les larmes ainsi retenues comme dans une prison, s'étoient aigries, avoient irrité la partie, & y avoient causé une inflammation qui s'étoit soûtenue pendant tout le temps de la suppuration de la petite vérole; le sac étant enslammé, avoit suppuré luimême, & la matière contenue dans la cavité avoit occasionné la tumeur; cette tumeur avoit subsissé long-temps sans se vuider ni du côté de l'œil ni du côté du nez, parce que les ouvertures du siphon lacrymal étoient absolument bouchées.

Si tout ce que je viens de dire ne prouve pas suffisamment que le pus étoit renfermé dans le fiphon lacrymal, du moins j'espère que ce qui suit ne laissera aucun doute sur cet article. Cette tumeur ayant cessé de couler pendant quelque temps, s'etoit remplie peu à peu, & etoit devenue aussi grosse qu'elle l'avoit été dans le commencement; quelque temps après survint inflammation avec douleur, à quoi on remedia par quelques saignées & un cataplasme de pommes cuites, dont le fuccès fut tel que la malade se crut guerie, d'autant mieux que sa tumeur avoit disparu, & qu'il n'étoit rien sorti par le nez; mais ce qui la trompoit, c'est que la matière avoit changé de route, car au lieu de se vuider dans le nez par le canal nazal, elle s'étoit fait jour par le point lacrymal inférieur; l'aurois bien voulu pouvoir déboucher l'autre point lacrymal, afin de mettre les choses dans un état à pouvoir nous promettre un heureux succès de l'opération, mais toutes les tentatives que je fis, furent inutiles; ne pouvant y introduire la sonde lacrymale, je me contentai d'injecter celui qui étoit ouvert : enfin, dès que le grand angle & ses environs surent dégonflez, je sis l'ouverture du sac, & je passai la bougie dans le canal nazal de la maniere que je l'ai dit. Je ne crois

pas qu'on puisse douter maintenant que le siphon lacrymal ne sût le siège de la matière purulente qui formoit la tumeur; il me reste donc à saire remarquer que la guérison compléte de cette maladie, soin d'être une chose facile, n'est pas même toûjours possible, car il ne sussit pas de détruire la tumeur, de tarir la suppuration & de consolider l'ulcère, il saut encore éviter le larmoiement, & c'est ce que je n'aurois pû saire sans doute, si les points lacrymaux (ou l'un des deux au moins) n'eussent été ouverts; car s'ils sont bouchez tous deux, & qu'on ne puisse pas les déboucher par les moyens que j'ai proposez, on guérira bien à la vérité la tumeur, mais il est constant que les malades auront l'œil lar-

moyant toute leur vie, c'est ce que l'on va voir.

Un jeune homme de vingt ans, pendant la petite vérole qu'il avoit eue à l'âge de quatorze, avoit été vingt jours sans pouvoir ouvrir l'œil droit; il avoit eu la narine du même coté sèche, enflammée & pleine de croutes pendant un mois: après la guérison de la petite vérole, il lui resta au grand angle de l'œil une tumeur de la grosseur d'une aveline, laquelle, quoiqu'on la pressat, ne se vuidoit ni par l'œil, ni par le nez : dans les fix premiers mois cette tumeur s'enflammoit de temps à autre, & l'on avoit recours aux cataplasmes anodins qui diffipoient l'inflammation fans diminuer la tumeur, parce que celle-ci ne se vuidant pas, se maintenoit toûjours dans le même état; elle ne devenoit douloureuse que lorsqu'elle s'enflammoit, & cette inflummation étoit quelquefois plus ou moins considérable. Un jour entrautres qu'elle occupoit les deux paupières, le nez & une partie du front, on crut qu'il se formoit abcès, & qu'il pourroit y avoir quelque changement avantageux, mais l'inflammation se dissipa sans qu'il parût se faire une évacuation sensible, & conséquemment sans que la tumeur diminuât : enfin le malade ennuyé de son mal, consulta plusieurs habiles gens, il se servit du bandage lacrymal que quelqu'un fui conseilla; ce bandage lui causa beaucoup de douleur, & l'inflammation étant survenue il fut oblige de le quitter jufqu'a ce qu'elle fut patlee:

alors il s'en servit pendant un mois avec moins d'incommodité, mais il sut encore contraint d'y renoncer à cause de l'inflammation qui cette sois sut plus considérable qu'à l'ordinaire; celle-ci n'étoit point dans la tumeur même, elle étoit au dehors immédiatement sous la peau dans le corps graitseux, aussi ne se termina-t-elle pas comme les autres, elle suppura, la matière perça la peau & se sit jour au dehors.

Le malade se servit quelque temps d'emplâtres que lui donnoient des ames charitables qui crurent l'avoir guéri, parce que pendant cinq ou fix jours l'enflure extraordinaire avoit disparu, & l'ouverture que le pus avoit faite, s'étoit entièrement fermée; mais si l'abcès qu'avoit formé cette nouvelle tumeur étoit guéri, loin que la première tumeur le fût, elle étoit au contraire augmentée, & cette augmentation pouvoit bien avoir pour cause le gonslement des membranes du fac, occasionné par l'inflammation & la suppuration qui s'étoient faites à la circonférence de ce sac, elle étoit accompagnée des mêmes symptômes qu'auparavant. On recommença l'usage du bandage compressif, il sut encore inutile, on ne put jamais déterminer la matière à passer d'un côté ni d'un autre: le malade qui jusque-là n'avoit voulu suivre aucun de mes conseils, se mit enfin entre mes mains, bien résolu de faire tout ce que je sui prescrirois.

J'étois bien convaincu qu'il ne pouvoit guérir complétement, je veux dire, sans qu'il lui restat un larmoiement toute sa vie, parce que les points lacrymaux étoient oblitérez au point de ne pouvoir être débouchez ni par la sonde ni par les injections; mais du moins falloit-il le délivrer de cette tumeur, qui, outre qu'elle le rendoit difforme & lui causoit de temps en temps des inflammations, pouvoit encore lui attirer quelque dépôt capable de carier les os, & produire un ulcère dissicile à consolider. J'ouvris donc cette tumeur, la matière qui en sortoit, étoit épaisse, recuite, mais sans mauvaise odeur, les parois de cette cavité étoient garnies de chairs rouges, moltasses, sans douleur, & semblables à des chairs bayeuses qui se forment sur la surface de tous les

ulcères simples quand on néglige de consommer les chairs.

La plaie fut pansée à l'ordinaire & guérit en peu de jours. mais il resta au malade, comme je l'avois prévû, le larmoiement, ce qui ne pouvoit arriver autrement, puisque les points lacrymaux étoient bouchez, & qu'il m'avoit été impossible de les déboucher, comme je l'ai fait remarquer; mais, toutes les fois qu'il y a seulement un de ces points ouvert. on peut guérir cette maladie & le larmoiement tout ensemble, parce qu'il est toûjours ou presque toûjours possible de déboucher le conduit nazal, en paffant la sonde par le fac lacrymal, & en suivant la gouttière qui le conduit dans le nez.

Sur cette observation l'on peut en faire une autre, c'est qu'il est étonnant que la matière de cette tumeur ait resté un temps si considérable sans se faire jour elle-même par la pourriture; mais on ne trouvera rien de surprenant dans ce fait quand on aura fait réflexion que la matière contenue n'étoit point acre, puisque la tumeur n'étoit point douloureuse, si ce n'est dans des temps fort éloignez les uns des autres, où cette matière en s'échauffant, devenoit piquante, & excitoit quelqu'inflammation passagère, ce qui même n'est arrivé que quatre ou cinq fois pendant le cours de fix années que la maladie a duré. On ne s'étonnera pas, dis-je, de ce fait, quand on aura encore observé que dans bien d'autres cas on voit des matières épanchées rester des temps bien plus confidérables sans s'échauffer ni fermenter, ne sût-ce que dans les hydrocèles, les ganglions arthritiques & autres qui contiennent un fluide qui n'a aucune communication avec l'air extérieur; car lorsque l'air y peut communiquer, le liquide renfermé ne tarde pas à s'altérer, il fermente, cause douleur. inflammation, suppuration, & quelquefois pourriture, comme on l'a pû voir dans la première observation.

J'ai vû une Dame qui nous en fournit encore une preuve: après une inflammation qu'elle eut sur l'œil droit, accompagnée d'un farmoiement abondant, il lui resta au grand angle une semblable tumeur qui ne se vuidoit ni par le nez,

Ddd iii

398 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE ni par l'œil, & qui pendant plus de huit mois demeura toûjours en même état, sans augmenter ni diminuer, & sans causer aucune douleur. Un jour que cette dame se trouvoit enchitrence & ga'elle se mouchoit souvent avec sorce, elle fentit tout-à-coup dans sa tumeur une douleur si vive, qu'il lui sembla que l'air y avoit passé; en esset, sa tumeur en devint plus grosse, plus tendue, & en six heures de temps il survint avec inflammation une si grande douleur, que la fièvre qui s'y joignit, me fit craindre la pourriture. Les faignees copieules, l'application des cataplalmes, & fur-tout une évacuation de pus qui se fit par le nez appaisèrent entièrement la douleur; en pressant la tumeur pour achever de la vuider, je fentis une espèce de gargouillement semblable à celui que produitent ordinairement l'air & l'eau mèlez ensemble : comme la malade ne soutiroit plus, ou du moias très-peu, elle ne voulut plus rien faire; j'étois cependant d'avis de lui faire l'operation, mais elle s'y opposa, difant que puilque le pas s'ecouloit, elle espéroit guérir sans opération; elle n'eut pas lieu de penser de même le lendemain, sa tumeur s'étoit remplie de nouveau, & elle n'osoit la presser ni se moucher de peur de renouveller les accidens. Y avant été minde je prestaj la tumeur, & je n'en sis presque sortir que de l'air, le peu de fluide qui s'échappa avec l'air, étoit une matière parfirme plus feetide que ce qui en ctoit forti la première fois.

Le même jour la tumeur s'étant remplie, fut aussi pressée par la malade, & il n'en sortit que de l'air; quatre heures après la trouvant encore pleine je la pressai, & il s'en celiappa de même beaucoup d'air avec très-peu de pus; je proposai de ches s'opération à la malade qui s'obstina toujours à la resuser: comme je la voyois de temps en temps je sui contaitai le banda e lacrymat, dans le dessein de rapprocher les parois du sac pour les consolider; elle consentit a s'en servir, mais ce sut sans succès, parce qu'elle ne vouloit le porter

que la nuit.

Ensin s'étant livrée à toutes sortes de remèdes de Char-

DES SCIENCES.

latans & d'Empiriques, toújours sans succès, & voyant d'ailleurs que sa maladie nuisoit à sa beauté, elle consentit à s'opération; je la lui sis de la manière que j'ai décrite, & la reussite sut telle que je l'avois espérée, au larmoiement près, auquel il est impossible de remedier quand on ne peut déboucher les conduits lacrymaux; de sorte que si les operations que l'on fait aux sistules & aux tumeurs lacrymales, tendent toutes à conserver le siphon lacrymal en son entier, celles que l'on pratique à la tumeur que je viens de traiter, doivent tendre au contraire à essacr si bien tout le siphon lacrymal, que les deux branches & le sac qui les joint, n'aient aucune cavité, & que les parois ou les chairs qu'ils renserment, soient si bien consolidées que le siphon soit nul.



OBSERVATIONS METEOROLOGICULS

FAITES A L'OBSERVATOIRE ROYAL

PENDANT L'ANNEE M. DCCXLIII.

Par M. MARALDI.

Observations sur la quantité de la Pluie.

N Janvier o 5 ½	En Juillet I 7 1/6
Février I I 1 3	Août I $5\frac{1}{3}$
Mars 1 4	Septembre o 1
Avril $\mathbf{I} = 9\frac{\mathbf{I}}{3}$	Octobre I $5\frac{r}{3}$
Mai 1 $1 \frac{5}{6}$	Novembre I $1\frac{1}{2}$
Juin I $o_{\frac{1}{6}}$	Décembre o $7\frac{\$}{6}$
6 10 6	6 4 6

La hauteur de la pluie tombée à l'Obiervatoire pendant l'année 1743, a été de 13 pouces 2 lignes $\frac{1}{3}$, ce qui marque une année rèche; la pluie tombée pendant les fix premiers mois de l'année, a été de 6P 10 $\frac{1}{6}$, & celle qui est tombée pendant les fix derniers mois, a été de 6P $\frac{4}{6}$.

Observations sur le Baromètre à 6 heures du matin.

2 133 2 12 rote into cut the interest cut and the Datometer,									
Just Jour. light									
Janvier 2 2 28									
1)	compactly.							
Mars 4 28	3 1	grand brouillard. ferein, nord-est grand.							
Avril 11 28	2	ferein, nord-ell foible.							
M.i 21 28	5	ferein, nord.							
Juin 12 28	3.								

is meande hauteur du mercure dans le Baromètre

Moindre ha	uteur	du me	reure dans le Baromètre.
Jours.	pouc.	lign.	
Janvier 13	27	10	couvert, sud-ouest.
Fes. i 6	2,7	1 1	rie, El-olmi
Mars {24	27 27	フュco フュco	ouvert, sud-ouest médiocr. uvert, nord-ouest médioc.
Avril 3	27	6 5	serein, ouest.
Mai 27	27	9 1	ferein, calme.
Juin 14	27	.01	

Juillet.

Plus grande hauteur du mercure dans le Baroinètre.	Moindre hauteur du mercure dans le Baremètres
Juillet 2 28 2 ½ ferein, calme.	Juillet 18 27 6 couvert, sud-ouest grand.
Août 13 28 4 serein, nord-est très-soible.	Août 17 27 11 1 pluie, ouest médiocre.
Septembre. 30 28 4 3.	Septembre. 17 28 0.
Octobre 1 28 4.	Octobre 29 27 9 1.
Nevembre. 21 28 4 ? grand brouillard épais.	Novembre. 3,27 10 presque fersin, calme.
December \$\frac{12}{23}\$ 28 7 grand brotallard epsis.	Decembre. 30 27 7 Quivert, oueft.

La plus grande hauteur du Baromètre a été de 28P 7¹ le 2 & le 21 de Janvier, le 12 & le 23 de Décembre par de grands brouillards; & la moindre hauteur a été de 27P 6¹ ¼ le 18 de Juillet par un temps couvert & un grand vent de sud-ouest.

Observations sur le Thermomètre.

Plus grande hauteur de la liqueur dans les Thermomètres, à 6 heures du matin.

Mois & Jours,	Ancien Thermomètre.	l'hermomètre de M. de Reaumur, à côte de l'ancien.	Thermomètre de M. de Reaumur, expote en dehors de la tour, au nord.				
	D	In	Denis.				
Janvier 14	41	1007	+ 6 couvert, sud-ouest grand.				
Février 16	45	1000 1	+ 9 couvert, sud-ouest grand.				
Mars 13	٠٠٠ إ ٥٠٠٠	1307	+ 6 pluvieux, sud-ouest foible				
Avril 25	46	1000	+ 9 ferein, nord-est foible.				
Mai 31	54	1013 [+ 12 \frac{7}{2} couvert, sud-ouest foible.				
Juin 17							
në në jour à 3 ^h après midi	74 3	1024,	+ 26 ferein, nord-est médiocre.				
Juillet 31	59	1016	+ 16 ferein, nord-est foible.				
même jour à 3 h après midi.	· · · 73 - · · ·	1024	+ 26.				
Août 1	62	1018	+ 17½ couvert, ouest.				
Août à 3h après midi. 15	74	1024 5	+ 24 1 ferein, calme.				
Septembre 11	59 =	1016 1	+ 164.				
Octobre	51 1	1011 1	· + 1 `.				
Novembre 1	52	1012 1	+ 11 fud-ouelt, médiocre.				
			-+ 5 ½ pluvieux, sud-ouest.				

Moindre hauteur de la liqueur dans les Thermomètres, à 6 heures du matin.

Meis & Jean.	Ancien Thermometre.	I hermomètre de M. de Rezomor, a côte de l'ancien.	Thermometre de M. de Bessomer, expete en deliors de la teur, 4a nord.
Février. ‡ Mars. ‡ Avril. 14 Mai. 5 Juin. 28 Juillet. 17	28 30 31 45 50 47	1000 ½ 1000 ½ 1000 ½ 1008 1011 ½ 1011	+ 10 \(\frac{2}{3}\) couvert, sud-oueth soible. + 11 ferein, sud-oueth médiocre. + 9.
Novembre 21	\cdots $31\frac{1}{2}\cdots$	1002	o ½ grand brouillard épais. 2 ½ grand brouillard.

On voit par ces observations que la plus grande chaleur de l'année 1743 est arrivée le 17 de Juin que la liqueur de l'ancien thermomètre est montée à 3 heures après midi à 74^d ²/₃, & celle du thermomètre de M. de Reaumur, exposé au nord, à 26^d; la liqueur de ce dernier thermomètre est montée au même degré le 31 Juillet. Le plus grand froid est arrivé le 7 de Janvier que la liqueur de l'ancien thermomètre est descendue à 22^d, & celle du thermomètre de M. de Reaumur à 5^d ¹/₂ au dessous de la congélation.

Déclinaison de l'Aiguille aimantée.

J'ai obsetvé plusieurs sois pendant l'année 1743, la déclinaison de l'aiguille aimantée de 4 pouces, de 15^d 10'.



SUR UNE CONJONCTION DE LA LUNE

A L'ETOILE T DU SAGITTAIRE,

Avec des Recherches sur la plus grande inclinaison de l'Orbite au plan de l'Écliptique, & sur la plus grande Latitude de la Lune.

Par M. LE MONNIER Fils.

Es circonstances particulières à ces observations méritent ; A de d'être rapportées, puisqu'il y a lieu de croire qu'elles font des plus avantageuses pour perfectionner la théorie des mouvemens de la Lune. L'étoile \u03c4 du Sagittaire ne devoit être éloignée au temps de la conjonction que d'une ou deux minutes du centre de la Lune, & comme la Lune ctoit pour fors Apogée, on s'étoit propose depuis long temps d'observer l'immersion & l'émersion de cette étoile du disque de la Lune. Cependant le temps ne l'ayant pas permis, j'ai eu du moins l'avantage d'observer au méridien les passages de la Lune & de l'Étoile pendant un intervalle assez favorable, le ciel étant tout d'un coup devenu serein; ce qui donne ¿galement bien la longitude & la lititude de la Lune que si l'on eût observé l'occultation. Selon les élémens que j'ai tirez de la théorie de M. Newton, cette conjonction a dû se faire à 10h 37' 30", la Lune étant au % 11d 16' 10", avec une latitude australe de 4d 10' 25"; dans ce calcul j'avois dejà rectific le lieu de l'étoile, laquelle, selon mes observations se trouvoit le 26 Septembre 1741, en % 11d 13' 55"=, c'est-à-dire, de deux tiers de minute plus avancce que sélen le Catalogue de Hamfleed: d'ailleurs fai en égard à faberration en longitude, & j'ai suppose 6 o' pour la reduction du lieu de la Lune au plan de l'écliptique.

Lee ij

A 8h 55' 15" de temps vrai, la distance de l'étoile au centre de la Lune étoit 48', & l'étoile pour lors dans la ligne qui passe par le mont Corax ou Proclus, & par le bord septentrional du mont Ætna; d'où il a dú s'ensuivre que cette ligne coupoit la circonférence du disque lunaire vers 307 degrés ½ de la Table générale des phases, publiée par Hévélius. J'ai mesuré aussi plusieurs fois le diamètre apparent de la Lune, & ayant égard à l'accourcitéement causé par la dissérence des réfractions, je l'ai établi de 29' 50"; ce diamètre est un peu plus grand que selon les Tables de Flamsteed sondées sur la théorie de M. Newton, ce qui indique assez que cette théorie de la Lune n'est pas encore aussi avancée qu'on pourroit se l'imaginer.

A 9^h 57′ 55″ ½, le premier bord de la Lune a passé au méridien, & a précédé l'étoile τ du Sagittaire de 0^h 3′ 02″, ce qui donne pour dissérence en ascension droite entre le bord précédent de la Lune & l'étoile, 0^d 45′ 40″. La hauteur apparente du bord inscrieur étoit alors 12^d 54′ 40″, & sa dissérence en déclinaison avec l'étoile étoit de 16′ 10″, dont l'étoile paroitsoit plus haute. Ensin l'ascension droite apparente de l'étoile étoit alors 282 ½ 43′ 10°, & la réfraction

de 4' ou 3' 55".

A 10h 15' o" l'étoile m'a paru encore fort éloignée du

disque de la Lune: ensuite nuages.

A 12h 41' 7" ½ le ciel s'étant éclairci, j'ai mesuré la distance apparente de l'étoile au bord éclairé, de 18' 42"½, d'où j'ai conclu sa vraie distance au centre, de 33' 50"½; car il faut observer que le diamètre de la Lune étoit déjà accourci de 20" par les réfractions, & l'étoile plus basse.

Il ne refle plus pour calculer cette observation que de saire un meilleur choix de parallaxe qu'il n'a été pratiqué jusqu'iei, re qui paroitroit d'abord affez sacile si les mêmes jours auxquels la Lune a paru dans ses plus grandes latitudes australes & boréales, son diamètre avoit été soigneusement observé, mais ayant voulu saire usage de cette methode, je crouve (& cela principalement par des observations saites en s'année

405

1730 au temps des quadratures) que les plus grandes latitudes de la Lune, & par consequent la plus grande inclinaison de son orbite n'est pas toûjours constante, le nœud étant chaque fois dans la ligne des syzygies. Le filence général de tous les Astronomes à ce sujet doit d'autant moins nous surprendre, qu'ayant confulté l'hittoire des observations, il n'est pas facile de reconnoître les erreurs des instrumens dont on s'est servi, & qui n'ont pas été assez vérifiez au zénit & à l'horizon; d'ailleurs, à l'exception de M. Halley qui propose dans son catalogue des Litoiles diverses méthode, pour découvrir la parallaxe de la Lune, je ne vois pas que d'autres Astronomes aient fait usage depuis Copernic & Tycho de la méthode des latitudes auftrales & boréales pour découvrir la parallaxe de la Lune, conformément à ce qui a été pratiqué autrefois par Ptolémée, & qu'on trouve au chapitre 12 du 5 me livre de son Almageste. Il y a plus, en prenant les distances de la I une aux Etoiles fixes, comme le propose M. Halley, il est bien plus difficile de déterminer les latitudes apparentes de la Lune, que par les observations faites au méridien; on peut donc conclurre de là qu'il n'a guère été possible jusqu'à present de reconnoître, en recherchant la quantité de la parallaxe, si les plus grandes inclinaitons possibles de l'orbite de la Lune au plan de l'écliptique ont été constantes, & qu'enfin on a mieux aimé les supposer telles, toutes les fois que la Lune étant en quadrature, la ligne de ses nœuds patsoit par le Soleil. C'est néanmoins cette inégalité, que je trouve d'environ une minute dans les plus grandes latitudes possibles de la Lune. qui m'a empêché jusqu'ici de fixer le rapport du diamètre de la Lune à sa parallaxe horizontale; de manière que je ne scaurois affurer s'il faut absolument diminuer d'environ une demi-minute la parallaxe horizontale de la Lune que M. Newton a déjà fait dans l'Astronomie de Gregori & dans le livre des Principes, d'un foixantième plus petite que ce qui en a été communiqué en même temps à l'Académie * par feu M. Cassini. Les Tables des Parallaxes de Mrs de la Hire & /. Tlamfleed repondent un peu mieux aux observations. Au refle Au ang

406 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE puisque l'inclinaison de l'orbite de la Lune au plan de l'écliptique est variable, comme il paroît par les observations du mois de Juillet de l'année 1739, le moyen le plus simple de découvrir cette inclinaison & la parallaxe, seroit d'observer la Lune en 1744 & les deux années suivantes, proche l'un ou l'autre Tropique, c'est-à-dire, dans quelque lieu où cet astre se trouvant dans sa plus grande latitude, paroîtroit en même temps au zénit. Mais il seroit peut-être aussi avantageux, & même plus facile d'observer les plus grandes latitudes australes & boréales de part & d'autre de l'équateur, ce qui se pourroit pratiquer, par exemple, à Paris & dans l'Isle de Bourbon, puisqu'on auroit tout d'un coup la somme des parallaxes; au lieu que par des observations saites en Europe dans un même lieu, nous ne pouvons conclurre (des Observations de la Lune faites au méridien au temps de ses plus grandes latitudes) la parallaxe de cet astre, que par des différences. Ces deux méthodes que je propose n'exigent pas, comme l'on voit, un correspondant sous le même méridien, foit de Paris, fe it de quel ju autre obtervatoire de l'Europe, où l'on projeteroit de conclurre immédiatement les paraflaxes par les déclinaisons de la Lune comparée à une même étoile; cette opération qu'on a proposée plusieurs sois a été tentée en effet il y a environ 40 ans, mais d'une manière trop imparfaite, les deux observateurs correspondans étant situez l'un à Berlin & l'autre au Cap de Bonne-Espérance.





MESSIEURS DE LA SOCIETE

Royale des Sciences établie à Montpellier, ont envoyé à l'Académie l'Ouvrage qui fuit, pour entretenir l'union intime qui doit être entre elles, comme ne faifant qu'un feul Corps, aux termes des Statuts accordez par le Roi au mois de Février 1706.

MEMOIRE

SUR DIFFE'RENTES PETRIFICATIONS
TIREES DES ANIMAUX ET DES VEGETAUX.

Par M. l'Abbé DE SAUVAGES.

N voit auprès d'Alais une veine de terre qui s'étend à plusieurs lieues, toûjours d'un même grain de gravier & d'ochre, qui n'est point interrompue quoique coupée par des ruisseaux, des rivières & des collines; cette veine qui forme une espèce de chaîne ou de bande, a sa direction du midi au nord, elle semble avoir coupé & séparé les terres qui sont à ses côtés, dont les unes sont franches, fortes & argilleuses, d'autres tal peuses, sablonneuse et le contondent point, & elles sont aissées à distinguer. La bande du milieu qui sait l'objet de cette remarque préliminaire, & dans laquelle j'ai trouvé les pétrisications dont je vais parler, est fertile en toutes sortes de productions du règne lapidaire,

dont la Nature semble avoir sait dans cet endroit un riche magafin; celles que j'ai obfervées en grand nombre peuvent en faire soupçonner d'autres, & fortifier cette opinion, sçavoir, que les minéraux & les fossiles vont tous de compagnie & se trouvent communément dans les mêmes espèces de terres. Sans parcourir un long espace de celle que j'ai marquée, i'v trouvai différentes glébes ou minerais d'argent, de cuivre, de fer, de plomb, d'alquiloux, d'antimoine & de minginese: on m'a affuré qu'il y en avoit aussi de zinck, de mercure, & même d'or dont on voit des pullettes dans le lable du Gardon. Je n'ai point de peine à croire qu'il n'y ait de tous les autres métaux, mais à leur défaut nous y trouverons encore beaucoup de mines de charbon de terre, de la mine de soufre, des marcassites de vitriol & d'alun, des fontaines minérales qui luivent les différentes proprietes des fels, des toufres & des bitumes par où elles patient, enfin des ochres, des bols de differentes couleurs, du tripoli & diverles pétrifications; cette veine de terre passe dans la même direction * au Mas-Dieu, à Porte, à Chamberiguaut, on dit même à Villefort, & peut-être plus loin, mais je ne l'y ai point suivie, & j'ignore les différentes branches qu'elle peut donner.

Ce seroit sans doute un affez vaste champ à des découvertes aussi utiles que curieuses, & qui pourroient remplir pluticurs Memoires; je me borne dans celai ci aux petriscations qui seront de deux sortes, les unes des coquillages, les autres des plantes, je m'arrêterai à ce qu'il y a de plus remarqual le dans chacune en melant quelques observations

dans les descriptions que je donnerai.

Observations sur wie nous elle espèce de coquillage pierreux.

Je trouvai sur le sommet d'une montagne plusieurs pétrifications de différens coquillages de mei qui paroissent être

^{*} Notre veine de terre a cela de remarquable qu'elle abonde fur-tout en d'atre, es places d'est le la latent de cre d'action, f en l'observoit dans les autres mines de ser, ne pourroit-elle pas servir à expliquer celle de l'aimant.

409

Jes mêmes, à peu de chose près, que ceux de nos côtes, & de ce nombre sont des ottracites, des musculites & des coclites de toute grandeur. Une autre montagne voifine, mais plus élevée, en porte d'autres qui sont parfaitement étrangers: ces derniers sont des cornes d'ammon ou nautiles applatis, qui ont depuis un pouce jusqu'à dix de diamètre, de grosses belemnites, autrement dactyles, des entroques que quelquesuns prennent pour la pétrification d'un ver, d'autres pour celle de la vertèbre d'un reptile, mais qui étant vûe de près ne paroît être ni l'un ni l'autre: il y a enfin un coquillage pierreux que je crois unique, & qui n'est décrit, que je sçache, par aucun Naturaliste; c'est par cet endroit & par sa sorme fingulière que j'ai cru devoir m'y arrêter & le faire connoître: on le trouve rarement dans son véritable état, & à en juger par la forme sous laquelle il paroît ordinairement, on le prendroit, comme les aetites, les priapolites & autres, pour un jeu de la Nature, ou plûtôt pour un fossile dont on ne sçait ni la destination ni l'usage.

On ne voit pas en effet qu'il ait pû fervir à loger un poisson, ni qu'on puisse le rapporter à aucun genre de coquillage connu; si cependant on veut deviner, comme je l'essayai d'abord, on prend facilement le change & on s'égare dans des systèmes chimériques sondez sur de simples apparences; celles de ce coquillage sont sort trompeuses, il paroît entier & bien terminé par-tout, cependant il n'est pas assez creux pour être un univalve & pouvoir retenir dans sa marche le corps de l'animal, & ses bords ne sont pas taillez de saçon qu'on puisse le ranger parmi les bivalves; d'ailleurs on ne trouve ici aucune trace des dissérens accroissemens de la coquille, qui suivent ceux du poisson, c'est-à-dire, ces dissérentes couches qui vont en s'élargitsant de la base au sommet, accroissemens qu'on distingue si bien sur les coquillages ordinaires, qu'on pourroit par-là supputer l'àge de plusieurs.

Celui-ci a quelquesois au dehors une cannelure plus ou Fig. 1. moins prosonde qui s'étend de la base aux bords, cette base est ou toute massive, ou creuse & cristallisée en dedans, mais

. Fff

dans aucun cas l'animal ne peut l'occuper comme dans les autres, & on est porté à regarder cette partie comme un roids qui lai est fort à charge, ou pour le moins très-inutile; enfin ce que ce coquillage a de plus remarquable & qui le diffingue proprement de tous les autres, ce sont des espèces de rocttes qui tapissent le dedans & le dehors, & qui y sont tracées comme autant de tourbillons; chacun de ces tourbillons est compose de plusieurs cercles concentriques, quelquefois irréguliers, mais toujours paralleles & à des diftances à peu près égales l'un de l'autre; ces cercles qui relevent un peu sur la partie convexe & qui sont applatis dans la partie concave, sont formez par différentes lames couchées l'une sur l'autre, elles semblent s'être ouvertes vers le milieu pour faisser éclorre celle qui leur a succédé; quelques-uns n'ont pas pousse tous leurs cercles, quelquetois il n'y en a, pour ainsi dire, que les germes qui n'ont point encore percé; au furplus ces tourbillons ne gardent aucun ordre régle, souvent dans les petits coquillages ils sont plus grands & plus développez, & les grands & les petits occupent indifféremment ou la base ou les bords.

Je dirai en passant qu'on croiroit que cette montagne contient un grain de terre qui prend facilement cette figure de lignes circulaires, car entre plusieurs dactyles que j'y ai trouvez, j'en ai vû deux ou trois qui avoient chacun un ou

deux de ces tourbillons.

Parmi ces coquillages pierreux les uns sont entièrement détachez du rocher, d'autres y tiennent encore & y sont incorporez, tous sont d'un grain de terre différent du rocher qui est une pierre de chaux, ces sortes de pierres ne sont jamais assez dures pour donner du seu avec le susil, notre coquillage en donne abondamment comme les meilleures pierres à seu, c'est un véritable caillou qui a emprunté d'ailleurs sa nature, & dont la pétrification est probablement antérieure à celle du rocher dans lequel, ou dans le limon duquel il a été ensuite enveloppé.

Fig. 2. J'ai quelques-uns de ces coquillages percez & fillonnez

en tout sens comme par des veis; jaurois peine à me perfuader que ces vermoulures tutient leur ouvrage, puitque le coquillage est fi dur que la fime n'y mord que difficilement, à moins de dire qu'il fut un peu ramolli comme les coraux dans les eaux de la mer; je croirois plûtôt que l'animal qu'il contenoit, s'est trouvé embarrassé dès le commencement dans des broutilles qu'il aura enveloppées dans fa loge à mesure qu'il y ajoûtoit de nouvelles couches, ces broutilles se pourriffant ensuite auront laissé, en tombant, leurs places & leurs empreintes vuides; c'est à de pareils obstacles qu'on doit attribuer d'autres défectuosités qui se trouvent dans ces coquillages, les uns sont applatis, d'autres sont échancrez, sans qu'il paroitle qu'ils aient ete ebréchez ou écornez par quelque choc.

Ce que j'ai rapporté jusqu'ici du coquillage pierreux.

donne peu d'idée de ce qu'il est dans son état naturel, j'en ai vû un ou deux entre mille; dans cet état une partie en étoit depuis long temps exposée aux injures de l'air, & montroit ses tourbillons, l'autre étoit récemment dépouillée du rocher, & j'ai vû claitement dans celle ci que la coquille aux tourbillons n'étoit que le noyau ou la carcasse d'une autre qui est sous une autre forme; ce noyau est tapissé au dedans & au dehors d'une autre couche de différentes lames, grises, tendres & unies, ou plûtôt qui ne sont point figurées, les différens accroiffemens y font bien marquez; cette leconde couche s'élève une autre fois autant que le noyau, & va former les bords ou l'orifice de la coquille qui est mince & arrondie, ces bords sont facilement emportez, & on ne peut les voir conservez que lorsqu'ils tiennent encore au rocher, le reste de l'écaille extérieure qui couvre le noyau, s'enlève Torfqu'elle est exposee à la pluie & à l'air, & les tourbillons commencent à paroître.

J'ai conjecturé que l'orifice de la coquille est bouché par Fig. 3. un convercle plat & rond, au moins j'en ai trouvé de pireils

auprès du coquillage, figurez comme lui, & qui étoient dans le même morceau de rocher; ce couvercle, ti c'est celui du

Fff ii

coquillage, ne tient pas probablement à ses bords, qui sont trop minces pour supporter les secousses d'une charnière, mais uniquement au corps de l'animal. J'ai vû des limaçons de terre qui portoient de pareils couvercles attachez sur le chignon du col, sorsque le limaçon est en marche le couvercle est éloigné de la coquille, si quelque chose le heurte, aussi-tôt le couvercle se rapproche du trou, & en ferme exactement l'entrée dès que tout est dedans & en sûreté.

Je finis ce qui regarde notre coquillage, en difant qu'il a toute la forme des nautiles ronds qui ont peu de volute par la base; si le nôtre en est un, je doute qu'il puisse nager & s'élever comme ceux de cette espèce, à cause de cette pointe massive qui sert bien de contrepoids pour tenir le coquillage debout & en équilibre malgré la grande cavité du devant, mais qui doit le rendre très-pesant & l'arrèter au fond, ce tera toujours un nautitite ou quelqu'autre coquillage d'une espèce nouvelle.

Observations sur les Lithoxylons ou Bois pierreux.

Je vais parler de pétrifications d'un autre genre que j'ai trouvées dans l'endroit que j'ai cité; la première qui est un lithoxylon, est un fragment d'un tronc d'arbre, qui a un pied & demi de largeur & un peu moins de hauteur, je le pris d'abord pour du vrai bois à la couleur & à la direction de ses fibres, ce ne sont pourtant là que les restes de sa première condition, qui ont encore pour apanage des vermoulures & une feinte pourriture, ces dernières marques témoignent encore l'origine de ce fossile, & que l'arbre d'où il l'a tirée ne vivoit plus, ou étoit bien malade lorsqu'il sut surpris par les écoulemens de la matière pétrissante; cette matière l'a si intimement pénétré qu'il ne reste plus rien du bois proprement dit, qui n'ait changé, c'est à tous égards une vraie pierre plus pefante même que d'autres de pareil volume. Pour m'affurer de son état j'en jetai quelques éclats au feu, je les y sis rougir sans qu'ils s'altérassent, ils ne donnerent ni cendre ni famee, ils s'eteignment des que je

les cus retircz, comme auroit sait une pierre commune, sans

avoir perdu sensiblement de leur poids.

If est aisé de conclurre après cette épreuve que tout ce qui rend se bois inflammable est entièrement banni de notre lithoxylon*, les sels, les terres qui font la pétrification, ont pris seur place, sans cependant boucher les pores sensibles ou les conduits de la sève, ceux mème qu'on n'aperçoit qu'au microscope, les premiers sont bien distincts & bien ouverts, sur-tout dans l'entre-deux de chaque couche; ce sut à ce dernier caractère, de même qu'au tissu lâche des mailles, que je reconnus se châtaignier, ils croissent en esset aux environs; j'allai plus soin, & il me sut aisé de compter ses années par le nombre de ses couches, il y en avoit environ soixante depuis se cœur ou la moëlle jusqu'à l'aubier, mais rien ne peut me saire conjecturer ni se temps ni sa durce de la métamorphose.

Je trouvai encore dans notre lithoxylon une chose remarquable, qu'il a pourtant de commun avec bien d'autres pierres, c'est qu'il est coupé obliquement, & le plus souvent horizontalement, par des veines de caillou blanc sans mélange & assez minces; ces veines traversent & occupent toute l'épaisseur du tronc dont elles interrompent en cet endroit la couleur & le tissu; ces couches de caillou, pour s'introduire, ont entièrement séparé le tronc en plusieurs pièces, sans pourtant les désunir; il est vrai que le lithoxylon est plus fragile en cet endroit, comme je le vis par les fragmens que je trouvai, dont les deux bouts sont toújours ter-

minez par cette veine.

Ces fragmens, au reste, étoient incrustez, seulement du côté de l'écorce, d'un ou de deux pouces de charbon de terre; ils étoient de plus sous un tas de la même matière qui avoit

^{*} Les matières fulfureuses ou 'itumineuses que nous dirons ci après avoir pû servir le véhicule à la matière pérturante, & de lien entre les parties, ne rendent pas pour cela le lith oxyl in inflammable, au mains à un teu ordinaire; ces matières peuvent y être en perite quantité, & outre cela li taxe. & si enveloppées qu'il faudroit un feu de vitrification ou de calcination pour les chaffer & donner quelques vapeurs.

F s iii

414 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE changé de place en s'éboulant, ce qui m'empêcha de découvrir le rette du trone, & peut-être des branches, dans le

même endroit.

Cette croute qui tenoit fortement, indique affez que c'est dans le charbon de terre que la pétrification s'est faite, on voit même qu'il y a contribué de son sonds, puisqu'on en trouve dans l'entre-deux de quelques couches de la pétrification; on sçait d'ailleurs que le charbon de terre abonde en sels, en soufre & en bitume, toutes matières propres à produire cette espèce de transmutation de substance en s'insinuant dans les pores insensibles, en y introduisant comme des véhicules, & y liant fortement la matière de la pétrification; mais comment ce charbon a-t-il donné passage à ces larges couches de caillou blanc qui lui sont étrangères? quel agent a poussé cette matière & lui a fait prendre ces différentes directions presque toûjours en ligne droite, à travers mille obstacles qui auroient dû ou l'arrêter ou la détourner? ce sont des myssères de la Nature dévoilez à peu de personnes, que je n'oscrois entreprendre d'expliquer.

Autre Lithoxylon.

J'ai long-temps hésité quel nom je donnerois à un autre fossile que je trouvai auprès du lithoxylon précedent dans les mêmes tas éboulez de charbon de terre, ce sont dissérens troncons qui ressemblent par le tissu & la couleur au charbon de bois ordinaire, dont ils ont même la légéreté. Je me désiai pourtant de la terre où je les avois trouvez, m'étant déja convaincu que les végétaux n'y séjournoient pas impunément; je jetai au seu ce prétendu charbon de bois à qui il ne manquoit pour en être que de brûler, je s'y sis rougir long-temps, mais mes efforts ne pûrent saire qu'il s'allumât, ni qu'il donnât ou de la cendre ou quelque vapeur, rien ne s'altéra que la couleur qui devint un peu plus claire.

Lorsqu'on catle cette pierre elle paroît au dedans d'un gris de plomb clair & luisant, comme s'il y entroit quelque matiere metallique; par cette couleur du dedans je la pr.s

d'abord pour une pierre que nos forgerons appellent la fille, qui se trouve mêlée dans leur charbon & dont ils ont grand soin de le purger, parce qu'elle s'attache dans la sorge au ser chaud & le casse; cependant notre sossile disfere de la sille en ce qu'il ne brûle point, qu'il est ferme, spongieux & séger comme la ponce; seroit-ce donc un Pumex vegetabilium ater Linnæi? Les Naturalistes ne connoissent sous ce nom que la suie, d'ailleurs la sorme cylindrique de ce sossile lorsqu'il est entier, sa couleur noire, sa ségéreté, ses sibres songitudinales éclatées, quelques morceaux d'écorce qui tiennent à quelques-unes, tout indique une nouvelle espèce de lithoxylon sur du charbon de bois qui a acquis en se pétrisiant, les mêmes propriétés que les pierres ponces qui sortent des volcans, & qu'on pourroit employer aux mêmes usages.

Observations sur différens Phytobiblions, ou feuilles de Plantes pétrisiées.

Dans le voisinage des pétrifications précédentes j'en ai trouvé d'autres d'une autre espèce, tirées aussi des végétaux, ce sont différens phytobiblions ou seuilles pierreuses de plantes, dont les unes sont du pays & croissent aux environs, d'autres sont parsaitement étrangères, & je ne sçache point en avoir vû qui en approchent, dans ce nombre prodigieux du Jardin Royal de Paris, ramassées de tous les coins du monde par les soins de M.rs du Fay, de Busson, & de Justieu; celles du pays ne se confondent point avec les étrangères, & quoique fort près les unes des autres, elles font par tas séparez. Parmi les premières on découvre plusieurs fortes de fougères, des iris, des galliums, des geraniums, des cyanus, &c. dans lesquels non seulement la seuille de la plante, mais encore la tige & quelquefois la fleur font bien représentées, & presqu'aussi conservées que celles qui font vivantes. Il n'en est pas de même, à certains égards, des plantes étrangères dont j'ignore les noms, je n'en ai jamais vu que les feuilles qui sont hautes, larges & minces,

comme celles de certaines plantes marécageuses dans lesquelles on ne voit aucune tige pendant une bonne partie de l'année.

Les plus grandes de ces feuilles approchent beaucoup, seulement par la taille, de celles du musa ou bananier, elses font plus épaisses vers le milieu, où l'on voit une arrête & une gouttière quelquefois affez marquées; j'ai mesuré huit pouces de largeur d'un bord à l'autre, pour ce qui est de la longueur je n'ai pû la suivre dans le rocher au delà de cing ou fix pieds, les nervures qui relevent assez, ont cela de particulier qu'elles ne partent point de l'arrête du milieu, mais de la base à laquelle elles sont perpendiculaires, du reste bien parallèles entr'elles: ce qui caractérile cette plante étrangère & quelques autres que je crois du même genre, c'est que toutes leurs nervures sont coupées à angles droits d'un bord à l'autre de la feuille par des nœuds ou fortes d'articulations, qui sont à des distances très-inégales dans des feuilles de même largeur; cette inégalité de distance entre les nœuds peut constituer différentes espèces, peut-être mieux marquées dans le refle de la plante, ils sont quelqueiois cloignes de trois ponces l'un de l'autre, quelquesois de six ou sept lignes, & cet ordre cil conflamment garde dans toute la hauteur de deux feuilles d'égale largeur.

Il y a une autre seuille articulée comme les précédentes, mais dont les nœuds sont éloignez de demi-pied, elle dissère encore d'elles en ce qu'elle est sur d'autres proportions, ses deux surfaces sont un peu convexes, & l'un de ses bords est plus renssé que l'autre, comme dans quelques-uns de nos iris dont un des bords est tranchant, & l'autre un peu arrondi.

Tous ces phytobiblions se trouvent sur des côtes élevées, sèches, pierreuses & stériles, & ils y sont ensoncez bien avant dans le rocher, des ravines ont emporté les veines de terre qui étoient entre deux à la hauteur d'une toise & demie, & ont mis les pétrifications à découvert; la pierre dans laquelle elles sont incorporées se détache aisément, elle est d'un gris d'ardoise, & semble être sormée d'un limon marécageux;

elle


DES SCIENCES.

elle se débite par lits ou par couches dans lesquelles, quelque minces qu'on les sende, on trouve toûjours des seuillages: on comprend par-là que ces seuilles ont été entassées dans ces espèces d'ardoises: on ne les reconnoît au reste pour des feuilles de plantes que par la sorme extérieure & par leur contour, la structure du dedans est totalement détruite pour s'être trouvé serrée dans les couches voisines; on voit sur ces couches les empreintes du devant & du derrière de la feuille, & on n'enlève qu'avec peine quelques fragmens de la feuille elle-même.

Deux choses fixèrent mon attention en examinant ces pierres, non seulement les plantes pierreuses y sont entassées avec quelque peu de rocher mêlé, mais elles sont ordinairement bien étendues & appliquées sans saire de plis; en second lieu ces couches ou ces différens lits qui portent les empreintes & la plante elle-même, sont posez de champ comme le reste du rocher; sà dessus je ne crus pas trop m'aventurer de juger que ce n'étoit point dans cette fituation que la pétrification s'étoit faite, & qu'elle avoit dû changer de place avec le rocher: en effet, il n'est pas croyable que des milliers de plantes se soient rapprochées les unes des autres en se tenant debout, ou par la base, ou par le sommet, ou par les côtés, car c'est ainsi qu'on les trouve; il est bien plus naturel de penser qu'elles étoient couchées à plat comme tous les autres corps minces & applatis, peut-être ont-elles été entraînées à diverses reprises par des torrens dans quelque mare d'eau, dans quelqu'endroit marécageux où elles auront été couvertes à mesure par du limon qui s'est ensuite durci : ce que j'ai dit jusqu'ici de nos phytobiblions semble établir ce sentiment, la différente position où on les trouve aujourd'hui ne le détruit pas, elle peut seulement servir à appuyer l'opinion de quelques Scavans modernes, d'un bouleversement général arrivé dans la Nature, opinion qui se presente avec un si grand air de vrai-semblance qu'elle approche d'une entière certitude.

Mem. 1743.

C'est-là ce que j'ai pû recueillir pour le présent sur les pétrifications du terrein dont j'ai park, jr ne des spère pas, en y souillant encore, d'y saire de nouvelles découvertes, peut être plus curieuses & qui pourront contribuer à enrichir l'Histoire Naturelle, je me ferai toûjours un devoir & un honneur d'en saire part à la Société Royale.



*EXTRAIT

D'une Lettre de M. Delisse, écrite de Petersbeurg le 24 Août 1743, & adressée à M. Cassini,

Servant de supplément au Mémoire de M. Deliste, inséré dans le volume de 1723, p. 105, pour trouver la Parallaxe du Soleil par le passage de Mercure dans le disque de cet Astre.

J'ai cherché une méthode facile de calculer l'esset des Parallaxes dans les passages de Mercure sur le Soleil, & j'ai trouvé qu'il n'y avoit pour cela que peu à ajoûter à la Méthode que j'ai donnée il y a vingt ans pour calculer les passages de Mercure sur le Soleil, par les seules longitudes & latitudes héliocentriques de Mercure, telles qu'elles se déduisent immédiatement des Tables astronomiques, en imaginant pour cela une espèce de projection du disque du Soleil dans l'orbe de Mercure, ainsi qu'il est expliqué dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1723, p. 108. Voici cette méthode qui peut servir de supplément à mon premier Mémoire, j'y ajoûterai quelques réslexions sur l'usage de ces observations pour déterminer la parallaxe du Soleil, &c.

Je suppose, suivant l'idée de mon premier Mémoire, que le cercle de projection du disque du Soleil dans l'orbe de Mercure vû du centre du Soleil, soit représenté par le cercle SEDT, dont le centre C est le point où répond se centre de la Terre vû du Soleil. Le diamètre SCT représente la section de l'écliptique, à laquelle est perpendiculaire le cercle de latitude OCL; la ligne ELD représente l'orbite apparente de Mercure qui coupe le cercle de projection aux

^{*} Quelques circonflances ayant empêché qu'on n'eût cette lettre entre les mains lorsqu'on finissoit ce volume, & avant le Mémoire de Montpellier, on s'est déterminé à l'imprimer ici à la suite des Observations de cette année, sur le passage de Mercure par le Soleil.

points D, E, qui font ceux de l'entrée & de la fortie du centre de Mercure vûes du centre de la Terre: l'on a aussimené la ligne RCK perpendiculaire à l'orbite apparente de Mercure. Je suppose ensin que par les points D, E de l'entrée & de la sortie l'on ait abaissé sur l'écliptique les perpendiculaires DZ, EY, qui représentent les latitudes hésiocentriques de Mercure aux momens de son entrée &

de sa sortie du Soleil vues du centre de la Terre.

Pour calculer l'entrée & la fortie vûes de quelque point que ce soit de la surface de la Terre, comme, par exemple, de Paris, il n'y a qu'à imaginer autour du point C un petit cercle décrit dans lequel soit enfermée la projection de la Terre, telle qu'elle est vûe du centre du Soleil; le demi-diamètre CP de cette projection sera par conséquent égal au demi-diamètre apparent de la Terre vû du Soleil, ou à la parallaxe horizontale du Soleil. Je suppose que le diamètre PQ de ce petit cercle soit la projection de l'axe de la Terre dont on connoîtra la fituation à l'égard du cercle de latitude OCL, par l'angle que fait l'écliptique avec le méridien : l'on peut connoître aussi la situation des points proposez de la Terre, comme A & B, dans quelque temps que ce soit, en suivant la méthode que M. de la Hire a enseignée pour le calcul des éclipses de Soleit; l'on n'a besoin pour cela que de sçavoir pour le temps donné la hauteur du Soleil au dessus de l'horizon du lieu proposé. & l'angle au Soleil, c'est-à-dire, l'angle du vertical avec le cercle de déclinaison, ce que M. de la Hire appelle l'angle parallactique. Soient donc A, B les deux positions de Paris aux momens de l'entrée & de la fortie de Mercure vû du centre de la Terre. Ces points sont déterminez par la connoissance des angles au Soleil PCA, PCB, & par la longueur des lignes CA, CB, qui sont les parallaxes de hauteur du Soleil par rupport à CP qui mesure la parallaxe horizontale. Si par les points A, B, comme centres, l'on imagine des cercles décrits dont les rayons AN, BM, soient égaux au diamètre CD ou CE de la projection du Soleil, les points N, M, où ces cercles couperont l'orbite de Mercure, représenteront

les points auxquels le centre de Mercure se doit trouver lousqu'il paroîtra de Paris entrer dans le disque du Soleil & en sortir; ainsi pour sçavoir combien cette entrée & cette sortie apparentes arriveront plûtôt ou plus tard qu'étant vûes du centre de la Terre, il ne saut que connoître les parties DN, ME de la route de Mercure, que l'on convertira en temps. Pour en saire aissement le calcul j'imagine par les points A. B, les signes All, Bl, abaissees perpendiculairement sur l'orbite de Mercure, & les signes AG, BF, parallèles à cette orbite, lesquelles rencontrent aux points G, F la signe RCA perpendiculaire à cette même orbite. Cela étant supposé, l'on voit que les angles ACP, PCB, PCO, OCR étant connus, de même que les distances AC, bC, les triangles AGC, BFC, rectangles en G & en F, sont déterminez, & que par conséquent l'on peut connoître seurs côtés AG, GC, BF, FC.

Ajoûtant les côtés GC, FC à la plus courte distance CK, son a les distances GK, FK égales aux perpendiculaires AH, BI; ainsi dans les triangles AHN, BIM, rectangles en H & I, dans les quels on connoît les perpendiculaires sufdites outre les hypoténuses, s'on peut calculer les bases HN, IM: si de HN on ôte HK = AG, il restera KN, qui étant comparé avec KD (moitié de la route de Mercure sur le Soleil pendant son passage vû du centre de la Terre) sera connoître DN; de la même manière si s'on ajoûte à IM, IK = BF, il viendra KM, qui étant comparé avec KE (autre moitié de la route sussité de Mercure sur le Soleil)

on connoîtra ME. Ce qu'il falloit trouver.

Ayant fait ces calculs pour Paris dans le prochain passage, en supposant la parallaxe horizontale du Soleil de 12 secondes, j'ai trouvé que l'entrée y devoit paroître 1'3" plus tard qu'étant vûe du centre de la Terre, & la sortie 25" seulement plûtôt que vûe du centre de la Terre, de sorte que la demeure du centre de Mercure sur le Soleil vûe de Paris, doit être de 1'28" plus courte qu'étant vûe du centre de la Terre.

Cette différence me paroît assez considérable pour y avoir égard; ainst il semble que pour faire un messeur usage

422 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE des observations de ce passage pour la vérification de la théo-

rie de Mercure, lorsque l'on aura déterminé exactement par observation les momens de l'entrée & de la sortie apparentes du centre de Mercure, il seroit bon de les réduire à l'apparence vue du centre de la Terre, avant d'en déduire le milieu du passage d'où dépend le temps de la conjonction, &c. J'ai trouvé sur les mêmes principes que je viens d'exposer, & en supposant toujours la parallaxe horizontale du Soleil de 12", que dans le passage de 1736 l'entrée du centre de Mercure sur le Soleil vûe de Paris, a dû précéder de 20" l'entrée vûe du centre de la Terre; c'est pourquoi si l'on suppose que, suivant l'observation de M. Maraldi, l'entrée apparente du centre se soit saite à 9h 33' 42"1, cette entrée auroit paru du centre de la Terre à 9h 34' 3" au méridien de Paris. J'ai aussi trouvé que dans le même passage la sortie apparente du centre de Mercure a dû arriver 1' 39" - plus tard que vûe du centre de la Terre; ainsi si l'on suppose la fortie du centre observée par M. Maraldi, à oh 16' 37"1, elle auroit dû paroître du centre de la Terre à oh 14' 58", & par confequent la demeure veritable du centre de Mercure fur le Soleil auroit du être par les observations de M. Maraldi, de 2h 40' 55", & le milieu du passage à 10h 54' 30"; au méridien de l'Observatoire Royal.

Les observations exactes du même passage qui auroient été faites dans des lieux assez éloignez, ne pourroient pas s'accorder à moins d'être corrigées chacune par les paral-laxes qui leur conviennent; car l'on conçoit bien que la demeure apparente du centre de Mercure sur le Soleil, doit varier suivant que les pays sont diversement situez, & principalement selon qu'ils dissèrent plus ou moins en latitude. J'ai calculé que dans le passage prochain la demeure du centre de Mercure sur le Sobiil devoit parontre à Petersbourg 15 ou 16 secondes plus courte qu'à Lisbonne, de sorte que si l'on pouvoit s'assurer par observation, de la demeure apparente du centre de Mercure sur le Soleil jusqu'à la précision d'une ou deux secondes, dans chacun de ces deux lieux. L'on

en pourroit conclurre sans autre calcul la parallaxe horizon-

tale du Soleil à une ou deux secondes près.

Si l'observation pouvoit être faite en quelqu'autre endroit encore plus dissérent en latitude, comme, par exemple, au Cap de Bonne-Espérance, la disserence seroit be arce applus grande, elle doit être de Petersbourg à ce Cap de plus d'une minute; de sorte que comme l'entrée & la sortie de Mercure du bord du Soleil se peuvent observer avec la précision de quelques secondes, il paroît que ce seroit un bon moyen pour determiner la parallaxe du Soleil se la darce d'un pareil pussigne ctoit exaclement observée en deux lieux de la Terre sort dissérens en latitude.

Vous sçavez, Monsieur, mieux que personne avec quelle précision on peut observer les momens de l'entrée & de la sortie de Mercure du disque du Soleil, & sur-tout l'entrée totale & le commencement de la fortie. M. Halley a rapporté dans son Observation de 1723, que l'entrée totale de Mercure ou le contact intérieur de Mercure & du Soleil lui avoit paru se faire presque dans un instant marqué par le moment auguel la lumière du Soleil avoit commence à paroître derrière le corps obscur de Mercure; il se servoit de la même lunette de 24 pieds avec laquelle il avoit observé si heureusement le passage de 1677 dans l'Isle de Sainte-Hélène. Le contact interieur lorique Mercure commence à fortir du Soleil, se devroit aussi observer avec la même subtilité au moment que la lumière du bord du Soleil qui est derrière le disque obscur de Mercure, commence à se détacher; ainsi en prenant toutes les précautions nécessaires. l'on peut être fort assuré de l'intervalle compris entre l'entre totale & le commencement de la tertie; mais pour en conclurre la demeure apparente du centre de Mercure fur le Soleil, il me femble qu'il faut avoir egard aux différentes longueurs & qualités des luncttes que l'on emplier en j'ai remarque que dans le dernier paffage l'intervalle du temps que le diamètre apparent de Mercare a employe à fortir du Soleil, avoit paru d'autant plus grand que les lunettes que

424 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE l'on y a employées ont été plus longues, comme on peut voir par la petite Table ci-jointe.

		Terry	s que le	dismètre de Mercure à foreir du Solcil,
de Rologne	de France.	44 1	mpanye	a foreir au Soiett.
	8 P	2'	381	par M. le Monnier à Paris.
TIP	13	2	37 1	par M. Manfredi à Bologne.
	14	2	43 1	oar M. Cathini à Thury.
	14	3	0 1	par M. Cassini de Thury à Paris.
	16	3	61	par M. Maraldi à Paris.
2.2	25 ª	3	161	par M. Vandellius à Bologne.

Il n'est pas difficile de rendre rait on de cet esset des lunettes, car il est très-vrai-semblable qu'il provient de la même cause qui fait paroître les diamètres apparens des corps lumineux plus grands qu'ils ne le sont réellement; ce qui doit diminuer l'apparence des corps obscurs placez au devant d'eux, de la même manière que M. de la Hire a cru que l'apparence de la Lune étoit diminuée dans les éclipses du Soleil: & comme cet effet est d'autant plus grand que les lunettes sont plus courtes, on doit trouver par les plus courtes functics le diamètre de Mercure sur le Soleil plus petit que par les plus longues, & par conséquent le temps que tout le disque de cette petite planète emploie à passer par le bord du Soleil en entrant ou en sortant, doit paroître d'autant plus court que l'on y emploie de plus courtes lunettes, toutes autres choses pareilles. Mais quoiqu'il y ait la diversité que je viens de dire dans la grandeur du diamètre apparent de Mercure & dans l'intervalle du temps de fon passige par le bord du Soleil, cela ne doit pas changer Finn valle de la demoure du centre de Mercure sur le Soleil (, moins que le diamètre du Soleil ne paroisse lui-même de différente grandeur à diverse sorte de lunette, ainsi que j'ai pluteurs raifons de le foupconner) car chacun pouvant déterminer par observation suivant la longueur ou la qualité de la lunette qu'il emploie, le temps que le diamètre de Mercure emploie à sortir, il peut conclurre des deux attituchemens interieurs la demeure apparente du centre.

L'on juge bien qu'il ne faut pas employer dans cette détermination des observations faites sur le tableau dans la chambre obscure, n'étant pas possible de marquer par ce moyen les momens de l'entrée & de la sortie avec toute la subtilité & la dissinction que l'on obtient en regardant directement le Soleil avec de longues lunettes; on peut s'en convaincre par la variété qui se trouve dans le temps de la durce du dernier passage observe de cette minière par dasserns. Astronomes, comme on peut voir par la Table suivante.

Demeure apparente du centre de Mercure sur le Soleil dans le passage de 173 6, par les observations saites sur le tableau dans la chambre obscure.

A	Ingolflat		٠				2 h	43	53"
	Ratifbone par le P. Schreyer.								
Α	Rosloc par M. Beyer	0		0	٠	٠	2	37	3 =
A	Venise par M. Zendrini	9		0			2	38	36

La différence de plusieurs minutes qui se trouve dans ces déterminations, en fait voir l'incertitude, & montre en même temps que l'on ne peut être assuré qu'à une ou deux minutes près, & peut-être davantage, de l'entrée & de la sortie de Mercure qui n'auront été observées que de cette manière, telle qu'est la première observation saite à Paris

par Gassendi l'an 1631, &c.

Il y a encore une chose qui mérite bien l'attention des Astronomes observateurs dans le prochain patiage, c'ell s'apparence de cet anneau lumineux qui a été vû à Montpellier autour de Mercure dans son dernier passage sur le Soleil, avec des lunettes de dissérentes longueurs, mais principalement avec une lunette de 25 pieds. Si cette apparence peut se confirmer par les observations des autres Astronomes, il ne seroit pas impossible d'observer le premier attouchement de Mercure sur le Soleil, puirque vors avez rapporte. Mon sieur, que cet anneau a paru même 6 ou 7 secondes après la sortie entière de Mercure hors du Soleil; mais ils doivent être avertis que pour apercevoir cet anneau, ils doivent prendre la précaution que vous avez indique, qui est d'employer pour cela l'endroit le plus sombre des verres noircis.

Men. 1743.

. Hhh

Pour ce qui est des autres observations que l'on peut saire dans les pusages de Mercure sur le Soleil pendant toute la durée de son apparition, je n'en parlerai pas ici, je me contenterai de saire mention des latitudes appurentes & veritables aux momens de l'entrée & de la sortie, ce que je ne crois pas que l'on puisse observer plus exactement que par le moyen d'un bon micromètre applique a une longue lunette, avec laquelle on meturera la différence de declinaisson de Mercure & du bord meridional du Soleil, d'où il sera ensuite aisé de conclurre les latitudes, &c. Dans le prochain passage de Mercure sur le Soleil la différence de declinaison de Mercure & du bord méridional du Soleil ne sera dans l'entrée que d'environ 2 minutes, mais elle augmentera continuellement, de sorte qu'à la sortie de Mercure cette disférence sera d'environ 14 minutes.

Pour faire un meilleur usage des latitudes observées de Mercure, que je suppose avoir été réduites aux momens de l'entre & de la sortie de Mercure du Soleil, il sant les distinguer des latitudes véritables, c'est à dire, de celles qui auroient été vûes du centre de la Terre, & il seroit bon pour cela d'avoir calculé d'avance leurs dissérences, asin de pouvoir

réduire les unes aux autres.

Il est aite de calculer par les Tables astronomiques les latitudes héliocentriques véritables DZ, EY. Pour ce qui est des apparentes, il taut imaginer par les points A. B. les paral·lèles à l'écliptique AX, BV, & par les points N, M, les perpendiculaires NA, MI qui scront les latitudes héliocentriques apparentes aux momens de l'entrée & de la sortie vûes de Paris. Le calcul de ces latitudes est aisé, car ayant connu, comme on a dit ci-devant, les trois côtés des triangles rectangles AHN, BIM, l'on en peut conclurre les angles ANH, BML. Or l'on voit que si d'une part l'on ajoûte à l'angle ANH l'angle OCR, la somme sera égale à l'angle NAX; & que d'une autre part si l'on ôte de l'angle BMI l'angle OCR, le reste sera égal à l'angle MBV; ainsi dans les triangles ANX, BMV rectangles en X & en V, connoissant

les hypoténuses & les angles en A & en B, l'on en pourra aifement calculer les latitudes heliocentriques apparentes A.V. MV, que l'on comparera avec les véritables DZ, EY,

pour avoir leurs différences.

Ayant fait ces calculs j'ai trouvé que dans le passage prochain la parallaxe horizontale du Soleil étant de 12 secondes, les latitudes héliocentriques apparentes NX, MV, n'étoient pour Paris plus grandes que les vraies DZ, EY. seulement de 12 secondes dans l'entrée, & de 5 secondes à la fortie. Les latitudes vues de la Terre étant encore plus de la moitié plus petites que les héliocentriques. Jeurs différences vûes de Paris ne seront dans l'entrée que d'environ 6 secondes, & dans la sortie de 2 à 3 secondes seulement. Mais quelque petites que soient ces dissérences, il est toûjours bon de les connoître pour y avoir égard, si on le juge à propos, ou pour sçavoir au moins ce que l'on néglige.

Si l'on étoit entièrement assuré que la vîtesse du mouvement de Mercure fût telle que les Tables astronomiques la donnent, il seroit aisé de déterminer la parallaxe horizontale du Soleil par la demeure apparente du centre de Mercure, observée dans un seul lieu, avec les latitudes apparentes de Mercure aux momens de l'entrée & de la fortie. Pour résoudre ce problème par tâtonnement il faudra supposer la parallaxe horizontale du Soleil d'une certaine quantité connue, comme, par exemple, de 12 secondes, suivant quoi l'on calculera de la manière que j'ai dit ci-dessus, la dissérence des latitudes vraies & des apparentes, afin de pouvoir réduire en latitudes vraies les latitudes apparentes observées. Il faudra auffi réduire ces latitudes vraies lycocentriques en latitudes héliocentriques, d'où l'on pourra ensuite conclurre la longueur DE de la partie de l'orbite de Mercure comprise dans le cercle de projection du Soleil, & par conséquent on pourra sçavoir le temps de la durée du passage vû du centre de la Terre, que l'on comparera avec celui de la durce apparente observée; la différence des deux sera connoître la fomme des petites portions DN, EM. L'on calculera enfaite ces memes quantités DN, EM, en employant la même parallaxe que l'on a de a suppote, & il tera aite de voir fi la fomme calculée s'accorde avec celle que l'on a conclue de l'observation; finon il taudra suppoter la parallaxe horizontale du Soleil ou plus grande ou plus petite que l'on n'avoit d'abord fait, & par ce moyen on pourra apres quelques tentatives de calcul, determiner la parallaxe horizontale du Soleil qui convient aux observations proposes, supposé

C'est sur les mêmes principes ou approch uns, que M. Hatley a recherché la parallaxe horizontale du Soleil par la durée du passage de 1677 qu'il avoit observe tort exaclement dans l'Itle de Sainte-Helène, en supposant la latitude de Mercure, suivant les observations de M. Gallet à Avignon, & en prenant le mouvement de Mercure des Tables de Street; mais M. Halley en a conclu la parallaxe horizontale du Soleil beaucoup trop grande, l'ayant calculée de 45 au sieu d'environ

qu'elles futient affez exacles pour une recherche auffi delicate.

12" qu'elle se déduit des observations de Mars.

Je laisse aux Astronomes de l'Académie à juger si ce moyen de determiner la purallaxe du Soleil leur paroit bon, & s'ils peuvent se flatter d'observer les passages de Mercure sur le Soleil assez exaclement pour en tirer cet usage, en attendant qu'ils le puissent faire avec plus de précision dans le passage de Venus sur le Soleil que l'on attend l'an 1-61, dont il n'y a point à douter que les Astronomes ne prositent après l'avertissement que M. Halley leur en a donne. On pourra de la meme manière que je l'ai montré ci-devant, predire d'avance par le calcul toutes les circonstances de ce sameux passage, de la manière qu'il doit être vu des disserver, pour les disseres usages auxquels on voudra destiner les observations.

F 1 N.









